




Smithsonian
Institution
Libraries

Gift of

DR. FREDERICK M. BAYER



VICTORIA NATURALIS
DE PISCIBUS ET CETIS
LIBRI V.

Cum aeneis figuris

IOHANNES IOUSTONVS MED. DOCTOR
conciñauit.

FRANCOFVRTI AD MOENUM

Impensa

MATTHIAS MERIANI.





ILLVSTRISSIMO AC CEL-
SISSIMO

PRINCIPI ET DOMINO,
DOMINO

WILHELMO
VI.

HASSIÆ LANDGRAVIO,
COMITI

CATTIMELIBOCIÆ, DIEZÆ, ZIGEN-
HAINII ET NIDDÆ, &c.

MAGNORVM IMPERII PRINCIPVM, ET
LIBERTATIS GERMANIÆ VINDICVM,
POSTERITATI,

MAXIMORVM REGVM FOEDERATO,
LITERARVM MECOENATI,
OMNIVM BONORVM DELICIO;

PRÆMISSO, DE FELICI AVSPICATISSIMI
CONIVGII INITI CVM CELSISSIMA PRINCIPE
BRANDEBVRGICA SVCCESSV, VOTO:

DEVM SIMVL PRECATVS, VT CELSITVDI-
NEM SVAM IMPERIO ET ILLVSTRISSIMÆ DO-
MVI HASSIACÆ DIVRNARE ET PERENNARE VELIT:

HANC HISTORIÆ NATVRALIS
DE PISCIBVS PARTEM

Humillimè dicat & offert, utque Sua Celsitudo qualescun-
que hos conatus vultu Celsissimæ Familiæ erga literas
fuet, excipere, & se, suaque studia commendata habere
dignetur,

Demisè orat


CELSISSIMO PRINCIPI
Devotus Cliens

JOANNES JONSTONVS M.D.

A 2

PRÆ-

*Franciscus Goaler Aldermanus Giesbroux
& Pharmacopoei Sumus S. S. Biblioth.
S. & Cap. Giesbroux A.D. 1734*



PRÆFATIO

AD LECTOREM.



ECE Tibi Historiæ naturalis specimen, studiose Lector. In piscibus id exhibere voluit Typographus: ego non multum interesse arbitrabar, in quibus daretur; modo & reliqua, quod Deo volente fiet, prodirent. Suscepti laboris tuum mihi commodum causa; cui fortè per diffusa volumina hæctenus incumbere molestum erat. Taceo jucunditatem, quâ melioribus ingeniis; dum inexhaustam specierum naturalium varietatem, & stupendum eorundè genium exhibet, illabitur:

Deum, eruditionem, conversationem, & naturæ imitationem, si respexeris, summè eam necessariam comperies. *Deum* dico. Cultor quotidianus infinitæ Dei Potentiæ & bonitatis esse teneris. Hic Naturæ liber tibi eius post sacrum codicem admiranda aperit. Machinam hęc tantæ vastitæ inveniēs; tantæ & eius partes molis, ut difficile sit judicare, quid magis in stuporem nos agat, infinita partium à se invicem distantia, an tanta earundem in se magnitudo. Videbis aspectu vilia, & tantæ subtilitatis corpuscula, ut nulla planè esse appareant; sed quarum virtutes maximis illis controversiam faciant. Sol centies sexagies, vel ut alii, centies quadragies major est Historico naturali terrâ: tantæ velocitatis idem, ut unâ horâ decies mille miliarium conficiat. Proximum et si terris Sydus, Luna; ab iisdem tamen, dum minimum distat, Lxx. terræ semidiametris; hoc est, miliarium astronomicorum 178698. removeatur: quæ si in nostra miliaria per 52. reduci deberent, quanta quæso distantia non exsurget? Terra & aqua in unum globum redacta; et si gravia corpora, ita tamen in medio aëre suspensa librantur, & ad polos mundi disponuntur, ut ne latum quidem unguem, vel ab oriente in occidentem dimoveri; aut à septentrione in Austrum, vel vice versâ, propelli possint. Pisciculus est Eche-neis, quem Remoram dicimus. At idem, gubernaculo navis affixus, immobilem eam reddere creditur. Ferruginea gleba Magnes. At quæ non miracula eius beneficio patramus? Imbellis populus formicæ: tamen iis Reip. ratio, memoria, cura. *Semina erosa condunt, ne rursus in fruges exeant è terra. Madefacta imbre proferunt & siccant. Et quoniam ex diverso convehunt, alterâ alterius ignarâ, certi dies ad recognitionem mutuam, velut nundinis, dantur.* Exiguum insectum Apis, nec ullius si solo aspectu æstimari debet pretii. At si earum naturâ, Remp. opera excusseris, exclamabis: *rerum naturâ nusquam magis quàm in minimis totam esse.* Infinitæ hæc potentiæ argumenta, quæ Historicus naturalis suggerit. Bonitatem si attendas, grande illius documentum, quod nulla re natura ad conservationem sui destituatur; quod omnes huius universæ partes, singulari nexu inter

xu inter se colligentur, & sibi mutuū ad conservationem totius præstent subsidium: quòd superiora, etsi mole, loco & qualitib. nobiliora videantur, inferioribus quasi inserviant; & denique, quòd cuncta homini tanquam regulæ suo famulentur. Rem se ita habere, per universam corporum naturalium seriem, in Historia deducitur. Bona *eruditionis* nostræ pars naturalium peritia. In eo defudat intellectus noster, ut quænam sit sublimium, elementorum, subterraneorum, plantarum, animalium, hominis denique ipsius conditio, penitus cognoscat. Spinosa illæ de materia primâ, infinito, loco, tempore, motu, generatione, &c. quæstiones huic desiderio non sufficiunt: historia, si exactè instrui velis, consulenda est. Generalia sunt quæ præcipiuntur, & isagoges primò vicem tenent: in adyta, per singularia inducimur. Ab his illa abstrahi, per eadem restringi, confirmari, refutari, nemini ignotum. Nullæ nobis metallorum, lapidum, terrarum, succorum, fluorū, plantar, &c. differentia essent, nisi à singularib. eorundemque inter se comparatione peterentur. Non poterat Aristoteles & ex eo Plinius scribere, *Capita piscibus proportionè corporis maxima: Nulli animali cui cornua exsertos dentes, sed omnibus concavos, piscium omnibus serratos præter scato: Volucrib. nullos præter vespertilionem: Quibus longa crura, iis & longa colla: Cornigera una parte dentata, & que in pedib. talos habent, sævo pinguescere: bisulca, scissisve in digitos pedibus, adipe; &c.* nisi Historiam consulisset. Inde ergo tibi & in hoc puncto necessaria; quod fortè accuratissimè explicatum, ut omnia solet Excellentissimus D. Sperlingius Amicus noster singularis in specialiorib. Physicè, quas adhuc premit, partibusque dabit. De *Conversatione* res clara est. Eo sapius de naturalibus miraculis inter familiares sermones agitur, quo magis ingenia oblectant. Quantum olim apud veteres in conviviis in usu, Plutarchi symposiaca, & Athenæi Dipnosophistæ docebunt. *Naturæ imitatio* summus sapientiæ nostræ apex est. Hæc indigentia humanæ subvenit, opes auxit, ingenium supra sortem mortalem exulit. Deo quasi similes reddimur, dum ipsius naturæ machinamentis usi, eandem, generando, corrumpendo, transformando, provehendo, impediendo, divertendo, resolvendo, seducendo, &c. nobis quasi subiici & famulari cogimus. Ausum est hætenus ingenium humanum, cælum perpetuo & uniformi motu æmulari; ignes perpetuos, deducta quasi astris facce, accendere; ventis, pluviis, iridibus, fulguribus, tonitribus, minari; aërem in unum coactum librare; aquas in declive ire solitas, in sublime propellere; monstra & novas species formare; lapides preciosos fundere; corpora in sua principia, plumbum in hydrargirum, ferrum in liquorem rubiginosum resolvere; arbores argenteas & aluminosas subito producere; plantarum incrementa retardare vel accelerare; easdem in seipsas transmutare; ex cineribus resuscitare; facultate purgativa, & venenata imbuere; ex stupidis, lignis, & mineralibus, Deos, cœlites, heroas, Aquilas, columbas, muscas, mundum adeoque ipsum efformare; iisque animam inspirare; oculum syderib. inferre; exilibus stupendam molem adaptare; Musica affectis varios excitare & sopire; dæmonum denique apparitiones, spectra, & nescio quas *πλυνοςφίας* ad instar Morganæ Rheginæ in freto Mamertino, de qua ingeniosissimus Kircherus, *Artis Magnæ Lucis & umbræ* l. 10. c. 1. agit, mentiri. An hæc absque naturalium cognitione peracta? Falleris. Non potest agricola suum agrum bene proscindere, effringere, tertiare, occare, runcare, farrire: non hortulanus suum hortum plantare, opilio ovibus prospicere; pecuarius pecori subvenire; venator feras sectari; piscator squamigero gregi insidiari; auceps aviculas allicere; &c. absque huius subsidiis si fuerit. Huius beneficium convenientia animantib. Adamus nomina imposuit: & Caini posteritas artes fabriles invenit. Non est ergò mirum, & Salomonem tantum huic studio impendisse, ut de plantis & animalibus libros, quos nos periisse dolemus, Urreta in Bibliotheca Preteganis habere nugatur, scripserit; tan-

tum & Alexandrum M. indagandi Animalium per Aristotelem naturæ sumptum, ut summa ad plura talenta excreverit: tantum & præterito seculo Franciscum I. Gallorū Regem, ut *Gyllum* & *Bellonium*, viros eruditissimos, & quorum quædam in hac materia scripta extant, in remotas Europæ partes, quin Asiæ & Africam miserit. Huius etiam sine dubio admiratione factum, quod præter Reges & Principes, præcipui Philosophi in eam inquisitionem, & posteritati commendarint. Habemus præter eos, quos in Bibliothecis, Alexandrina, Constantinopolitana, Pergamensi, & aliis periisse, dolemus; quique fortè adhuc cū blattis & tineis conflictantur, inter veteres Geographos, Aristotelem, Theophrastum, Dioscoridem, Ælium, Oppianum, Columellam, Varronem, Palladium, &c. & qui omnium instar est Plinium, cuius Solinus simia appellatur; inter recentiores, Gesnerum Germaniæ Plinium, Aldrovandum, Wottonum, Turnerum, Mouffetum, Aricolum, Boëtium, Baccium, Ruveum, Schönfeldium, Freygium, Mathiolum, Tabernmontanum, Bauhinum Ximenem, Bustamantium, Rondeletium, Bellonium, Cæsum, Thevetum, Marggravium, Pisonem, ab Horto, &c. & qui utriusque Indiæ Navigationes scripserunt. Hinc fit, ut sæpè mirari soleam, quod nullam huic Historiæ in Academiis, Bononiensem si excipias (in Wittebergenfi quoque eam cæpit urgere. Cl. Sperlingius) Professionem assignatam videam: & malimus sæpè inter quæstiones de generalibus motibus consensescere, nulli vitæ generi prompti, quam naturæ abdita scrutari, quæ omni inserviant. Et tantū de Historia naturali. De *Labore* meo hæc paucis habeo. Totam me naturalem historiam pertexere constituisse, mihi ad tantas curas Deus vitam producere voluerit, eamque ex vastis illis tam recentium quam antiquorum, Plinii inprimis, Aristotelis, Oppiani, Gesneri & Aldrovandi, voluminibus excerptam, & brevioribus gyris inclusam, ut te quasi scripta introduce emilla præcipue quæ ad naturalium cognitionem spectant omiſſa alii attingere, ne te distraham: ordinem qui mihi videtur commodissimus sequi, ut memoria tua juvetur: Paralipomena ex recentioribus illis inprimis qui Indica nobis dedere, addidisse, ne quid omiſſum esse conqueraris: in descriptionibus authorum ipsorum plerumque verbis uti, sæpè & breviora capita inferere, ne quid secus acceptum occurrat: Authorum loca etiam ab istis neglecta adjecisse, ne te ab his abduci per compendia, imagineris: Figuras & quidem elegantes ut Chalcographus adiiiceret persuasi, ut descriptiones facilius conciperes, & impressam memoriæ imaginem, specie ipse visâ depromere posses. In hoc de Piscibus volumine adjectos quosdam ex Schönfeldio, habebis: Liber verò quartus ex Marggravii, in cuius nimis matura morte, ingentem Resp. literaria jacturam fecit, Historia Brasiliæ naturali totidem verbis depromptus est. Cur ad suas classes reduci non potuerint, dixi. His interim frui, studiose Lector, & ad sequentes nundinas, Avium, Quadrupedum, & Aquaticorum. Exanguium, quæ jam parata, Historiam expecta. Benè vale, & studiis nostris fave. Dabam Lesznæ Polonorum ex Museo, in cureotide Nativitatis Salvatoris nostri, Anno M, D C. II.



HISTORIÆ NATVRALIS
De
PISCIBVS,
LIBER PRIMVS,
DE PISCIBVS MARINIS.

Titulus I.
DE PELAGIIS.

CAPUT I.
DE PELAGIIS SQUALIOSIS.
ARTICVLVS I.
DE ASELLIS.

TAB. I.
TAB. II
I.

a. Varro
l. 4. de LL.
b Oppian. vocant.
l. 3. Halient.

c. Plin. H.
N. l. 9. c. 7.
item. l. 32.
c. II.
d Athen.
Dipnos.
l. 7.



ISCES, qui Latini
Aselli dicuntur,
Græci ὄρες & ὀρίους,
seu ab asinino colo-
re, quod a Varroni
placet, seu à tor-
pore, ut b oppiano,

Genera eorum duo e Plinius, &
d Dorion, faciunt, Callariam & Bac-
chum seu ὄρον quem Gadon alii dicunt,
& Galleridam, ὀρίκος, & μάστιγος; tria
Oppianus, nisi Oniscum pro parvo
sumpserit: Nos eis Asellum nigrum,
Molvam, Morhuam, Gobergum, adjici-
mus, iisdemque Mustelam, & Tincam
socios quasi damus.

Onos, qui nonnullis ὀρίκος, Asel-
lus, Plinio, seu quod Libero Patri sa-
cer, seu ob tumidum ventrem Ba-
chus, Dorioni Gadus, Hollandis ju-
venculus Bolck, adultus Cabellian, di-
citur, magnitudine est insigni, tres e-
nim cubitos sæpe excedit; colore in
tergore, nigricante, ad latera & in

ventre albicante, capite amplo, ore,
ante quod cirrum habet, (radiolū &
virgulam quidam vocant) grandissi-
mo. ἀνὴρροζὸν ὁμοίως τῷς γαλαῖς, e Aristot.
teles dicit, ventre non variegato (ma- H. A. l. 9.
lè Epicharmus apud Athenæum πο-
κίλοχάσορες vocat) sed tumido, ut πελοχά-
σορες legendum sit, jecore maximo.
Degit in alto mari, in aliquo latibulo;
sub f Sirii maximè exortum latitat, f Plin. H. N.
cum alii per summum hyberni tem- l. 9. c. 17.
poris frigus se abdant, sæpe se avenâ Aristot.
obruit, unde forte Sandi apud Boruf. H. A.
fos nomen. Ælian.

Vsus eius in cibis apud Romanos
post Acipenserem commendatus,
hodie apud Septentrionales frequen-
tissimus. Carne est alba & friabili.
quod si mari puro & alimento probò
utatur, carnis bonitate cum saxatili-
bus contendit, si Galeno credimus. Galen. de
Difficilem tamen esse concoctu, vi- de Alim.
rosūq; aliquid habere Diphilus a- facult. l. 3.
pud Athenæum prodidit. Exsiccatus c. 30.
osseam duritiem contrahit, nec nisi
fustibus verberatus coquitur; unde
piscis fustuarii, & Germanor. Stock-
fisch nomen. Sale inveteratus, & sal-
sugine abluta ex nova aqua elixus,
Laberdanus; (Laberdan) in Germa-
niam superiorem deVectus, Rheins-
fisch/ seu Rheni piscis, vocatur.

Callarias seu Clarias, Galaria, Galeri-
da & Galaxia, Hollandis Schelfisch/
Mur-

TAB. I. Murmelio *Piscis capitosus*, Gallis *Mer-*
 2. 3. *lucius*, longitudine plerunque est cu-
 TAB. II. bitali, teres, ventricosus, squammas
 2. 3. habet minutas, in lateribus & dorso
 ad cineritium colorem vergentes. *Caput* maiusculum, & in eo lapillos
 duos oblongos, latum, pressum. *Oris*
 rictum maximum. *Oculos* maximos,
branchias utrinque quaternas, dupli-
 ces; in interiore oris parte post lin-
 guam ossa parte inferna, superna, a-
 spera, & in gula, regione cordis duo
 alia reliquis longiora, quæ obstant ne
 pisces dum devorat, in gulæ angustias
 compulsi, aculeorum asperitate cor
 vulnerent. *Ventriculus* est magnus,
 crassus, superiore parte latus, inferiore
 in acutum desinens, albus, in in-
 ternacapacitate tenuissima ac niger-
 rima membrana obducitur. Pinnis
 natat quatuor, quar. quæ in supina
 parte, ori sunt propiores, quam quæ
 ad branchias. Unicam habere spinam
 ex dissecto se dedidisse Salvianus pro-
 didit. *Interiora* si spectes, *cor*, quod in-
 ter branchias situm est, pericardio in-
 volutum, figuram ossis dactylorum
 exprimit. *secum*, cui sel committitur, est
 album, *intestina* rubent, *uterus* bifidus
 nec admodum longus conspicitur.
 Ex vertebrarum extremitatibus, quæ
 admodum retusa sunt, crassa utrinque
 membrana, scapulæ formam dissecta
 adamussim representans, suboritur;
 quæ capacitatem insignem intus va-
 cuam, extuberantemque adeo efficit,
 ut piscis ipse ventriosus reddatur. *De-*
git plerumque circa cænosa ac her-
 bosa littora. Gobionibus, atherinis, &
 marinis reiectamenris vescitur. Car-
 ne est candida & friabili.

Aldrovand.
 l. 3. de
 Piscib. c. 3.

Huic similis est quidam, quem Ve-
 neti *Pisces mollem*, Romani vulgo *Fi-*
cum, Galli *Merlangum* vocant. Albus
 est, argentei coloris, mollis, squammis
 tam parvis, ut visum fugiant, tectus,
 oculis magnis, argenteis; ore medio-
 cri, dentibus in maxillis, parvis, albis,
 acutis, ordinatis. In capite calculos
 oblongos habet. *Pinnas* ipsi tres inter-
 gore, duas ab ano ad caudam, in late-
 ribus ad branchias utrinque unam,
 Bellonius tribuit. Spina tergoris se-
 xaginta vertebrae constat. linea à
 branchiis ad caudam sinuosa ducitur.

Ventriculū habet magnum cum multis
 appendicibus. *Epar* ex candido rube-
 scens, vulvam bifariam secundum
 Rondeletium, quadrariam secun-
 dum Bellonium divisam. Ascendit
 sæpe ex alto ad littora, & Aphyis, Ca-
 ridibus, Gobionibusque, quos inte-
 gros devorat, pascitur.

Gallia tam frequens est, ut à carnis
 levitate, vulgari proverbio locum fe-
 cerit. Hominem duodenis merlan-
 gis probè pastum, minore ab his pon-
 dere in cursu fatigari, quàm si senos
 tantum *Zonæ* appensos gestaret.

Asellus NIGER Anglis ideo *Coll-*
fisch à carbonibus sic dictus; squam-
 mis est latioribus, tergore nigrican-
 te, ventre candidiore. Linea à capite
 ad caudam atra, & ad latera aliquan-
 tulum inflexa producit. pinnæ reli-
 quis sui generis piscibus duriores &
 robustiores sunt. Parvus carnem ha-
 bet planè insipidam, profectus habe-
 tur in pretio.

Asellum virefc. v. Tab. 46.

ARTICVLVS II.

De Molva, Morhua, Mustela,
& Tinca marina.

MOLVA, Rendeletio *Asinus va-*
rius, & *Molva maior*, dorsum ha-
 bet cinereum multis maculis nigris
 conspersum, *ventrem* candidum fal-
 catum, *pinnas* in dorso tres, à podice
 unicam, duas ad branchias, duas in
 ventre. *dentes* in maxillis, internas
 partes Asino similes.

Morhua seu *Molva altera*, Anglis Aldrovand.
 Morchuel, plerumque est sesquicu-
 bitalis longitudinis, pedis unius. *O-*
s l. 3. c. 6. ipsi magnum, *dentes* in maxillis, *oculi*
 magni. Ex inferioris maxillæ extremo
appendix carnosa cœu pilus è barba
 propendet. *Pinnæ* ad branchias & in
 ventre binæ, parte prona tres, à podi-
 ce duæ conspiciuntur. *Dorsum* cine-
 reis fulvisque maculis notatur. *Venter*
 est falcatus. Caro coctione propter
 humoris tenuis consumptionem, glu-
 tinosior, ut farina aqua diluta, & sac-
 charum *dissolutum* evadit, butyro im-
 mersa adeo digitis adhærescit, ut vix
 inde avelli possit. *Intestina* & folliculi
 ichtyocollæ conficiendæ inferviunt.


Gober-

Tabella. I.

Asellus. Cabotau.
Bolch.




Callarias. Asellus minor.
Scholtzisch. Rheinfisch.




Asellus alter sine Merluccius.

Ein ander art Scholtzisch.



Mustela.


Meer Trüsch



Hippurus. Rödskopff


12

Sinca marina.
Meer Schleye.




Har engus

Hering




5




Siparis. Schmalz fisch.

7



Aper
Meerobber



8



Scolopax. Meer Schnepf

10

Monoceros.
Meer Einhorn.



Glaucus.
Meer Stichleng.

11




Asellus.

Cabeliau.

1


Tabella. II.



Asellus minor.

2



Gulleken.



Asellus mollis.

3

Wijtingh.




Asellus alius.

4



Reuersus

indius Anguilli formis.



5


Malva. ein art stockfisch.



6

Rutilus


Vrff. Cyfle.



8

Coruulus.

raplein




7

Salpa.


Stockfisch.

10



9

Coruulus. räplein andre art.



Gobergus duorum cubitorum magnitudinem superat. Colore est cinereo, ventre falcato, ore sine dentibus mediocri partibus internis Merlucio similis. Carne duriore quam A-

TAB. I.
4.

finus. Quem Mustelam Genuenses vocant. Illyrici *Pegorellam* dicunt. Belonius Aristotelis & Galeni *Callariam*, Rondeletius *Asellum* veterum esse opinatur. Trium interdum palmarum est longitudinis, cruris humani crassitie, colore exlivido inopacum abeunte. Duas in tergo pinnas gerit, minimo capiti vicina est, præter has alia ad caudam usque protenditur, ad latera utrinque una rotunda, ut & cauda visitur, sub quibus postremis crassiores ac carnosius quidam cirri bifidi conspiciuntur. Maxillæ ipsi mobiles. Dentes confusi, in superiore labro, maculam, cordis figura, denticulis circumfultam, linguam albicantem & in cuspidem efformatam ostendit. Branchias distendit utrinque quatuor. Interiora si spectes, sub branchiis cor delitescit triquetrum, bursâ suâ involutum, hepar pallidum ac ferè lacteum in tres lobos divisum, diaphragmati appensum. Sinistra eius pars, cæteris maior, vesiculam fellis oblongam admittit. Lien prægrandis sanguineus, gracilis, oblongus, pastorum instrumentum, cui cornutæ Musæ nomen referens, à ventriculo dependet. In pyloro, triginta & aliquot apophyses numerantur. Intestina tribus revolutionibus circumflectuntur, priusquam rectum attingat. Vesicula quædam cæteris Asellis communis, gemino velurifolliculo tergori coniuncta, commodum nationis usum exhibere creditur.

TAB. I.
5. Tinca marinâ, propter corporis cum palustri similitudinem sic dicta, *Pescesco* Italice quod passificus instar mollis sit, vocatur. Salvianus *Asellum* *Callariam* esse sed falsò, contendit. Vix pedalem mensuram excedit. Corpore est toto oblongo, latiusculo, squammis minutis contexto, coloris cinericii. Capite, in quo duos lapillos gerit, lato & presso. Oremagno, &

valdè denticulato. Oculis aureis. Ex inferiore maxilla appendix cum barba propendet. Branchias habet utrinque quaternas, & ad eas binas latiusculas pinnis, unam scilicet utrinque. Ex anteriore ventris parte pinnarum vicebini longi admodum atque rotundi cirri propendent. In primo dorso pinna parva erigitur, post eam alia una enascitur, per dorsum totum ad caudam usque extenditur. Inferiori ventri singularis pinna ab ano orta, ad caudam etiam usque producta, subnectitur. Cauda in unicum rotundam definit. Hepar magnum & subalbidum visitur.

Caro concoctu est facilis, sed excrementitia.

ARTICVLVS III.

De Harengo, & Lipari.

Piscis, quem Germani HAREN- Aldrovand, GYM fortè à Græcorum *πέρχνη*, l. 3. c. 10. quod salsamentum sonat, alii Halecem vocant, qui apud antiquos sit & vocetur, ignoratur. *Chalcidi* marinæ seu Sardinæ quidam congenerem faciunt. *Thriassis* sive Alosis nonnulli.

Dorso est quodammodo cæruleo, ventre albo falcato, squammis acutis, pertinaciterque hærentibus. Branchiarum scissuram, quia pro corporis ratione magnam habet, citissimè aqua extractus emoritur. Jeiuno duntaxat intestino instructum Albertus author est.

In Oceano Germanico circa Britanniam, Hiberniam, Scotiam, Norvegiam, Daniam inveniuntur, in Mediterraneo quoque capi, & Romæ, Massiliæ, Venetiis proflare falsò Belonius prodidit, formæ similitudine, quam cum Trissis habeat deceptus. Puro aquæ elemento Nutriri voluerunt quidam, quod in aëre protracti in momento expirent. Magnis simul agminibus natant, & tanta ipsorum copia, ut ad ccm, coronatorum in singulos annos capturæ precium ascendere Cardanus prodiderit. In terra sancta Oceanici maris Insula rim, hominum vitam harengis sustentabant.

Cum per petulantiam unam ex captis virgis cecidissent, adeo eorum numerus est imminutus, ut post illa vix centum ex eo quæstu vixerint. Lucet in aqua, ventribus versus summum æquor, obverfis. imò tantum de se splendorem, squammis maxime quæ circa oculos, emittunt, ut mare fulgurare videatur. Lucem emoriente mori, credidere quidam, per aliquot post mortem superesse dies, quidam experti sunt. Semel anno teste Alberto pariunt.

Caradenus in Brigantibus. Lanfius de Principatu Europæ. Mira de eorum natatu prodita sunt. Proavouum tempore ad Norvegiam sua quasi stativa habuerunt, nostro tempore Britanniam totam immenfis exercitibus circumnatant. Circa solstitium æstivum ex alto Scotiae littora petunt: inde Anglica littora adeunt, & ab Augusto medio ad Novembrem à castro Scarborough ad Thamesin capiuntur. Postea aliqua vehemētiore procella in Britannicum mare deferuntur, & in eo ad Christi natalitia piscantibus se offerunt. hinc Hiberniam utrinque pernatantes, in Septentrionalem Oceanum, circumnavigata quasi Britannia, se transferunt. & ibi ad Junium occultantur. postquam fretificavere, redeunt.

Vfus ipforum in cibis, apud Septentrionales frequens. Recentes, muriæ conditi, & exsiccati, mensis inferuntur. Solent & saliti aqua macerari: salugine deposita, in craticula affiuntur. Conspēcta in novo orbe volantium nubes. *Miseræ horum*, inquit

Thuan. Hist. l. 117. Thuanus, *conditio, quibus nec in mari natantibus, nec in aëre volantibus, tutus unquam receptus, naturamque in utroque elemento novercam experti, cum ut se à perniciæ cognatorum piscium asserant, in altum evehunt, mox ab avibus circumvolantibus rapiuntur: quarum si rostrum fugiendo evaserint, a refectis alis deficientes, rursus se in aquas præcipitant, & volando fessi, à piscibus in festis glutuntur. Itaque mediam sortem eligentes plerunque in obvias naves involant, & præda hominum fiunt.*

Plin. H. N. l. 32. c. 12. Liparis piscis à Plinio memoratus, à pinguedine, quasi λιπαρός nomen in-

venit. *Capite terrestrem curriculum* TAB. I. refert. Os ei parvum, sine dentibus; 7. maxillis asperis. virga à capite ad caudam satis lata. *Squammæ parvæ. pinne* ad branchias & in ventre binæ. alia à podice ad caudam, alia à cervicis loco ad eandem continua sine aculeis.

Cauda in duas definit. Adeo pinguis est, ut sub cute pinguedinē loco carnis habeat; asservatus, totus in oleum abiverit.

ARTICVLVS IV.

De Apro Scolopace & Monocero.

APER Rondeletii, quem ille cum TAB. I. 8. Aldrovand. l. 3. c. 12. de Piscibus. Apro veterum eundē, se falsò ut Aldrovandus ostendit ponit, piscis est squamosus, ferè rotundus, compressus corpore præduro; & aspera veluti ac villosa cute prædito, rostro suis instar, oblongo & obtuso, sine dentibus. *aculeis* præacutis, duris, longis, rectis. fetas inæquales esse dices, qui mox à capite secundum dorsi longitudinem decurrunt. *Pinna*s habet ad branchias duas, in ventre duas alias, multis firmisq; aculeis & à se disjunctis constantes. à podice tres aculeos breves & acutos. Cauda in unam pinnam definit.

Iconem porci supini Salviani tradit Tab. XXXI. l.

Qui Rondeletio SCOLOPAX, seu TAB. I. 9. Ascolopax est, hunc alii *Elephantem*, sed perperam. rostrum enim rigidum est; Gesnerus *Serram* Plinii quod radium caudam versus ferratū habeat, nominat. Semper ferè parvum esse, exinde coniicit Rondeletius, quod tres eiusdem magnitudinis ovīs distentos viderit.

Corpore est rotundo, Erythrini modo rubefcente. *rostro* prælongo, rigido. In dorso habet *aculeum* longū durum, præacutum, altera tantum parte ferratum. denticulis ferrā referentibus, utpote contiguis basibus quæ latiusculæ sunt. *Cauda* habet tenuem.

Caro ei substantia Pagro similis. bonifucci & facilis concoctionis. Cum rarus sit, exsiccatu potius servatur, quam editur.

Monoceros Clusii, ob consimilem TAB. I. potius 10.

potius cum Sclopace formam, quam ut quod inter squamosos censeretur debeat; aspero enim corio est; priori subiungitur. Ex orientali India allatum Clusius ita descripsit. Ab extimo ore usq; ad caudæ pinnas, paulo longior erat tribus unciis, medio corpore paulo plus uncia latus, &c.

ARTICVLVS V.

De Glaucō veterum & Hippuro.

TAB. I. **G**LAUCVS piscis à colore cæruleo seu Cyaneo ita dictus, ὑπόλευκος interdum à Græcis teste Eustachio, dicitur, & benè à *Glaucisco*. cum ille æstate lateat, si Aristoteli & Ouidio credimus; hunc æstate & hyeme Damoxenus Comicus in cibis laudet, distinguitur. Mnesitheus apud Athenæum inter ἰμνιτῶν, Volaterranus ferariorum & carnivororū genera, eum ponit; Aristoteles squamosum facit, & paucas appendices supernè circa ventriculum exeuntes habere adjicit. Plinius austero & irascenti mari simili colore, esse prodit.

Plin. H. N. l. 9. c. 36. Apud Rondeletium tres ipsius habemus species. Prior provincialibus *Cabrolle* dictus, tricubitalis quandoq; corpore est longo, ventre compresso, dorso falcato, cæruleo, cute nitida, squammis vix apparentibus, ni cutis exsicceetur. ventre cādidissimo, maxillis asperis potius quàm dentibus munitis. Statim à capite aculeos habet; quorum duo qui juxta anum sunt, velut in vagina conduntur. Aculeos pinna sequitur, ad caudam usq; continua, initio magna, maculā nigrā notata, inde brevis & tenuis, tenuibus quasi villis constans. Ad branchias pinnae aurei sunt coloris, pro podice rimam potius quàm formam fortitus est. Ventriculum habet magnum cum uno appendice. Vesica fellis intestino adhæret. Splen parvus, caro candida & pinguis visitur. Salvianus *Amiam* veterum esse credit, Jovius centrinam quibusdam videri dicit.

Alter minor, unde γλαυκίδιον apud Athenæum esse conjicit, septem aculeos in dorso, ad caudam spectantes habet; à superiore branchiarum par-

te ad medium corpus linea tortuosa admodum dimittitur, hinc rectā ad caudam protenditur.

Tertio quem *sinuosum* vocat, quod linea à branchiis ducta, serpentum corporis flexibus gradientium instar tortuosa sit, dentes sunt acuti, dorsum ex cæruleo nigrescit,

Locum in petris etiam & arenis pasci Oppianus scripsit. Numenius apud Athenæum κατὰ μνία σταλάσεια, id id, per algas molles, fluctibus minimè agitata & muscum versari, tradit. Aristoteles, & Athenæus pelagium fecit. Cibus quidem ipsi, carnes. Sed nec algam vel muscum contemnit. Unde Tarentinus escā ad Glaucos capiendos præscribens, partem ex musco & farina, partem ex piscium carne componit. Fœtum suū ore, ubi metuit recipere, iterū emittere, tradidere quidam; quia spinosus est, de Glaucō Galeo sumendū id videtur: sanè solū ex Galeis Acanthiā fœtus suos propter spinam non recipere, author est Aristoteles. Æstate circa 1x. dies nō conspicitur. Plinius alibi dictor. immemor, nunquam apparere scripsit.

Vfus ipsius expetitus in cibis, siue uterum gerat siue non. Caput tamen potissimū, apud Anaxandridem, Sotadē Comicū, in primis si in Olyntho, & Megaris captus esset, cōmendabatur. Eustathius palmā oculis tradit. ut ut sit, difficulter si Tralliano & Mnesitheo credimus, concoquitur. Concoctus permultūimenti præbet. Ex jure sumptū seu Glaucum seu Glauciscum, copiam lactis mulieribus facere, Plinius Author est.

ARTICVLVS VI.

De Hippuro & Reverso Indico.

HIPPURUS seu à similitudine equinae caudæ, seu ἵππο ὅτι ἴσως δίκην ἔχει, quod equi more feratur & saliat, ita dictus, aliis ἀγρεύτης ab agnis saltus urinantibus similes exercentibus, Dorioni & Epeneto κορυφαῖον, à pinna quæ à vertice incipit, in eoq; veluti cristā erigitur, Hicefio *Hippurea*, Hispanis *Lápugo*, Gazæ *Equilis* vocatur. Glaucō colore internisq; partibus si-

milis est, & facilè inter cæteros pisces ex pinna quæ à capite incipiēs in pro-na parte ipsi unica est, & caudæ equi-næ simillima, villis multis constat, cuiusmodi in nullis aliis piscibus reperitur. Véter in medio corpore situs est.

Aristot.
H.A.I.9.
c.10.

Degit in pelago, mari Mediterra-neo ignotus. Carystius ab Archestra-to maximè celebratur, quod mirum, cum cæteri ibi pisces viles sint. Dele-ctatur carnibus, & nassis inclusus tât-opere crescit, ut inde incrementum cepisse videatur. Vere parit. hyeme latet. in natatu celer est, & nunquam nisi certis diebus capitur.

TAB.
III. I.
Clusius
Exot. l. 6.
c.18.

REVERSUS Indicus duplex est, An-guilliformis alter, de quo inferius di-cemus: alter, de quo hic, squammosus. Nomen inde, quod retractus vene-tur, accepit. Magnitudine est palmi. Squammis contegitur rugosis, spinis in dorso, & ab umbilico ad caudam maximè acutissimis. Docilis est, & fa-cilè cicuratur. Magnam Indis in ve-nandis piscibus præstat operam. Te-nui sed valido funiculo alligatus ad mare deferitur, blandis animatus verbis in piscem conspectum, etiam magnum, emittitur, eiusdemq; lateri seu ventri sese affigit. sic extrahitur. Præda blandè avellitur, ne, quia vali-dè adhæret, descerpta intereat.

Niremberg.
Nat. Exot.
l. II. c. 18.

REVRSSVM Indicum anguilliformem
vide Tab. II.

CAPUT II.

De Pelagiis Lævibus.

ARTICVLVS I.

De Thunno.

THunnus, seu à Græcorum Θύνειν, quod est magno impetum moveri, seu ab Ebræorū ἄ Thannia, quo Ce-taceum piscem intelligunt, sic dictus, multa apud Authores pro diversita-te ætatum sortitur nomina. Thynnus seu Thynna simpliciter sive mas est sive fœmina, Pelamyde major, Thun-no propriè dicto minor. b Cordyla appellatur partus, q; fœtas redeuntes in mare autumno cõitatur, Byzantii αὐξιδας, ὅτι τὸ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις αὐξάνει. ut testatur c Aristoteles, seu quod

a Aldrov.
l. 3. 18.

TAB.
III. 2.
3. 4.

b Plinius
H.N. l. 9.
c. 15.



c. Aristotel.

paucis diebus augefcent (Gaza Au-H.A.I.6. xum vocat) dicunt. Redux in Pon-c. 16. tum ex magno mari Cordyla, Pelamy-dis nomen, seu ὅτι τὸ ἐν τῷ πηλῷ μένει, i. e. quod in limose abdat, seu ὅτι τὸ πέλειν αἶμα, quod gregatim degat, ut d Plutar-cho placet, (Limosam, Limariam, & Lu-de solert. tariam alii vocant) sortitur. Pelamy-des cum annum excessere tempus, Thunni vocatur. hisce paulò maiores Tritones. e Orcynus, Apolectus, Sarda, e Aldrov. Synodontis, Cybia seu Cybios, Cete, Melan-l. 3. c. II. drys, Triton, Chelidonas, Xanthias, pro-priis suarum appellationum rationi-bus non carent. sed & variis eorum sale asservatis partibus, singularia no-mina iudica, apud Authores inve-nies.

Lubricos eos Plinius facit. f Ron-f Rondelet. deletius suum Orcynum, ut & eum in Hist. quem Pelamydis veræ seu Thunni Pisc. Aristotelis nomine exhibet, squam-mis magnis ita ad amussim compa-ctis, ut iis carere videatur, regi, co-ctione easdem dehiscere, tuncque perspicuè apparere tenui membrana contextas, scribit. Pelamydem verò Sardam cute levi esse, & sine squam-mis, ea parte, quæ à pinnis ad bran-chias sitis, incipit excepta, adjicit. Sed nec vel de sexuum notis; vel de Pe-lamydum, & Thunnorum differenti-itiis inter Authores convenire vide-tur. f Aristoteli g Plinio & h Athe- f Aristot. næo mas à fœmina eo distinguitur, H.A.I.5. quod hæc sub ventre pinnulam ha-c. 9. beat ἀφαγεὺς dictam, quæ mas caret. g. Plin. H.N. l. 9. Rondeletius in utroque semper pin-nam sub ventre deprehendit, indi-h Athen. visam in mare, divisam in fœmina, ut Dipnos. l. podicis foramen dilatari, fœtusque commodius in lucem edi possit. Ligu-res & Massilienses piscatores nun-quam ex Pelamydibus Thunnos fieri apertè ostendisse, author est i Sca-i Scaliger. liger: à Pelamyde hoc unum distare in Exerci- Thunnū, q; hic sit lividus lateribus, tat. illa undâribus maculis trāsversis atq; obliquis eidè destinato gerat, asseret k Bellonius. Captus An. M. DC. LXV. k Bellonius circa Gaditanum fretum, pedem cit. Aldrov. xxxii. longitidine, latitudine xvi. in cuius pelle integra classis delineata conspecta est.

Parusius Indicus
squamosus

Tagfisch. Tab. III




Pelamis Carulca




Oreomus

Waldthun.




Pomilus


Einseit fisch.



Amia

Siebt thunn





Oppian. *Locus* Thunnorum varius pro parte esse videtur. *Oppianus*, qui eos piscib., pelagiis annumerat, ex Oceano in mare Mediterraneum, cum ve- read sobolis propagationem instigatur, venire, ideoque tum plurimos in Tyrrheno & Iberico capi, author est; mense Majo Xiphiis cogentibus ir-rumpere, Jovius adjicit. Pelamydes æquora fluvio aut paludi vicina incolere, ideò in Pontum ad dulciora pa-bula gregatim intrare, ex Plinio *m* habemus, ibidē, ut & in Mœoticis pa-ludibus nasci, * Strabo retulit. te-pore gaudere ideò per summa maris natate, aliquando flumina subire, ex *Geogr. l. 7. n* Aristotele discimus; Vifos qui Aga-thopoli ad pontem usque, qui aliquot millib. passuum à mari distabat, con-scenderent, o Rondeletius prodidit. sed & in Rheno, Nilo, Pado, Platina scripsit. in algolis quibusdam locis. Gaditanis extra Herculis columnas sub solano vento cò delatis, ingenti numero, magnitudine & crassitie in-credibili, occurrissē, Admiranda A-ristot. *p* vèditant. Vix credēdū Thyn-norum multitudinē in Indico mari tantum, ut Magni Alexandri classis haud alio modo, quàm hostium ac-cie obvia contrariū agmen adversa fronte direxerit q apud * Pliniū legi-mus. Græci scriptores enim Cete & Phytiteres fuisse innuunt. De eo-rum circa Byzantium & captura & mora ita q Strabo, &c.

Strabo *Geogr. l. 7.* *Cibus* eis aliquando r alga; sæpē, circa Hispaniam inprimis, (ex ante-riore * ad columnas delati pelago, esca deficiente macerantur) glan-des. ex quercubus ad mare nascen-tibus s delapsæ quibus vehementer pinguescunt. & ex harum ubertate, ubertas Thynnor. colligitur: ut plu-rimum caro. Tepore foeturæ r quic-quid attigerint, liguriunt. quin & partu soluto, ne propriis quidem par-cunt natis, sed læti tempore veris n

Ova vorant subito, & lacerant sub dentibus atris. aliquando præ pingue-dine rumpi x Aristoteles author est.

Vitam ad biennium duntaxat pro-ducere, quod y Plinio ex Aristotele placuit, vix verisimile videtur. Ad tantam enim excresecunt magni-

tudinem, ut xv. talenta pendeant, caudaque duo cubita seu ut apud z Aristot. Aristotelem extat, quinque palmum H.A.l.8. latitudine, expleat, & visi capi, quos c. ult. corporis magnitudine, squammarum crassitie & corporum duritie bien-nio multo provectiores fuisse fateri oportuerit.

De *Generatione* habemus, Thun-nos coire mense * Februario post idus Junij initio parere a semel, & quidē b a Aristot. in Pōto Thunnos, bis credi, quia par- H.A.l.5. tim tempestivus partim cordus eius c. II. editi. foetus est. prior soboles mense De- Scalg. cembriante brumam exit, posterior b Plin. vere. Ova edunt quasi in utriculo. Ex H.N.l.9. his fiunt, quas Scordulas vocant, By- c. II.5. zantij Auxiadæ quod paucis diebus Oppian. auferant. Halient. l.4. v. 505.

Exeunt Autumno cum Thunnis Vide Op- simul, verno autem tempore repe- pian. & tunt, jam factæ Pelamydes. Quan- Scalg. p. tum ad animales functiones, concessit 234. & istis singularia quædam Natura. Dromades esse, seu ut Gaza reddit cursores, ex superioribus cognosci potuit. Non vagantur tamen a bru- a Plin. ma; ubicunque deprehensi usque ad H.N.l.9. æquinoctium, ibi hybernant. Ex Pon- c. II. to exituri lævam tenent, & Aquilo-nem operiuntur, ut secundo fluxu exeant. ingressuri eundem, ad dex-tram flectuntur, quia dextro oculo plus cernunt, utraque natura hebe-te. Eadem b debilitas in causa, quod b Plin. ad saxum illud miri candoris, à vado H.N.l.5. ad summa perlucens, quod in Euripo Thracii Bosphori, quo Propontis Euxino iungitur, in ipsis Europam A-siamque separantis freti angustiis, juxta Chalcedonem in Asiæ littore visitur, exhorrescant, & sic repente territi, ad versum Byzantii promon-torium, ex ea causa appellatum Auri cornu, præcipiti petunt agmine. No-tu proficisci & vetustissimum Am-phylii vatis apud c Herodotum ora- c Herodot. culum, & nummus à d Bellonio vi- l.2. Histor. sus, in quo altera parte spica, altera d Aldro- Thunus cōspiciebatur, & supra hūc vand l.3. do Luna cū inscriptione PHILIPPENZE, piscib. c. 18. innuit. nec de nihilo est, quod Plinius, postquam e dixisset, capturam illo- e Plin. rum à vergiliarum exortu ad arctū- H.N.l.6. ri occasum durare, reliquo tempore B 3 hyber-

f Plutarch.
de solert. A-
nimal.

g Ælian.
H.A. l. 15.
c. 3.

h Aristot.
H.A. l. 4.
c. 10.

i Oppian.
Halicut. l. 2.
c. 5.

hyberno latere in gurgitibus imis, nisi tepore aliquo evocatos, aut pleniluniis, adjiciat. In natando figuram cubicam, si gregatim vagantur, fervant, atque sex lateribus cōprehensī, soliditatem ex semetipsis constituunt. Ad promontorium g Bubonicum, maximi, suum instar, soli vagantur. alii more luporum bini proficiuntur. nonnulli more caprarum, gregatim pascuntur. Ex oriente canicula, in Euxinum natāre contendunt; & marinis fluctibus, & fervidē radiato sole calefcentibus, inter se velut contexti, confertis turmis sese invicem opacant. *Dormire h* in imis gurgitibus, sub saxo aut litore abditos, i Aristoteles prodidit; & quidem tam profunde, ut ne jactā quidem fuscinā, moveantur. Sub Caniculæ exortum æstro exagitantur. Hæret ille ubi cutis tenuior, sub pinna, & ita miseros divexat, ut sæpē in terram ἀσπασιν τε, saliant, sæpē in naves se conjiciant.

De *Sympathia & Antipathia* non est quod multa dicam. Dicuntur Cephos habere comites, qui carunculas pisciculorum, à Thunnis discerptorum, aquis innatantes, depascuntur. Cum gregatim præter Italiam acti elabuntur, à Sicilia prohibiti, in majores incurrunt belluas. Majo Mense à Xiphiis ex Atlantico Oceano in mare mediterraneū pelluntur. Non aliter ab iis gregatim in fugam agi, quàm ovium greges à lupis Mathiolus auctor est. De captura Thunnorum agere alterius loci est.

k Plin.
H.N. l. 9.
c. 15.

Vsum reperere in *Cibis*. Olim membratim cæsi k cervice & ab domine (τασσηλαίας Athenæus vocat) commendabantur, atque clidio (clidia Thyum Festus, Petimen ex Nævio Petimen piscinū, quod est inter duos armos ad pectus, claviculas Medici vocant) salitis, Omotarichi nomen impositum est) recenti duntaxat, & tum quoque gravi ructu; cætera parte plenis pulpamentis asservabantur. Melandria vocabantur, cæsis quercus affulis, simillima. Vilissima ex his, quæ caudæ proxima ααρία dicebantur, quæ pingui carenti hinc ἀπρόων nomen, probatissima, quæ faucibus, Pelamides in apolectos, particulatim-

que confecti, in genera Cybiorum (sic dicuntur seu falsamenti frustra quæcunque in formam κυβοειδῆ dissecta; vel quæ ex dorso partibus cerviciclidioque proximis) dispertiebantur. Alexis caput, cōmendabat, caudam Antiphanes. Falconius Hetruscus eruditioris gulæ ganeo, novum & sapidissimum obsonii genus ex iis commentus est. Athenæus ἐμυττώτω (intritum hoc, ex aliis & aliis condimentis) aliis piscibus prætulit. Alii falsamenta, quæ θυνναῖα seu θύνια potius, quàm recentis piscis quamlibet partem præferunt. Sunt quippe Xenocrati apud Oribasiū stomacho incepti, mali succi, flatulenti, ad excernendum difficiles. Galeno, durā carne præditi, & insuaves. Archestratus tamen nobilem Thunnum circa Byzantium, Carystum & Siciliam; præstantiorem circa Cephalem & Tyn-daridem oram; præstantissimum circa Hipponium Italiæ, nasci, circa Samum ingentem, & deorum conviviis dignum capi, prodidit.

Præbent & in *Medicina usum*. San- m Plin. guis, m fel, & jecur, sive recentia sive H.N. l. 32. servata, vim psilothri obtinent. Non c. 10. pubesciturum, qui in pueritia iis illitus est, n Ælianus affirmat. Omota- n Ælian. richus o largius sumptus, Presteris H.A. l. 13. serpentis venenum retundit. Cybio- c. 27. rum cinis, cum melle ad Condyl- o Dioscor. mata confert. l. 2. c. 30.

ARTICVLVS II.

De Pompilo & Amia.

POMPILVS seu αἰχὴ τῆς πομπῆς à TAB. III. transvehendo, (fabulantur enim 5. Pompilum hominē περθεῖα a portito- a Ælian. rē, vel ut b Athenæo placet θαλασσεργόν, H.A. l. 15. ab Apolline* quod Ocyrhoen puel- c. 23. lam trajecisset, in sui nominis piscem b Athen. transmutatum) seu quod navigantes Dipn. l. 6. in alto mari ad continentem usque* Apollon. comiteretur; aliis facer piscis, aliis Rhodius in Argon. πμφουλ@ dicitur, & à c Plinio inter c Plin. H.N. Thunnos reputatur. Athenæus l. 9. c. 29. d Pelamydi similem & varium es- d Athen. l. 6. se inquit. Rondeletius e pro eo- c Rondelet. dem, piscem squamis carentem, in Hist. in dorso varium & maculosum, in Piscium. quo à branchiis ad caudam linea magna

magna curva, à qua ad ventrem lineæ multæ transversæ interpunctæ descendunt, ducitur. pars quæ supra & inter oculos est, flavescit, aurique colorem imitatur. Cauda in unicam non divisam, neque crescentis Lunæ figura, Thynnorum & Pelamydum more, desinit.

Locus ipsis ima maris sedes est. Sæ-

Plin. H. N. pè navigia f velis euntia comitantes, *l. 9. c. 15.* mira aliqua dulcedine per aliquot horarum spacia, & pascuum millia à gubernaculis non separantur, ne tridente quidem sæpius in eos jacto ter-
g. Oppian. riti. ubi terram g persensere, rece-
Halieut. l. 1. dunt, nec longè abesse nautis colligi-
Ælian. H. A. tur. Inimicos experiuntur Delphino-
l. 2. c. 15. b sed magno horum exitio. Degusta-
7. Athen. l. tis enim illis, continuò convellun-
h. Athen. tur, furoreque incensi, pelluntur,
l. c. ad littora, esca marinis avibus fu-
 turi.

Amiam h seu *αμια* το *αμαρνα* τῆς πα-

Plutarch. *αμια*, quod una cum sui generis
utra ani- piscibus eat; sive quod *ενα αμαρνα* φέρε-
mal. ται *αμαρνα* *αγγελιδόν*, quod non solitaria
 sit, sed gregatim vivat, ita dictam, *Æ-*
l. 2. c. 15. *lian.* *ius* i *Troctam*, Hispani *Bizam* quasi
H. A. l. 1. c. 6. Bizantium, alii *Bonitam*, vocant. Jo-
TAB. vius & Salvianus pro ea Lechiam, alii
III. 6. Sphyrænam, quidam illum piscem
 qui Hispanis Lambugo dicitur, per-
l. c. peram substituunt. Piscis est *k* *Pela-*
Rondelet. *mydi*, vel *Thunno* vel *Scombro* cor-
de Piscib. poris specie, pinnis caudæ similis, cu-
 te lævi, ea parte quæ circa branchias
 est dempta, rostro acuto, oculis parvis
 auri æmulis. *dentibus* ferratis, acutif-
 simis, in os recurvis. *branchiis* opertis,
 ventre crasso, argenteo, rugoso, lon-
 go, ad podicem usque demisso, cuius
 appendices sunt innumeræ scombro-
 rum appendicibus tenuiores. *dorso*
 cæruleo, & dum vivit splendente; à
 quo ad ventrem lineæ ductæ sunt ob-
 liquæ, nigrantes, certis intervallis à
 se distantes. *Caudam* habet tenuem, in

* *Aristotel.* figuram lunæ in cornua curvatæ, in-
de part. testina gracilia, epar rubescens, sple-
Animal. nem nigrantem, fel toti intestino * at-
l. 4. c. 2. textum, vel ad illud porrectum
l. Aristotel. l pari cum eo longitudine, sæpe et-
H. A. l. 2. iam replicatum.

Degere in mari, stagnis & fluviis af-

fect.

firmat *m* *Aristoteles*, & cum eo *n* *m* *Aristotel.*
Scaliger. vicinum fluviis & stagnis *H. A. l. 8.*
 ob dulcem aquam & limum amare, *c. 13.*
Oppianus o Pontum subire, atque *n* *Scalig.* ad
l. 2. H. A. ibi cum suis ducibus ætatem tradu-
c. 18. cere, tum quod ibi belluæ magnæ o *Oppian.*
 pauciores, tum quod ob dulcium p *Halieut.*
 aquar. permissionem, pastus gratior; *l. 1.*
 unde eor. incrementum q singulis p *Arist.*
H. A. l. 8. diebus intelligitur, certum. Circa *c. 13.*
 Provinciam in maris angustiis quas *q* *Aristotel.*
 insulæ frequentes efficiunt, capi, *H. A. l. 6.*
Rondeletius author est. *c. 13.*

Vescuntur r aliquando algâ, ut plu- *r* *Aristot.*
 rimum carne. Audaces & celeres *l. 8. Hist.*
 sunt. quin *Troctam* saltu valere *Æ-* *c. 2.*
*lian*us loco supra citato scripsit.

Pugnam cū *Delphinis* apud f *Op-* *Oppian.*
pianum eleganter descriptam inve- *Halieutic.*
 nies. idem de *Troctis* apud t *Ælia-* *l. 2.*
 num legitur. Captæ proflunt, & ar- *t* *Ælian.*
 rosâ lineâ aufugiunt. Appetuntur à *H. A. l. 12.*
 quibusdam piscibus in escam, *Glauco* *c. 53.*
 inprimis, si *Tarentino* fides est.

Adhibentur u in cibis tanquam u *Aristot.*
 boni succi ad excernendum medii, *H. A. l. 4.*
 sed parcè nutrientes. *Archestratus* *c. 8.*
 autumni tempore post *Vergiliarum*
 occasum, *Byzantiasque* inprimis cō-
 mendat. procul à mari *Helleston-*
 tiaco deteriores scribit. si vicinum
Ægei maris tractum pertransieris,
 pristinâ gloriam maculare inuenies,

ARTICVLVS III.

De Xiphias seu Gladio.

Piscem qui à figura rostri *XIPHIAS* *TAB.*
 communiter, *οχιφιας* *Epicharmo*, *IV. I. 2.*
ξιφις a *Menandro*, *Gladius* Latinis *a* *Ælian.*
 dicitur, *Homerus* b *χιφιας*, *Hesychius* & *H. A. l. 13.*
Varinus θ *χιφινιας*, alii *Thranin*, *Hermo-* *c. 4.*
 laus *Tomum Thurinum*, ita enim apud b *Homer.*
 * *Plinium* legit. fortè à *Thuriis* *Italiae* *Odyf. m.*
 oppido. *Albertus* *Militem* appellat,
Galeum à c *Plinio* vocari; *Salvianus* & c *Plin.*
Massurius perperam oppinantur. *H. N. l. 32.*

Magnitudine interdū est insigni. Ad *c. 11.*
 decē nonnunquā cubitos accedere, ** Plin. H. N.*
 tradit d *Rōdeletius*. *Delphini* magni- *l. 32. c. 11.*
 tudinē excedere, e *Plinius*; *naviculas* *d* *Rondelet.*
 æquare, f *Strabo*. *Corpus* habet teres, à *e* *Plin. H. N.*
 capite statim valdè crassū, deinde ad *l. c.*
 caudā usq; tenuius, in extremo ante *f* *Strabo.*
 caudæ exortum eminentia quædam
 extube-

extuberat. *Corium* caudam versus, ducta manu læve est, os versus asperum. *Squamme* sub cute latent plurimæ, *adeps* in dorso suis more residet. Utraque *maxilla* rostrata est, superior magis ossea, durior, aliquando bicubitallis, (*Arthenæus* *f* totius corporis magnitudini æqualem esse, scribit) inferior brevior & triangularis, plærumque illa habet se ad totam magnitudinem ut tria ad decem, ista ut unum. *Gladius* *g* est ferro acutior, sed extincto pisce corrumpitur. Gellius eius mucrone dura excavavit saxa. *Dentes* ipsi falsò *h* *Ælianus* tribuit, non admodum curvos, nec admodum inanes. Nullos enim habet, eorum loco ossa oblonga & aspera in palato resident, absunt in tantum gladium materiâ, quæ dentibus cedere debuerat. *Oculi* ipsi orbiculati prominentes, & ante eos foramina. *Branchiæ* *i* octonæ & duplices, *tergus* ex cinereo nigricans, & serici instar splendens. *Pellis* tenuissima, *venter* argento micans. *Fellis* vesicula intestino committitur.

Degunt in mari, & *k* rarò adeunt littora. Copiosius verò juxta Scyllæum promontorium apud Siculos & Zophyrium quod Italiæ extremum est, hodieque Spartiventum à nautis nuncupatur, capiuntur. Tribuuntur tamen ab *Æliano* *l* & Dania in lacu Sueriensi notissimi dicuntur.

Victitant * piscibus, quos rostri incurfu interficiunt, ne prius comedunt, quam spiculo *m* transfixerint, Exortu *Caniculæ* *n* divexantur ab oestro seu asilo (Animal est parvum, scorpionis effigie aranei magnitudine) tantoque infestantur dolore, ut in naves sæpenumero exiliant. *Balænam* exhorrescunt, eamque conspiciati, gladium suum in terram, aut obvium quemcunq; vadi locum impingunt, sic infixò capite sese continent. Nec *o* tamen sua ignorare arma credendum. Utitur rostro tanquam gladio. Sæpe in mari Indico validissimas Lusitanorum naves, ad sesquipalium aliquando perforant. *Vissus* in mediterranea iuxta navim na-

tantem, medium rostro discidisse. Græcanicum sermonem ab Italico distinguere, illum minimè reformidare, ad hunc diffugere, Joannes Marius Cætaneus, qui Locrensi in littore Xiphianum piscationi intertuit, prodidit, & Brutii testantur.

Vissus in cibo rarus. Carne enim est arida, & difficulter concoquitur, *Archestratus* Byzantinum commendat.

ARTICVLVS IV.

De Remora & Cetorum

Duce.

DE REMORA, quæ *Echeneis*, *Remi-TAB.*
ligo, & *ætanetætes*, dicitur, vix quic-IV. 3.
quam certi scribere possum, adeò Authores in diversa scinduntur, tria tamen occurrunt, descriptio, facultatis naves retinendi, & causa. Variè à veteribus describitur. Quibusdam est parvus piscis, assuetus petris. Quibusdam *p* eum pedes ex Aristotele habere opinantur, ita positâ pinnarum multitudinem. *Mutianus* muricem esse, latiore purpurâ, neque aspero, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice concha, utroque latere sese colligente, quibus in hærentibus, plenam ventis sterisse navem, portantem nuncium à Periandro, ut castrarentur nobiles pueri, conchasque quæ id præstiterint, apud Gnidiorum Venerem coli, prodidit. Trebius Niger pedalem esse, & crassitudine quinque digitorum credit. Tres eo nomine celebrari, haud perperam inde colligas. Nec inter recentiores de eodem convenit. *Rondeletius* inter ignotos reponit. *Gillius* nunquam se piscem, vel piscatorem qui ipsum vidisset vidisse profiteretur. *Bellonio* est totus ex ossis, mollis, lubricus, coloris herbacei, inferiore parte planus, dorso repandus, in gibbo convexus, limacis rubri testa carentis effigiem referens. Eidem ad spitam longitudinè & manubrii ligonis crassitiè plerumq; excrescit, circa saxa in mari, sed lentè serpit, & iter cornibus præterdit, mucaginemque ut limax serpendo relin-

f Athen.
Dipnos. l. 7.

g Oppian.
Halieut.
l. 2.

h Ælian.
H. A. l. 14.
c. 23.

i Aristot.
H. A.
l. 2, c. 13.

k Plin.
H. N.
l. 32, c. 11.


l Ælian.
H. A. l. 14.
c. 23.

* Ælian.
l. c.
m Oppian.
Halieut.
l. 2, v. 509.

n Plin.
H. N. l.

Oppian.
l. 2, v. 509.

o Ælian.
H. A. l. 9.
c. 40.



Gladus.


Schwerdtfisch. Meer Schwert.



Remora. Schiffsalter.




Leither der walfisch




Myxichthys

Serpens Marinus. Meer Schlang.




Serpens Marinus verus. Meer Schlang



Conger.

Meer Aal.



7.

relinquit. In Corcyra frequentissimè è verriculis extrahi dicitur. Quam in *Imperati Neapolitani* Exoticotamiejo Neapoli vidimus, sic describitur. Capite supino acetabula habet similitudine cirrorum sive acetabulorum Polypi, quibus naves magnosque acetaceos pisces apprehendens pertinaciter hæret. Cursumque eorum remoratur, & pro arbitratu suo retinet. Ad magnitudinem corporis Icon expressa est.

Remora Aldrovandi color toto ferè corpore ad violaceum inclinatur. *Lateralia* candicant. medium corpus subviridis linea interfecat. *Cauda*, quæ unicam pinnam degenerat ad cæruleum vergit. *Rostrum* canino simile, nisi inferior maxilla superiorem longitudine superaret. *Pinnæ* toto corpore sex. Simillimus Embdæ in Frisia pisciculus repertus est, referente

Gesnero, quatuor digitorum longitudine. Cuticula sine squammis tenuissima. capite pro corporis magnitudine maximo. Oculis parvis, reliquo corpore turbinato. sub mento quiddam habebat figura acetabuli. Cavitas cum digito premeretur, ita adhærebat ut circumferri posset. *Par facultatis navigia retinendi ratio*. Ruant ventilicet, & sæviant procellæ cogitantare navigia secundum Plinium (verbacius sunt. Ventum est ad summa natare, &c.) Plinio Oppianus ad stipulatur. Cheremenianus Trallianus apud Plutarchum impedimentum & moram navigationi inferre, & ut tardius navigia ferantur facere asserit ille puppi, hic lateri navis, Oppianus * carina adhærere scribit. Petrus Melara Cardinalis Turonensis triremem cum è Gallia Italiam mari peteret, ab eodem (nisi forte de Lampetra id accipiendum sit) in medio cursu retentum fuisse. Kircherus pro fabulosis omnia ista habet. Nunquam talem à Plinio ad tempora nostra effectum notatum, etsi totus orbis navigationibus lustratus sit. Non posse potentia majus à minore vinci. Nul- lum magnetis frustum, quamvis efficacissimum, exactissimeque libratum aliud majus, & gravius allicere. Frequenter in freto Siculo

ob contrarios æstus, unam onerariam extensis velis, secundo vento in mediis fluctibus hædere, vicinis cursum tenentibus.

De causis haud certiora occurrunt.

† Rondelietius u Aristotelis responso, quo cur clavus cum sit parvus, &

in extrema navi, tantum possit, ut ab exiguo temone & hominis unius viribus, magnæ navium moles moveatur, exponit, innixus, minus potius ad contactum Remoræ moveri, quam

sistit ostendit. Idem de Plutarcho dicendum, dum navim multo musco

& alga obductam, aquam obtusius secare, & tardius moveri, hisce Eche-

neidem adhærere, sic tarditatis non causam, sed causæ accidens esse, pro-

dit. Fracastorio y latentis scopuli Echeneidem indicium esse, navi ita ut avelli nequeat propter metum va-

cui, adhærescere, placet. Scaliger z Plinium secutus, ad occultas quali-

tates confugit. Movendi quibusdam esse potestatem, contrariam aliis. Nemini comperta in igne caloris

principia hunc. a Lonicerus sequitur. Suarezius * influentias cele-

stes addit. nec Basilius b & Ambrosius c renuunt. Peculiaris d Keck-

manni opinio, Viscosum & frigidissimum humorem de se fundere putat Echeneidem. hoc aquam circa gu-

bernaculum congelari, ipsum quasi immobile reddi. Vix quicquam verisimile.

Quantum ad usum alii è Græcis e lubricos partus atque procidentias contineri ad maturitatem alligato eo prodiderunt : alii sale ad servatum

ad alligatumque, gravidis partus solvere, ob id alio nomine Odynotyon tem appellari. Amatoriis veneficiis

infamem esse, indiciorum & litium moram, inter falsa repono.

Cetos ducem habere, tum quod mole corporis oppressi tardè moveantur, & facile in cœnum, brevia & angustias impingant: tum quod pa-

rum acutè cernant, f Oppianus Ælianus & alii authores sunt. desti-

tutas, ad terram delabi & perire, Plutarchus & Claudianus prodidere. ἡ γὰρ ἰς ἡγέμων ὀδύνη, Plinio, nescio

quare Musculus, quo nomine Balenæ partem

† Rondel. de pisc. marin. l. 15. c. 18.

u Aristot. in Mechanicis quest. 6.

x Plutarch. Symp. l. 2. probl. 7.

y Fracastor. l. de Sympath. c. 8.

z Scalig. Exer.

a Lonicer. l. de Aquatic.

* Suarez. Disput. Metaph. 18.

b Basilius 8. Hexam.

c Ambros. homil. 7.

c Ambros. Hexam. l. 5.

e. 10. d Keckerm. in probl. nauticis.

e Plin. H. N. l. 22. c. 1.

T A B.

IV. 4.

f Oppian. Halient. l. 3.

g Ælian. H. A. l. 10.

c. 6.

q Gesner. in Histor. Piscium.

r Plin. H. N. l. 32. c. 1.

s l. 2. Sympos. probl. 7.

* Kircher. l. 3. Artis Magnet. Oppian. Halient. l. 1. v. 221.

partem Oppiano & Aristoteli dici falsò opinatur Bellonius, Hermolao Iulus, aliis *Mysticetus* dicitur. Longus est, colore albo, capite longo, angusta cauda, si *Æliano* credimus. Aldrovandus i dodrantalem, rostro acuto, capite prælongo & plano, cauda angusta & tenui, toto corpore aspero, squammis experte, sed osseo corio tecto, proponit.

i Aldrov. de Piscib. l. 3. c. 23.

Fabulosum ne id, quod Rondeletius arbitratur, an ambiguum, quod

* Scaliger. ad H. A. Aristot. l. 2. c. 16.

* Scaliger, natura talem dederit, an amicitiae adscribendum sit, non disputo. *Amicitia exempla sunt Balena, musculus, quando pragravi superciliorum pondere obrutis, eius oculis, infestantia magna vada, prænatans demonstrat, oculorumque vice fungitur*, apud k Plinium

k Plin. H. N. l. 9. c. 62.

legimus. Agnitum, ore velut anchoram à Balænis recipi, in faucibus dormire; hoc quiescente, illas non moveri, hoc gubernatore, destitutas, ad terram delabi & perire, Plutarchus

l Plutarch. l. utra animal. m Claudian. in Eutrop.

l & m Claudianus prodidere.

ARTICVLVS V.

De Serpente Marino.

TAB.

IV. 5. 6.

TAB. V.

i.

a Plin.

H. N. l. 32.

c. 1.

b Ælian.

H. A. l. 18.

c. 28.

c Aristot.

H. A. l. 2.

c. 15.

d Aristot.

H. A. l. 8.

c. ult.

e Plin.

H. N. l. 6.

c. 23.

f Solinus in

Polyhist.

g Arrian. in

Periplus ma-

ris rubri.

h Virgil. l. 2.

Æneid.

Serpens marinus, a Plinio *Draco marinus*, *Æliano* b *μῆλον* & *Hydrus* i. Aristoteli *ὄφις θαλάσσιος* dicitur.

Notabilis ipsorum quibusdam locis magnitudo. Eius sunt in Africa, ut boves d infestentur, & triremes apprehensas evertant. Circa Norvegiam ducentorum pedum longi visi, tantas aliquando supra mare spinas, erigentes, ut navis per unam transire possit, si Olao Magno credimus. Conspicitur in sinu Codano quidam flavi coloris x l. pedum, innoxius, nisi irritaveris. Apud insulas quasdam ante Persidem, vicenum cubitorum, ter ruere classem. Tales in f Carmaniae promontorium & Arabiam circa tres insulas è mari egrediuntur. Baraces sinus g navigantibus perniciosus, quod ad eum è pelago tendentibus prægrandes & nigri serpentes occurrant. Maximi cuiusdam descriptionem & in Virgilio h invenies. Is de quo hoc loco, terrestri similis est,

capite & corpore congru *ἀμαυρότερον* duntaxat, ore acutius, si i Aristotelem sequimur. Si Salvianum, habet dorsum subrubrum; latera subflava, ventrem sub albidum. Rondeletius eū triū cubitorū facit, corpore fulvo, quàm Anguilla rotundior, colore què & sceleron apud Aldrovandum exhibebat, capite congru, oculis flavescens, ventre & rostro cinereis, maxilla superiore longiore. Dentes murænae modo, sed rariores habere; addit: pinnulas ad branchias veluti Anguillæ duas. A Castelletto ad k Aldrovandum missus, colore e-k Aldrov. de rat congru, sed ad cæruleum inclinante. Ore intra rubido, dentibus acutissimis instructo, sub mento apophysis barbæ modo propendebat, altera ad anirificium.

Maris est incola: nec tamen *ἐν τοῖς σφόνδασι βαθεῖαν*, seu profundissimis, gurgitibus nascitur: Qui in aquis fluviatilibus reperiuntur, Hydri sunt & toto cælo ab istis differunt. Degit tamen aliquando & in terra, ut terrestris m quædam species. toto ferè die in mari vivit, somni causa in terram egreditur. Vehementior est congro, si *σφόνδασι* ita placet vertere. Captus n atque immisus in arenam, caver- n Plin. nam sibi rostro mira celeritate excavat. H. N. l. 9. c. 37.

Pugnare aliquando in Turcia tempore Bajazetis à solis ortu ad occasum cum terrestribus; Occisorum utrinque octo millia numerata sunt. Aquatici concessere victoriam.

Comedi quidè potest: sed propter similem cum terrestri formam rejicitur.

ARTICVLVS VI.

De Congro & Ophidio Plinij.

TAB.

IV. 7.

Congri, qui Græcis à *γῆρα*, quod est voro; *ἀπειδίσει* * γὰρ τῶν πολυπόδων τὰς * Ritters- *πλεῖστας, κόγγε* & *όγγε* * aliis Gryl- hufus ad l. lus, quibusdam à corporis & coloris similitudine, *Anguilla marina*, dicitur, Oppian. duo genera; Vnum Album & pelagium, alterum Nigricans, quod haud Dipnos. l. 7. rectè vel littorale vel pelagium dixeris.

a Aristot. ris. ambigit enim ut scribit a Aristoteles: recentiores unum duntaxat, in quo omnes notæ congruæ veteribus attributæ, reperiuntur.

Longus est & lubricus seu lævis.

sæpè in quatuor aut quinque cubitorum longitudinem excrefcit. Visus *

* Scaliger. ad Arist. H.A. l. 2. c. 16.

b Eudox. l. 6. de terra motu apud Athen. c Strabo Geogr. l. 3.

Eudoxus; circa Cartejam in exterioribus locis augeri supra minarum octoginta, c Strabo prodiderit. Toto dorso rubet, ventre & lateribus pallet. Binis natat pinnis. Linea nigra in

exteriore parte membranaceæ pinnae per dorsum extensa conspicitur. Oculi sunt Anguillis longè majores. In extremo rostro duo brevia cutacea corniculagerit. Dentes habet parvos

pectinatim coeuntes, branchias utrinque binas, pinnae harum rubent, quæ verò corpus ambit fusca est, & ad cæruleum inclinat. Interiora si spectes,

Gula d ipsi exigua, qua alii pisces carent. fellis vesica ab epate pendens.

In nullo non degunt mari, fluminibus inprimis f vicinum si sit. nam & hos juvenes subire solent: ne de paludibus dicam, quarum illustis alumnus à Matrone g Parodo vocatur.

In terram egredi non absonum, cum idem & de serpente marino superius dixerimus, & de Anguillis ex Aristotele colligatur. Vescuntur pisciculis.

ideò vehementiore spirante vento, quo tempore numerosiores pisciculi mare intrant, pinguescunt.

h Oppian. Coitus eorum Anguillar. coitui h comparatur, non quod ex simili spumæ sanie in arena obruta nascantur; sed quod circumplexu mutuo supinar. partium coitum peragant, quod

δρόδοις & μύργοις τῶν ἑσών i solenne est: Ova * longa serie inter se protensa, pinguedine ita obducuntur, ut vix appareant. Si in ignem conjeceris, abit in vaporem pingue; ova exiliunt, & elisa crepitant.

Latent hyeme, k nec, eadem, præterquam statis diebus paucis, & iisdem semper, capiuntur. Gregales ne sint, an solitarii ambigitur. Causam

l Mnesitheus præbuit. Modò gregarios esse posse dicit; modò nec inter hos nec inter illos recenset.

Inimicitias cum Polypo, Locusta, & muræna exercet. Polypum devorat. m Neque enim ob lævitatem ac eodem apprehendi potest. A Locusta laceratur, licet valido sit corpore. Ipse & Muræna caudas inter se prærodunt.

Vfus ipsius apud Græcos in cibis laudatus. inprimis si è Sicyone adferretur, Italum tantum cæteris præcellere putabant, quantum pinguis Thynnus vilissimis coracinis. Tanti denique æstimatus, ut Nereus quidem Chius Diis eum elixasse legatur: Dorion verè opsophagus, cum puer optimor. pisciū nomina dicere iussus, Congrum inter cæteros recensuisset, piscium se non Deorū nomina dicere iussisse, reposuerit; Nūc in vili admodum sunt, apud omnes, Hispanis exceptis, precio. Angli pusillos cum aceto & sinapi comedunt. Congener congris est, qui in mari circa Canibales insulas capitur. Cute intensè viridi & elegantissimè variegata, rictu patenti, & dentibus acutissimis. Caro detractâ cute candidissima est; sed qualitatis adeò virulentæ, ut sæpè in mortem gustantes coniciat.

Ophidion Plinii, quem Salvianus & Bellonius cum serpente marino confundunt, quemque Tragum Oppiani quidam esse opinantur, duorum est apud Rondeletium generum. Vnum est barbatum, quod gemina barba à maxilla inferiore pendente instructum sit; Alterum imberbe & flavum, de cætero superiori simile. Bellonius palmum non excedere, pelle lubrica esse, pinnae carnosas habere, integram in gyrum caudam ambire, & multa nigredine perfundi, testatur. Linguam habet parvam, acutam. Cor trigonum ruberrimum, hepar ad sinistram latus exportectum, stomachum oblongum, pylorum permultis apophysibus circumdatum, à quo tres intestinorum revolutiones ad anum pertingunt, lienem rubrum, & oblongum. Cætera ad ipsos Afellos accedit.

C 2 ARTI-

1 Athen. l. 8.

m Aristot. H.A. l. 8. c. 2.

n Plin. H.N. l. 9. c. 62.

De Laet. Ind. Ovid. l. 1. c. 18.

TAB. V. 2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

ARTICVLVS VII.

De Muræna.

TAB.

V. 3. 4.

Muræna, quibusdam *Draeo mari-*
mus, quod corporis specie serpē-

tes æmuletur, Græcis *μύρανα*, *συμύρανα*
& *ἐμύρανα* (multæ n. dictiones q̄ ab *συμ*

a *Eustach.* incipiunt, olim per *ἐμ* scribebantur) a

in *Homer.* *ἐμ* τὸ μύρεν vel *μύρεσθαι*, quod, b præ pin-

b *Macrob.* guedine in summa aqua fluitent, & à
Saturnal. sole terrefactæ, qua curvare se ne-

queant, mergi non possunt; quod tamen de optimis quæ Latini *Flutæ*, Græcis *πλωταί*, quasi navigabiles vocantur, potissimum sumi debet, quavis & *rhyades* pisces *Flutas* Gaza verat, dicitur.

Externa si attendas, ad duorum cubitorum longitudinem accedunt; circa *Cartejam* locis exterioribus minarum supra octoginta reperiri, c *Strabo*, ad decem libras augeri neque maiorem se vidisse, *Salvianus*, prodidit. d Longus est, lubricus seu lævis, & serpentis speciem referens. c. 13. l. 4. *Cutis* quæ e tenuissima diversi coloris, qui nec in omnibus sibi respōdet, seu quod alius vivis sit, alius in mortuis (sanè *Plinius*, fin *Gallia* septentrionali, *Murænis* omnibus, in dextra maxilla septenas maculas ad formam septentrionis aureo colore fulgere, duntaxat viventibus, pariterque cum anima extinguī testatur) appareat. Mas paucioribus maculis distinguitur, & quibusdā veluti stellis cōspēgitur, fæmina plurib⁹ veluti aureis guttis, quas *Ovidius* auratas notas dixit, variatur; g *Bellonio*; eidemque ut plurimum fulvescunt. *Rondeletius* colore fusco, idēd *καλαμῆν* ab *Oppiano* dici; *Massurius* maculis luteis & nigris; *Gillius* alium colore subnigro, luteis alium, albo nigris quasdam colore distinctas, prodidit. h *Aldrov.* fæmina varia est, blattariæ floribus simillimis, hinc ardens *Ovidio* dicitur. Caput habet rotundum, tenue, & acuminatum, rictum oris latissimum. Dentes acutissimos, ferratos, solidos, non in maxillis solum, sed & in ima quoque faucium parte dispositos. Carnosum palatum, quod linguæ

loco obtinuit. *Maxillam* superiorem aquilinam in cuius extremo duæ sunt breves apophyses seu verrucæ *Oculos* magnos. *Dorsum* cultellatum, ut *Pytheas* ait, hoc est, spinō acuto, & pinnulam ferè constituyente. *Pinnas* & branchias, adimitipis i *Plinius*. i *Plin. H.* sed malè. Quaternas enim has habent. Sed k parvas; utpote ex quaternis minutis osculis, sive foraminibus k *Athen.* paulum modo se exferentes; seu ut l *Aristoteles* dicit, non διηρθρωμένα, id l *Aristot.* est explicatas, sed præter alior. pi. H. A. l. 2. scium morem confusas. Illas non ad c. 13. latus sitas, neque tales ut natare possint.

Quantum ad *Interiora*, carnem habet candidissimam, sub cute obliquis & transversis ductibus dispositā, variis musculis hinc & inde abeuntibus munitam, multis spinulis brevibus & recurvis conspersam. *hepar* subfulvum, oblongum, stomacho incumbens, longiusculum; *fel* Cyaneum, magnitudine avellanæ, quod *Bellonius* jecori; m *Aristoteles* intestinis in- m *Aristot.* hære, à jecore meatibus quibus- l. 2. dam dependere, scribit. Habet & lie- c. 15. nem oblongum nigricantem, stomacho annexum. *Ventriculum* longum, à cuius medio intestinum sine spiritis ad anum protensius, juxtaque eum cellulæ, instar intestini coli, habentur. *Vertebres* quæ minus frequentes, sed oblongiores quàm *Anguillæ*, processus insunt transversī ac sursum spectantes præter aliorum piscium morem *Aristas* *Scaliger* * vocat, quæ si * *Scalig. ad* corium inversum detrahatur, cum co A. H. l. 2. simul omnes educūtur. In *Oesophagi* c. 16. l. 108. qui latus, & à rictu incipit, orificio, hamuli leviter uncinati, ad gulam citra fauces spectantes, linguæ vicem suppleant, ac statim à branchiis folliculus teres, spinæ incumbit, flatu turgidus, commodioris natationis usum præbens.

Vivunt quidem in mari, circa petrosa n loca; videntur tamen & flu- n *Synef.* viorum ostia petere. In Oceano ra- *Epist.* rissimæ sunt. o *Tartessus* & è Siculo p o *Clem.* freto, unde ad piscinas Romam ac- *Alex. in* cersebantur, antiquis in pretio fuere. *padagog.* minus ex *Tarsensi* & *Carpathio* mari p *Varro de* probabantur. Exeunt & in terram fre- R. R. l. 2. quenter,






c *Strabo*
Geogra.
l. 3.


d *Aristot.*
H. A. l. 2.
c. 13. l. 4.

e *Plin. H.*
N. l. 9. c. 11.
f *Plin. H.*
N. l. 9.
c. 23.

g *Bellon.*
Hist. l. 5.
c. 10.

h *Aldrov.*
de Piscib.
l. 3. c. 27.





q. *Arist. H.* quenter, in eademque q capiuntur.
A. l. 5. & diu, quod parvas branchias ha-
6. 10. beant, parum aquæ admittant, nec
 multum refrigerii desiderant, vivunt.

Cibus ipsis caro, ideò in petris quæ
 Channis, & Patellis plenæ domici-
 lium. Nec ab humana abstinent. Cu-
 ius * *reignarus Vedius Pollio*, Eques
Plin. H. N. l. 9. Romanus, & ex amicis Augusti, inve-
6. 23. nit in hoc animali documenta sævi-
Tertullian. de pallio. tiæ, vivariis earum immergens da-
Seneca l. 1. de Clem. mnata servitia, non tanquam ad hoc
 feris terrarum non sufficientibus, sed
 quia in alio genere totum pariter ho-
 minem distrahi spectare non poterat.
 Cum rabie agitantur, sævissimè per-
 sequuntur squamosos; ita verò
 morfu valent, ut partem nisi tota am-
 putetur, ab ea liberari posse neget,
Macrob. Saturnal. l. 2. c. 11. Rondeletius. In Sicilia * in summa
 aqua præ pinguedine flutantur. Un-
 de manu capi murænas flutas Papi-
 rius apud Varronem prodidit.

De Murænæ cum vipera congres-
Plin. H. N. l. 9. c. 23. su à multis r sparsa opinio. Muræna
 inquit libidinis, impetu plena, la-
 tibulum vipæræ intrat. Vipera mas-
 stimulis concitata ad mare accedit,
 & sibilo edito amatam evocat. sic am-
 bo invicem colligantur. Falsitatem si
 discrepantia (alii marem cum vipera
Nicand. in Theriac. Ælian. H. A. l. 1. c. 5. fœmina congregi, alii fœminam cum
l. 9. c. 6. viperamare produnt) non ostendit,
Athen. l. 7. at certè illud, quod Nicander famæ,
Oppian. l. 1. de Venat. & l. 1. Halieut. Plinius & Ælianus vulgo eam tri-
Orus Ap- pol. l. 2. c. 111. buant. Andreas s apud Athenæum,
 quod vipera nemor. secreta amet.
 nec à quoquam id observatum esse,
Isidor. l. 12. Orig. 6. 6. vel piscatore vel littorū ubi frequen-
 tes murænæ, accola, neget, ostendere
 potest. Coeunt autem more t ser-
 pentum, & ova parva, eaque *φάδου*
 seu arenacea, numerosa * & quocun-
 que tandem tempore pariunt. u Mu-
A. l. 5. c. 10. rænulæ recens prognatæ, celeri ado-
 * *Arist. H. A. l. 5. c. 4.* lescunt incremento,

A. l. 5. c. 4. Latitant y hyberno tempore, quo,
videm l. 3. c. 10. paucos dies si excipias, non capiun-
 tur. Quia z pinnis carent, flexuoso
Plin. H. N. l. 8. c. 15. corporis impulsu moventur.

Ad Ingenium & Mores pertinet,
 quod, è vivariis a egressæ piscatores
 adoriri, & è navibus in mare pronos
 dejicere; reti circumdatæ b macu-
 ia Thor.

las appetere ipsas, conscia teretis ac
 lubrici tergi, cum multiplici flexu
Plin. H. N. l. 32. c. 2. laxari donec evadant; ut hædere in
 hanc amplius devorare quàm ha-
 mum, admove reque dentibus lineas,
 atque ita erodere; infixas hamo,
 quod sint cultellato dorso, sese inver-
 tere; cauda ictas, celerrimè exani-
 mari, capite ictas difficulter unde a-
 nimam in cauda habere certum c c *Plin. H. N. l. 32.*
 Plinio concentu & tintinnabulis, q
 ex fabula de viperæ sibilo natum ef-
 se credo, à piscatoribus evocari; di-
 cuntur. Docilitatis argumentum,
 L. Crassi, qui cum Cn. Domitio Cen-
 sor fuit, Muræna Inauribus d & gem-
 mis distincto monili ornata, tan-
 quam eximæ pulchritudinis puella,
 vocem Crassi cognoscebat, ad eum
 adnatabat, & porrecta cum gaudio
 accipiebat. in piscina mortuam, atra-
 tus tanquam filiam luxit. Idem de
 Antonii Drusi in villa apud Bau-
 los, in parte Bajana, Muræna, di-
 citur.

Antipathiam ipsarum cum Locu-
 sta, Polypo, Ozena, Congo, Aceto,
 & Ferula notarunt authores. e Vin-
 cuntur à locustis. Ad carnes f Po-
 lyporum Ozænarum g inprimis præ-
 properæ feruntur. Pugnas Ælianus
 descripsit; addidit Kiranides incre-
 dibile, evanescere Murænam, si cum
 Locusta coquatur. Cum Congo
 sæpissimè congressam Puteolis, spe-
 ctavit Perottus. Acetigustu præci-
 puè h in rabiem aguntur. Licinius
 Macer pinguescere iactatu, (alias
 iactatu) fuisse non interimì, easdem
 ferulâ protinus, prodidit. Mirum
 quod ex i Æliano habemus, cum i
 plagam unam acceperit torpescen-
 tem persistere; sin plures inferas,
 funditus ira accendi.

Summis olim apud Romanos fue-
 re in deliciis, seu ut gulæ irritamen-
 ta, seu quod diutissimè & magna co-
 pia in variis fervari possent. vel
 unus C. Hirrius duodena k mil
 lia sestertia, ipsis alendis insume-
 bat, & uno tempore Cæsari
 vim. Murænarum mutuo dedis-
 se in pondus dicitur, nam per-
 mutare pretio vel aliâ merce noluit.

C 3 Huius

Macrob. Satur. l. 2. c. 11. Huius villam intra quam modicam quadragies piscinæ venierant. Tripatinus summa cœnarum lautitia, ex *Plin. H. N. l. 35. c. 12.* Fenestella *l* appellatur; unaque fuit Murænarum, altera Luporum, tertia Myxonis piscis. Heliogabalus *m* eandem lactibus in locis mediterraneis rusticos pavisse creditur, ut totum Romanum imperium perderet. *n Macrob. Saturn. l. 2. c. 11.* Piscis *n* æstivum Liciniis Murænarum nomen imposuit, ut Sergio Orata. Commendatas maxime prægnantes ex *o* Horatio potest colligi. *o Horat. l. 2. ferm. Saty. 8.* sed & à lactibus summam obtinuisse carnē. Nam sive molles illar. carnes statuas, sive duras, opprobrium virare non poterunt. Illæ inflationes, hæc cruditates difficiles concoctu pariunt. Galenus *p* tamen mediocres posuit, si in puro mari versentur.

p Galen. l. de cibis boni & mali succi. l. 3. de Aliment. Reperere & in Medicina usum. Nam Marcellus pellium cinerem ex aceto fronti illitum, prodesse adversus capitis dolorem prodidit.

ARTICVLVS VIII.

De Myro, Reverso Indico Anguilliformi & Tania.

TAB. V. 5. **M**YRUS, seu *μυρος*, *ἡ τοῦ μύρου* sive *μύρου*, fluere, quod præ nimia pinguedine mari supernatet, dicitur. Volaterranus, falso Plinio & Gazæ Oculatam, Plauto Ophthalmiam vocari scripsit. Alicubi Myrinus, sed perperam, *μύρινος* enim legi debet, vocatur. Sitne Murænarum mas, quod *a Plin. H. N. l. 9. c. 23.* a Plinius, Hesychius & alii *p*didere, ex descriptione colligetur. Aristoteles concolorem, muræna robustiorem, colore piceo, dentibus intus & extra instructum prodidit. Athenæo *λεόντως* seu colore leonis & *ῥύγος* seu torquillæ, esse creditur.

b Athen. Dipn. l. 7. Duo eius apud Dorionem *b* genera. *Nigrum*, quod Galli piscatores serpentem vocant, & *Ruffum*, quod deterius. Ille serpenti magis similis est quàm Muræna, corpore nigricante, rotundo, sine maculis, sine squammis. Carne tenerrima, sine ullis *c* spinis. *c Athen. Dipn. l. 7.* Pinnulas habet valdè exiguas cutis substantiâ, unam à cervicis loco ad anum usque, & alteram ab ano ad



eandem, quarum ora nigra est: unicum utrinque branchiarum imperfectarum foramen, *puncta* in utroque laterè aliquot aurea, quæ magis in viventibus quam mortuis apparent. *gulam* ventriculo præpositam, *intestina* longa, rectà ad podicem porrecta. *jecur* longum, rubescens, sine felle. *splenem* longum, tenuem.

Alter serpens rubescēs Rondeletio (Dorionis Myrū *ὀμπροσθεν*, nō absurdè dixeris) piscis est rarissim⁹, corporibus specie serpētib. terrenis similis, colore rubrō vel phæniceo, lineis obliquis & sinuosis à dorso ad ventrem ductis, eam lineam quæ à capite ad caudam protensa est, secantibus; scissura oris non admodum magna. *Dentes* habet acutos, ferratos, *branchias* squammosorum piscium instar opertas, in *dorso* à capite ferè ad caudam capillamenta tenuia à sese disiuncta, in ventre similia. *Cauda* in pinnam unam definit.

REVERSUS INDICUS Anguilli- *TAB. II.* formis, inter Pelagios non squammosos. ab Aldrovando refertur, inter Galeorum genera ab Hernando. Instar Anguillæ Columbus facit, nisi grandiusculum caput haberet. Capite autem pelliculam quandam crumenæ similem gestare scribit, si Hernandum sequimur, *d* tres spithamas est longus, Corio nigro, figura mirabili: vix possis divinare an natet supinus vel pronus, imo iudices, cum supinus est prorum jacere, & cum pronus supinum. Rostrum habet acutum, labrum inferius superiori longius, latius, & ad superiora contortum. Caput compressum, ac rostellum spinifero octo uncias longo, tres lato insigne, quo tuberoni & aliis piscibus adhærere solet, pinnas circa branchias quaternas, singulas, juxta ventrem & dorsum, caudam nonnihil lunatam. Vivit in Oceano Septentrionali. & piscibus vescitur. Vfus eius in piscibus capiendis, Viso fulgore aëris statim prædam deserit. *c Martyr. l. 3. Decad. Ocean.* Modus piscationis à *e* Martyre descriptus est. *TAB. VI. l. 2. 3.*

TANIARUM, quæ à similitudine fasciæ & vittæ ita dicuntur, Gaza vitas


Tania altera.




Meer haub

Tania.

Tania Balloni.



Tania falcata Imperati




Canis Carcharias


Großer Merhuid.


Canis Carcharias species alia

Ein ander art.
Meer oder Wallhunds.



Canis Carcharias. aliur





tas reddidit, tres apud scriptores *descriptions* sese offerunt. Una est corpore longo, tenui, stricto, flexili; tenuitatis tantæ, ut ossa vertebrarum spinæque quibus firmatur, carne non recta, appareant. Caput ei depressum, ossibus multis constans. Oculi magni, rotundi, pupilla exigula ad branchias pinna utrinque unica ad notandum data. in prona parte villos habet ad caudam usque, in quos & cauda terminatur. Flammæ modo cum natat movetur; inde nomen Flambo à Gallis accepit. Altera corpore est priori similis, eoque argenteo, ad tres interdum cubitos excrefcit. branchiæ ei, præter quæ ad pinnas, sub maxilla inferiore duæ ruffæ eius coloris dorsi villi & cauda, maculæ in parte prona purpureæ, rotundæ, certo spacio à se distantes. Venter magnus & longus. *Intestinalis* sine ullis gyris. Cor *compressum*, hepar ex albo rufescens. *Lien*, & *fel* adeo parva, ut fermè visum effugiant.

Tertia Falce nuncupatur, quod falcem messoriam referat. Est ulnam longa, palmum lata, tota in gyrum quibusdam veluti crenis serrata, Capite deformi, ut simiam dicas oculis magnis. In lateribus linea visitur aspera. pinna in tergore unica, continua, subrubra, duæ sub branchiis totidemque sub sterno. Polypi modo mollis est. & perfrixus vel assus in quoddam veluti gluten resolvitur. Huc pertinet Piscis, quem *Iridem marinam* non absone dixeris. Solis quodammodo aristis & cute constat, & rubro, amethystino, cæruleo & aureo colore variat. quin rectius quàm præcedens *Tenia falcata* dicetur.

CAPUT III.

De Pelagiis Cartilagineis.

ARTICVLVS I.

De Cartilagineis in genere.

Cartilaginei pisces dicuntur, qui pro dorsi spina spinea Cartilagine habent Græci *χορδοσανγες* olim dixeret; Aristoteles *σελάχη* & *σελάχια* primus,

a à splendore cutis, ut testatur Galenus, quæ noctu lucent, vocavit. Dno aplin. H. N. l. 9. c. 24. a. taliū sunt genera. Planū unū, in quo alii aspera, alii lævi cute sunt præditi; alii spinis carent, quidam iis arman-
tur; Alterum longum & rotundum, qui Galeno *γαλεοί* & *γαλεώνμοι*, Aristoteli *γαλεοί*, *γαλεοειδείς*, aliquando & *γαλεώδη*, *ἡ τοῦ τῆς γαλῆς*, id est, mustela terrestri, seu quod corporis similitudine eam referant, seu quod quædam communia habeant, inter quæ *jecur* adiposum, in oleū resolubile, dicuntur. Tribuitur hoc nomen & Canicularum generi, quod b *Ælianus* secundum & varium, Oppianus c tertium ponit, utrumque in cæno volutari, addit. b *Ælian.* Magnitudo, etiam minorum, inter H. A. l. I. c. 55. mares ultra cubitum. Spinam Cartilagineam d branchias detectas, quod c *Oppian.* cartilagine tegumenta earum con- Halient. l. I. v. 378. stent, pinnas duplices & utrinque; qui d *Arist.* nas habere, nullo discreto adipe car- H. A. l. I. ni ventrive adhærescente pinguesce- c. 5. & 2. re, ova ea specie, qua aves habere, cō- c. 13. mune omnibus. *Locus* illorum variat, Plana parte inferiore supinaque habent; oblongis in lateribus adhærent, & tegumēti loco quinq; habent foramina. Cor pentagonum, jecoris, e *Aristot.* & eius gemini substantia e adipea, fel H. A. l. 5. in jecore situm, appendices supra c. 5. ventriculum exeuntes, Galeis propriæ sunt. Vulvæ, quas qui ova pariunt, in binos sinus partitas, & sub præcordiorum septo constitutas habent, ad avium naturam vergunt. ad easdem in gravidis veluti mammæ albidæ visuntur. Os supina parte esse, non omnibus convenit, in extremo quædam rostro habent. quibus ita situm est, cibum corripere, nisi conversi resupinētur, nequeunt. sic & pisces quos inlectantur saluti, & ipsorum cōmodo cōsultuit Natura. Immodica satietate isti interirent. illi, dum moram sese convertendo nectunt, effugiunt. Sexus duplici dignoscitur nota. Maribus bina quædam circa excrementi ostium propendent: minores iidem. Fœminæ maiores, illis destituuntur. *Locus* cartilagineis mare est. sed alii in pelago, alii in profundo cæno morantur. Cum pariendi tempus instat, vada & littora petunt.

Cibus

Cibus ipsi pisces, hos resupinati, ut diximus, *f* capiunt. Quantum ad *f* Plin. H.N. l. 9. c. 24. *Generationem*, ore parere perperam sibi Ægyptii persuadebant. Coitus

diversus, visa ex cartilagineis nonnulla, quæ *g* averfa canum terrestrium more cohærebant. Plani qui

caudam habent, non solum admotis supinis, sed etiam terga fœminarum, marium supinis superpositis, modo caudæ crassities nihil impediunt, coeunt. Quia semine non abundant, nec fœminæ suos conceptus, nec mares suū semen spargere, quod generis non vivipari pisces facere solent, visuntur. Ova h eodem tempore & superiore parte ad præcordiorū septum omnibus, eum maiora rum minora multa; & inferiore iam exclusi fœtus; diversitas inferius patebit. quod non omnia simul, sed sæpè numero ac diu edunt; interim quæ in ima matrice sunt, concoquuntur; eodē mense sæpè & parere & coire crediti sunt. Superfœtare, & senis complurimum uterum ferre mensibus, auctor est *i* Aristoteles. Ex alto terram

repetunt, ubi pariant. Sic teporē captant, & proli provident. Pariunt autem verè animal. hinc partus viviparino *k* similis. si quid in quibusdam

differentiæ occurrit, in sequentibus dicetur. discrimen sanè ipsi pisces inter se ostendunt. senos vel octenos, undecim interdum si Rondeletio

credendum, fœtus suis partibus absolutos pedali longitudine diversis temporibus parere scribit Bellonius. persæpè vivo emergente fœtu, ovis adhuc crudis, scatere uterum, superiorem eius partem, quæ ad septum est occupantibus, eorumque alia dextro alia sinistro matricis cornu

concludi, adiicit. quod Galei metu infidiarum catulos devorent, his *l* evanescentibus revocent, prodidere antiqui, & ad *Ingenium* referri potest *Antipathiam* cum Pastinaca, quæ nihil venenatius ex mari, exercere, apud

Plinium *m* invenies. Tanta est avidas ipsius veneni.

*V*isus Cartilagineorū in *cl*is rarus.

Caro est concoctu difficilis, diuturno usu, visum hebetare, prodirum à

Diphilo. Exenteratos quosdam absque sale insolari ex Ephippo colliges. *πμαχιτης* ipsi est.

ARTICVLVS II.

De Cartilagineis Longis.

PUNCTVM I.

De Cane Aristotelis, seu Carcharia.

PRimum inter Cartilagineos longos locum Galei seu Musteli inter hos *Κύων* seu Canis, vel quia hoc genere *maximus*, sibi vendicat. *Galeus* hic simpliciter a Aristoteli; *Galeus* Aristot. H. A. l. 5. c. 11. *Canis*, *b* Oppiano; *Canicula*, *c* Plinio; *Carcharias*, quia dentibus plurimum valet Theophrasto: *d* aliis *Scylla*. Perperam Rondeletio, ex Nicandri auctoritate, *Lamia*. Nam & interpretamur, & incredibile est tantæ magnitudinis piscem, qui loricatorum etiam homines devoret, planis ab eo accenseri posse. Potuit Nicæder *Carchariam* *Lamiam* propter aliquam naturæ similitudinem vocare, & Siculis *Rana marina* *Lamia* dicitur. Cete non esse, vel exinde colligas, quod & branchias habeat, & ova concipiat.

Magnitudine Galeos omnes excedit. Visus mille librarum pondere mediocris. Captus, qui ad quatuor librarum millia accederet. Inventus in quodam loricatorum homo est. alter, currui impositus, vix à duobus equis trahi potuit. Cute aspera integitur. Os ipsi non in rostro, quod in mucrone exprorectū, sed supina parte est.

Caput amplissimum. *Dentes* trianguli forma, durissimi, acutissimi, utrinque serrati, seno ordine dispositi. Prioris ordinis extra prominent, & in anteriorem partem vergunt. secundi rari sunt. tertii, quarti, quinti, & sexti, in os maxima ex parte recurvi, in utraque maxilla carne molli continguntur. quælibet maxilla duos & septuaginta comprehendit.

Oculos habet maximos rotundos; in quibus tunica cornea parte anteriore, poste-

l Plutarch. *libro utra animal.*
T *et zes*
Cheliad. l. 3. c. 126.

m Plin. *H.N.* l. 32. c. 2.

T *A* *B*. *VI.* 4. 5. 6.

A *A* *l*. 5. c. 11.

b *Oppian.*

Halieut.

l. *l.* *v.* 374.

c *Plin. H.N.*

l. *l.* *3.* c. 15.

d *Theophr.*


l. *l.* *4.* c. 8.

c *Plin.*

H.N. l. 9.


c. 24.

T *A* *B*. *u.* *VII.* 1. 2.




*Canis Carcharius
dentium series.
Meerhunds gebiss.*

*Mandibula
canis marini
des meer hunds
gebiss.*




Sawhund.



*Galeus
Centrina. dilus.*


Dulpecula Marina.

Fuchs Hund. Meerfuchs.



*aliqu. Galeus
seu Centrina*

Sawhund. 5. ander art.



Simia Marina.




Meercaff.

Simia




marina Danica.





Zigana. Meerfchlegel

Meerwag.




Zigana seu Libella

altera.



Catulus maior. großer hundertfisch.


Tab. VIII.



Catulus. 2

Canicula Aristot.


Kleiner Meerhund.



Canis

Marinus.


3



Canicula. 4



Galeus canis

ein art der kleiner Meerhund.




Mustelus Spina. 5

Stachelhund.




Mustelus Lævis. 6

glatt Seehund.




Galeus. 7

hundfisch




Galeus Asternus seu stellatus. Sternhund.

8



Galeus Glaucus. *Galeus Stellaris.* *Varietatis Sph.*

9



posterioreque dura est. quæ humorem crystal inum involvit, telas arnarum tenuitate superat. *nervi optici* ex substantia cartilaginea & dura constant. musculi qui eos quodammodo intra trahunt, & fixos tenent, non radicem nervorum opticorum ambiunt. sed à superiore ossis regionis oculorum parte orti, in longum extenduntur; quem situm in humanis quoque videmus. Laterum & tergoris *pinnæ* longè quàm in sui generis maiores sunt. binæ earum haud procul à cauda, binæ aliæ ad branchias & podicem, aliæ in medio ferè dorso. *Cauda* duabus constans pinnis cubitalem longitudinem æquat, & eius pars superior, quæ vetebis communita, altius attollitur quàm inferior. hæc crescentis lunæ figuram exprimit; quarum inter capedinem dimidia linea explere potest. *Hepar* adipatum, in duos maximos lobos dividitur. *Degit* in alto. sed ad littora refugit. Amnes nonnunquam adire, fortè dum prædam insequitur, Wottenus author est. *Vescitur* carne, & pisces adoritur ex insidiis. benè ἀρπακτῆρ; Oppianus vocavit: quia Archetrato ἀνθρωποφάγος, carne humana delectari, facile crediderim. Pugnam cum Urinantibus apud Plinium *f* legimus. Cum caniculis, inquit, atrox dimicatio. Inguina & calces omnemque candorem Thunnos inprimis persequitur, & ex eorum venatione cum gregatim præter Italiam acti elabuntur, Siciliamque attingere prohibentur, pinguescit. Vidit Bellonius undecim foetus uno *partu* edidisse, non tunicis involutos, sed umbilicali tantum in ea cum utero matris coniunctos. Caput in aliis animalibus primò prodibat. In *Cibis* non adeò expetuntur. Divinum quidem *g* Archestratus cibum vocat; & Mnesitheus iis quicquid concocuantur annumerat; *h* Galenus tamen, excrementitiæ carnis esse, asserit. Facile in apparatu peccatur. Dentes argento inclusi, sub nomine dentium serpentis, dentitione juvare, & puerorum pavores arcere, vulgo creduntur. Dentificia optima ex iis parari Rondeletius tradit.

PUNCTVM II.

De Galeo Aristotelis, & Catulis.

Quem Oppianus γαλεόν κύνα seu TAB. Mustelum seu Galeum Canem VIII. 4. vocat, is Aristoteli simpliciter γαλεός est. Quia apud Latinos nomen non habet, poterit vel simpliciter Mustelus, aut Galeus, Mustelusve Canis vocari. Fortè est Græcorū σινδύψας. Corpore est oblongo & rotundo cinereo, à podice ad extremam usq; caudam gracilescit. Centenas aliquando libras excedit; nec squammis, sed corio tegitur. Oculos habet oblongos; retrò eos bina foramina auditui inservientia, ex parte inferiore tunica enascitur, quæ, palpebræ avium modo, totum oculum operit. Os ipsi in supina parte, denticulatum, ante ipsum duo alia foramina olfactui dicata. Branchiæ utrinque quinæ detectæ, juxta quas duæ pinnæ, aliæque rursus duæ supina parte enascuntur, præter has maribus duæ appendices, ex podice pendent. *Hepati* bifido & pallido, vesicula fellis subnectitur. *Splen* subrubescit. In cœnosis maris locis habitat. Ova vitellis ovorum Gallinæ similia, ex quibus foetus, donec foras prodeant, nutriuntur, parit. Quia Carne *vescitur* gregalem ne credas. Natantes homines adoritur. In cibis plebi inservit.

CATULI a Aristoteli τὰ σκύλια, a Aristot. Athenæo & Oppiano σκύμοι, aliis γελίοι γαλεός, Hinnulos vertunt nonnulli, quibusdam Caniculæ dicuntur, TAB. Bellonius Nissolas Massiliensium esse, quod albas maculas per dorsum dispersas habeant, putat. Galli duos pro iis, Roussettes dictos ponunt. Maior ad cubitalem magnitudinem ex crescere solet, interdum binos superat; Cute est adeo aspera & durâ, ut eâ ebur perpoliri possit. Dorsum & latera subnigricant, nigerrimisq; & latissimis maculis insigniuntur. In petris & alto mari frequentius degit. hinc Saxatilis Canicula Rondeletio dicitur.

Minori cubiti aliquando magnitudo.

f Plin.
H.N. l. 9.
c. 46.

g Athen.
Dipnos.
l. 4.
h Galen.
l. 3. de
Aliment.

b Aristot.
H.A.I. 6.
c. 10.

tudo, dorsum & latera subrubent, notisque liventibus, & multò quàm in maiore minoribus, consperguntur. Cutis, si à cauda sursum ad caput macrum ducas, aspera; si à capite ad caudam, minimè. Oculis, ore, branchiis, pinna, caudaque similes, ab aliis parum differunt, *Generationem* si attendas, *b. ova* ipsis in medio matricis circa spinam hærent, aucta circumducuntur. In binos enim partita sinus matricis cum sit, atque sub præcordiorum septo constituta, in circumstantem utramque partem abscedunt. Gerunt testacea quædam, in quibus ovi specie, humor inest; quem colore & perspicuitate corru, figurâ pulvinaribus quæ capiti dormituri supponimus, similem, facit Rondeletius: Ova nulla continguntur secundina: à venosa umbilica parte ipsis nutrimentum est. testæ facies similis tibiarum ligulis, atque in ea sunt meatus, capillamentorum tenuitate. Testa intus rupta dilapsaque foetus exit; & ex ovo vivum protruditur animal. Caro Maioris ferinum edit odorem. Uterque etiam à plebe reicitur.

PUNCTUM III.

De Mustelo Lævi & Asteria.

TAB. VIII. 6. **M**USTELVS seu Galeus LÆVIS, non à cutis Lævore, sed ut ab Acatia cui per q̃ similis est, distinguatur ita dicitur. Romæ *Pesce Columbo* vocatur. Vix ad viginti libras pervenit. Colore est albicante, *Corio lævi*, ore edentulo, dentium vicem asperæ maxillæ obtinent, foramina pro naribus habet; quibus minora sunt alia post oculos, rostro, branchiis, pinnis, caudâ, intereanisque cum Cane Galeo convenit. *Vicinitat* piscibus, etsi inter gregales habeatur. De *Generatione* sic Aristoteles. Ova in medio matricum continent, ubi circumstetere in utrumque matricis sinum descendunt, & evadunt annexa per umbilicum ad matricem ani-

a Arist.
H.A.I. 6.
c. 10.

malia, ita ut absumptis ovis, non alio modo quam quadrupedes foetus habere videantur. Annexus est longus umbilicus ad matricis partem inferiorem, unusquisque tanquam apensus acceptabulo. Et ad foetus medium qua jecur habet, quem si feces, intus alimentum quasi ex ovo deprehendas: etiam cum amplius ovum non est. Tamen secundæ membranaeque sua cuique foetui, more quadrupedû. Foetus p̃ initia caput in superiore parte habet, adultus autē atque perfectus devexum. In læva mares generantur, in dextra foeminae, quin eadem in parte simul tum foemina, tum mas. Dissecto foetu, quorū habet viscera, puta jecur, ea interius magna, & sanguine constantia, sicut in quadrupedibus. Propter duram insuavemque carnem plebi relinquitur.

GALEUS ASTERIAS, Oppiano TAB. Ponticæ, Eliano simpliciter γαλέος VIII. nisi Galeos omnes maculatos vocet, 8.9. Bellonio *Mustelus stellaris*, qui etiam Oppiano *Pardalum* dici credit. Lævi mustelo internis & externis partibus est similis, cute tamen læviore. Dorsū maculæ aliæ stellarum speciem referunt, aliæ sunt rotundæ. Locum victum, partum, Ingenium, & Mores, communia cum cæteris habet. Itceus Galeorum optimos & tenerrimos esse opinatur.

PUNCTUM IV.

De Glauco Eliani & Maltha.

TAB. VIII. 7. **G**LAUCUS Eliani vel ideo inter Galeos refertur, quod sit Cartilagineus, tota corporis figura cæteros Galeos referat, & parvulos periculo instante, ore hiantē excipiat, præterito, revomat. a Piscis est quatuor aut quinque cubitorum magnitudine. Cute lævi. Dorsō cæruleo *Pisc.* exsaturato, ventre candido. Rostro *Aldrov.* acuto. Ore in supina parte posito. *H. Pisc.* Oculis magnis, ex quorum inferiore parte nascitur membrana candida, quæ ad oculum sursum attollitur, eisque

a Rondeletius Hist. 2. 6. 37.

eisque veluti nubes caliginem offundit. Dentium acutor. latorum, quodammodo ferratorum; ad latera spectantium ordines sunt duo, in palato substantia fungosa & mollis, quæ supernam inferamque; oris partem replet. *lingua* crassa & aspera. Branchiæ detectæ; propè has *pinnae* duæ magnæ, ad podicem totidem minores. duæ in tergore. *Cauda* ex duabus constat. superior multò longior est quàm inferior, sursumque spectat. *Interna* si attendas, videbis *ventriculū* amplissimum & longissimum; *splenem*, qui ventriculo annectitur, longum, ex multis particulis carnosis rodundisque *racemi* instar compactum. *Hepar* adiposum, in duos lobos dissectum, quor. alteri vesicula fellis adhæret. *Fel* viride. parte ventris infima in maribus feminis vasa in duas partes diuisa, in foeminis *vulvam*, in maribus substantiam carnosam, digitali magnitudine, penis specie. *Intestina* primo sunt gracilia, dein lata, sine ullis spiris. Ex venis meseraicis rami duo oriuntur; quorum alter ad hepar, alter ad ventriculū tendit, & in multos ramos diducitur. *Cor* quoque angulatum est. Carnis humanæ avidissimus, & ad littora deambulantibus inhians. Exemplum militis cuiusdam præbuit, à quo cum calces apprehendere frustra tentasset, occisus est.

MALTHAM inter belluas marinas numerat Oppianus. Suidas cum Presti aliquando eandem facit. aliquando ab eodem distinguit, *δυσωλάγωνισον* belluam appellans, Rondelerius Cetaceum esse piscem, & ex Galeorum numero colligit, quod caro ipsi sit laxa, mollisque. Pinnis, cauda, internis partibus, à Cane Galeo non differt, nisi quod alba oculor. macula destituatur. Rostro est breui, dentibus latis & acutis. Os habet in supina parte, non multum infra rostrum. *dentium* multos ordines.

PUNCTUM V.

De Vulpecula marina, &
Galeo Acanthea.

Piscis, qui Græcis ἀλώπηξ, Oppiano TAB. VII. 3. *ἀλωπηκίας γαλέος*, Bellonio *Simia marina* Latinis *vulpecula marina*, vel à caudæ a longitudine, vel insuavi b *a* Rondeler. Hist. *Pisc. Bellon. l. 1. de Aquat. c. 7.* ingratoque gustu, vel ab c astu ingenioque, nomen fortitus esse videatur. Distinguitur ne ab d *Archestrati vulpecula*, quam circa Rhodum sapidissimam, & alio nomine κύνα πύονα, id est canem pinguem apud Athen. l. 8. appellari scribit; an cum eo sit eadem, ignoro. Piscis est aliquando ad centenas libras excrecens. Cum Cane Galeo, oculis, foraminibus auditui, & olfactui inservientibus, & branchiis conueniens. Crassior & brevior. Cute tectus. Dorsum habet cineraceum, ventrem candidum, *caudam* falcatam, & quodammodo ensi formem, quæ magnitudine reliquum corpus superat, & in cuius exortu pinna conspicitur, Rondelerius ita eam exprimit, ac si ex binis pinnis constaret, quarum illa, quæ sursum abit, toto corpore longior est, altera decuplo minor. Pinnas ad branchias & anum quam in dorso longiores. Ventriculū amplum, intestina lata, jecur pallidum & in duas fibras diuisum. Iconem apud Aldrovandum vide. nos hic alterius cuiusdam subiicimus. *Locis*, in mari gaudet cœnosis à littoribus magis remotis. Pisces etiam grandiores pro cibo. In *Conceptu* & partu spinacem imitatur. Sobolem metu periculi intro recipere, præterlapsò emittere, Rondelerius oculatus testis est. Cauda, longitudo ob mollitiem quæ in tenellis facillimè e *Plin. l. 9.* flectitur, impedit. Hamo e de vorato glutunt amplius ad infima *c. 43.* lineæ, quæ facillè prærodunt. Caro *Oppian. Halieut. l. 3. v. 144.* virus respit.

GALEUS ACANTHIAS Gazæ Mustelus Spinax; Scaligero Mustelus Spinus TAB. VIII. 5. D 2 est,

est, *Æliano Centrines* nomine venit. Nunquam viginti libras implet. Corpus sensim gracilescit. Dorsum cinereum apparet, venter albicat. Rondeletius in mari argenteo colore esse, cum exspiravit ex cinereo rubescere, author est. *Rostrum* ipsi primò latum, mox in acutum desinens. Retro oculos, qui mediocres, bina foramina auditu dicantur. Ante os, quod in supina parte, & dentibus validissimis armatur, bina alia olfactui inserviunt. Branchiæ à lateribus utrinque quinæ & detectæ, *Pinna* duæ natatui destinatæ branchias sequuntur; in parte supina nullæ sunt, præterquam expodice utraque parte, quæ in foemina minores, in mare maiores sunt. hac nota, quia in cæteris omnibus Galeis inter podicem & caudam, imo ventri singularis commissa conspicitur, ab aliis, ut mas appendicibus parvis, quas illic obtinet, à foemina, distinguitur. Utraque in dorso pinna, aculeum longum, triangularem magis, quàm rotundum annexum habet. *Cauda* est gemina, superiore parte longior, inferiore brevior. *Splen* in duos lobos dividitur. Cæteris partibus cum aliis convenit. *Locus* ipsi cænosa maris receptacula, flumina nunquam subit: nec in Euripo Pyrrhæo reperitur. In septo præcordiorum supra mammæ *ova* continere; ubi ovum descendit atque absolutum fuerit, in eo catulum fieri, author est *f* Aristoteles. Sex in ventre foetus perfectos observatos, multis aliis ovis non exclusis, pendentes, qui ex ovis per venam umbilicalem excludantur. Ova nullo vinculo alligata esse, observavit Rondeletius. Ex ovis alimentum trahere, donec perfecti foras emittantur, haud malè colligi potest. *Gregalem* esse, quod multi simul capiantur, certum est. Quod foetus suos nec recipere, nec emitte possit, *g* spinæ faciunt. Carne est dura & insipida; minus tamen quàm vulpecularivrus respicit.

f Aristot.
Hist. A. l. 6.
c. 8.
I. Scaliger.

g Arist.
H. A. l. 6.
c. 10.

PUNCTUM VI.

De *Centrine*.

Nomine CENTRINES, * *Ælianus* TAB. VII. 4. 5. Mustelos aculeis præditos intelligit, cum duo Canum genera, in Galeos & Centrinas dispescit: nos eum intelligimus, quem *a* Aristoteles *παραλεόν, γωπίδανον*, esse, *b* Athenæus ab Epæncto *ἑπνωπίδεα* vocari, docet. Romæ & tota Italia *Pesce Porco* dicitur. Plinius nusquam eius meminit, nec apud Aristotelem quicquam invenias, quamvis scripsisse Athenæus prodiderit. Quantum ad descriptionem brevis est, crassus & spissus, à capite ad podicem *trianguli* figura. Cute integitur asperimâ, brevibus crebrisque aculeis horrida, qui in capite & dorso robustiores sunt, colore ex cinereo nigricante. *Caput* habet exiguum & depressum. *Oculos* splendentes, post eos duo foramina auditui destinata, duo supina rostri parte pro naribus conspiciuntur. *Caput* supina parte, rotundum, magnum, semper ferè hians. *Dentes* latos, acutos, quorum in superiori maxilla triplex, in inferiori simplex ordo est. Branchias utrinque in lateribus quinque, eademq; detectas. *Pinna* prior à capite statim enascens, aculeo longo & ad caput sese inclinante armata, cristæ instar multum surrigitur, quæ è podicis regione minor, minore & ad caudam vergente aculeo, instructa est. In caudam & podicis pinnas, imo ventri, nulla alia pinnula subnectitur, quod ei cum *Acanthia* commune. Cauda in pinnam inferiore parte latam, superiore parte in acutum angulum desinentem degenerat. In partibus internis, ventriculus est oblongus crassus. *intestina* haud multis gyris reflexa. *Hepar* præpingue, magnum, in duos lobos ad infimam ferè usque ventris sedem extensos divisum, albicat. *Locus* ipsi in cænosis pelagi domiciliis potius quàm littore; ideo varius capitur.

Ova

Ova primum in se gignit numerosissima, vitellis gallinaceorum ovorum similia. animal reliquorum cartilagineorum more excludit. Venenum fundere ex *c* Oppiano discimus, quos ille *κέντηρον ἐπὶ πόνυμυς* vocat, hoc *κέντηρον* vocari, vetus scholiastes adscripsit. Vix aliquis eius in *cibis* usus. nerveâ potius quam carneâ substantia constat. In *Medicina* oleum ex hepate frixo collectum, ad duritiem humani hepatis emolliendam conferre, & articularum dolores lenire ex Rondeletio habeo. Cinis urinas vehementer movet.

PUNCTUM VII.

De Simiamarina, & Zygena.

TAB. VII. 6. *Simiarum* *Marinarum* duas habemus descriptiones a *Æliano* est bellua in mari rubro, cartilaginea, terrestri tum tum colore tum facile similis; in hoc differt, quod variè distinguatur, cervicemque & branchias ruffas habeat. Tegmen corporis testudinis involutum est. Cum natat, volare videtur. *b* Gesnerus piscem sibi ex *Dania* allatum scribit, coloris corpore toto viridis, dorso magis fusci, ad latera pallidi. *Os* sinum habebat. *pinnas* tanquam volans extendebat, & inter duas in dorso *pinnas* aculeum retrò tendebat. *branchiarum* foramina quina apparebant, obliquo inter os & oculos descensu. Testudineum involutum si accessisset, *Æliani* simiam fecisset.

TAB. VII. 8. 9. *Zygæna* piscis monstrosus, à capitis figura, qua *τὸ ζυγόν* imitatur, quo transversum librile, ex quo lances dependent significatur, nomen obtinuit.

GAZA Libellam vertit. *Massilienses* piscem *Judæum* à similitudine tegmenti capitis, quo olim *Judæi* in provincia utebantur, dicunt. *Galenus*, *Ælianus*, *Oppianus* *c* eosque secutus *Suidas*, ceteris annumerant. *Galeis*, quia multa cum

illis communia habet, haud male subnectitur. Corio tegitur. Ventre est albo, dorso cinereo, pro spinis cartilagineas obtinet. *Cervicem* & *gulam* habere scripsit *Rondeletius*. *Os* ipsi non rotundum, non rostratum, nec in latera compressum; sed in ea extensum, atque transversum habet. Pars frontis anterior, quæ utroque oculo, magno, & deorsum potius quam sursum vel ad latera vergente, clauditur, in semicirculum ferè extuberrat, & sic in aciem acuitur, ut obvios pisces secare posse credatur. *Os* subtus, inferiore parte, per magnum, dentibus validis sinus planis, in latus ferræ modò vergentibus, triplici vel quadruplici ordine digestis armatum, latet. *Lingua* lata, humanæ haud absimilis. *branchie* utrinque quinæ & detectæ. *Pinnas* icon ostendit. in dorso nullam esse tradit *Rondeletius*. *Cauda* duabus inæqualibus pinnis constat, quarum superior vertebris fulcitur, ac multo longior est; inferior vertebris caret, & brevior extat. *Versatur d* in profundo. Pisces obvios, a *Æliano* & homines natantes frontis suæ acie subvertit, & *Leoni* quod ad vires, ab *Oppiano* *e* opponitur. Occursus eius olim, navigantibus *f* infaustus habebatur. Ab ista *ZYGÆNA* plurimum ille differt, qui ventre candicante, ore, miniacei coloris, cætera niger esse, scribitur.

PUNCTUM VIII.

De Mola Salviani, seu Orthrakorisco Rondeletij.

TAB. IX. 1. 2. *Monstroso* pisci *monstrosiorem* subijcimus, sed & istum toto corpore cartilagineum. *Mola* quibusdam, seu quod informem molam referat, seu quod retunditate corporis molæ molendinariæ similis sit, ut *Rondeletio* placet, dicitur. Apud *Massilienses*, *Luna*, vel quod extrema corporis parte, quæ pinnis subest, crescentis figurâ referat, vel quæ demptis pinnis toto corpore plenæ instar sit,

vel quod corporis extremū in cornua curvatæ respondeat, vel deniq; quod noctu splendeat, vocatur. sed cave pro *a* Æliani sumas. Porcum, quem Lacedæmonij *Orthroriscum* vocant, quemque *b* Appion maximum piscium esse, & cum capitur grunnire, credit Rondeletius, nec abludit cōparatio. Nec *c* longus, nec planus est, sed in latera comprimitur. brevis adeo, ut solum caput potius quàm piscem repræsentare videatur. Centenas sæpe libras superat. *Cute* tegitur asperâ nō secus ac *Squatina*, argentei coloris, ventre est subalbido, dorso cineraceo. Os habet exiguum. *dentes* tantum geminos, utramque universam oris partem munientes, quorum inferior retusior, superior magis acutus ac secans est, latos continuosque Rondeletius facit. Oculos parvos ac orbiculares. *De branchiis ita Salvianus*. Branchiarum internum orificium utrinque, unum est parvum & semicirculare, prope quod etiam utrinque pinna una parva & rotunda sita est, quæ alia prorsus ratione quam aliorum piscium laterales pinnae, moventur. Cum enim illæ in piscibus à cauda ad caput, in hoc nostro à dorso in imum ventrem deducuntur. In extremo præterea dorso prope caudam alia multò major pinna, non rotunda sed sublonga erigitur: è cuius regione altera eiusdem magnitudinis & figuræ imò ventri statim ab ano subest, quæ alio etiam modo quàm dorsi & ventris aliarum piscium pinnae mobiles sunt. Non enim ut illæ à cauda ad caput eriguntur, & à capite ad caudam inclinantur, sed in utrumq; latus moventur.

In caudam carneam non degenerat: nam postrema eius æquè ac latera lata sunt: pinnata tamen cauda, non oblonga sed lata, atque omnem postremam piscis partem amplexante, in latereque mobili munitur. Crescentis lunæ figuram referre; superiore parte articulatam esse, ut tam in dextrum,

quam in sinistrum moveatur, Rondeletius addidit.

Quantum ad *Interna*, quæ ob corporis rotunditatem conglobata sunt, Carne est candidissima, nerveam potius, quàm carneam substantiam præ se ferente. Cocta gluten ex tergoribus boum confectum refert. *Adipe* ut in porco, multo carni corium firmissimè adhæret, & difficillimè avellitur. *Iecur* habet pallidum, magnum, & tenerrimum, dum coquitur in densam pinguedinem faceffit. Nocto ex internis partibus cæruleus è longinquo splendor, imò ignis splendidissimus enitet. Grunnire dum capitur, dicitur. Pinguedo eius est multa & candidissima; liquefacta, lucernis inservit, solo pisculento odore molesta. *Speciem aliam Gallus quidam Venetiis descripsit*. Iconem exhibeo. Forma, inquit, in orbem vergebat. Corio sine squammis, &c.

An huc Piscis Cadamusti suem referens dolium crassitudine, duo longitudine superans, formæ obrotundæ, suilla cute, Oculis parvis, edentulus, loripes, branchiis brachii mensuram excedentibus, cauda longa, & lata spectet, aliis iudicandum relinquo.

ARTICVLVS III.

De Cartilagineis planis.

PUNCTUM I.

De Torpedine.

ABsolutis Cartilagineis longis, TAB. ad Planos progredimur, pri- IX. mus occurrit *Torpedo*, quæ veteribus Græcis *νάρκη* & *νάρκη*, ad differentiam affectus, *θαλάσσια*; modernis *τρεπάλια*, & Margotir, Alberto *Stupefactor*; mixto barbaris, *Torpigo*, *Terpigo*, *Stupor*, *stupefaciens* & *stupefcor*, dicitur. Ex Cartilagineis planis esse,

ex

a Ælian.

H.A.L. 15.

c. 4.

b Plin.


H.N. l. 32.

c. 1.

e Aldrov.


de Piscib.

l. 3. c. 44.




Mola Peregrina

1




Mola Zitterfisch

2



Torpedo maculosa
gefleckte Zitterfisch


4



Torpedo


Zitterfisch

3




Torpedo

5



Torpedo


6



Aquilla

Adlerfisch

8



Dufinaca

Angel fisch
Meer angel

7

Meer adler



Aquila speciosa
et alia

Meer Adlers. ander rr.

9

ex *à* Aristotele & Plinio habemus. Lævem, apud *h* Athenæum legitur. Corruptus Aristotelis *c* locus ex quo colligitur spinosa. nec vacat errore *d* Cardanus. Duo olim ipsius genera. *Nigrum* quod ad capitis dolorē commendatur, & subruſſum, ſeu ad rubricæ colorem accedens. In *Maruſſoſas*, & *Non maculoſas* optimè diſpeſcuntur. Tria illarum genera. *Macule* in quibuſdam diverſarum figurarum & albicantes, huc & illuc ſparguntur, in quibuſdam quinæ rotundæ, nigricantes, pentagoni figurâ locatæ, oculos tam egregiè repræſentant, ut Oculatam Plinius dixerit; benè dictum Bellonius defendit. Omnium corpus ſi caudam exceperis orbiculare eſt, ſenas libras vix excedunt, molli & lubrica cute teguntur. Venter eſt ſubalbidus, *dorſum* ſubflavum, & ad rubricæ fabrilis colorem accedens, partes quæ ad caudam mediis corpulentiores apparent. hæ *cartilaginem* quandam tabidam in ſeipſis habere videntur. *Ore* ſunt in ſupina parte parvo, ante quod foramina duo odores deferunt, dentibus minutis & ferratis. Oculis in ſuperiore parte antè exiguïs, quos retrò foramina duo, ipſis grandiora, patula, & in palatum pervia. Cerebro non carent. *Lingua* deſtituuntur: *Branchiæ* in medio ſunt corpore (ob ipſius tenuitatem ad latera locari non poterant) utrinque quinæ & detectæ, quarum oriſicia parva & ſemicircularia, tenui quadam cuticula conteguntur: *pinna* juxta caudam duæ; pro reliquis latitudinè utuntur, & utroque ſui corporis ſemicirculo quaſi pinnis natant, podex in caudæ exortu, ipſa brevis & latiuſcula. *Intus* Carnoſum habent ventriculum: *intestinum* breve & amplum. *hepar* pallidum, & in duos lobos diviſum. *Fellis* *veſica* illaque magna hepatis committitur & dextrò annexa lobo, in ſiniſtrum quoque venulas quaſdam immittit. *Lien* eſt parvus & ſub rubens. Uterus oblongus & bifidus. *Habitant* *e* in mari, locis cœnoſis. reperiuntur & in *f* Nilo. ut haud male in *Marinas*

etiam & Fluviatiles, diſtinxeris Piſcibus *veſcuntur*; quoaſtu; ut poſt dicam, capiunt. *Pariunt* circa æquinoctium, & quidem ova intra ſe præmollia, quæ in alium locum uterî transferunt, & excludunt. Sic animal pariunt, ova concipiunt. Oetogenos fœtus habens, inventa eſt. Hyemè propter frigus in terra latent. Latitudine ſua quaſi geminis pinnis *feruntur*, natant ſed ægrè, nam *h* *h* *Oppian.* *νωτὴς βραδυτῆς βαρύνονται, pigra tarditate* *Hal. l. 2.* *gravantur.* idè *βραχὴν κεραλῆν καὶ πολυμύχανον* Natura conceſſit. Singularis ipſis torporem vel tremorem inferendi, unde nomen habent, facultas. Merſæ in *i* limo ſe occultant *i* *Plin. H.* & piſces, qui ſecuri ſupernatantes obtorpuere, corripunt. Idem *c. 42.* *h* procul & è longinquo, vel ſi haſta *Oppian.* virgave attingantur, quamvis prævalidos lacertos, torpidos, & quamlibet ad curſum veloces pedes, aligatos reddunt. Et illiqui, rete, in quo una ex iis capta fuerit, attrigint, torporem patiuntur, quod *l* *Æ-* *N. l. 32. c. 1.* *liani* fide dictum ſit: & ſi inter mortuos piſces vivens Torpedo ſeſe moveat, qui tacti fuerint, interno quodam motu cientur, ut videantur vivere, quod Godignus de rebus Abyſſinis prodidit. Intotone corpore, quod Salviano placet, an parte, quod *m* Diphilus, *n* Oppianus *m* *Athen.* & Cardanus prodidere, incertum. *Dipn. l. 7.* Exiguam plerarumque, quæque quavis corporis excitatione reſellatur; nec totum corpus inſeſtantem, *n* *Oppian.* *Hal. l. 22.* *Gilii* & *Kircheri* experienciâ docemur, ut vel inde *Albèrtum*, qui hoc veneno hominè interfici prodidit, reſellere liceat. Cauſam in cæcam facultatem, quod mortua eadem deſtituitur, conjeceſe alii; in narceticam *o* & inſenſibilem *o* *Kirchnerus l. 3.* *qualitatem*, nervis & maſculis contrariam alii. *Magnet. art. p. 6.* *ſus* Torpedinis in *cibis* commentus *p* *à* Galèno & aliis, quod *l. 4.* *p* *Gal.* *l. 3. de A-* *diocritè* per ventrem ſubeunt. *tim.* tem habeat; *à* Diphilo & aliis rejectus eſt. Partes duntaxat quæ circa caput laudantur. Venetiis ne in foro

e *Oppian.*
l. c. Hal. v.
104.
f *Athen.*
Dipn. l. 7.

m *Athen.*
Dipn. l. 7.
n *Oppian.*
Hal. l. 22.
v. 55.
o *Kirchnerus l. 3.*
Magnet.
art. p. 6.
l. 4.
p *Gal.*
l. 3. de A-
tim.

qDiosco-
rid.l.2.
mater.
medi.
c.17.

Plin.H.N.
l.32. c.10.

foropiscario vendatur, præfetti san-
nitatis autoritate cautum est. Ge-
nuæ, Massiliæ, & alibi à tenuiore for-
tuna expetitur. In *Medicina* diuturnis
capitum q doloribus admoveatur: &
sedem prociduum coërcet. idem ap-
ud Marcellum Empiricum inve-
nies. fortè & arthriticos demuleet;
eodemque modo Anteroëa Cæsaris
libertum supra fidem podagram cu-
rassè, Scribonius Largus testatur. &
Diaturpænos ceratum apud Ægine-
tam ad podagram habemus. Mirum,
si verum, quod ea Plinius. si capiatur
cum Luna in libra fuerit, triduoque
asservetur sub dio, facilis partus face-
re postea, quoties inferatur. fortè
quod velut induciis dolorum datis,
natura ad excludendum fœtum fir-
matur. Corium nuper decorticatæ, si
parti matricis prolapsæ involvatur,
ipsam reducere, Aëtius ex aliis ha-
buit.

PUNCTUM II.

De *Pastinaca marina*.

TAB.
IX. 7.

QUEM Græci *πυγώνα*, seu ut D.
Ambrosius vertit, *Turturem*, ab a-
larum expansarum similitudine vo-
cant, is Latinis *Pastinaca marina*, seu à
colore, seu quod radio suo ceu pasti-
no instrumento fossorio fodiat &
pungat: Gallis *Raja*, ob similitudi-
nem quam cum Raiis habet, dicitur.
Duas eius *species* Bellonius & Ronde-
letius agnovere. hic capite tantum
& rostro differre ait: ille in *levem*, cu-
ius cutis perpolita, dorsum livet in
corticis platani modum, venter albi-
cat, plurimis veluti striis, per carnem
hinc inde deductis; & *Asperam*, quæ
tota aculeis horret, atque ad caudam
præsertim permultis uncinis in gy-
rum dispositis scatet; dispescit. Ma-
gnitudine vix denas libras superant.
Corpora sunt quadrilatero, ventre
albicant, dorso livent. Superiore par-
te aliquod *capitis* vestigium ante-
rius cernitur, capiti palustris ranæ
non absumile: in eo nonnisi *oculi* ob-
longi & grandiusculi, à quibus fora-

mina bina, oculis maiora, semper pa-
tula, in palatum deducuntur, pars
oculis anterior in rostrum carnosum
acuitur. Os habet parvum & eden-
tulum, (mendum in Dioscoride, si
dentes habere innuit) solaque ma-
xillæ asperitate illorum vice utitur.
Pinnis carent circa caudæ exortum
unam orbicularem si excipias, ideò
latitudine sua* natant. *Branchias* in* *Arist.*
medio ferè ventre quinquæ, in partibus *H.A.l.1.*
flaccidis & carne vacuis, (partes *a c.5.*
circa caudam mediis partibus car- *a Galen.*
nosiores habere, cartilagineis planis *l.3. Ali-*
commune est,) sitæ sint. *Caudam* *ment.*
habent longissimam, spinosam,
muris caudæ persimilem, Crassa
primum, paulatim in magnam tenui-
tatem stringitur, super eam, in medio
ferè aculeus, osseus, longus, acutissi-
mus, & serratus, quincunciali magni-
tudine, Dioscoridi *κέντρον*, Horo A-
pollini *ἀκάνθα*, Plinio radius eminet.

Quantum ad *interiora*, Ventricu-
lum habet parvum, augustum, cui,
quia satis ab ore diffusus est, *stoma-*
chus præponitur: idem in ecphysin à
quæ breve & gracile intestinum de-
pendet, quod aliud initio angustius,
mox sensim latius, dein priusquam
maximè dilaretur, angustum postre-
mum in rectum intestinum defi-
nens, & unde excrementa porracei
coloris rejiciuntur, desinit. *Iecur*
amplum, ex albo flavescens, in duos
lobos, quorum dexter latior & ma-
ior, sinister brevior & minor, divi-
sum. *Fel* hepatis adnexum, ex viri-
di flavescens. Uterum oblongum,
quo ova continentur.

Degunt in cænosis maris locis. Car-
nibus vescuntur* & latrocinantur* *Plin.H.*
ex occulto, transeuntes radio (quod *N.l.9.*
telum est eis) figentes; nec quen- *c.42.*
quam* attingunt, nisi telo suo vul- **Oppian.*
neratum. *Halieut.*

Ex insidiis venari, quod Mugilem *l.2.v.472.*
velocissimum piscem assequantur,
argumento esse potest. *Cœunt* *b b Aristor.*
ut *Rajæ*, admotis invicem non so- *H.A.l.5.*
lum partibus supinis, sed etiam tergo *c.3.*
fœminarum supinis marium, super-
positis. Fœtus aliorum cartilagi- *c Aristor.*
neorum more non recipiunt. *c Id H.A.l.6.*
enim *c.10.*

enim acuties caudæ phibet. *Volatum* d quoq; exercere, falso apud *Ælianum* dicitur: sed e radii sui veneno se tueri, tam certum, quam *Musica* dieteriis & salrationibus f delectari; ambigitur videtur. De ejusdem radij venenositate non est quod dubitemus. Nullum usquam execrabilius, arbores, infixus radici, necat, arma, ut telum perforat; visceri & veneni malo, non tamen, ut nulli remedio, quod *Ælianus* g prodidit, succumbat; & necesse fuerit h Leonidam. Bysantium ictum occumbere. Bene radlicinis cum aceto vulneri admoventur, feliciter fursures in eodem cocti auxiliantur. Lauri decoctum, Theriaca Andromachi, Galeus, cum quo inimicitias gerit, haud frustra adhibita. Cauda, quæ idem intulit, in arborem, quercum imprimis, infixa, aut de eadem suspensa, emarcidam eandem evadere, sanari ægrum, Aëtius prodidit. De *Usu in cibo*, ne falso i Galenus mollem & jucundam carnem eius faciat, vehementer metuo, gustus in suavem & ferihum quid respicientem, testatur. In *Medicina* mitigat k dentium dolores radius, quos frangit & extrahit, Torreri cum, mox conteri resinaque excipi, debere, apud Celsum legimus.

PUNCTUM III.

De Aquila.

TAB. IX. 8.9. Quid per Aquilam piscem, seu veteres voluerint, difficulter sciri potest, planum a duntaxat, & cartilagineum; animalque parere, ab omnibus proditum est, radium aliquem in cauda habuerit, nec ne, reticere. Non mirum itaque in diversa recentiores trahi, & unam à Salviano, quam Rondeletius alteram Pastinacæ speciem facit, duas ab Aldrovando, monstrosam à Bellonio & Paræo describi, *Salvianiana* magnitudine trecentas libras non superat. Lævi & molli cure regitur, inferiore

parte alba, superiore livida. Caput habet exertum, capiti bufonis simillimum: oculos magnos, rotundos & prominentes, post quos bina, magna, & patula foramina insculpta sunt. Os supina parte mediocri & denticulatum. Latera, quæ acuta, expansas volantis Aquilæ alas æmulantur. In caudæ exortu utrinque una parte & rotunda pinna exoritur, in maribus ex utroque podicis latere, una appendix pendet. Cauda pastinacæ tenuior & longior; in dorso paulo post principium pinhatam unam erigit, atque hac deinceps aculeus ossæus, longus, acutissimus atque serratus, eminet. Intra, Jecur est subflavum, lien subater. Aldrovandi prior videtur ἀκρόαλ, latissimis alis, quæ corpori hærent ceruleis, in extremitate rubris. Altera supra oculos & in fronte aculeata est, in cauda binos gerit radios. Cœnosa hipiscæ in mari loca incolunt, resupinati piscibus aliis vescuntur, quos ex occulto figunt. Vivos fœtus cartilagineorum more pariunt. Radio lædunt, idèò publicè cum eo non divenduntur. Caro quia tetrum & gravem spirat odorem, à mensis exulat. Quæ de lapide in capite eius à Kiranide scribuntur, fabulosa sunt. Bellonii verè monstrosus est, descripsit eum Gesnerus. Piscis hic rarus (inquit) & ignotus omnibus, & Paræus volentem facit, rostro viridi.

PUNCTUM IV.

De Rayjs in genere.

RAjarum nomen fortè à radendo TAB. X. Latini sumere. Græci à quadam cum rubo similitudine, sunt dorso asperæ, ut recurvas supina parte rubus, spinas gerit; βάραν marem, a Plin. H. fœminam βάλιδα dixere. Plinius a N. l. 23. Græco vocabulo utitur. Ex cartilagineis b & planis esse nullum dubium. Albertus in pectinum genere posuit. Tria verò illarum E apud

Plin. H. N. I. 9. c. 24. apud antiquos genera. βατον unum simpliciter, λειβατον Alterum Aristoteles & Galenus vocavere, stellatū Athenæus addidit. Rondeletius postquam in *laeves* & *asperas* easdem divisisset, mox stellulis notatas, iisque carentes addidit; & ex *asperis*, alias modicè tactum vellicante lanugine, alias robustis sed raris aculeis; quasdam robustissimis & densissimis asperari dicit. Magnitudine inter se differunt, bicubitales aliquando Salviander vidit, haud minores c. Aegolico clypeo in India nasci, Ælianus prodidit. Cuticulari teguntur operimento, omnibus membranula, quam nebulam vocant, *oculus* obtenditur, juxta oculos foramina sunt magna ampla, ad oris usque intima patentia, quibus operculum interiore parte à natura additum est. Orè aperto dilatantur, clauso magna ex parte occluduntur. *Cauda* omnibus proceratque aspera, in eius dorso duæ pinnulæ, toridemque, sed exiguæ & orbiculares ad ejusdem exortum. Quod cartilaginei generis plana, pinnis destitui scripsit Aristoteles, illas quibus natando corpus impellunt, intellexit, quæ ad caudam, dirigendi itineris gratia data sunt. Si quid in contrarium apud eum occurrit, mendum in causa; βαταζα, & pro βατ & legendum est. *Interiora* si lustremus, *fellis* omnibus in hepate vesica. *Splen* in verticuli plexu; intestina crassa; in ecphyssi & recti intestini extremo angusta, genitale vitulæ marinæ simile. Circulatorum ex exsiccatis Draconū & Basiliscorum figuras effecerunt, sic plebeculæ imponunt.

TAB.
XII. 1.

Commoda Raii in cœnosis maris locis, non procul à littore *habitatio*. Hyeme latent, & quia numerosæ capiuntur, gregales haud malè colligas.

Coëunt d non tantum admotis invicem partibus supinis, sed etiam tergo foeminarum supinis mariū superpositis, nec inter suum duntaxat genus consistunt. Cum Squatina quoque coire scripsit Aristoteles. Gerunt utero testacea quædam, testa tibiæ ligulis similis est. Pariunt animal, cum

primum ova intra se pepererint. *Ova* quæ flava, sine testa primum in superiore vulvæ conspiciuntur, quædam magnitudinem ovorum gallinæ æquant, alia his minora, nonnulla ciceris magnitudinem nō excedunt, pluracentenis in singulis aliquando numerantur. Quæ à perfectione propius absunt, in inferiorem matricis partem dimissa, testâ, & in qua albumen & ovum continentur, operiuntur, quadrati formia hæc, demptis angulorum, quæ variæ sunt appendicibus. Unius lateris appendices longiores, sunt foliis gladioli herbæ similes; alterius, breviores, latiores, replicatæ, quibus undique summotis, laterum anguli, tibiæ repræsentant ligulas. Unū aut ad summū duo pariunt, quod maximus earum in mariproventus, infinita ovorum in superiore vulvæ parte series facit, ex quibus tempore perfectis, iterati foetus excluduntur. Abditas, pinnas exertas movere specie vermiculorū, allapfos ad eas pisciculos capere, sic tarditatem motus astu compensare c. Plinius c. Plin. H. N. I. 9. author est. Aristoteles radiolos vocat. Mendum tamen hisce locis subesse, suspicio est, cum nec pinnas nec radiolos habeant, vel pinnas Plinius improprie vocavit, & radiolis ab Aristotele tributum, quod rostri acumini cōpetere videtur. Olaus quondam depingit; quæ homini in septentrionali Oceano circumvento suppetias tulerit. *Vsus* etiam in *Cibis*. Copiosioris nutrimenti & concoctu difficiles f. Galenus facit. Rondeletius de Rajæ bonitate quæritus; videri atperinde ac si quis pallium elixum tenuante. comedat, respondit. Arcestratus scapulas & hyeme laudat. Laterum extremas partes à divitibus comedi, reliquas plebi relinqui, ex Gesnero habemus. Apud Hollandos potissimum elixantur, butyrum, acetum, & sinapi condimenti loco sunt. Caseo & Silphio veteres condiebant. In *Medicina* auribus fel est utilissimum, hepate ad pruritum feliciter Rondeletius usus est.



PUN.

PUNCTUM V.

De Raijs Lævibus, & in specie de Lævi Raja, Vndulata, & Oculata.

TAB.
X. 1. 2. 3.
4. 5. 6.

RAJA in Lævēs & asperas optimè distinguuntur: Inter illas, quarū aliæ acuto, aliæ obtuso rostro sunt, prima est quæ λευόβατος simpliciter Græcis, LÆVIRAJA Latinis, *Mucosa*, & à lata fascia qua mucus seu potius coryza in laborantibus excipisoleat, *Bavosa* Romanis dicitur. Omnium est sui generis piscium post bovem maxima.

Corpore quidem tenui, sed in amplissimas alas expanso. Cute ab aculeis nuda. Uterque oculus, media dorsilinea, & cauda tenuioribus & raris aculeis muniuntur, sed & in supina parte quidam in os, quod latum est, cibi sine dubio retinendi causâ, recurrunt. Rostrum tenui & pellucida cartilagine, constat. Alæ utrinque expansæ tenuēs sunt, & prona parte nigricant. Cauda, quæ tribus aculeorum ordinibus, instruitur, tota supina parte alba est. Rima quæ podici, pudendum muliebrem refert. Quam Aldrovandus describit, maculis supina parte nigris undique variabat. Rostrum pars in obtusum angulum, figura depresso, & quasi quadrangula tendebat. Branchias quinque directas, habebat. Inter cutem & peritonæum albida caro mucosa, panniculi carnosus vicem obtinebat. Intra, hepar erat in latitudine ventris, ex albo rufescens, tribus lobis, linguarum figuram referentibus, quorum medius brevissimus, distinctum. Sub hepate figuræ planæ ventriculus, pars convexa ad sinistram vergebat latus, concava in spinam. Mesenterium ad connexionem ventriculi & intestini medio hepatis lobo colligabatur, sub ventriculo caro cernebatur rubicunda, lienis fortè vice fungens. Cor thoracis

sinu exiguo triangulari, exiguum, trunco unico veluti pediculo appensum continebatur.

RAJA UNULATA à maculis flexuosis ita dicta, à colore *Cinerea* dicitur. Corpus ovi potius est, quam Rhombi formâ, pronâ parte multis sinuosis lineis describitur. Aculei in lineâ dorsum pauci, parvi, & rari; circa oculos nonnulli; in cauda majores & densiores triplici ordine disponentur.

RAJA OCLATA & lævis, Asterias quibusdam, sed perperam dicitur. Nam & *Galeus* à maculis, Asterias à maculis stellatis dispositis ab Aristotele nominatus est: quales in ista minimè deprehenduntur; & Asterias veterum tenerior est bonique succi; quod de hac dici non potest; & Gallihoc genus Miralet à speculorum parvorum similitudine vocare solent.

PUNCTUM VI.

De Oxyrincho majore & Rajastellari.

DUO OXYRINCHORUM genera (à rostri acumine ita dicuntur) TAB. X. 8.
Rondeletius facit. Maiorem unum, Minorem alterum. Bos ille Bellonii est; non quod quadrupedem repræsentet; sed quod Rajarum generis maximus, ad Bovis magnitudinem excrescat. Ligures *vaccam* vocant, in quibusdam Galliarum locis *Eleno*, quasi subulam, quod piscis rostrum tale sit, dicitur. Ex a planis cartilagineis Bos a Aristor. vem esse dubitari non debet. Ad duo. H.A.L. 5.
decim ulnas latitudinis excrescere, c. 5.
b Oppiani autoritate affirmo. In Plin. H. N. descriptione non conveniunt Authores. Dorso, facie, lateribus admodum niger est. Supinæ partes albi- l. 9. c. 24. cant, si Æliano credendum. Bel- b Oppian. l. 2. v. 143. lionius toto corpore lividum facit. c Ælian. H.A.L. 1.
Eidem dentes habet truces, hami in modum inflexos, triplici ordine in maxilla dispositos, eosque mobiles. d Oppian. Æliano adeo inclusi, ut in conspectum l. c. v. 145.
E 2 ctum

e Ovid. in
Haliens.

f Aristot.
H.A.l.6.
c.12.

TAB.X.
9.
TAB.
XII.7.

etum non veniant. Rondeletio Major Oxyrinchus minori similis est, alis amplis & extrusis, ipso corpore strictiore, acutioreque dorso longiore. *Aculeorum* in sola cauda unicum habet ordinem. Pelagii sunt e Ovidio boves; in cœnosis locis degunt Oppiano; Æliano in lutosis gignuntur. Piscibus *vescuntur*, sed humum maximè appetunt. *Pariunt* statim animal. Corpore etsi sint magno, ideo quibusdam inter Cetaceos, imbelli tamen, mollitie conscii, sola corporis mole feruntur, sic & piscantes pondere suo opprimunt, & capti, renituntur. Carne sunt quam cæteræ molliore, & sale fumoque conditi exsiccantur, exsiccati diu incorrupti remanent.

OXYRINCHUS Minor corpore est maximo, & maculis multis lentis specie, notatur. *Dentes* habet in os vergentes. Ad oculos quatuor aculeos; in cauda tres eorum ordines, diversos & inæquales; primus medii ordinis maior est secundo, tertius primo, quartus secundo respondet. Utrinq; per transversum recti sunt, ad latera conversi, qui per hos sequuntur in cauda extremi, in caput recurvantur. In supina parterostri, alii sunt ad capiendos pisces recurvi, alii acutiores. Cæteris partibus cum reliquis conveniunt. Ad Oxyrinchos referri debet ille, quem Gesnerus Venetiis accepit, corpore cinereo, maculis distinguantibus fuscis, ambitu corporis subrufo, Normannis Hal, Lusitanis Huga dictus.

Iconem hic vide.

TAB.
X.7.

RAIA STELLARIS lævis, Græcis Asterias, quam Gellius Rajam oculatam esse vult, capite, dorso, & cauda ab aliis distinguitur. Dorso pars prona alæque expansæ, stellulis, elegante, depictæ conspiciuntur. *Aculei* in eodem mox à capite incipientes, in priorem caudæ pinnulam desinunt. *Caput*, quia crassius & latius, Pastinacæ quàm aliis Raiis similis est. Cauda tenuis, & quàm reliquis brevior.

PUNCTUM VII.

De Raijs Asperis : Et in specie de Raja aspera Stellari, Oculata, Et Clavata.

RAJA ASPERA STELLARIS tota aculeis horret. In oculorum intervallo multi sunt, breves, frequentes, peracuti: in medii dorso lineæ alii magni, in cauda tres magnorum ordines, alii plurimis & minoribus distincti, infiniti alii sine ordine per totum corpus resperguntur, pro *dentibus* ossa dura & aspera gerit. Duæ huius generis esse videntur. Una quæ stellulas habet in medio albas, sed quas ambit circulus ex nigris punctis constans, totumque corpus aculeis horridum est. Altera, stellulas prorsus candidas, cum multo paucioribus aculeis obtinet.

OCULATA lævi maculis similis est. *Aculeos* in alis extensis è regione macularum utrimque habet, alios in lateribus capitis utrinque, alios in dorso, in cauda, maiores, frequentiores, & validiores visuntur.

Raja CLAVATA duplex est. Una quam Massilienses Clavade, Gallii Rajebouclier vocant. Corporis specie reliquis est similis, sed multo brevior minusque acuto, &c. Colore nigricante, alis valde expansis. *Hepar* habet flavescens in duas partes dissectum, in quo vesica, fel aqueum & tenue continens. Pingue est illud, & inter cibos delicatissimos, in oleum resolutum, hepatis duritiem resolvit. Carne est durum. Posset Aquilæ conferri.

Alterà à superiore differt (Verba sunt Rondeletii, cui multas Rajarum species debemus,) &c. Congener hisce est & illa. Cuius icon Venetiis ad Gesnerum missa est. Maculis distinguitur fuscis, reliquum corpus obscure subluteum est, reliqua apparent.





PUN.

Raia.


Roche.
2

Raia.

Roche.
1



Glatte Spiegel Roche



Gefür.

Spiegel Roche.




Augen Roche.

Raia asperima


Raucher Roche.

Raia Astoria Aspera

7





Großer Spiz
Roche Wall rock
Naser ochs.




Kleiner Spiz
Roche


Raia Clauata alia. 3




Raia spinosa. Doren Roche. 5




Raia Fullonica. Kanten Roche. 4




Leuis Raia. alia. species. 6



Squatina. Angelus marinus. 7




MeerEngel. 8










Pana. Piscatrix. Sine Marina.

Meer Krotte. Meer Tagel. Fischer Krott.

Pana Piscatrix. 9



Aldrouandi.



PUNCTUM VIII.

De Raja spinosa, Aspera,
Fullonica, & Asperri-

ma.

TAB. XI. 5. *Aldrov. de Piscib. l. 3. c. 59.*
RAJASPINOSA Gallis *Cardaire*, quasi *Lanifica*, à spinis seu aculeis quorū multi infixi sunt instrumentis quibus lana carminatur; figura corporis lævi rajæ similis est, si longas cutis spinas excipias. *Spinæ* non in alis solum habet, ut clavata altera; sed etiam in lateribus circa caput; duo oculis præfixi sunt, & in media dorsi linea, & ad priorem usque caudæ pinnulam continuus est aculeorum ordo unicus. Carnis substantia & succo ab aliis non variat.

TAB. X. 7. *Aldrov. libro cit. cap. 60.*
ASPERA, illa à Rondeletio cognominatur, quæ à cæteris eo differt, quod *aculeis* parvis latera conspersa habet, corporis verò truncum nullis. *Rostrum* est acutiore. In cauda tres sunt longorum & firmissimorum aculeorum, ad extremum usque caudæ ordines.

TAB. XI. 4. *Aldrov. lib. cit. 61.*
RAJÆ FULLONICÆ ab eonomine inditum est, quod ubique in alis, corpore, capite, cauda, tota frequentissimis aculeis conspersa sit, instrumenti illius, quo fullones pannos poliunt instar, quod totum aculeis ferreis cōsertum est. *Rostrum* est satis longo & acuto. Caudæ aculei incurvi sunt, triplici ordine dispositi. Rara est, & pugnacissima esse creditur.

TAB. X. 6. *Idem c. 62.*
RAJA ASPERRIMA, à præcedente eo tantum differt, quod non solum prona, sed etiam supina tota aculeis peracutis ita horret, ut manu tolli non posset, nisi pinnulis cauda apprehensis, ideo supina in iconē exhibetur; pro dentibus maxillas habet asperas & osseas.

PUNCTUM IX.

De Ranamarina.

TAB. XI. 8. *Vossius de Idol. l. 4. c. 28.*
RANAMARINA. Græcis βαταρχος δαλατιός, Plutarcho βαταρχος ἄλιος nomen ranæ ex eo forte meruit, a quod gyrinas sive ranulas recens editas, & imperfectas, oculis quidem & cauda notabiles, sed quibus postea demum accessuri sint pedes & cau-

dæ notabiles, sed quibus postea demum accessuri sint pedes & caudæ fissura, referat. A venandi solertia *Piscatrix*, quod & à Plutarcho factum; ob sædam corporis monstrositatem *Diabolus marinus* Dalmatis; ob oris hiantis amplitudinem, *Lamia* Siculis; ob carnis molliem *Maltha* Bellonio; sed perperam dicitur. Magnitudine est ubique ferè pedali & cubitali, alibi tricubitalem inveniri, *Salvianus* author est. Cute capitis, *aculeis* exceptis; lubrica & molli, infernâ parte subalbida, superna verò ex nigra flavescente regitur. Unde molles, *Ovidio* tergo *Ranæ*. *Caput* habet toto corpore longè grandius, ut nihil in eo præter caput & caudâ cōspicias aculeatū, asperū, orbiculatū atq; depressum. *Os* in promptu, seu anteriori parte, secus ac aliis cartilagineis, vastum, pro corporis proportionem grandissimum, ac quàm maximè hians. *Dentes* permultos magnos, acutissimos, in os recurvos, utrique maxillæ, duobus palati ossibus, & linguæ radici infixos. *Bellonius* mobiles, albos, & confusis ordinibus dispositos facit. *Maxille* ipsi retusi, semicirculares, quarum superior brevior est, inferior longior & prominens. *Lingua* maxilla superiore longior. Membrana quædam gingivanum interiore parte enata, & in os complicata, quæ à maxilla separari non videtur. *Oculi* ampli in capitis vertice potius quam in temporibus siti, *aculeis* sepiuntur: Ante eos duæ propendent appendices, tenues, albæ, tetri odoris, si *Oppiano* credimus. In medio nasi * *pinna* oblonga prædura, & * *Kircher.* versatilis, visitur: à cuius extremo *mul-* *l. 3.* sculus quidā ceu cirrus instar fili subtilissimi deducitur, per cuius cavū humorem certum in fundum usq; cirri derivāt, ubi coacervatus ad vivi vermiculi similitudinem tumet. Omnia hamum piscatoris exactè exprimunt. Parvæ ex rostro albicantes carunculæ, & eminentia sub oculis cornicula *Plinio*, fila capilli speciè referentia, postremis quibusdam præpilatis, *d'Aristoteli*; gracilia quædam cornua *Bellonio*; pilli *Gilio*; geminæ rigidæ albæque setæ *Salviano*, di-

cuntur. *Branchias* neque detectas, *c Arist. H. c. neque supina parte cæterorum pla-*
A. l. 2. c. 13. norum cartilagineorum more, sed
 in lateribus, non spineo operimento,
 sed cuticulari intactas habent. *Pinn-*
nas, contra cartilagineorum plano-
 rum morem, in medio corpore, ubi
 cauda capiti jungitur, membrana-
 ceas & crassiusculas duas, propter
 amplitudinem partis superioris: in
 superiore caudæ parte una non ad-
 modum lata, sed longiuscula conspi-
 citur. A capite illico *cauda* sequitur,
 rotunda, brevis, carnosæ in pinnam,
 rotundam, crassiusculam & latam
 desinens. Ex huius & capitis lateri-
 bus, appendiculæ carnosæ, certis in-
 intervallis à se distantes, dependent,
 quæ, natante ranâ, supernatant. *In-*
tra, si spectes, *peritonæum* videbis ni-
 grum; *ventrem* magnum, carnosum,
 appendice utrinque unica & brevi
 instructum; *intestina* gracilia, multis
 gyris circumvolata; *hepar* parvum,
 rubescens, in quinque lobos, ut Bel-
 lonius scribit, divisum. (Rondele-
 tius sectum negat) eorum utrinque
 bini ad latera protrahuntur. *Fellis* ve-
 fica longo meatu ex hepate propen-
 dens, intestinis annectitur. *Vulva* est
 bifida, anfractuosa, duas ulnas longa;
 tribuit & vesicam, sed nescio quam
 verè Bellonius, & addit, totidem in
 Rana numerari cartilagineas, quot in
 quovis sceletto, ossium animalium
 terrestrium formas referentes, quæ
 prorsus medullâ, præter vertebrae
 careant; totidem item nervorum
 conjugamenta in eius cerebro, mul-
 tò tamen liquido, numerari, quot in
 reliquis animalibus numerantur.
Ventriculus & interanea, si per os exi-
 mantur, corpusque quoad eius fieri
 potest, distendatur, totum perluci-
 dum, & instar carbunculi fulgens e-
 vadit, immissoq; lumine, laterna hor-
 rendo aspectu apparet. *Locus* ipsi her-
 bosæ d. maris partes & e littus. *Cibus*
 e Martial. carnes humanæ etiam. Natantem a-
 l. 10. c. 37. liquando virili mēbro apprehensum in
 profundum detraxisse, Gesnerus f. se
 de Aquatil. audivisse refert. Contra cæterorum
 lib. in Ran. cartilagineorum morem, *Ova* non a-
 g Arist. H. nimal g pariunt. Caput corpore

grandius & aculeatum in causa, quod
 ut aditui sic exitui, ineptum est. *O-*
A. l. 2. c. 13. vum unum solidum, durumque ut
 foris servetur, cum cæterorum cute
 molli tegantur, Aristoteles h. prodi-
 dit. Univerſa simul juxta terram e-
 dunt; ortus cum iis, quæ extra perfi-
 ciuntur, & iis, quæ intus, idem. Nu-
 merosius i. quidem foetificant: sed
 quia de facili pereunt, pauciores re-
 periuntur. Aliquantidū extra aquam
 vivere, Rondeletius testatur. Vifa
 duos in littore dies inter herbas vi-
 xisse, vulpeculæque terrenæ noctu
 victum queritantis pedem, denti-
 bus arripuisse, & ad aurorâ detinuiſ-
 se. *Solitarias* esse ex eo, quod plures
 una capi non soleant, colligitur. Pla-
 na quamvis, non sola tamen latitu-
 dine natat, sed pinnulis etiam, quas
 in lateribus habere dictum est. Sin-
 gulari in venando k astu utuntur. In-
 ter saxa conditæ, aperto immani ri-
 ctu, mentitum vermiculum muscu-
 lo annexum, per pinnam in faucium
 rictum conjiciunt, eo viso pisciculi
 ceu ad escam accurrunt, rictum, ca-
 vitatem alicuius saxi reptantes sub-
 intrant, piscatores retracto, qui velli-
 catur hamo, orisque rictu clauso, to-
 tum pisciculorum gregem devorant.
 Macilentiores, quæ præpilatis villo-
 rû capitibus destituuntur. *Vfus* earum
 in cibo ferè nullus. Infula, mucosa &
 ferina saporis carne præditæ sunt. A-
 naxandrides tamè eas in Coryis Thra-
 cum Regis convivis reponit. Ventrem
 inter lautissimos cibos Antiphanis re-
 censet. In *Medicina* fel adversus suf-
 fusiones utile est. Quod strumas uti-
 liter pungi, piscis eius qui Rana in
 mari appellatur, officulo de cauda, ita
 ut non vulnerentur; idque fiat quo-
 tidie donec percurentur, apud Plin. 1 Plin. H.
 nium occurrit; Rajarum potius acu-
 leis convenit. Nullum enim officu-
 lum Rana habet. Diversa est ab istis
 tum illa castanei coloris, ventre can-
 dicante; tum Rana MINOR dicitur.
 Tota tam supinè quàm ponè asperâ
 cute tegitur, supinè aculeata est, &
 albicat, pronè colore est cinereo. Os
 habet exile & planè edentulû: *Caput*
 erectum & velut cornu in extremo
 pro-

d Ovidio in
 Halieut. rendo aspectu apparet. *Locus* ipsi her-
 bosæ d. maris partes & e littus. *Cibus*
 e Martial. carnes humanæ etiam. Natantem a-
 l. 10. c. 37. liquando virili mēbro apprehensum in
 profundum detraxisse, Gesnerus f. se
 de Aquatil. audivisse refert. Contra cæterorum
 lib. in Ran. cartilagineorum morem, *Ova* non a-
 g Arist. H. nimal g pariunt. Caput corpore

procerum, sub eo cuteus nervus, quem velut ex vagina exerere, rursusque contrahere videtur. *Oculi* ad latera ubi angustum valdè caput, velut in fovea quadam latent. Foramina olfactu distincta, supra os coeunte extremitate hærent, auditui infervientia oculis sunt contigua Pinnae ex iconè cognosces.

PUNCTUM X.

De Squatina.

TAB. XI. 7. **S**QUATINA piscis, *pívn* Græcis, *Squatrus*, quod sit squammis acutis, *Isidoro*, *Lima Valla*, *Celtes* in veteri lexico, dicitur. Media inter Mustelos & Planos à Rondeletio ponitur. Magnitudine ad centum sexaginta sæpè libras excrefcit. Coloris est, pñe cinerei ad fuscū vergentis, asperrima: ut * *cute* lignum & ebore poliantur, supinè alba & lævis. Partem corporis anteriorem habet latam, circularem, retusam, ut *rostro* prorsus careat. *Os* prima parte obvium, brevibus sed acutissimis, hisque aliterquàm in aliis piscibus dispositis *dentibus* munitum. Maxillarum ossa in angulum obtusum desinentia, in lingua extrema carneum tuberculum. Ex superioris maxillæ extremo, quod cute non integitur, apophyses duæ in alias divisæ demittuntur. Post oculos, qui in superioris capitis parte, ad latera parvi, foramina ad os usque patentia videntur. *Pinnae* utrinque binæ sunt, & utræque in lateribus. *Cauda* longiuscula in aliam lunatam pinnam definit. *Mares* à fœminis appendicibus cartilagineis, quæ circa anum, distinguuntur. Intra nihil à cæteris cartilagineis differt. *Hepar* habet in duos lobos divisum, in quo *fellis vesica* a felle viridi plena latet. *Lienem* mediocrem ex rubro nigricantem. *Cor* angulatum, compressum, & unico sinu instructum. De dentiū situ ita Rondeletius, sunt eorū ordines, &c. *Cænosa* incolere loca *b* Oppianus prodidit, in alto versari apud

Rondeletium legitur. *Coit* etiam * *c Aristot.* cum Raja. Sic *πρωβάτ* * nascitur, *H.A.l. 6.* inter se mutuò partim supinarum attritu. Bis *c parit* autumno occasu *c. 11.* vergiliarum, qui partus secundus est; ** Plin. H.* primus enim verno fit tempore; sed *N.l. 9.* secundus felicior. Singulis fœturis *c. 51.* septeni aut octoni prodeunt. Singu- ** Arist. H.* laris & his in venando astus est. Ob- *A.l. 6.* ruunt se arena; sic latentes verberant *c. 11.* oris vi radios (pinnae exerere vermi- *d Aristot.* culorum specie apud Plinium extat) *H.A.l. 5.* his pisciculi visis, quasi ad algâ adha- *c. 9.* tant, sic capiuntur. Colorem mutare & piscium quidem solas, prodidit *e Aristot.* & Aristoteles; quod nec corpore sint *H.A.l. 9.* pellucidæ, nec cute ita tenui, ut humorū spirituumq; perturbatione varii earum colores perluceant; negavit Rondeletius. Concedi in metu potest. Nam & tum in hiatu pinnis subiectum recipiuntur fœtus, ut apud *f Oppian.* f Oppianum legimus, in ventrem recipi *g Aldrovandus* credidit. *Halieut.* Rejiciuntur à *mensis*, quod flatuum *L.l.v. 742.* crassorum humorum proventū, quod *g Aldrov.* cartilagineis omnibus commune, *de Piscib.* proferant. Unde oculorum acies *l. 3. c. 66.* obtunditur. Olim Smyrnæ secundum Dorionem, Mileti secundum Arcestratum ortæ, cæteris præferebantur. In *Medicina* invenere in tertio tabis genere locum. Oleum ex hepate ad hepatis duritiem confert. Ova exsiccata sistendo alvi profluvio. Ex cute optimum fit in psora & scabie smegma. Illitæ mammas crescere non patiuntur, si *b Plin. H.* fides est; duriusculas reddi, utrum- *N.l. 27.* que experientiam cōprobasse, Rondeletius author. *c. 10.*

PUNCTUM XI.

De Squatino raia & Lamia.

PISCIS QUI SQVATINORAI dicitur TAB. XI. 12. Latinis, Græcis *πρωβάτ* ex Squatina & Raja procreatus creditur, Parte priore Raje similem facit a *Aristot.* Aristoteles, posteriore Squatinæ. Absurdum id Rondeletio, quod & Philosophus dubius pronunciet, & ex Galeno *b* fieri secundū naturam non posse, ut tantopere dissidéria corpora *b Galen. 3.* de usu com- *parti,*

commisceantur didicerimus. Stant tamen ab Aristotele plerique, Bellonius, Gellius, Jovius, Aldrovandus, Columna præcipui. Castellus nudum eius skeleton misit & paucis ita descripsit. Neapoli frequens est, quod miror, &c.

c Athen. 1.7. LAMIAM, quæ ~~ἀπὸ τῆς λολυῆς~~ à gula quibusdam dicitur. Nicander *c* Carchariam & Scyllam vocari scribit, Rondeletius eandem cum Cane Carcharia facit. Plinius inter Cartilagineos planos enumerat. Descriptionem eius nemo veterum supeditat. Maximam evadere, cute intergi scabra os in anteriore capitis parte habere, *dentibus* plus minus ducentis in utraque maxilla per quaternos versus dispositis, ad radicem latis, in acutum & pyramidem desinentibus, ad latera crematis, referunt Bellonius prodit. Verè an falso, non dixerim. Generis Galeorum certè, qui longi pisces sunt, eandem pronunciat.

PUNCTUM XII.

De Lumpo Anglorum & Pisce gibbo.

TAB. XIII. 1. Piscem qui Anglis Lumpus, quasi massa informis dicitur, sic describitur à Turnero. Piscis edulis est Lumpus noster, &c. Dorsum rubicundum, ventrem album habere, & in magnis delicis reputari Massarias addidit. Noseum molli & in ore diffuente carne, esse experti sumus, cum Andreadepoli in Scoria studiis operam daremus.

TAB. XIII. 2. Piscem GIBBOSUM Græci *ωσίδανον* vocant, reperitur in mari Balthæo coriiporiuncula, quam Fabricius Gesnero misit. Crassiuscula & tenax est, punctis multis seu tuberculis exasperatur. Eminent etiam Spinæ quædam ceu rubi, sed mucrone recto, pyramidis formâ, aliæ magnæ aliæ parvæ ex fusco albicantes. De sua pictura sic Gesnerus, &c.



TITULUS II.

De Piscibus Marinis Saxatilibus.

CAPUT I.

De Saxatilibus Squammosis.

ARTICULUS I.

De Scarò.



TAB. XIII. Absoluta Pelagiorum natura, Saxatiles sequuntur, XIII. inter hos primòs Scarus, 3. 4. qui seu *σάρκω τῆς σκαρίων*, id est, tripudiando, seu quod Athenæo a placet, quòd inclusus nassus, crebris caudæ ictibus, qui *σκαρίων* seu *σκαρίων* *a Athen. 1.7.* vocantur, averfus, fores laxat, atque ita retrorsum erumpat; seu q, algam, aliasq; herbas depascatur; *σκαρίων* enim interdum est *νέμεσος*, ita dictus; *Meryx* quoq; seu *Ruminax*, ut Scaliger vertit, ab Aristotele *b q*, latis utriusque maxillæ dentibus solus ruminet, *Cerebrum Iovis* Ennio vocatur. Serò olim Romanis & toti Italiæ visus; idè nec latinum piscis nomen habetur. Duo illius sunt genera, unum quod *ὀνίας*, benè ab Onisio distinguendus, quod a sino concolor sit, dicitur. *Alterum*, cui *αἰόλος*, ex Nicandro Thiatyreno nomen imposuit *c* Athenæus. *d* Oppianus modò *σκαρίων*, modò *βαλίων* cognominat. *Onias* squammis est magnis tenuibus, colore ex cæruleo nigrescente, ventrè candido; Sargo, corporis forma ad rotundam accedente, aculeorum pinnarumque situ, & numero, similis, maculâ duntaxat nigrâ, in caudâ, & quod lineis nigris in dorso ad ventrè careat, distinguitur. *Oculos* habet magnos, supercilia coloris Indici.

Dentes hominis modo planos imò solus latos, superioribus dentibus carere, q, Michael Ephesus prodidit, falsum, si *Meryx* est, & habere compertum. *Branchiæ* ipsi binæ, simplices alteræ, alteræ duplices, plura & majora in maxillis ossæ tubercula.

Cauda

Cauda lata in duas pinnas non divisa. *Cor* angulatum, *hepar* album in tres labos divisum, à quo *fellis* vesicula intestinis alligata pendet. *Fel* coloris nigri. *Splen* ater, *ventriculus* cum quatuor appendicibus parvus. *Aia* & seu *Varius* oculis, ventris inferiore parte, in qua podex, purpurei est coloris, cauda coloris Indici, reliquo corpore partim ex viridi, partim ex nigro cæruleo. Squam-
mis veluti notis obscurioribus aspersis. Ore medioctri, dentibus latis in superiore maxilla densis, in inferiore raris & acutis. *Ventre* in medio duabus purpureis notis insigni. A dorso & cauda ferè *aculei* tenui membrana connexi, æquis interval-
lis dispositi, conspiciuntur. In singulorum summa parte membranula pendet vexilli instar. *pinne* ad branchias sitæ latæ sunt, & veluti ovi ea figura. Intus habet *ventriculum* satis capacem, *hepar* subalbum, intestina lata & multa, *fellis* multum, *splenem* magnum. *Quem Bellonius in Creta observavit*, corpore erat ex livido rube-
scente, a squamis latis & translucidis. Capite utrinque compresso, den-
tibus obtusis, quorum incisarii nostris erant persimiles. gula non valde magna. Ad caudæ latera appendices transversas atque eminentes, quales in nullo se observasse pisce ait, utrin-
que habebat Gigantis Scarus, dentes habebat utrinque quatuor. La-
tos in inferiore maxilla, in superiore
d Columel-
la R.R. l. 8.
c. 17.
† Plin. H.
N. l. 9. c. 17.
e Aristot.
H. A. l. 9.
c. 17.

brius capiatur. *A Carpathio advectus*, *Claudio Tiberio Principe*, f (Octavium ^{f Plin. H.} Macrobius vocat) è libertis eius præfe-
tus classis, inter Ostiensem & Campani-
oram, sparsos disseminavit. Quinquennio
ferè est cura adhibita, ut capti redderen-
tur mari. Postea frequentes inveniebantur
Italia in littore, non ante ibi capti, ad-
movitq. sibi gula saporis piscibus satis, &
novum incolam mari dedit, ne quis pere-
grinas aves Romæ parere miretur. Saxa-
tilem esse vix dubitandum. Sig Op. ^{g Oppian.}
planus dum inter littorales recenset, ^{Halieut.}
contrarium innuere videtur, vitium ^{l. i. v. 109.}
est, & bene ^{σπαρ} pro Scaris legitur.
In dulcibus quoque nutritum aquis
inuere h Columella videtur, nisi pro
Scaro Squalum legi debere velis. <sup>h Columel-
la l. 8. c. 16.</sup>
Sanè haud perperam ex i Varrone
id conicere, licebit. <sup>i Varro de
R. R. l. 3. c. 3.</sup> *Vicitat* k herbis, ^{k Aristot.}
& algæ pisis, phaeolisque plurimum ^{H. A. l. 8. c. 2}
inhiet Mercuriali adeo, ut ea capia-
tur. ^{Plin. H. N.}
Pythagoras ^{Τερνιφάρον} facit, si ^{l. 9. c. 17.}
Gyrardo fides est. Diphilus tamen ^{Oppian.}
carnivorum esse & lepores marinos ^{Hal. l. 22}
captare scribit, nisi error committi-
tur. potius namque Mullo ista quàm
Scaro conveniunt. Quod m solus in-
ter pisces ruminet, superius dictum
est. ^{Ælian. H.} *Gregales* esse vel exinde quod so-
dales è nassis liberare conentur, ^{A l. 1. c. 2.}
colligas. m Caudam capitis morden-
dam porrigunt. apprehensa edu-
cunt. Quod noctu non capiuntur,
vigilantiæ ipsorum debetur. malè
Gelenius ideò solùm inter pisces
dormire scripsit. Melius dices, solere
---πρὸς ὕπνον

Εὐνύχιον καὶ λησιον ὥσπερ καὶ κενόθυτον ἵαται;
alicubi somnum nocturnum sub la-
tebris capere, sic insidias vitare. Sa-
lacissimum esse Ælianus prodidit. ^{n Ælian. H.}
ideò n fœminæ capiuntur. ^{A. l. 1. c. 2.} *Parere* bis
in anno fatendum. hoc o Saxatilibus
commune. ^{o Aristot.} *Vocalem* esse, quod apud
Athenæum Oppianum Tzertem ^{H. A. l. 4.}
proditur, dubium, cum pulmones
non habeat; nisi ore aquam impel-
lendo sonum edere dicamus. ^{c. 9.} *Vsum*
si attendamus, in delicatissimis olim
apud Romanos cibus erat; & iecino-
ra eorum in Vitellii Principis patina
inter lautiores primitias enumera-
tur. Primas inter Saxatiles tenere, &
F mollis

p Celsus.

mollis ac friabilis carnis esse, nullum videtur dubium: quamvis p Celsus & Philotimus aliter credidisse putentur. Inspidos esse nisi cum suis facibus edantur, creditum apud Græcos. Jecur in cibo sumptum iſtericis prodesset, apud q Ælium legimus.

q Ælian.
H.A.l.14.

c.2.

ARTICVLVS II.

De Turdo.

TAB.
XIII.5.6.7.8.9.
10.11.

a Athen. l.7

Turdus Græcis κίχλη à macula-
rum similitudine sic dictus,
olim teste Nicandro &
Pancrate apud a Athenæum tuit.
Duo ipsorum Genera constituit Sal-
vianus, Maiorem & oblongum, qui
vel viridis vel ruber est. Ronde-
letius duodecim species pinxit. Ve-
teribus, apud Athenæum μελανόστι-
χον, seu nigris oculis varius. Erato-
stheni πέρκας seu nigro distinctus,
Pancrati οἰνώδης quasi vini colorem
referens, Numenio αλκιδής, id est
purpureus dicitur. Phavorinus
πικιλόστιχον vocavit. Mutare tamen

b Aristot.

H. A. l.8.

c. ult.

c Aristot.



H. A. l.2.

c.13.


colorem dicuntur. b Circa ver magis
exsaturatos, dilutos magis æstate
videas. Branchias ipsis quaternas
Aristoteles c tribuit omnes duplici
ordine excepto novissima. Quin-
que sunt ab Aldrovando observati,
duodecim à Rondeletio. Primus,
qui magna ex parte aureus, amethi-
stino, cæruleoque ac rubro variat,
os intus habet ruberrimum, denti-
bus carens. Oculos maximos, quo-
rum auream pupillam circulus am-
bit niger, nigrum rursus aureus, au-
reum cæruleus, hunc iterum aureus,
ac tandem niger, alias omnes am-
bit. Habet & duas è mento depen-
dentes apophyses cutaceas, subfla-
vi coloris. tres præ cæteris lineas san-
guineas, & denticulatas. Pinnas ad
branchias omnino aureas, in pecto-
re totas cæruleas, nervos earum au-
reos. Cuius coloris sunt & illæ,
quæ ab ano, in dorso & cauda, qua
uropygio junguntur, maculis dun-
taxat parvis sanguineis resperſas,
cæteras cæruleas conspicias. Se-

cundus ad latera nonnihil albicat. in
capite vermicularibus, alibi rotun-
dis, ubique cæruleis maculis insigni-
tur. Tergoris pinna ex aureo ru-
ber, sicuti & cauda, quæ in extre-
mo cærulea est. Utrunque denta-
tus est. Tertio Corpus subviret, ven-
ter albicat. Squammarum extremi-
tates cæuleæ sunt. Caput pro cor-
poris proportionem parvum, totum
cæulei sed dilutioris coloris, præ-
ter branchiarum opercula, quæ can-
dicant, maculisque oblongis & se-
micircularibus aureis conspergun-
tur. Eiusdem coloris lineæ decus-
satim & transversaliter per corpus
ducuntur. Dentes habet maximos,
acutissimos, ingentemque oris ri-
ctum. Quartus toto corpore san-
guineo, aureoque distinguitur. dor-
sum & corporis maculæ ex cæruleo
nigricant. Quintus πολύγερμμος, to-
tus ruber saturatus. Maculæ in ex-
tremo tergo conspicuæ, orificiis
non absimiles, sunt nigræ, in capite
longæ, & serpentis in morem ferè
contortæ, cæuleæ. Lineæ à capi-
te ad caudam recta ductæ, rubræ
sunt.


Turdus Rondeletii Primus admo-
dum varius est. Unde αἰολος dictus.
adauratæ figuram accedens, pinnarū
fitu numeroque cæteris saxatilibus
similis, dorso fusco, ventre ex albo
livescente. Dentes habet recur-
vos, labra crassa, & rugosa. Oculos
sub quibus pars variis coloribus est
illustris, magnos & rotundos. Pin-
nas ad branchias aureas, ad podi-
cem & in tergo flavas, nigris cæru-
leisque maculis asperſas. Alter
colore est ex viridi cæruleo, & quia
colorem colli Paræus in pinnis &
in cauda refert, Pavo dicitur. Ter-
tius qui Pulcher dicitur, & à qui-
busdam ferculum regium, multas
colorum differentias habet. Viri-
dis est magna ex parte, sed pun-
ctis purpureis, cæruleis, Indicis,
& aliis confusis coloribus consper-
ſus. pinnis ad branchias flavis seu
ruffis, aliis omnibus partim cæru-
leis, partim viridibus, partim ruffis.
Branchiarum operculis punctis & li-
neis




Scarus omias. Meer Brachs men.




Scarus Varius.




Turdus. Kramet fisch.




Turdus Meer Pflaw.




Turdus.




Turdus.



Turdus.





Turdus.





Pauo. Meer Pflaw.

Turdus.



Attagenus. alius.

Attager. Lepus. Roter Kramet fisch.





neis rufis, sinuosis, certis spaciis distinctis. Cauda rufa punctis cæruleis, notata. Romæ & in Levino Insula frequentissimus est. *Quartus* circa Monspelium Psittacus, ab eadem colorum varietate dicitur. Dorso est nigrescente, pinna eius virescente. Ventre & lateribus flavescentibus. A branchiis ad caudam lineæ virides ducuntur. Pinnarum in ventre infimæ cæuleæ sunt. *Quintus* Gobionem flavum refert, hoc solo, quod lineam albam ab oculis ad caudam ductam habeat, & maculis nigris, quibus Gobius aspersus est, careat, distinctus. *Sextus* quinto est similis, nisi quod huic rostrum sit longius & aquilinum, & lineæ ab oculis ad caudam ducta cæulea. *Septimus* coloribus variis est insignis, dorso aureo, viridibus maculis consperso, ventre candicante, lineis rufis & tortuosis, nullo ordine dispositis notato, labris viridibus. Cauda & pinnis magna ex parte cæruleis. Branchiarum opercula purpureum quiddam habent. forte Scirrhis Wottoni. *Octavus* solis lineis in ventre sese interfecantibus ab isto distinguitur. *Nono* color est viridescens & flavus, lineæ ab oculis ad caudam alba, cum multis aliis auri coloris confunditur & obliquatur. *Decimus* colore est viridi. Extrema operculi branchiarum & pinnarum ventris purpura sunt. Oculi sunt rufi; os parvum, venter ex albo flavescit. A Monspelienfibus. Menestrior, hoc est Tibicen vocatur. *Undecimus* inter Turdos maximus, ad Lupi magnitudinem accedit. Colore est rubricæ, quæ pro terra Armenia utuntur, multis nigris & magnis maculis respergitur. Ventre plumbei coloris. *Duodecimo* caput est cæruleum, dorsum virescens. Linea viridis & tenuis, à branchiis ad caudam porrigitur, in extremitate macula rotunda insignis. Quem Gesnerus observavit, ita ab eodem describitur. Dorsum & laterum dimidia pars superior, fusci sunt coloris, maculis crebris, subnigris, variantibus. Lineæ: Inter Saxatiles esse Galenus & Diocles nos doque-

re. Non quælibet tamen Saxa amat, sed quæ prope littora sita, musco & alga obducantur. nec longe ab hoc domicilio recedit. In Ponto cum Merula desideratur. Non solis herbis vel alga vivere, sed interdum pisciculis, loliginibus, & aliis crustaceis pasci, Salvianus auctor est. Hyeme aliorum saxatiliū more latere aiunt. quo tempore etiam fortificant. A Merula specie non differre, hunc marem, illam fœminam esse, inter Oppiani errores poni potest. Singulare idem e in eis coniugalis amoris exemplum, notat. Mortuo marito progressæ de thalamis fœminæ, errant, communemque cum iisdem mortem oppetunt. Carnem habent mollem, tenerā ac friabilem, ut Galenus prodidit. Trallianus cibum fastidientibus eum commendat, & Ptisanam marinam vocat. Platina quoque modo coqui, sed assum sinapum requirere scribit.

ARTICVLVS III.

De Pavone Salviani, &
Leprade.

Pavo piscis, quem Salviano debemus, cuius & a Ambrosius & Ili-
dorus Hispalensis meminere, di-
versus est à Pavone b Philostrati,
qui in Phaside Indiæ flumine repe-
ritur, & cæruleas quasdam cri-
stas, squammas versicolores, cau-
damque auream in quamcunque
voluerit partem versatilem, habet.
Romæ Papagalo, à Lusitanis Budia
vocatur. Bilibris sæpè est, ad cu-
biti mensuram perraro ascendit. fi-
gura corporis, lacustri Tincæ ab-
similis non est. Squamvis latis tegi-
tur, & variis coloribus depictus est.
Corpus enim ferè totum, inæquali
varietate viret. Ventr̃is pars poste-
rior viret ex albo, anterior ex albo li-
vet. dorsum & cauda, ex viridi nigri-
cant. latera ex viridi partim flave-
scent, partim livent. Caput quod cras-
sum est ex cæruleo viret, maculis

quam plurimis rubentibus, nonnullisque cæruleis piscem totum nulla habita ordinis ratione pingentibus. *Rostrum* extensum, sed non acutum. *Labia* crassissima, quorum superius duplex apparet. *Oculos* magnos & aureos. *Branchias* utrinque quaternas, & juxta eas *pinnas* latas & rotundas, duasque alias minus latas in ventre. In dorso una fatis longa erigitur, cuius anterior pars stricta & aculeis munita est: posterior latior & aculeorum experta. Apodice, qui in medio ferè ventre una quoque, duobus aut tribus innixa aculeis, per imum ventrem ad caudam explicatur. *Cauda* in unam *pinnam* latam ac ferè rotundam violaceam & maculis atque lineolis plurimis cæruleis insignitam definit. *Interiora* si spectemus, *ventriculum* habet magnum, appendices multas, *intestina* ampla, *hepar* subalbium, cui fellis vesicula hæret. *Lienem* subatrum. *Viscus* ipsi præter algam, & alia marina excrementa, pisciculi. Solitarius est, & sæpe singuli capiuntur. Verno in primis & autumnali tempore, fortè quod æstate ab calore, hyeme ob frigoris impatientiam lateant. Ignobilis inter cibos censetur.

TAB.
XII. 13.
Aldrovand.
de Piscib.
l. 1. c. 5.

LEPRAS seu *Pforus*, quod iisdem præditus sit fuggillationibus quibus quæ lepra & pfora laborant; sic ut nonnullis, sed metuo ne perperam videatur dictus, *Lelepris* Latinis, si vera prodit Rondeletius dicitur. Ex Turdorum est genere. Vix ad dodrantem in mari Adriatico excrecere solet, cum pedem & amplius in Oceano excedat. Totum corpus habet maculis nunc cancellatis, nunc rectis, nunc in obliquum sparsis variægatum. *Squammas* ad oram rubore suffusas, latas. *Caput* non ita multis coloribus cancellatum, quod lineas hinc inde ductas, ex cæruleo, viridi, ac rubro mistas, ostendit. *Oculos* parvos, rotundos: iridem oculorum aëri similem, quam si quando in gyrum contorqueat, cyaneum, deinde aureum, tandem argenteum circulum in crystallini coloris fulgorem referre conspicias. Os ipsi parvum, dentes

albi, acuti. *Maxilla* superior tubi in modum cranio infarcitur, ut penè duobus labia carnosæ esse credas: *lingua* alba & penè soluta. Contiaquam tergoris *pinnam* gerit, sedecim aculeis munitam, atque aliam sub ventre ano vicinam. Omnes *pinnæ* transparentes sunt, molles, leves, rubro, cæruleo, viridi, & aliis coloribus maculatae. *Linea* quæ piscibus utrinque latera dividit, nequaquam in hoc pisce recta procedit, sed à superiori branchiæ angulo arcuata, secundum tergus deducta est: mox ubi tergoris *pinna* definit, illuc quidem linea reflectitur, & arcuatur, deinde recta per mediam caudam deferretur. Quantum ad *internas partes* peritoneum habet album, *hepar* expallido lacteum, ad sinistram magis protensum, tribus lobis, uno tantum longo duobus brevibus, constans. *Lienem* planum, oblongum, minoris digiti magnitudine, rubrum. *Intestina* eiusdem capacitatis, ut propriè stomachus in eo videri non possit, semel à stomacho ad anum revoluta, multisque omentis obducta. *Lactes* copiosas, & vulvam bicornem. Hanc ex Bellonio, qui eundem cum *Marzapani* dici credit, fortè quod æquè in deliciis ac carnis suavitatem appetatur, ac panis Martius vulgò dictus. Est tamen alius TAB. Marzapanis piscis, qui *Rosa* dicitur, & XIV. 1. totus maximè in dorso rubet, minus in ventre.

ARTICULVS. IV.

De Merula.

MERULA, Oppiani interpreti & TAB. Apicio *Merulus*, Plinio medico XIV. 2. prodente Bellonio *Piscis Aspratilis*, Venetis *Tinca marina*, Græcis *κόσσιφος* & *κόστυφος* dicitur. De illius colore differtunt authores. Numenius apud Athenæum a *Nigram* cognominat. Oppianus *αἰθώνα*. Varinus *μελανόσκιον*, vocant. Salviano & Rondeletio ex colore Indico & cæruleo nigricant. Hic & sexu distinguit, in mare, colorem ad violaceum magis accedere, fœminæ ex vario nigrescere, scri-

feribens. idem colorem Indicum aut purpureum exsaturatum nigrum ab antiquis vocari, quod purpuram nigram. Circæam flore nigro, qui tamen purpureus est, aut Indicus, prodidit. invenitur & quoddam genus dorso nigro, ventre Indico, quibusdam partibus cæruleis. *b* Aldrovandus totum viridem exhibet. Virentē & Ovidius reliquit. Colorem mutare apud *Ælianum* legimus. Omnes in eo conveniunt Tincas figura corporis referre, & squammas latiores quam Turdum, vertebrae dorfi valde erectas habere. Hoc vnum in eius Anatomia dignum occurrit, quod cum *hepar* habeat album, in duos lobos grandes divisum: fel tamen exerat tenui vasculo inclusum, & reolutionibus duplicatum, cuius longitudo est sesquipedalis. Quam Aldrovandus describit, magis in cauda, obscurius in dorso virefcit. pinnarum extremitates cæruleas, branchiarum opercula in fine rubentia habet. Oculorum pupillam circulus ruber, rubrum cæruleus ambit. Inter Saxatiles inque Petris stabulantes *abc* Aristotele & *d* Plinio referri certum est, quibus & *e* alij accedunt. Pōtum *f* tamen non intrant. *Vescuntur* ijsdem quibus Turdi. Comestum ve-
c *Arist.* H. A. l. 8. c. 15.
d *Plin.* H. N. l. 9. c. 15.
e *Columel.* ro *g* primo tentant & premunt, mox de R. R. l. 8. iacere sinunt. ubi non palpitare viderint, devorant. *Generationem* quod spectat, marium *h* quisque cum multis congregitur fœminis. Medicam aut Persicam vitam agere diceres. Zelotypia semper vehementer laborant mares, cum partus temporis instant maximè. Fœminis domi quiescentibus, incubant quasi illi foribus, ne insidiæ tendantur. sub crepusculum vespertinum (nocte fieri scribit *i* Oppianus) intermissa custodia, cibum exquirunt. solæ coniunguntur quæ sunt intus, algas in cavernis & circum petras ad victum repertiunt. Mortuo mare, foras egrediuntur, quæ semper antea domi manebant, fœminæ. Imperantur à Squilla. ideo piscatores; cum eos fœminas observare vident, Squillam vivam hamo affixam demittunt. Merulus,

dum se de illo ultimum sperat, arripit, sic capitur, & exigui animi voluptas fit ultio.

ARTICVLVS V.

De Iulide.

Ιουλις piscis Synesio *Ιαλ*, Hermip-
 po Smyrneo *Hicca*, quo nomine XIV. Hermolaus Sturionem intelligi arbitrabatur, aliis *Iurella*, & *Iura*, dicitur. Quia non vna ipsorum species, ideo in descriptione variari, non mirum. Rondeletio digiti non excedit magnitudinem. Varius est, dorso violaceo. Squammis regitur parvis pinnarum numero, situ, labiis, dentibus recurvis, cauda, aliis saxatilibus est similis. A capite ad caudam subauream lineam ductam habet, hinc inde rostri modo dentatam, cui pars quæ subest colore est cæruleo, ventre candido flavescente. Bellonius addit, corpore esse gracili & oblongo; tanto in tergore *colorum* varietate, ut in eo iridem utrimque depictam videas. Squammis tenuissimis, multorum colorum, super quibus ductæ lineæ rectæ, cæruleæ, virides, melinæ, rubræ ac fuscæ apparent, contegi. Caudam rotundam habere. Salviani descriptio ista est. Iulis rostro est acuto, & c. Saxatilibus accenferi ex Oppiano *a* colligimus. Antipoli & in toto Ligustico sinu frequentissimum esse nec Adriatico mari infrequentem Rondeletius prodidit. *Vescuntur* minoribus pisciculis, & eorum inopia, alga. Voraces Numenius testatur. Singulares in faxis vivere prodidit cum Salviano Bellonius, gregales facit *b* Aristoteles. Cavent sibi ab hamo, haud tamen escam sæpè præripiunt. Os veneno refertum habere, & in piscatu urinatores & piscatores pertinacissimè persequi, eorumque sanguinem appetere, *c* clarè ab Oppiano & *d* *Æliano* affirmatur. Lævia, quæ in adversum Aldrovandus protulit. *Ægris* in albo iure elixari, *sa-* nius in sartagine frigi & assari prodidit Salvianus, fortè si caput amputa-

a Oppian.
 Hal. l. 1. v. 124.

b Aristot.
 H. A. l. 9.

c Oppian.
 Halient.
 l. 2. v. 434.
d *Ælian.*
 H. A. l. 2.
 c. 44.

¶ Dioscor.
in facile
parabil.

tum. Ius alvum emollire apud Dioscoridem; vrinas apud Plinium reperio.

ARTICVLVS VI.

De Phycide.

TAB.
XIV. 4.

PHycis, qui forte à Phycene solo sexu differt, *Fuca* Theodoro, dicitur. Nostri temporis Græci *Phycida*, ut Gellius ait, *Phocida*, ut Rondeletius, *Phyceam* ut Massarias, *Pephycatismenā* ut Hermolaus, *Lampianam* ut Bellonius, appellant. Nomen, quod in musco marino (φύκη βρύον ἐρυθρὸν θαλάσσιον Neophyto & aliis) nidificet, inuenisse creditur. Idē est cum *Tinca* marina & pisce *Ficu*, Romæ vocato. (nomen huic quod passi ficus instat, carnis sit mollissimæ & succi plena) Rondeletio refragatur Salvianus, & illum ipsum esse, qui ob magnam cum *Perca* marina similitudinem *Percia* dicitur, contendit: nec abludit Aldrovandus. Sane æque repando est vterque tergo, color idem est. Rostro acuto & extento, pinnarum situ, numero, & figura conveniunt. Non credendum tamē eodēdem prorsus esse. Caput crassius *Phycidi* os maius, maioribusque dentibus in superiore maxilla munitum. Venter non ita prominet. Pinnæ parvis & ruffis maculis non insigniuntur. Lineis transversis nigricantibus, quibus *Perce* latera notantur, caret. In capite & branchiarum operculis, lineolæ & puncta quædam cærulea, conspiciuntur. Marem nigriorem & squammis amplioribus dixit a Aristoteles, sed nec idem perpetuo color. Verno tempore satur, reliquis dilutior videtur. Quod ἀκνίσιος φῖν apud Athenæum dicit, de aculeis quibus dorsū vel imi ventris spinæ horrent intellexisse, dicendum est. quia nunquam palmi magnitudinem excedunt, ideo φνκίδια ab Aristotele dicuntur. Bellonius non vnum genus esse ostendit. Vidisse enim se fuscis, rubentes, virides, πολυχροας testatur. Addit, omnes pinnam tergoris continuam, duodecim aculeis, muni-

a Aristot.
H. A. l. 6. c.
13.

tam, rursus ad branchiarum latera vtrinque vnam, & sub ventre duas, quarum singulæ squammis tegantur latis, firmis, sæpe vliginosis, gere, dentes in superiori maxilla vtrinque ad latus unum vel duos videri; in inferiore plures; retro in maxillis molares multos. Omnibus lacteum est *jecur*, ad sinistrum magis extensum, fel lateri dextro, oblongo folliculo inclusum, colore subluteum, incumbit. Inter saxatiles Aristoteles, Plinius & Diocles posuere. λιμενίην Suidas vocat. & Ovidius inter littorales recenset. Luto, alga, & musco, quod *b καυλίον* vocatur, vescuntur; & quanquam cætera abstineant carne: squillas tamen sæpissimē appetunt; *Parituræ*, *Nidum* † ex alga sibi construunt, in eoque pariunt. Sic foetus contra tempestates tuentur. † Bis anno parere c Aristoteles author est, Eunuchos apud Oppianum dicitur falsum. Cynædum enim piscem illis verbis verecūdo circumscribit. Laudantur à Xenocrate in *cibis*, *Diphilo* etiam ἀπακάστα ιχθύδια καὶ εὐφθαλα, tenera carnis pisciculi, ac faciles concoctū, dicuntur. Sed & d Hippocrates inter raram & levem carnem habentes recenset, eūq; viri mulierosi, seu ἀνδρὸς † πολυφρονος, ἐπωνυμίην & cognomen tum à piscatoribus ferre, innuit. Recensentur & in *Cotyis* Thracum Reges convivio. hodie procerum patinas raro implent.

b Arist. H.
A. l. 8. c. 2.

† Arist. H.
A. l. 8. c. vlt
† Plutar.
dololert.
animal.
c Arist. H.
A. l. 6. c. 13.

d Hippoc.
2. de vict.
ratione.

















ARTICVLVS VII.

De *Perca* marina.

PHycidi PERCAM, quæ Græcis TAB. XIV
πέρικη, Dioscoridī & Paulo Ægineτæ περκίς, licet Plinius in piscium catalogo pro diversis habuisse videatur, dicitur, & nomen à colore, quæ Græci περκὼν dicunt, fortita est, propter similitudinem de qua superius subiungemus. Nota ipsi cum paucissimis piscibus communis, quod transversis per tergus lineis conspergatur. Propter istam varietatem Aristoteli est. γραμμαποικίλη, ut apud Athenæum inuenies, quod eadem vividā,

† Tab. XIV
f. 6. c. 6.
Aldrovand.
de Piscib.
l. 1. c. 9.

ἀνδρῶν



ἀνδρόγυνος Matroni Parodo dicitur. Dub vero ipsius sunt genera, *Fluviatile* nempe, de quo postea, & *Marinum*. *Marina* nunquam ad eam ad quam fluviatilis magnitudinem excrefcit. Ex colore veluti sanguineo nigricat, & vnam duntaxat eandemque continuam pinnam intergore habet. Squammis tegitur parvis. Venter livet, latera purpurant. tergus ex flavo nigricat. Aldrovandus tres proponit. *Prima* caput, pennæ, cauda ex rubro flavescent, seu potius aureo perfunduntur. Supremum dorsum ferrugineum est, deinceps flavescit, mox per latera & ventrem albicat quidem, cæterum maculæ amethistinae albedinem operiunt. Pinnarum tergoris nervi argenteo colore, reliquarum & caudæ aureo perfunduntur. Lineæ transversales quæ à dorso per latera descendunt, ad instar labentis ex alto aquæ, argento emicant. Os habet intus album, labra rubicunda. *Alter*a, quæ Maioris nomine venit, rostro intus & extrarubet, in ambitu flavescit. Tergus rufescit. latera & venter albicant. Squammarum extremitates rubent, dorsi pinna tota, & tota fere in extremo crocea. qua Uropygio hæret, dorso concolor est. Branchiarum opercula flava, latis vermiculatisque lineis cineritiis conspersis suggillantur. *Tertia* insigniter dentata est. Tergus & caput ex cinereo flavescent. Pennæ & cauda nigricant. Latera cærulea. Venter ad amethystinum inclinat. Lineæ laterales obscurè rubescunt, quæ vero à branchiis ad caudam feruntur, in dorso rufæ sunt, reliquæ virides. *Degit* a circa musco-

ἀνδρόγυνος ἄνθρωπον, cum optima post habentur: sed saporis insulsi gratia reiicitur. Plinius in *Medicina* invenisse usum testatur. Name cinerem è capite falsæ, addito melle, verendorumpustulas discutere. eundem admixto sale, cunila & oleo vulvæ mederi, & suffitione secundas extrahere prodidit.

ARTICVLVS VIII.

De Channe, & Canadella.

CHANNE Græcis χάννη si fœmina, TAB. XIV. χάννη si mas, dicitur: (χάννη & 10. II. 12. χάννη corruptū esse videtur) quibus Aldrov. d. *Hiatula* ab hiando nomen inditum habet, non quod moriens tantum hiet, vt Bellonius credidit, sed quod mandibulas ita constitutas habeat, & perpetuo hiare videatur, hinc Epicharmus μεγαλοχάμμονας vocavit. A Speusippo Percæ & Phycidi ob colorum varietatem confertur. Unde Aristoteles citante Athenæo, ποικιλέρυθρον μήλαιαν, & ποικιλόχραμνον appellavit. De figura nihil apud veteres occurrit. Tantam ei cum Perca similitudinem tribuit Bellonius, vt pisces pene eosdem esse credas, & pro iisdem vendantur. Salvianus rostri acumine, pinnarū situ, numero, & figura, oculis, branchiis, cauda, atque pictorato corpore, Percæ & Phycidi similem Channen prodidit mediocritate oris, paruitate dentium, tenuitate capitis, exiguitate Squammarum ouata totius corporis figura, Percæ. Colorum varietate, inferiore maxilla, & branchiarum aculeis, manifestè ab utroque distinguitur. Tergus Channæ ex rubro minus quam illarum nigricat. *Venter* & latera violacea quodam albedine notata sunt. Pinna dorsi flavet, quæ vero in imo ventre est, & cauda, rufis maculis insignitur. Ab ore per branchiarum opercula & latera, rubræ quædam lineæ, neque æqualis latitudinis, neque æquis distinctæ intervallis vsq; fere ad caudā deducuntur.

a Oppian. Hal. l. I. v. fa & algosa saxa. Ad littora Oceani
121. Germanici dum, reperiri Albertus
b Oppian. scribit, de petrosis duntaxat & asperis id intellexisse credendus est. Saxatilem esse ex Galeno, Plinio, b Oppiano, & Diocle clarum est. Carnibus vescitur. Tam mas quam fœmina saxatiliū more hyeme conditur, quo tempore c quoq; fœtificat, Marcilius Ficinus celerrimi cursus esse prodidit. In cibis salubritatis laude resplendet, hinc proverbium vetus

deducuntur. Maxilla inferior non solū rubet, sed superiore etiam prominentior est. ideo perpetuo hiare videntur. In posteriore branchiarum operculi parte duo sunt *aculei* albi & acutissimi, non magni tamen, quibus Phycides & Percæ destituuntur. Venter & intestina ampla habet, *hepar* subalbidum. *lienem* subrubrum. *Calculos* in capite gerit, quod ex Bellonio habemus. *Locum* ipsi in pelago † Aristoteles assignavit; sed a Oppianus in saxosis degere docuit. nec piscatorum experientia abludit. Sola carne *b vescitur* carcinis inprimis, & dum per impetum pisces infestatur, sæpe in os ventriculus † procidit. *Sexus* discrimen ambiguum in eis. Omnes enim vulvas habere traduntur. & omnes ovis capiuntur gravidæ. Rem se ita habere, ex plurimarum sectione Rondeletius didicit, in usitatumque hunc conceptum plurimæ horum piscium fecunditati adscribendum retur. Mare ova perficit, & vice maris fungitur. DE CANADELLA, (sic Martegue stagni accolis vocatur) sic Bellonius. Ligustico mari cognitissima Canadella elegantem ac varium habet colorem, &c.

ARTICVLVS IX.

De Hepato.

TAB. XIV. 13. 14. **P**isces qui Græcis à colore & magnitudine hepatis Hepatus, à colore rutilo & subobscurο λεβίας vocatur, Hermolaus *jecur marinum*, Gaza *jecorinum*, Galeni interpretis *jecorarium* nominat. Diuersum ab Hepato Æliani, pisce a breui & oculis conuiuentibus, cuius pupillæ ad cyanæum colorem accedunt, sequentia ostendunt, Anille, qui ἐν τοῖς μέγχοις τῆς θαλάσσης, *b* habitat, quia ad natandum, quāuis magnus, segnis, circa latibula sua duntaxat volutatur, idem sit, affirmari vix potest. Descriptionē si spectes, Phagrum & Erythrinum & Hepatum pro similibus posuere veteres, sed illum rostro breuiorem, ferratis dentibus, colore nigro, oculis habi-

tatotius ratione maioribus, caudā macula nigra insigni, corde trigono, eodemque quod de suprema forte parte, quam αὐλὴν φλεβονεύουσα vocat Aristoteles, sumendum est, nisi de hepate potius id dici debeat, albo, felle nullo, additum: nec omissum calculos in capite gerere, solitarium esse, & paucas ventriculi d'appendices habere. Hæ notæ an Belloniano, qui Gesnero describente. Piscis est unde quaque fermè rubicundus, circa ventrem albicat, in dorso dimidia sui posteriore parte tribus maculis atris notatur, ultima caudam attingente addente Bellonio. Squammis integitur asperis. Dentes habet quā Phycidis obtusiores, qui peccinatim coeant. Calculos in capite gerit, penes lectorem sit iudicium. Aldrovandus hunc cuius icon apponitur, ponit, & Rondeletii Hepatum, qui modernis Græcis δειπνῶ, verum Hepatum esse opinatur. Et sane piscis est Pagro similis, oculis maioribus, quam pro ratione corporis vt Melanurus; colore obscuro seu ex cæruleo nigrescente, pinnarum numero, situ aculeisque Pagro similis, latiore maioreque cauda, in qua maculam Melanuri instar nigram habet. Dentes ipsi non lati sed rotundi & serrati, Branchiæ utriusque quaternæ, ventriculus cū appendicibus quatuor magnus. Intestina tenuia, *hepar* album sine felle, *cor* angulatum, in cerebro lapides duo. Verbo, optime cum illo quem ex veteribus descripsimus congruit. *Moribus* videtur esse insulsis, & parum ad vindictam pronus, quod apud Athenæum facere Eubulus innuit. Carnis in medio duræ & mollis esse, apud Galenum legimus. Frixi & pauco sale aspersi in cibo sunt suavissimi. Hepar tritum & emplastrimodo impostum, omnem tumorem & podagram sanare mentitur Kiranides.

* *

ARTI-

ARTICVLVS X.

De Melanuro, & Alpheste.

TAB.
XIV. 15.
16.
MELANVRVS à nigredine caudæ quasi Nigricaudam voces, ita dicitur, falso *oculatum* Gaza appellavit, quia tanquam diversi pisces à Plinio ponuntur. An Plauti Ophitiam recte dixeris, quod Rondeletius fecit, iudicio Tuo relinquo.

a Athen. 1. *μελανόχραμμον & πολύχραμμον* a Athenæus dixit, quod nigræ lineæ latera eius pingant. Hicæsius Sargo similem seu corporis figuram, seu nigram caudæ notam spectes, fecit: sed hæc & in sparo, qui *ὀρροπιγόςικτ* inuenitur. Palmi magnitudinem aliquando superat, nec amplius quam vnam vel sesquilibrium pendit. *Squamis* tegitur, latis, nec facile deciduis. Os habet parvum, dentibus parvis minutum. *Oculos* secundum corporis proportionem maximos ex cæruleo nigrescentes, pinnarum numero, situ, & figura, branchiis, & cauda cū Aurata convenit, hæc latam ac nigerrimam notam habet, latera lineis nigricantibus à branchiis ad caudam deductis pinguntur. Ventre est subalbido: dorso ex cæruleo nigricante. Quantum ad *interranea Hepar* habet magnum, ex quo fellis folliculus pendet. Venter medium, Cor angulatum, in ventre *vesicam* aere plenam, crassam, & densam. Quæ Aldrovandus depinxit, & cuius hic Iconem damus, totus ex cæruleo amethystinoque nigricat, præter squammarum extremitates & extremum oculorum circulum, caudæque initium, quæ auro resplendent, pinnae nigricant. Uropygium supinum candicat, primum intense violaceū, & velut nigram maculam constituit, *Vesitur*, prope littora in arenosis locis *balgæ*. Ideo vix vere saxatilis dicitur. *Ælianus* c varias incolere sedes tradit. Bellonius in Oceano Gallico perrarum, in Mediterraneo frequentissimum. Iovius Romæ ra-

ro videri, sæpe Neapoli prodidere. Tempestate fervente d cibis quos d *Ælian.* faxis eruunt vivunt, & abiectissima *H.A.L. I. 63* quoque, quæ alii pisces nisi urgente *41.* fame non attingerent, sectantur; sereno mari in solo sabulo pabulum inquirunt, imo quia vagabundi pisces sunt, non vno solo pabulo contentos esse verisimile est. Sane in e Stabiana Campaniæ ad Herculis petram Melanuri in mare panem abiectum rapiunt. Timidissimos esse piscatores testantur, f hinc ad *egrees* g Op- f *Ælian.* piano. Neque nassa capiuntur, nec *H.A.L. I. 63* ad eum accedunt. Mari quieto, in *41.* ima eius sede ad petras & algas quiescunt, quocunque tandem tegumē- *g Oppian.* ro protecti, fluctuante, cæteris ob *Hal. I. I. 7.* impetum descendantibus, ad petras adnatant, & spumam ad sui tutelam tum sufficere, ac si natura edocuisset, nec tētari iratum à piscatoribus mare, arbitrantur. Hepate tamen caprillo, & massa ex pane & caseo facta capi, Tarentino & h Oppiano de- *h Oppian.* bemus. *Haleut. I.*

Laudatur in cibo à Xenocrate, cui *3. v. 459.* Hicæsius i accedit: à Matrone Paro- *i Athen.* do reijcitur, illi forte si alga viscatur, *l. 7. Dipn.* huic si cænō & sordidis maris excrementis.

TAB.
XV. 1.
2. 3.
ALPHESTES piscis ab inveniēdo, nescio quare dictus, *Cynædus* quoque *XV. I.* quasi præposteræ libidinis studiosus *2. 3.* (sama est k semper binos capi, & al- *k Athen.* terum alteri ad caudam comitem vi- *l. 7.* deri) vocatur.

In *Descriptione* variatur ab authoribus si calorem secteris. Veteres omnino cerei coloris, purpurascētes tamen, quibusdam in partibus faciunt. *Plinius* solos piscium luteos esse *Plin. H. N. l. 32. c. 11.* testatur. Apud *Rondeletium* & *Bellonium* corpore est Pagro strictiore, *figura* Moenis similis, pedali magnitudine, *dentibus* ferratis caninis similibus, *dorso* purpureo, cæteris partibus luteis, *squamis* in gyrum crenatis, multa scabritie horrentibus. A cervice ad caudam spinas tenui membrana connexas, vnde *μονάκων* θ. habet.

Aldrovandus Cinædum totum fere Pagri modo rubentem, & aureis, argenteisque maculis exiguis, rotundis re-

dis respersum, quam Illyrici Sebeni-
genſes Cagnizam quaſi Catullientē
vocant, proſert: dat tamen & alium
tergore amethiſtino, lateribus ferē
cæruleis, ventre candicante punctis
cæruleis notato, pinnis tergoris & re-
tro anum viridentibus, illa etiam ma-
culis rotundis viridibus inſignita.
Cæteræ pinnae & cauda ex aureo ru-
beſcunt.

Rondeletij Cinædo ſimilis eſt ille
qui Venetis *Brasvola*, Luſitanis *Sal-
moneta* vocatur. Rufus eſt toto cor-
pore, cauda lutea maculis fufcis di-
ſtincta, extremitate æquali non ar-
cuata. *Macula* nigræ ad pinnarū, quæ
luteæ ſunt, iuxta branchias initia ha-
bentur. *Linca* ruſſa à branchiis ad
caudam tendit, punctis intercepta
nigris. De natura Alpheſtis nihil pla-
ne occurrit, Rondeletius carne &
ſubſtantia eadem cum ſaxatilibus eſ-
ſe dicit, tenera nimirum molli, &
minime glutinoſa.

ARTICVLVS XI.

De Coracino.

TAB. **C**oracinus, Gazæ, *Corvulus* &
XV. 4. 5. *Gracculus*, Salviano *Corvinus*, Au-
6. ſonio † *Corvus*, Tarentino forte κορα-
† Auſon. E- κινός, ſeu à colore nigro, vt Oppiano
piſt. 4. a placet, qui apud Vitruvium Cora-
a Oppian. cinus, ſeu quod ἰὺς κόραος κίνει, quod
Halieut. l. pupillas moveat, vt Athenæo b vi-
I. v. 139. ſum eſt, nomen ſortitus videtur, niſi
b Athen. forte iliud amnico, hoc marino ma-
Dipn. l. 7. gis conveniat. An idem σαπέρος, πλα-
τις ακός, Nili accolis πέλις, Alexandri-
nis ἡ μύνη, quod Rondeletius volu-
it, diſtus ſit; an vero, quod Aldro-
vando probatur, Saperdæ nomen
Coracino amnico Platiftaci eidem
proſectæ ætatis, Peltæ & Hemineri,
c Oppian. Nilotico duntaxat ſit proprium, in
d. l. dubio relinquo. μύλον, non eſſe Do-
d Arift. H. rionis apud Athenæum verba oſten-
A. l. 5. c. 9. dunt.
e Plin. H. N. l. 32. c.

5. In eo ponitur à Rondeletio cenſu,
f Athen. qui mare ſimul & flumina frequen-
l. 8. tant: quod & apud e Plinium, f A-
g Strabo. thenæum, & g Strabonem inveniri
Geogr. l. credit, ſed quia ſaxatilem eſſe ab e

Oppiano & Ariſtotele proditum, &
excitatis authoribus Coracinum dū-
taxat in Nilo eſſe; quin quod apud
Pliniū legitur, Nilo peculiare, col-
ligitur; nec vllum piſcem ex mari in
Nilum aſcendere propter Crocodi-
lorum metum, præter Mugilem, A-
loſam, & Delphinum Strabo affir-
mat, duo potius Coracini vt Percæ
genera dari credendum eſt, quam
eaſdem anni & mari communes. Et
ſane multos in Mæotide palude de-
gere & Dorione: plurimos in lacu nō
procul Oceano è monte inferioris
Mauritaniz originem trahente ſta-
gnante, quam Nilidem vocant, ac
Nili ortum credunt, ex Plinio diſci-
mus.

Quis veterum genuinus Coraci-
nus ſit, haud tuto affirmari poteſt.
Speuſippus Melanuro ſimilem, dixit.
Ariſtophanes ob alarum nigredinē
μελανπέρυγον, Numenius ob varia-
tem linearum αἰόλην vocavit, A recen-
tioribus quoque diverſimode deſcri-
bitur. Bellonius pro eo piſcem mari
& fluminibus communem ex Glau-
corum genere, *Peſce Scarpa* Comen-
ſibus nominatum, obtrulit. Ronde-
letius ſuum ita deſcribit. Coracinus
piſcis eſt marinus &c. Salvianus du-
plicem dedit. Prior qui Romæ ſim-
pliciter Corvo & Corvetto dicitur,
roſtrum habet breve & tetuſum. Os
&c. Alter, qui Corvo de Fortiera Ro-
mæ, Niger, iure merito, vt prior al-
bus, quia multo minus nigricat, cen-
ſendus eſt. Roſtro, ore, Capite, oculis,
pinnis, cauda, totius corporis figura, &
interaneis omnibus cum priore cō-
venit; in eo diſcrepat, quod totus fe-
re nigriceat, aculeum, cui ani pinna
inhæret, maiorem & validiorem ha-
bet. Pedalem magnitudinem nun-
quam ſuperat, & ſaporis ſuavitate,
carniſque teneritudine inferior eſt.
Geſnerus Corvulum colore rubro de-
pinxit.

Inter h gregales ponuntur Coraci. h Ariftot.
ni: hyeme i latent, nec niſi ſtatis die- H. A. l. 9.
bus, iis que ſemper capiuntur, quod c. 2.
& Rondeletius affirmat. Nunquam i Ariftot. H.
meſſe Tritici pariunt, ſed autumno A. l. 8. c. 15.
ſcætificant inter algas; longo tempo-
ris ſpa-

ris spacio vterum ferunt, & inter minora genera piscium celerrimo incremento perficiuntur. Anno squalente melius valere, quia per siccitatem tepor accidit, ab Aristot. proditum est.

An adversus arborum formicas polleant, quod ex Palladio Caelius Rhodiginus, qui pro Coracina pice, Coracinum piscem legi debere ait, affirmat, ignoro, Rondeletium certe experimētum tefellit, sed & huic, vero veterum Coracino fidem non tentasse, obiicitur. Meliores sunt cū vterū gerunt. Nilotici marinis, celixis assi, præferuntur. m Hicēsius, parum alere, facile excerni, succi esse mediocriter boni, dixit.

Vsum in Medicina quod spectat, lapides in capite repertos calculos cōminuere, vel pituitam ex qua calculi gignantur exsiccando vel pondere seu pellendo, idque sibi experientia cognitum, reliquit Rondeletius.

N. Corvuli iconem refert Tab. 2.

ARTICVLVS XII.

De Exocato seu Adonide.

TAB. XV. EXOCAETVM, qui Adonis & Cirrhis, fortè & κίρρα, & κίρρα, aliis, inter saxatiles esse Athenæus testatur. Squamosus sit an lævis dubium. Nomen ab eo invenit, quod in litore seu sicco dormiat. Subruffum esse, corpore tereti, littoralis & pusilli Cestrei magnitudine, cui digitorum octo longitudo maxima est, pisciculo Hirco, (Mœnam marem, quo tēpore dat operam soboli hunc putat Casaubonus) præter nigram subalvomaculam quam Hirci barbam vocant, simillimum facit Athenæus, & inque eodem à branchiis in vtraque corporis parte lineam albam vno continuo tractu ad caudam vsq; duci addit. Rondeletius sequentem Iconem pro Adonide posuit. Piscis vero est semipedali magnitudine, forma tereti σποπόρρι secundum Athenæum, secundum Oppianum ξανθός, seu colore aureo, partibus

quibusdam virecente, magis rubecente aliis. Corpore Mœnis iam fœtis aut Gobionibus similis Branchias habet parvas, à branchiis ad caudam lineam candidam continuam.

Miratur eum Arcadia, tamen & in littorē Monspelium stertentem, sæpissimè vidit Rondeletius. Quod vero Exocætum circa Clitorium vocalem & sine branchiis tradit b Plinius, impossibile videtur, & habere ostendimus. Nec quicquam de istis c Pausanius de vocalibus in Arcadia creditis duntaxat agit, & diversus ab Exocæto marino fluvialis πολυλῶ.

Diutinæ in sicco vitæ; quod magna aeris copia aqua suffocari possit, ob rimæ branchiarum angustiam non trahatur, causa, d Rondeletio. Propter eandem & Anguillas diutissime etiam sub terra vivere, credit; sed, quia in aqua, quæ frigidius elementum, sueti vivere pisces; & anguilla sine easenis diebus e Aquilone spirante, qui frigidior ventus est, Austro paucioribus; reliqui diutiusverno quam æstivo tempore vivunt; difficulter, nimia aeris frigidi attractione extra aquas lædi posse pisces, persuadere poterit. Vide e Scaligerum.

ARTICVLVS XIII.

De Sciana seu Vmbra, & Glauco Bellonii.

Piscis qui Græcis vulgò σκιάνα, Xenocrati σκίας, σκιάνης & σκιάνη. Græcis modernis σκί, nonnullis μυροπόσσι, is alicubi Ovis marina, communiter Latinis Vmbrina & Vmbra, seu à colore nigrescente, quam vmbrosus Isidorus, luteum Ovidius vocat; seu à lineis quibusdam obliquis à dorso descendentibus aureis & obscuris, quæ aliarum apparent vmbre; seu quod dum moveatur adumbrantem quendam oculis colorem iridis in morem rutilet; seu à proverbiali ioco, quo σκίας dicebantur, qui non vocati ad convivium veniebāt, quasi multi convivas secuti essent, cum de hoc pisce edendum erat, dicitur.

Piscis est cetaceus, LX. plærumque librarum, quatuor plus minus cubitos longus. *Squammæ* eius veluti obliquæ apparent, in Oceano nigriores & quasi opacæ; in Mediterraneo argentei, aurei, atque interdum ab his varii coloris, iridem dum piscis agitur imitantur, quod Bellonius prodidit. Rondeletius ei lineas obliquas quasdam aureas, manifestas, alias aliarum veluti umbras attribuit. Aldrovando fere unicolor est, tota videlicet ferruginea, in dorso, supremo capite, pinnis, & cauda obscurioris coloris; in ventre, lateribus, & branchiarum ossibus dilutioris, quia ad amethistinum inclinat. Salviano, dum parva est argentea ferè tota apparet: maior facta, ventre argenteo, dorso verò & lateribus subliventibus ac veluti opacis conspicitur. *Caput* ex descriptione Salviani habet magnū: in dorso duas *pinnas*, quarum prior octonis aculeis, nullis altera munitur, ad branchias, quas quaternas utrinque habet, una utrinque enascitur; duæque aliæ in ventre conspiciuntur, imo ab ano una alia hæret. Coracino tam similis est, ut ichtyopolæ vnum pro alio substituant, magnitudine differunt. Sed & pro Glaucosupponitur, in eo diversus, quod *dentes* in oris ambitu rari, firmos, acutos, prominentes, terretes, caninis longiores, & graciliores, quæ habeat; (negant habere Aldrovandus & Rondeletius) quorum superiores inferioribus maiores, sic maxillæ inhaerent, ut ipsius pars esse videantur. De *Verruca* sub mento controversum: affirmant quidam habere, negant alii. *Caudam* in angulos veluti desinentem gerit, ut Scari & Iulides. *Calculos* in capite habet prægrandes, quorum Aristoteles & Plinius meminere; *ventriculum* magnū & carnosum; *intestina* mediocria & pingua; *jecur* pallidum, ex quo felle vesica pendet. Lienem subatrum.

Marinum piscem omnes fatentur, sed de loco non conveniunt. Arenosos gurgites melius eas pascere, Columella prodidit, Oppianus petraea

cognominat, & saxa herbosa incolere asserit, hisce & Galenus accedit.

Quia perraro plures capiuntur, *solivaga* potius quam gregalis esse creditur. *Carnivora* & agilis, & propter lapides in capite frigoris impatiens. Dum caput recondidere, late se totas Struthionum & Phasianorum instar, putant. Oppiani id fide asseritur, Cibos quod spectat. Inter nobiles ab Ennio, Epicharmo, & Numenio pisces numeratur. Romæ inter sapidissimos, canicularum inprimis tempore censetur, & paritum cum Siluris precio venundari solet. Capita Triumviris rei Romanæ conservatoribus dono dantur, de quo facta est apud Iovium de Tanusio historia. Apud Pictones ex aceto & capis minutim concisis editur. Salvianus cum læucophago comestam, caryophyllis transfixam, ac verrubus astatam laudat. Archestratus gulæ suo tempore procerum princeps, nobilem capitis condituram multis carminibus expressit. De *Carnis* salubritate non conveniunt Authores. Galenus Philotimum quod eas mollis carnis piscibus adnumerarit, reprehendit. Xenocrates bonum ex eo nec admodum copiosum succum generari, & saporis esse iucundiscribit.

Invenit & in Medicina usum. *Interranea* & *squammæ* combustæ, pannos teste Plinio discutunt. *Lapides* argento inclusi tanquam colicæ amuletum gestantur. Non emptos, sed dono datos gestari debere, nugacis vulgi delirium est.



GLAUCVS Bellonii pelagius est piscis, ex eorum qui plures patinas implent numero, Lutetiæ invisus, Genuensibus frequens, apud quas *Fegarus*, ut apud Venetos Corbetus, quasi Corvulus dicitur. Massiliensibus & Romanis nullo alio quam *Vmbrina* nomine venit. Ita de eo Bellonius.

* * *

ARTI-

Alpheltis Cinædus. Steinfisch.

Cinædus Alpheltis.





Coracinus.

4

Meer Rapp Se rapp.

Cinædus alia

3




Coracinus niger.

Schwarzer Meer Rapp.

Coracinus.

minor.





Ammocatus. Exocætus

Sindaal.

Ammodites.


Adonis Exocætus Bellonij alaudis adnumerandus.



Glaucus.

10

Meer Bleim.





Umbræ.

Meer Schatten.

9

Gobius maior. Gofn. Paganellus.

Großer Meer Grop.




Acus.

Hornfisch Meer nadel.

13

Gobius minor.


Kleiner Meer Grop.



Acus. alia Species. ein

ander Hornfisch. Meer Nadel.


14



Acus minor.

Kleiner Hornfisch.


15



Acus. maior

Meer Nadel der groſſen.


16



Acus alia

Meer Nadel ein ander art.


17






Tab. XVI.

Anthias Rondetti. rond Kopf




*Anthias Rond.
asellus conformis.*




ein art bolch.


Anthias tortus.



Anthias prior.




Anthias secundus.




Anthias quantus.

meer trostel.



Anthias Conger.



ARTICVLVS XIV.

De Anthiis.

TAB.
XV.
I. 2. 4. 5. 6.
7.

ANthiarum nomen omnibus piscibus latis imposuit Bellonius, sed malè : nec idoneum testem habet; nec omnes lati tam pulchri, ut vel Anthiæ, vel Callictydēs, vel Callionymi dici possint. Ex squammosarum esse genere, dubium; à corporis floriditate nomen apud Græcos accepisse, certum. Ἀνθιπῖαν eundem ipse Aristoteles facit. Athenæo κύνιχθος & καλινύνημα dicitur, ἔκδοται vocavere quidam, quo nomine & ille cui squammæ contra aliorum piscium morem ad os versus tribuuntur, insignitur : *sacrum* alii seu quod magnus sit, ut morbum comitiale, qui magnus est *sacrum* dicimus : seu quod quo loco Anthias est, ibi nullam bestiam esse confessum sit, vocant. Hicetius λύκον dicit tradit, quod malè in λούκον Rondeletius vertit. Hesychius enim ἰχθὺν ποῖον λύκον appellari asserit. Quatuor ipsorum genera ab Oppiano ponuntur.

Oppian.
Halient.
I. I. V. 254.

Ζαντοὶ δὲ γένεσις τε, τὸ δὲ τρίτον ἀμακῆ-
λαίνοι.
Ἄλῃος δὲ εὐόπης τε; καὶ αὐλωπῆς κα-
λόςσιν.

*Sunt flavæ & niveæ, sunt atro san-
guine fusæ*

*Euops atq; Aupeps alios hoc nomine
dicunt.*

Totidem & Rondeletius posuit; quorum vix aliquis, cum omnes dentati sunt, Anthiæ verò Oppiano edentuli, probatur. Prior totus corpore & pinnis rubens, Pagri aut Cinædi modo, ad imberbes Mullos referri potest. Alter Aselli species est: quod neq; salitus, neque vento siccat, servari potest, vel calidiori in Gallia cælo, vel occultæ qualitati adscribendum est. Tertium ad Turdos pertinere stellulæ, quas in pinna ad anum gerit, & corporis forma testantur. Oculos habet magnos, rotundos, purpureos, & ubros. Podicem magnum è quo *intestinum* rubro viridique distinctum excidit. Pro quarto, (huius generis

Oppianus εὐόπης καὶ αὐλωπῆς vocat; id est εὐοφθαλμῶς & ἀπληκῶς καὶ ἔσφραλμῶς; ut Scholiastes meus exponit, Ælianus *Ælian. H. A.* cetacei generis & ore robusto facit, *l. 13. c. 17.* squammosus & latus piscis, quem ex eo, quod supercilia oculos ambiant, Aulopiam esse colligas, ponitur. *Aldrovandus* quatuor quoque Anthiarum nomine è diversis locis sibi missos ponit, sed pro iis non obtrudit. *Primi* venter totus argenteis squamis resplendet : lateribus aureæ intermiscuntur. In dorso, quod fuliginosum, unica tantum pinna duodecim armata aculeis visitur, ventris pinnæ ad castaneum vergunt. Branchiarum opercula ex aureo & violaceo variant. Labrum inferius tum intus, tum foris ex flavo virefcit, quod peculiaris notæ loco esse potest. *Alter* toto dorso pinnis duabus dorfi & quæ retro anum est, viret. Vertice capitis aterrimo, cervicæ & labro inferiore interna parte purpurascens. Ossibus branchiarum auro resplendentibus, ventre toto argenteo purpura permixto. *Tertius* tam amplis violaceis toto corpore variegatur, ut violaceis quasi totus videatur. Pinnarum numero cum superioribus convenit; quæ ad branchias, vergunt ad violaceum, & in extremo roseæ sunt. Iris oculorum & mentum roseo sanguineove colore, specificam & ob quam solam dignosci potest notam, in eo constituunt. *Quarto* inusitata est oculorum ac præsertim pupillæ magnitudo & pulchritudo : iridem ex aureo roseoque permixtam habet. In capite retro oculos, cervicæ, & ad branchias, amethystin, o aureo, argenteo, cæruleoque variat. Labrum superius habet viride, inferius cæruleum : *linguam* maximam candicantem. Ventrem primum viridem, dein argenteo & auro ad podicem usque splendentem, ad caudam usque roseum & sanguineum. *Locus* Anthiis in saxis, quæ tamen aliquando, cum ἀδινφάγῳ οἰσπῶν ἐλάυνει, deserunt. *Ανάγκη δὲ πᾶσι τὸν χῶρον ἀγῆρον εἶναι*, † locum absque bellicis † *Ælian. Hist. Ani- mal. l. 8.* εὐόπῳς ἀπληκῶς reputandum est. Unde *mal. l. 8.* sacri, *c. 28.*

Plin. H. N.
l. 9. c. 59.

facri, ut superius dictum dicuntur. Cum unum hamo teneri vident, lineam secare asperitate dorsi forte, traduntur, eo qui tenetur extendente, ut secari possit.

Capiti οἰκιστον εἰσι θεαμάτων, ἢ δασυθήσκοντες ἐαυτοῖς οἰκάσιν θρηνεῖν καὶ προπὸν πινὰ ἱκετεύειν.

Ælian. H.
A. l. 12. c.
47.

miserabile præbent spectaculum & mortem suam lugere, & quodammodo supplicare videntur.

De ipsorum capiendi modo ita Plinius. De Anthiapisce sileri convenit, quæ plerosque ad verto credidisse. Chelidonias insulas diximus. Asiæ scopuli maris ante promontorium sitas, ibi frequens hic piscis & celeriter, &c. : Consentur ab Eustathio inter eos pisces, qui ἀνθρώποι φάγοι, quod ob magnitudinem sumptuum, ganeorum opes exhauriant: sed & θεοί, Dii, quod preciosissimi sint, vocantur. Carnis est solidiusculæ. Unde χονδρώδης apud Athenæum (malè χευδῶδης) dicitur.

Fel cum melle inunctum, exanthemata, tubera, scrophulas, & dothienas sanat. Lapidis capitis ad colulum ligati, Cephalalgiam domant.

ARTICVLVS XV.

De Gobiis squammosis saxatilibus.

TAB.
XV.
II. 12.

Gobiorum historiam loci & tegumenti differentia intricatam facit. Nobis desquammosis saxatilibus hic res est, eisdemque littorales adjiciemus, ne de iis pluribus in locis agere cogamur. Græcis dicitur κωείος, Numenio apud Athenæum κωῖος, quem per κωείον Phavorinus explicat; Latinis Gobius, Gobio, Govius, ut apud Ovidium, & Cobio ut apud Plinium legitur. Parvi sunt tam illi, qui in mari, quam qui in aquis. Tzetzès tricubiales fama accepit, quod fortè de illis, qui in rubro mari, prout ab Æliano proditum, sumendum est. Bellonius ex saxatilibus album quendam facit, quem Græci χλωρόν & καυλίνην, Rondeletius flavescentem seu pallidum vocat. Est is palmi longitudine, toto corpore rotundo, non composito & spisso, squamis rotundis recto, colore vario. Nigris maculis

Athenæus
Dipnos. l. 7.
Tzetzès
Varior. Æ-
lian. H. A.
l. 17. c. 6.

conspergitur, oculis sursum potius quam deorsum spectantibus. Ad branchias pinnae duas habet, in ventre non duas cæterorum more, sed unicam non divisam, quâ notâ Gobii maximè à reliquis piscibus inter noscuntur; à podice aliam, in dorso non unicam velut alii saxatiles, sed duas, prior minor est, altera ad caudam usque extenditur. Dentes ei parvi, os magnum, ventriculus, cum multis appendicibus capax, Aristoteles complures supernè circa eum exire scribit. Hepar ipsi album non sine errore tribuit Hicæsius. Qui Aldrovando Venetiis missus est, pinnae habebat in tergore binas coniunctas, quarum prior aculeis vigeat, altera levis erat, binas item in pectore, totidemque ab ano omnes nigras. Caudam & superiorem partem corporis nigra. Ventrem candicantem.

Aristotel.
H. A. l. 2.
l. 2. c. ult.

Ex littoralibus duplices apud Aucthores invenio. Albos & nigros.

Illos Rondeletius ita vocat, non quòd tam candidi sint, ut cum aliorum piscium candore contendere possint, sed quod candore cæteros Gobios superent.

Nigros ita Bellonius describit. Eminentes ac turgentés supra caput oculos gerunt. Cornea tunica alba, & ut serpentibus dura obductos, adversus aquarum impetum, & ut sursum facilius ut Uranoscopus cernant. Vix excedunt duorum pollicum crassitiem aut palmi longitudinem. Rarè enim pedales & brachiales evadunt. Et si autem lubrici sunt, tamen squamis integuntur hirtis, pinnaeque habent unam in tergore continuam mollem & sine aculeis. Pinnae utrinque quatuor latas atque obtusas, ac præter has sub ventre etiam duas; sed ea, quæ caudam constituit, rotunda est. Dentes exerunt parvos, tenues, & subrubros. Corpus teres est, paucis spinis refertum, Color varius. Etenim qui Gobiones circa algam versantur ad viridem inclinant, alii ad cinereum accedunt, nonnulli albicant, alii ex fulvo integrum degenerant. Omnes grandiore sunt capite & lata cervice. At quod

quod ad internas eius piscis partes attinet: peritonæum Gobionibus foris album est, intus nigerrimum; *Hepar* dextro lateri magis incumbit, pallidum, de quo *fel* pendet veluti janthinum. *Intestina* multis circumvolutionibus inflectuntur. *Stomachus* est oblongus, pylorus multis apophysis prædictus vulva undecunque ovis referta.

Facit & Rondeletius Nigri mentionem, quia Venetis Go, à Gallis Boulerot nuncupatur. Digni is est magnitudine & crassitie, corpore rotundo ferè, non compresso, loco binarum pinnarum, quæ cæteris sunt in ventre, unicam habet nigram, barbam inquit dices; & exinde Athenæi *ρεδρον* seu hircum, cui *Exocætum* confert, esse judicat. Vivit in littoribus & stagnis marinis.

De *Loco* proprio ambigitur. Ovidio littorales sunt, Diocli saxatiles, cui *Synæsius* accedit, dum circa Africæ quoddam littus, loco petroso capiscrit. Aristoteles in fluviis quoque pinguefcere ait. A Theophrasto proditur in Ponto regione apprehendi in glacie Piscium maximè Gobiones, non nisi patinarum calore vitalem motum fatentes; quod fortè de lacustribus vel fluviatilibus sumendum erit. Oppiano *σκαμνίστοι καὶ πέρενοι* gaudet. Pariunt juxta littora, suaque ovaliuscula & arenida, ut Aristoteles prodidit, lapidum amplexibus mandant.

Ab Æliano inter illos ponitur, qui *σανόξαντας ἰόν ἀφίσσι*. *Venenum* pungendo immittunt, annumerantur; Oppianus quoque *κέντερον ὠδονέοντα*, aculeos lethales ipsis tribuit, quod nec cum Ovidio, cui, *spina nocivis non gobius ulla*; nec cum Martiale, cui *in terris Venetis, principium mensæ gobius esse solet*, congruit. Et sanè invenit, & in cibis usum, etsi Juvenali vilissimus videatur Alexanderides in Coryis Thracum Regis convivio eos nominat. Antiphanes laudat, Phalericos in primis. Archephonti parasito, qui in Ægyptum ex Attica, à Ptolomæo Rege ad cœnam invitatus, navigavit, Gobiorum frusta tria non sine stupore convivis o-

mnibus visa, apposita sunt. Iovius enim persuavem, & pingui teneritudine delicatum facit. Galenus ad voluptatem, digestionem, & probum succum gignendum præstantissimum, ait. Mnesitheo *ἐυογνοὶ* sunt & *ρεδοφίμοι*, Hic esio facile excernuntur, & non multum nutriunt, flavescunt substantia rarior & magis putredinis experts. Apud Hippocratem parem in alimonia cum Dracone, Callionimo & Cuculo vim obtinet. Assus & sine sale mansus, nimia egerendi desideria sedat, si Kiranidi credendum, illitum; canum rabidorum, serpentiumque moribus prædesse Dioscorides prodidit. Dorycinii vim, crudum, tostum, elixum infringere, apud Nicandri scholiasten legimus.

ARTICULVS XVI.

De *Sphyræna* sive *Sudi*.

SPHYRÆNA, cuius præter Ovidium nullum alium meminisse, **TAB. XVIII.** perperam scribit Plinius; nam inter Græcos Aristoteles, ex Latinis M. Varro meminere; Atticis *κίερα*, ut Athenæus affirmat, (significat hoc, ut & *σφύρα* stimulum aut stylum; item teli genus bello Persico inventum) Latinis *Sudis*, ut apud Plinium videmus, *Gazæ Malleolus*, sed malè, Romanis *Lucius marinus* vocatur, sunt qui pro *Oxyrincho*, quia acuminato est rostro, sumunt. **Athen. Di. p. 1.7.**

Duas ipsarum posuit species Rondeletius ex Oppiano, sed tam dissimiles, ut an ex eodem sint genere dubitari possit. Prior enim squamosa à capite ad caudam lineam habet, altera squamis omninò destituitur. Totidem & Bellonius innuit, quarum una *Trachurum* colore refert, atque eodem modo sub ventre albicat. Altera senescens *Mormyri* laterales picturas colore assequitur. Quaternæ vix libram pondent, ut optime Plinius magnitudine inter amplissimos rarum scripserit: visi tamen aliquando bilibres, Colore *Asellum* æmulatur. *Rostro* est foris cæolato, in extremo cuneato, nigro. *Ore* valdè rescif-

Galen. l. 2. de Aliment.

Hippocr. l. de inter. affect.

TAB.

XVIII.

Athen. Di. p. 1.7.

Plin. H.N. l. 9. c. 2.

Plin. H.N. l. 9. c. 11.

Athen. Di. p. 1.8.

Aristot. H. A. l. 8 c. 19. Theophr. l. de piscib. in sicco.

Oppian. l. 2 Halient. v. 457.

Martialis in Xenis.

Athen. l. 7.

rescisso. *Maxilla* superior quæ obtusa & brevior, cum inferiore, quæ acuta & longior ita coit, ut vix oris rostrive scissuram ullam diceret. *Dentes* utrinque habet, in superiore maiores, in inferiore minores. In ipso oris hiatus unus est, cæterorum longissimus & acutissimus, qui ore clauso in foramen anterioris ac membranae partis ita suscipitur, ut extrinsecus etiam paululum emineat. *Lingua* scabra est, denticulisque aspera. *Linea*, quæ à branchiis ad caudam usque per latus deducitur, & initio flavescit cum dorso, squammis parvulis & duriusculis, mira arte contexta est. Denumero *pinnarum* Authores non conveniunt.

Aldrovandi Sphyræna per dorsum nigricat, cætera ad amethystinum vergunt, & eiusdem coloris maculis interstinguuntur. *Linea* flavescit, ruberrimis infra supraque punctis exiguis notata. *Caput* cæruleum. *Oculi* & *pinnæ* pallescunt. *Cor* oblongum est, sub quadam vesicula alba inclusum. *Pylorus* à stomacho confurgit tam multiplici *apophysum* seu cæcorum casarie intertextus, ut penitus stomachum contegant; nec à quoquam numerari possint. *Fel* ab hepatis loco dextro latere in folle oblongo dependet. *Follem* ei natura vento plenum oblongum, anteriore parte bifidum, utrinque in acutum exeuntem donavit, ne ad imum fideret. *Spina* dorso raris vertebrais coagmentatur.

De loco non est quod multa dicamus. *Ælianus* dum pelagias dicit, *Smyrænas* potius innuere videtur. *Expresè* enim ex quo ille de piscibus ferè omnia ἐν πέτρῃσι καὶ ἐν ψαμάθοισιν νέμονται. Gregatim degere & *Aristoteles* testatur, & piscatores comprobant. Captis an ὀλιγοῦσι μελέεσσι διεξελθὲν *lubricis excidere membris*, quod ex *Oppiano* *Ælianus* prodidit, an competat, ex superioribus colligi potest. Non fallitur, qui pro *Sphyrænas* *Smyrænas* legerit.

Quantum ad usum *Romæ* ceu plebeius negligitur, nec peculiarem habet condituræ modum. *Hicæsius* a-

pud *Athenæum* τροφιμότερος congris esse, ἀπειθεῖς δὲ τὴν γαστρὶν καὶ ἀσάμους, ἐυχυλῖα δὲ μέσους gustui ingratos, ori insua- ves, succum mediocriter laudabilem generare dicit: sed cum congris ex cartilagineorum sint genere, *Philotimoque* δυσκαπεργάστεροι dicantur, & *Rondeletius* carne esse candida suavi, quodammodo friabili, & *Afelli* carnem referente, cui simul cum *Lupo* præcipuam authoritatem fuisse *Cornelius Nepos*, & *Laberius Poeta* tradiderint; quin *Cestræ* lumbi cum aliis lautissimis obsoniis ab *Antiphane* nominentur, vel *librarios*, vel *Athenæum* attactum superius errorem commisisse, verisimile est.

ARTICULVS. XVII.

De Acu.

PUNCTVM I.

De Acu Aristotelis.

Piscis quem Latini *Acum* vocant, TAB. XIV. 13. Græcis longitudine & tenuitate *Πέδιον*, *Ραφίς*, *Athenæo* Ἀλαινίς, quasi sine muco, dicitur, sunt qui βληδόν ut *Varinus* citat, & βελδόν nuncupant.

Vnam eius duntaxat speciem *Salvianus* agnoscit. *Bellonius* cum *Rondeletio* duas. Nos de *Acu* *Aristotelis*, *Oppiani*, & *Bellonii* agemus. Hinc autem *Rondeletius* illum piscem esse credit, quem *Bellonius* *Typhlinen* & *Caciliam marinam* ob corporis figuram, *Plinii* *Spondylem*, Græcorum vulgo *Herophidiam*, *Massilienses* *Gagnolam*, quod quoties piscantur, si alios pisces præcedere viderint, lucrum portendi credant, vocant. Piscis est longus, cubiti longitudine, digiti crassitudine, totus subflavus. *Corpus* utriusque sexus angulosum, oblongum, à capite ad meatum excrementorum semper crassescens, sexangulum, sed deinceps, ut tenuius efficitur, pro sexangula quadrangulam formam induit. *Caput* habet exiguum, *Rostrum* oblongum, durum, nec acuminatum. *Extrema* pars latiuscula exstat, rictus in altitudinem dehi-

Aldrovand.
de Piscib.
l. 1. c. 21.

Oppian.

Halient. l. 1.

v. 168.

Aristot. H.

l. 1. c. 2.

μονται.

Gregatim

degere

& Aristoteles

testatur,

& piscatores

compro-

bant.

Captis an

ὀλιγοῦσι μελέεσσι διε-

ξελθὲν

lubricis excidere mem-

bris, quod

ex Oppiano

Ælianus

prodidit, an

competat, ex

superioribus

colligi

potest.

Non fallitur,

qui pro

Sphyræ-

nas

Smyrænas

legerit.

Quantum

ad usum

Romæ

ceu

ple-

beius

negligitur,

nec

peculiarem

habet

condituræ

modum.

Hicæsius

a-

dehiscit, figura tubam æmulatur, in extremo tubæ veluti foramen conspicitur, tam pusillum, ut tum propter ipsius parvitatem, tum propter rostri magnitudinem angustiamque, ne minimus quidem pisciculus ingeri possit, eo veluti per fistulam, ex humore alimentum attrahit. Oculi sunt tam exigui, ut vix mili magnitudinem æquent. Branchiæ utrinque quaternæ, podex in medio ferè corpore. De pinnis disputatur. Salvianus cum Aldrovando unam parvam & tenuissimam in medio dorso ponit. Bellonius cum Rondeletio duas in lateribus juxta branchias, eam quæ in tergo tam tenuem & exiguam, iste addit, ut vix nisi cum vivit, aut in aquis moveretur, conspiciatur. Internas species, habet gulam, qua plurimi pisces carent, ventriculum parvum, oblongum. Hepar pallidum, sub quo dextra parte fel cælium hordei magnitudine continetur. Cor vix milio maius. Vulvam cæterorum piscium more bicornem, ovis sesami magnitudine, rotundis, rubris, transparentibus plenam. De intestinis inter Bellonium & Rondeletium non convenit. Iste gracilia, recta, in spiras non contorta prodit, hic unum tantum album, recta exporrectum, multa pinguedine circumfessum scribit.

Quantum ad Generationem; ova se in dissectarum, rimas, seu τὸν τῆς γαστρὸς Ἀσφύσει, de qua superius, multa invenisse, & multos fetus jam profectos, quorum maiores partes omnes perfectas habebant, & movebantur; Alii tam tenues & exigui erant, ut oculi duntaxat & rostrum cernerentur, restatur Rondeletius. Emittit illa eo, & quasi in altero sinu fovet donec excluderit, dilatât natura rimam, donec pepererit: à partu vel ita coit ut coaluisse videatur, vel revera coalescit, quod & in cæciliis serpentibus traditur, huicque omnino tribuendum est, quod dehiscenti propter multitudinem vorum utero, adscriptit

Scaliger vertit. Multæ earum parturientes disrumpuntur ab ovis. Quid sibi sequentia verba velint, καὶ ὡς περ τὰ φαλάγγια ἀεὶ κέχωνται, καὶ πρὸς τὴν βελόνην. ἔκπλει δὲ πρὸς αὐτὴν καὶ τις θύγῃ φέγγουσιν. Fœtus circa parentem quasi phalangia circumfusi sunt. Ita enim parit, ut ei adhæreant, sed si tetigeris, fugiunt, difficile est dicere. De usu in cibo & Medicina dixisse sufficiat, Carnis esse duræ ac siccæ eoque difficulter concoqui. Unde Hicetio ἀχὺλ & boni succi, & combustæ cinerem in potu ad stillicidium urinæ à Galenò commendari.

PUNCTVM II.

De Acu Oppiani.

ACUM Oppiani ab Acu Aristotelis debere distingui, tum quod hic dentatus sit, tum quod rima destituitur, ostendit. Haud in multam magnitudinem excrescit, seni vix libram pendeat. Vidit tamen & trilbrem Salvianus. Ventre est plano, candido & argenteo, reliquo corpore quodammodo ob lineam è squamis contextam utrinque protensam, quadrato, reliquis partibus lævibus, & sine squammis. Dorso cæruleo ad viride inclinante. Rostrum habet acutum, tenue, longum & durum, ut ait Athenæus. Caput triangulare viride. Inferiorem maxillam superiore longiorem, & in mollem quandam substantiam, degenerantem. Dentes utrinque parvos & frequentes. Oculos magnos, rotundos, luteos ante quos meatus ad audiendum vel odorandum triangulari figura observavit Rondeletius. Branchiæ sunt quaternæ duplices. Pinne ad branchias duæ parvæ; duæ aliæ sub ventre breves, quas rursus alia sequitur, longè à podice ad caudam se extendens, è cuius regione in dorso alia. Cauda brevis est in duas pinnulas terminata. Podex non admodum conspicuus. Rimam illam quam Aristoteles Acui tribuit circa podicem huius Acus foris quidem conspicuam esse, sed intus minimè videri, Salvianus author est, Rondeletius diligentissimus omnium

H

circa,

Aristot. H. statatur Rondeletius. Emittit illa eo, & quasi in altero sinu fovet donec excluderit, dilatât natura rimam, donec pepererit: à partu vel ita coit ut coaluisse videatur, vel revera coalescit, quod & in cæciliis serpentibus traditur, huicque omnino tribuendum est, quod dehiscenti propter multitudinem vorum utero, adscriptit

Plin. H. N. I. Plinius; ex Aristotele, malè de eodem vertit Gaza, nec melius Ælianus deprompsit. Αἱ πρὸς αὐτὸν περὶ τῆς πλεονάζουσαν τὴν τῶν ὁσίων, id est, ut

circa Acum indagator eius non meminit. *Partes interiores*, ventriculum, hepar, intestina, quæ appendicibus carent, longa habet. *Hepati* vesicula fellis oblonga adhæret. *Cor* angulosum est. In arenosis, saxosisque locis

Oppian.

Halieut. l. 3

v. 605.

degit. Solemne ipsis ὅτε κελπον δικτύκον κεραιῶσι, quando sinum retis effugerint, iterum reverti, & dum ira velut perciti id dentibus lacerant, in laqueos iterum impingere. Carne est dura & sicca. Frixus & omphacio vel succo mali aurantii irroratus edisoleat; nec ingratus palato invenitur.

ACVUS MINOR Bellonii *Lacertus* est, seu *Saurus Acubus similis*. Rondeletio. Piscis est marinus, pedis magnitudine, Acubus brevior & crassior. *Rostro* acutiore sed brevior & sursum recurvo. *Dentium* loco maxillas ferratas habet. *Branchias* quaternas, septem etiam, ut in superiore, quem Bellonius Maiorem vocat, supernè ac infernè & in cauda propendentes *pinnulis*; his, oculis, & ante hos foraminibus, ventrisque squamis ac lineis, quæ ventrè ferè quadratum efficiunt firmatque, Acubus est similis; carnis substantia, & posteriore corporis parte Scombris. *Intra* ventriculus est oblongus. *Intestinalis* longa gracilia, in gyrum convoluta. *Hepar* longum rubescens: *fel* & *splen* nigricantia. Cuius Aldrovandus Iconè dedit, toto corpore subviret, maculis ex amethystino & cæruleo mixtis, in dorso intensius, in pectore remissius variantibus. Rarus est, & in insula nomine Lissa, olim Phuna affatim capitur. Inde salitus navigiis transfertur, & maximo quæstu divenditur.

ARTICVLVS XVIII.

De Fabro.

TAB.
XVII.

I. 2.

Aldrovand.

de Piscib.

l. 1. c. 25.

FABER piscis, seu exinde quod omnia fabrilia instrumenta in eo reperiuntur, teste Salviano, seu propter multiformes dorfi ac ventris aculeos atque varia capitis ossa, quibus fabrilia omnia instrumenta representantur; seu ab atræ fuliginis colore, quod tamen, si ex Oppiano de-

sumptum est, Coracino potius tribui debet, ita dictus est. An χαλκός sit, quod Salviano placet, dubitatur. Cum eum Gadibus principatum obtinere scribat Plinius; rotundum vel orbicularem, Athenæus faciat. Si est, utique & ζεύς seu Jupiter dicetur, nam & hoc ζ χαλκός nomen est, seu à χαλκός formatum; seu quod fortè, ut nunc fit, olim etiam in templi Iovis tanquam sacer suspendebatur. Quidam χειρὸ φαρῶν nuncupant; an propter maculas laterales, digitorum Divi Christophori ut aiunt vestigia, vel quod eum quem iussu Salvatoris Div. Petrus cepit (maculæ prædictæ numitmatibus illius quodammodo figuram exprimere creduntur) opinentur, nescio. Romæ *Citula*, Liguribus *Rotula*, Hollandis *Gallus marinus* dicitur. Qui Chalchiden, Acanthiam vel Citharum, vel Porcum marinum esse judicant, falluntur. *Primus* enim inter viles pisciculos à Columella; ab Aristotele inter fluviatiles reponitur. *Alter* cartilagineus & rotundus. Citharum piscem inferius dabimus. Porcus inter magnos pisces recensetur. *Zaf* Hefichii idem fortè cum isto. Cum nec inter ψαλλοειδείς, qui una parte can- dicant, nigricant altera, nec inter planos, à quibus oculorum situ differt, referri possit, benè inter latos censebitur, quamvis maximè compresso ac plano sit corpore.

Coloris est varii. *Caput* & dorsum obscura sunt, pinnæ nigricant, latera partim ex cæruleo virent, partim aurea sunt. In medio corpore macula nigra, orbicularis, vel ovata nummi minoris magnitudine, colore cælesti, cum tribus imagunculis, figura quodammodo Hippocampi, colore aureo, visitur. *Squamis* tam exiguis tegitur, tenuibusque ut nisi digito scalpas vix appareant. *Caput* ipsi compressum, extensum, osseum, ossibus quàm plurimis, variis, angulosis, tenuibus, atque perlucidis constructum, maculis quibusdā exiguis purpureis exornatum. *Linea* obliqua à capite ad caudam ducitur. *Oslatis* simum, plurimum hians, edentulum,

etia

etfi quodammodo dentatum pinxit Bellonius. *Oculi* magni, rotundi, aurei. *Branchie* utrinque quaternæ, quarum ossæ opercula in aculeos desinunt. *Pinnae* duæ mediocres ad branchias, duæque aliæ in anteriore ventris parte paulò longiores, ac in quinos velut longos pilos aut fetas porcinas degenerantes, ab ano rursus duæ aliæ quarum prior pars quinque duntaxat aculeis constat; altera multo longior, & ad caudam ferè usque extensa, aculeis caret, in *dorso* unica tantum & magna, ut quæ paulò ante medium dorsum exorta, ad caudam usq; ferè extenditur, figura huic pisci propria, & aliorum piscium dorsifinnæ dissimilis. Primum namque in longissimos pilos eius ferè modo, quam in anteriori ventris parte conspici diximus terminatur; deinde plurimis robustissimis aculeis intertextis armatur; postremò aliis etiam aculeis ossæ multò brevioribus, bifidis atque recurvis, secundum eius exortum in dorso præmunitur. Pars *ventris* utrinque ossibus instar acuti cultri secantibus firmatur. *Cauda* in unam pinnam definit. *Ventriculum* habet mediocrem, gulam manifestam, intestina parva tenuius in gyros convoluta, inter quæ ova rubra latere Rondeletius ait. *Hepar* candidum sine felle, lienem rubescentem exiguum, mesenterio hærentem. *Cordis* pars infima rubet, suprema & media ex albo rubescit, quod in paucis piscibus spectatur.

In saxis eum degere tradidit Oppianus, in Atlantico & Gaditano generosissimis piscibus adnumerari Columella. Ita carnivorus est, ut nec alia maris purgamenta spernat. An ei stridor competat, quem Chalcidi Aristoteles tribuit, ita ut pro χαλκός χαλκός legatur, quod Aldrovando placet aliis judicandum relinquo: mihi, cum brachiæ opercula tam horrida habeat, ut dimota sonitum edant, & verò plurimi ex piscibus τὴν δεικνύσασαν φωνὴν τῇ τρέφει τῶν βραγχίων (ἀκροῦθ' ὁ δεικνύσας οἱ πόποι) hoc quod vox videtur, attritu branchiarum quippe loca spinea sunt emittunt, verisimile videtur. So-

livagus est, & erectus, non passerum more in latus conversus natat.

Reputatur inter pisces carne satis tenera & friabili, concoctu facili, & boni succi. Apud veteres in multa fuisse æstimatione ex Columella dum dicit, *Atlantico pascitur Faber: qui & in nostro Gadium municipio, generosissimis piscibus adnumeratur, eumque prisca consuetudine Zeum appellamus*, didicimus. Cum ob corporis tenuitatem, commodè assari nequeat, aut frictum & omphacio aut aurantii mali succo irroratum, aut in aqua & vino partibus æqualibus, oleo, sale, beneque olentibus herbis atq; aromatibus elixum comedi, Salvianus tradit.

Columella
R.R. l. 8.
c. 16.
Plin. H. N.
l. 9. c. 18.

CAPUT II

De Piscibus saxatilibus
lævibus.

ARTICULVS VNICVS.

De Alaudis & Pholide.

Inter Saxatiles læves, Alaudæ duntaxat, cum iis qui ad eas pertinent Gutturoso nempe pisce, & Exocæto Bellonii, & Pholis reperiuntur. ALAUDAM duplicem facit Rondeletius, *Cristatam* & *non Cristatam*.

TAB.
XVII. 3.
Aldrovand.
de Piscibus
l. 1. c. ult.

Illa corporis specie Scorpioidi admodum est similis. Colore fusco, multis maculis partim rotundis, partim oblongis & tortuosis notato, tenui, lævi & lubrico, ore parvo, *dentibus* anterioribus ferratis, posterioribus exertis, *oculis* parvis cæruleis, in vertice dum vivit erecta est *crista*, mollis & cærulea. *Pinnae* ad branchias latæ sed breves; in ventre parvæ & tennes. *Podex* non procul à branchiis distat, à quo pinna ad caudam protenditur, alia in cervice ad caudam continua. *Peritoneum* ex nigro viride est. *Cor* angulatum.

tum. *Hepar* ex albo rubet, à quo *fellis* vesica pendet, perspicuitate & coloris jucunditate smaragdum referens. *Intestina* lata sunt, coloris lutei. Ob parvam branchiarum scissuram sat diu extra aquam vivit.

Carne est molli, sed ob parvitatem negligitur.

TAB.
XVIII.
3.

Ad hanc Piscis *GUTTUVROSUS* dictus referri potest. Nigricat quidem ferè undiquaque: sed & punctis cæruleis distinguitur, & color luteus per totam superiorem dorsi pinnae partem, circa branchias & summo ventre visitur.

Littoralis est, & foramina lapidum aut ædificiorum littoralium subire solet, vel carne vasi iniecta mox exempta capitur.

TAB.
XVIII.
2.

ALAVDA NON CRISTATA capite est parvo & rotundo, ore & oculis parvis, *dentibus* anterioribus ferratis, posterioribus longiusculis, acutis, exertis. *Pinnulas* duas habet ad branchias, duas in ventre, aliam statim à capite ad caudam continuam, item aliam à podice orisatis propinquo ad caudam usque ductam.

Cauda in unicam definit saxatiliū more. *Macule* multæ mediæ corporis parti asperæ sunt.

Aqua, muco, parvis *Atherinis* & *Aphyis* vescitur. Carnis substantia & mollitudine cristatæ par. In petrarum rimis degit, hinc nomen *Percepere* sortitus est.

TAB.
XV.7.8. Huc & *Exocætus* seu *ADO-*
NIS Bellonii, quicum *Urticis* plurimum delectetur, & istæ circa littora inter cautes hæreant, mari profundius mergi recusât, in rupibus Bononiæ, in cavis cautium quiescit.

Species illarum sunt plures, quarum una *Cristata* est *Massiliæ* frequens, primò aspectu *Gobium* referens. *Cute* glabra obducitur. *Vulgus* *Glinos* vocat, colore est sub-ruffo, ut *Scorpæna* multis aliis coloribus confuso. *Dentes* habet ut *Scarus*, firmos, continuam tergo-

ris *pinnam*, ac nescio quid supra *oculos*, quod veluti à pellis laxitate procedit, laterum *pinnas* inversas, duas sub ventre duabus tantum *cirrhis* radiatas. *Cristati* caput ad *Chamæleonem* accedit, in cuius acumine *pinnam* Galli *cristam* referentem videas. *Dentes* habet anteriores acutissimos.

Cauda *pinnam*, & laterum rotundam, sub sterno duas; alteram in tergore continuam, maximè latam. *Branchias* tectas, & parvo foramine pervias, sed & detectæ quatuor numerantur utrinque. *Cute* integitur laxa, multis coloribus ut *Draco* variegata. *Chamas* & *conchylia* conficit: sed & *urticis* interdum *pascitur*. *Triduum* vel *quattriduum* absque aqua vivit.

Tertium Exocæti genus, piscatoribus Byzantinis *Glini*, aliis *Chelidonii* nomine venit.

Rarè sex digitorum longitudinem, & duorum pollicum crassitiem excedit. *Squamis* caret, & *lituræ* *melinæ* *cyaneæ* & *fulvæ* per tergus diffunduntur. *Pinna* tergoris continua est & mollis, *caudæ* & laterum *latæ*, varii coloris omnes. *Branchie* sunt contextæ *Spinea* exterior, ut in *Dracone* marino, duobus aculeis obfirmatur: sed ab eo diffidet, quòd quilibet aculeus duobus ferratis denticulis repandis & aduncis fulcitur. *Caput* habet polymitum, *Os* grande, inferiorem *maxillam* latam & planam. *Dentes* *Glini* priore aliquantulum minores. Dum scinditur, *branchias* non ostendit integras sed rudimenta coloris paulò magis rubra quàm in *Muræna*. Non malè ad *Basiliscos* *Oppiani* referrentur.

PHOLIS à muco ita dicitur, quem emittit. *οὐλοῦνται καὶ αὐτὴν καὶ γίνεται καὶ ὁμοίως γινώσκον. In circuitu eius is concrefcit, ac fit quascubile.* *Antipoli* & ab *Italis* *Barvofa* vocatur. *Alauda* paulò maior est, dorso fusco, *cutelævi*, maculosa, ventre pallido, *Pinnis* aliisque partibus à superioribus non differens.


Nec

Aristot. H.
A.L.9. c.55.
& Scalig.
in
Aristot. l.6.

TAB.
XVII.4.


Mullus Minor.

Kleiner Rotbart.




Faber.

Meer Schmidt.




Mullus maior.

Großer Rotbart.




Liparis

Schmalz fisch




Faber marinus

Meer Schmid.




Pholis. alaudæ species

SchleimLerch.




Alauda.

Meer Lerch.




Hyrundo.

Meer Schwallb




Cuculus.

Redfisch Meerhyren.




Cuculus.

Redfisch.




Milvus.

Meer wgy.




Hyrundo. alia



Atherina.

Kleiner Hering art.


15



Phagus.

Rote Meer Brämen.


13



Chromis.

Kesten. Brämen.

14





Necabludit ab his SCORPIODES Rondeletij sic dictus, quod capitis forma Scorpionis marini similis sit, totidemque supra oculos apophyses licet molles habeat. Galli *Leporem marinum*, quia rostrum terreni leporis *ωρίομη* sive *scissura* admodum simile habet, nuncupant. Differt à Scorpiondentibus, quos ferratos quidem habet, sed tenues & densos admodum, & in superiore maxilla duos extertos, ab eodem & Galerita pinnæ dorsæ magnitudine, duabusque eiusdem pinnæ nigris maculis distinguitur. Littoralis est, mucos vescitur & aqua.

TITULUS III.

De Piscibus Marinis Littoralibus.

CAPUT I.

De Squammosis non planis.

ARTICVLVS I.

De Mullo.

Non minus benè primum *Mullo* inter littorales pisces locum dari, quam *Scaro* inter saxatiles datus est, inferius patebit. *Nomen* apud Latinos non tam à mulleorum colore, (calcei erant quibus priores Albanorum Reges, postea patricij vsi sunt) quod Feneftellæ teste Plinio placet; quam à mollicie invenit. Servitutis est indignatissimus, ut Columella loquitur, & in piscinis nihil vel parum saltem crescit. Græcis *τερίγη* non *τερίγλα*, & *τερίγλις* quod de tæmina sumendum est, quod ter pariat. Hinc Oppianus *τεργόνισιν ἐπωώνυμους γονήσι* dicit; vocatur. Cretensium vox *Στεργλημπαρών* ex Græca & Veneta composita est. An *γενίωλας* dicantur, quod Hesychius innuere videtur, cum

Triglas Græci *γενεαλίδα* cognominant, in medio relinquo.

Duo ipsorum sunt genera. Alii sunt *Barbati*, quos *γενεαλίδα* vocant, qui quæ sola succi bonitate, siquidem alii alga, alii carne vescuntur, differunt. Vnde *Lutarii* apud Plinium nomen. *Imberbes* alii, quos quidam *ἀπογόνους*, *τεργόλας* Sophron, & quidem, *ὀμφαλοτόμους*, quod umbilicus podexve aut magis quam aliis congeneribus patet, aut minus rotundus est; *ἐνδιατῆς*, quod in summo mari natantes tranquillitatem promittant, nuncupat. Dari tales Salvianus negat, nullum alium ex veteribus eius meminisse, perperam prætendens. Xenocrates enim saxatilem barba destitui innuere videtur, dum pelagium describit. Nulla stros recte dixeris, quorum alium imberbem, alterum à squammis asperum Rondeletius facit. Figuræ est totus oblongiusculæ, magnitudinis mediocris; binas libras rarò exuperare, apud Plinium habetur, quadrilibris Seneca, sex librarum Iuvenalis meminere. Si verum est octoginta librarum in mari rubro captum, ut Lucius Mutianus apud Plinium prodidit. Alterius is generis fuerit necesse est, dorso repando, unde *κύφας* gibbosas Epicharmus in nuptiis Hebes dixit, ventre plano albicante, cætera purpureo, hinc *ροδόχροα φύλα* Mullorum apud Oppianum. Matronus Parodus *μυλοπαρόν* colore miniaceo fecit. *Squam-
mæ* magnis, tenuibus, serratis, obliquo situ dispositis, faciliè ut apparet deciduis, robustis tamen. (Tiberius piscatori sibi secreto agenti insignè adferenti Mullum, eo faciem perfricari iussit) Pallentes eadem seu ad viredinem vergentes, virgis quibusdam paralellis insignitæ. Si vivus desquametur, *colorem sanguineum* sortiri, hinc *χρησώπας* apud Plutarchum, & *ξανθοχρόα* apud Nausicratem nomina, Massurius author est. *Mortuum* versicolori quadam & numerosa varietate spectari, rubescentiumque squammarum multiplici mutatione pallefcere, utique si vitro inclusus spectetur, à Seneca & Plinio

*Iuvenalis
in Satyrâ,
Plin. H. N.
l. 9. c. 18.*

*Oppianus
l. c.*

*Suetonius
in Tiberio.*

TAB.
XVII.
5. 6.
TAB.
XVIII. 4.

Plin. H. N.
l. 9. c. 17.

Oppian.
Halieut.
l. i. v. 590.

Seneca N. proditum est. Caput habet repandum, multis velut cancellis aureis exornatum, in quo spinam Canisimilem, quæ renibus apposita, miro fit remedio, Marcellus Empiricus asserit.

Os parvum, edentulum, oculos mediocriter rufos, in Aldrovandi ex Hispania misso, nigricant. Duo cirri cutacei albi in quibusdam, in nonnullis rubri, molles, rotundi, longi, atque barbæ similitudinem gerentes propendent. Branchiæ utrinque sunt quaternæ, ad quas pinnae sunt duæ aurei coloris, in ventre totidem candidæ, à podice rursus alia; in tergore duæ, prior ex firmioribus, posterior mollioribus aculeis constat.

Cauda rubet, & in lunatam pinnâ degenerat, ac propterea laterum pinnae, velut in acutum tendere Bellonius autumat. Interiora si spectes, gula est parva. Ventriculus cum innumeris appendicibus itidem, hepar ex albo rubescit, Splen exiguus est & nigricat. Scaliger, sinistro illud ventriculi lateri adiacere, dextro hunc, scribit. Intestina sunt mediocria, cor triangulare.

Quæ huic adscriptimus Minori quoque Salviani Mullo conveniunt, hoc discrepat, quod purpureo pingatur, aureis lineis careat, & lituris quibusdam flavis ac liventibus notetur, & squammis modico contactu deciduis vestiatur.

Plin. H. N. De Loco ambigitur inter Authores. Septentrionali Oceano & proxima occidentis parte gigni Plinius dixit; Galeno sunt pelagii. Oppiano

modo χαμαίοις παρ' αἰγιαλοῖς νέμονται humilia prope littora degunt: modo inter saxatiles cum Seneca referuntur; nec abludit Ælianus, λεπράδεις ei à loco, quem incolunt nonnulli, πίτερες λεπράς καὶ ἀραιὰς minuta & rara tubercula, aspera illa habere, scribit.

Per incerta maris spacia vagari, & circa littora, eorundemque saxa, ut plurimum vel quosdam duntaxat degere, verisimile videtur. Sane Ælian. H. imberbem inter saxatiles numerat A. l. c. 26. Xenocrates, & Cantharo ἀσπερ tri-

buit Ælianus; πέτρεον αἰεὶ λεπρῶς μέ- Oppian. μιν, petris semper asperus delectatur a Hal. l. 3. v. pud Oppianum idem: quam tamen 340. littoralibus annumerare Aristoteles Arist. H. A. l. 8. c. 31. non dubitavit.

Procreantur & in marinis lacubus, Varro R. R. detinuit & in vivariis Horrensus ad l. 3. c. 17.

Baulos, & maiorem sibi habebat curam, ne ipsius esurirent Mulli, quam Varro se habere proficitur, ne sui in rosea esurirent asiæ. Gregalis est & autumnno viget. Pamphagi sunt, & præter cœnum, unde ipsi Sargus, comes, ostrea, algam, & conchas, quibus apertis inhiant, piscium & hominum cadaveribus vescuntur, &

μάλλον τοῖς μεμιασμένοις καὶ κακόμοις φιλήδουσι, magis sordidissimis & male olētibus, Oppian. adde betarum folia, delectantur. Hal. l. 3.

De cadaveribus apud Oppianum 435. & Ælium legimus, & videntur Ælian. H. id pugnae navales & naufragia, quæ A. l. 2. c. 41. & l. 12. c. magna copia subsequi solent, Rit- 42.

tershusio declarare. Antiphanes Rittershus. tamen inter Helenæ cibos, quod ad Oppian. homines non insectarentur potuit. l. c.

Pisces insectari nullum dubium Orphum ἐπέφη, inquit Oppianus, Oppian. Halieut. l. 3. v. 188.

Vescitur lepore marino unum tantum animalium ut non intereat nullus pi- Aristot. H. A. l. 9. c. 37.

scis, tenerascit duntaxat & ingratorior vi- Plin. H. N. liorque fit, verba sunt Plinii. Dum l. 9. c. 17. itaque carnivorum Aristoteles ne- & 15.

gat, exiis, qui vel præter carnes nihil attingunt, vel viva tantum maris animalia venantur, eximere videntur.

Ter parere anno constans est Authorum opinio, his certe toties fertura apparet. Aristoteles ἐπὶ τῷ πη- Arist. H. A. λῶ διδ' ὅψ' ἐτίλειν πολὺν γὰρ χρόνον ὀσπλὸς l. 6. c. 17.

ἡνυχὸς ἐστίν, in cæno, itaque sero parere, diu enim frigidum est, addidit, solus Ælianus apud Aldrovandum, sterilem reddi postquam ter pepererit, natis in utero vermiculis, qui semen exedunt, prodit, quod mihi nondum apud eundem invenire contigit. Antipathiam cum lepore marino habere ex præcedentibus cognosci potuit; addit Aphrodisæus Torpedinem, cuius viribus stupefactivis ista resistere creditur.

Insignis

Insignis est prodigo veterum luxu seu precium, seu coquos seu lances confideres. Argenti pari pondere sæpius à privatis etiam Quiritibus emptum, cum pedis longitudinem superaret, Iovius prodidit. *Asinius celer Claudio Principe unum octo millibus nummum*, id est, quadringentis plus minus Caroleis, *mercatus est*, licet magis luxuriam æstimare, quod Plinius suis temporibus neget facile Mullum repertum, qui duas libras excederet. Crispinus Ægyptius ex servili conditione ad equestrem dignitatem Domitiani indulgentia evectus,

—— *Mullum sex millibus emit*

AEquantem sane paribus sestertia libris.

Publ. Octavius ingētis formæ (quatuor pondo & ad selibram esse aiebant (à Tiberio Cæsare in macellum missum, quinque millibus sestertiiis mercatus est. Idem tres, triginta millibus nummum vānisse, graviter conqueritur & annonam macelli Senatus arbitratu quotannis temperandam censet. Nec satis soluta luxuria videbatur, nisi & coci maximo conducerentur pretio. *Reputatio hac inquit Plinius aufert transversum animum ad contemplationem eorum, qui in conquestione luxus, coquos emi singulos pluris quam equos quiritabant. At nunc coci triumphorum pretiis parantur, & coquorum pisces. Nullusque prope iam mortalis æstimatur pluris, quam qui peritissime censum Domini mergit.* Lances quibus inferebatur,

Chrysendeta Martialis vocat, vel crustis aureis ornabantur; vel gemmatæ fuere; gemmæ auro confertæ & contestæ tenebantur, vt Turnebus explicat. Non eadem tamen omnibus præstantia. Polluci Ionici maxime placent. Aëtio Syncero qui ad rupes Herculeas capiuntur. Nausicrati Æxonici: Æxoniam Magnesiæ urbs est, sed Cratinus eos improbat. Archestratus laudat Tichuntinos; Tichus castellum prope Tachinam Campiæ oppidum est. Corficæ &

Taurominitanæ rupes à Iuvenale celebrantur.

Iuvenal. Satyr. 5.

Perothus præstantissimos in mari Tyrrheno iuxta Corniculū, & Tarquinios capi prodidit. Iovius Romæ hyeme & suburbano mari captos maximè prædicari; Ligusticis, Venetis, & Neapolitanis non eam saporis gratiam esse; quanquam multo grandiores in convivia veniant, scribit.

Sed & longius à littoribus captis sua quoque gloria. Purior enim aqua in causa; corporis rubicundus, igneus, aureusque fulgor argumento. Magnas parvis gulæ procures præferabant, seu propter maiora capita, & iecinora; summopere ista expetita ex Galeno habemus: seu quod ita subtilioribus pabulis placeret; seu vt inexplibilem gulam preciosissimo obsonio explerent, quas Philoxenum Poetam apud Dionysium fecisse legimus. Heliogabalus non integros, sed quod præciue stupendum Lampridius scribit, barbas eorum plenis discis, palatinis suis apposuit.

De carnis qualitate inter scriptores non convenit. Xenocrates obsoniorum præstantissimum, stomacho idoneum, origratum, boni succi, carne plana, difficilem ad corrumpendum, mediocrem ad excernendum pronunciavit. Celsus medium inter duras & teneras carnes habentes reponit. Diocli, Philotimo & Psello difficulter concoquitur. Durissima est & valde friabilis; boni nutrimenti, si bene concocta fuerit, Galeno. Apparatus ad Oeconomiam pertinet. *Olim parum videbatur recens Mullus, nisi qui in convivia manu moretur. Vitreis ollis inclusis offerebantur, & observabatur morientium color, quem in multis mutationes mors luctante spiritu vertit.* Apicius ad omne luxus ingenium mirus, in sociorum garo (nam ea quoque res cognomen invenit) necari eos præcellens putavit.

Venit & inter Remedia. Sanguinis & hæmorrhoidum fluxus promoveret. Sæpe sumptus oculorum aciem hebetat.

Galén. de Aliment. facult. l. 3. Achias l. 2. 6. 79.

Seneca Quest. Natur. l. 3. 17.

Impotentia virilis.

hebetat. Vinum in quo suffocatus est inter virilis impotentiae causas, numeravit Trepiates, nec mulieres si biberint concipere; ideo Dianæ in sacris offertur. Assus torminosis peculiariter prodest, à Tralliano dysenteria hepatica laborantibus præscribitur. Carnes excapitibus decoctæ & cum melle subactæ, ani tollunt vitia. Percussis denique à Pastinaca cum lasere medetur.

IMBERBEM duplicem nobis descripsit Rondeletius. Prior, quem Occitani *Imbriago* à rubore, quo ebriosorum facies inficitur, vocant, rarus est, veteribus parum notus. Hirundini & Cuculo corporis figura similis, colore magis rubro, capite magno stellulis cælato. Oculis magnis, Ore parvo, edentulo, pars inferior Cinnabaris colore inficitur. Os branchias operiens in aculeos ad caudam spectantes terminatur, ad quas pinnae duæ sunt rubrae cum appendicibus aliquot, in ventre duæ alia. Cute aspera & rubra in dorso & lateribus contegitur. Ventre est candido, ad quem è dorso lineæ multæ ducuntur. A capite ad caudam dorso medio acutorum officulorum ordines, cavum efficiunt; è medio pinna rubra aculeis ferratis constans erigitur, quod non nisi in Sagittario videbis; quam alia veluti è mollioribus pilis constans sequitur. Cauda rubra est Scorpionis caudæ similis. Ventriculus parvus cum multis appendicibus. Venter vere multis ovibus distenditur.

Alter à squammarum asperitate, Asper nominatus, corpore est brevi, terti, digiti magnitudine, colore minij vel valde purpureo. Capite, branchiis, pinnis descripto similis, squammas habet parvas, ferratas, oblique fitas, à capite ad caudam lineam ex squamis contextam, pinnas ad branchias extra candidas, intra ex viridi nigrescentes. Ventriculum cum appendicibus paucis parvum, hepar candidum, & sine felle. Splenem parvum ex rubro nigricantem.

Aldrovand. Histor.

Diversus ab hoc Aldrovandi asper Mullus est, vtpote totus fereruber,

capite aureis cancellis ornatus, in Piscium l. vertice aculeatus, dorso planus & a. 2. c. 2. sper, ventre candicans, branchiarum cæruleis striis pictis, cætera flavescens.

ARTICVLVS II.

De Hirundine & Cuculo.

Quænam sit Græcorum Hirundo, TAB. seu vt illi vocant *χελιδών* ambigi- XVII. tur. Rondeletius eandem cum *Lucerna* Plinij, quod noctu luceat, facit, & in Plinij loco transpositionem arbitrantur. Aldrovandus eum piscem esse, quem pro corace sive corvo Salvianus, pro Lucerna Gesnerus posuere; iudicat, & Hirundinem Plinii ab Hirundine Græcorum distinguit, illamque Rondeletii Mugilemalatum, Bellonii & Salviani veram Hirundinem opinatur. Ut vt sit, videtur *Lucerna* dici, non quod lingua eius per os exerta tranquillibus noctibus luceat, (piscibus enim explanata ista, si Aristoteli credimus; & fieri id, piscatores negant,) sed quod vel pinnae versicolores noctu fulgorem quædam emittant; vel quod speciem antiquæ lucernæ gerat, vel denique quod oculi eius noctu luceant, quod verissimum esse iudico. Caponem Romani à capitis asperitate & magnitudine dixerunt.

Dua ipsius sunt species, quæ in omnibus ferè cum cuculo conveniunt. Ore, rostro, capite offeo, anguloso, cælato, aculeorum, pinnarum, cirrorum cartilagineorum numero & loco. Maxima in appendicibus, vtrinque ternis, similitudo: in eo distinguuntur, quod binæ rostri eminentiæ, quæ in cuculo longiusculæ sunt, in hoc vix conspiciantur, pinna lateribus hærens, primum sit viridis, in extremo cærulea, tergus quoque variegatur. Cuculus denique sæpe tres libras attingat, duas nunquam hirundo. Squammis tam exilibus teguntur, vt Gesnerus pro iis asperam habere cuticulam scripserit.

Alter Hirundo duas latas & cæruleas ad latera pinnas, Milvinis brevior-

breviores habet, has per medium ferre corpus expandit. *Corpore* quoque est recurvo, & crassiore, grandiore ventre.

Ælian. H. A. G. 2. c. 3. *Solitarios* esse captura arguit, singuli & pauci capiuntur. Cum aliquid metuunt, ex mari exilire dicuntur, sed humiliter volant.

TAB. XVII.
IO. II. *Cuculum* Græci *κόκκυρα*, seu à sono, quo avis eiusdem nominis more obstrepat, ut Aristoteles & Athenæus testantur; seu quod cum retibus capitur vocem *κὲ* exprimat, dicunt. *Psellus* *ψαλλύριον* nominat. Typhon apud Athenæum cum *τῆ τριγλῆ* sit similis, cum Trigola eundem à quibusdam haberi prodit.

Totus piscis rotundus est carnosusque, vix tres libras superat. Toto corpore præterquam in medio latere, in quo virga ex tenuibus squamis contexta protenditur, *glaber* est, in dorso à capite ad caudam duo squammarum ordines deferuntur. *Caput* ipsi magnum, osseum, angulosum, totum cælatur, alicubi *aculeis* munitum. *Rostrum* in duas longiusculas eminentias semicirculum constituentes terminatur. Super utrumque oculum supercilii loco brevis, sed acutissimus & durissimus aculeus extat.

Utrumque branchiarum operculum alio & quidem longiori armatur. *Maxille* extrema sui parte asperiores dentium vice funguntur. Ante pinna, cartilaginei cirri, utrinque terni dependent. *Ventrem* habet planum. *Caput*, dorsum, latera & pinna rubra. *Ventriculum* cum multis appendicibus satis carnosum. *Intestina* lata, inter se convoluta, & multa pinguedine obducta, *hepar* subalbidum sine felle. *Splenem* rubrum & parvum.

Oppian. Hal. l. 1. v. 27. *Aristot. H. A. l. 8. c. 13.* Littoribus ab Oppiano accensetur. Aristoteles & Ælianus inter illos & pelagios ambigere dixerunt. Inter Brasiliam & Portugaliam densis agminibus volant, & aliquando milleni, sæpe centeni capiuntur. Pinnarum magnitudine aditus in nando celer est.

Carnem habet plurimam, albam,

duram, & siccam. Diphilus Milvo præposuit, quia friabilis, haud temere salubrem censeas. Ab Hipocrate in pituitosis morbis conceditur. Romæ frixus & arantii mali succo irroratus, editur, quidam nec elixum aspernantur.

ARTICVLVS III.

De Milvo, Hirundine Plinii, & Lyra.

MILVUS seu *Milvago* Plinij idem **TAB. XVII. 12.**
est cum *Hirundine* Græcorum *Aldrovand. de Piscib. l. 2. c. 5.* *Rondeletii* Aldrovando, Græcis *ἰεραξ*, Oppiano *ἰεραξ* id est Accipiter dicitur, quod Accipitris species inter aves Milvus sit. *Pinnis* caudaque expansis Milvum avem omnino refert, latis nimirum & maculosis. *Corpore* est rotundo, oblongo, maiori ex parte nigro rubescente, aliquando omnino rubro. Sesquipedalem mensuram, vel maxime auctus non excedit. *Caput* habet osseum, quadratum, durum, asperum, cuius pars posterior duobus iisdemque magnis & robustissimis aculeis, ad caudam spectantibus armatur. *Branchiæ* quæ rectæ, opercula ossea in duos aculeos robustos desinentia gerunt. *Pinnæ* stellulis maculisque variis asperguntur. *Squamme* osseæ, asperæ & triangulares serpentium more inter se committuntur. *Cauda* unica atque lata pinna terminatur. Quantum ad interiora, *Lingua*, & palatum splendore Sandaracum vel Cinnabarim superant, his noctulux, ac si candentes carbones ore continerentur. *Ventriculus* mediocris multis appendicibus munitus est, *hepati* pallido vesicula fellis committitur. *Lien* est oblongus & subruber. *Vterus* bifidus, ovis rubentibus refertus. *Cor* angulatum.

Qui Hirundinis nomine Aldrovando ex Hispania missus erat, sub oculis ex violaceo albicabat, cancellis quæ ad aureum colorem vergebant, exceptis. *Alas* habebat longissimas & latissimas, ex cæruleo viri-

descendentes, maculis plurimis rotundis cæruleis conspersas maiores aureis punctis oculorum qui in Pavonis cauda conspiciuntur similitudine ambiebantur. *Tergus* asperum partim aureo, partim ferrugineo colore tinctum erat.

Quem hic describimus, solo in mari degit, & raro, si Salviano credendum, capitur. Licet edentulus, Carnivorustamen est. Iuxta littora ubi minor insequetium piscium metus est, humilem exercet *volatum*: altum, ubi maior. Ad lapidis ictum volatum protulisse, quatuor extra summam aquam cubitis eminens, in Gallico maris interni littore visus est. Qui ad Herculis columnas navigant, tantum aliquando ibi horum piscium volantium turbam affirmant, ut aves aquatiles esse videantur.

A mensis propter carnis ingratitudinem reiicitur. A nautis templis offerri, ibique ob raram formam suspēdi, Gillius author est. Rondeletius fel contra *oculorum suffusiones* efficax esse comperit.

Oculor. suffusiones. TAB. XVIII. 5. **HIRUNDINEM** Plinij cum piscem Aldrovandus esse iudicat, qui Romæ Pesce *Rondine*, Agathensibus *Falco marinus*, Massiliensibus *Landola* dicitur. Si alas auferas ad Mugilis Cestrei inprimis accedit figuram, hinc Mugil alatus Rondeletio. Cubiti magnitudinem attingit. *Squamis* contegitur magnis. *Caput* habet rotundiusculum, *rostrum* acutum, *os* parvum, prorsus edentulum. *Pinna* quibus volatum exercet, totum corpus longitudine adæquant. *Cauda* pinna est lata, magna, lunata, & ceu in duas pinnas desinens. *Linea* quæ in cæteris piscibus à branchiis vel à capite per latera ad caudam dicitur, in hoc pisce à pinnis ventris orta per imum ventrem ad caudam fertur. *Venter* albicat, *dorsum* quod latiusculum est, ex cæruleo nigricat.

Describit & alium Aldrovandus, sub nomine *Mulli alati* seu *Lyræ* missum, aliis rotundis, intus virentibus, extra nigricantibus, pinnis pectoris & cauda fulcis, ventre argenteo. *Lateralia, branchiarum ossa*, & *Synciput* au-

ro resplendebant. Non omnibus locis capitur, & Romæ rarissimum ajunt. Alga & aliis maris quiscuilibet victitat, sed carne abstinet. Mugilibus carne & succo similis esse creditur.

LYRA piscis, qui quibusdam *Cephalus*, *Orphus*, *Erythrinus*, imò *αἰθαλῆς* TAB. XXIV. 3. falso creditur, vel à cornibus anterioribus, quibus similitudinem *lyræ* repræsentat, vel quod veluti *lyræ* sonum edat, ita vocatur.

Species eius duas Rondeletius posuit. Prior *lyra* piscis est teres, ruber, *capite* osseo, magno: *rostro* in duo cornua lata protenso, quibus *lyræ* antiquæ formam refert: quem veterum *Lyram* Salvianus esse credit: quique squammis parvis & asperis contegitur, & plus ossium quam carnis habet. *Altera*, quam superioris marem quidam esse arbitrantur, sed falso, quoniam in huius quoque ventre ova rubentia reperiuntur; palmi est magnitudine. *Corpus* habet quoad vivit rubrum extincto color evanescit. *Caput* osseum, angulosum, aculeis & eminentiis plurimis asperum, cuius anterior pars in duo longa, lata, & retusa cornua degenerat, sub quorum exortu os est satis amplum, rotundum, & edentulum. Ex inferiore maxilla *cirri* quidam breves, molles & carnosi dependent. *Oculi* & branchiarum ossea opercula aculeis muniuntur. Ex duabus in dorso pinnis prior brevior in longas & rubentes setas degenerat, posterior à medio dorso ad caudam, sed inermis decurrit. *Cauda* in unicam pinnam illamque parvam definit. Tegitur ossearum atque grandium squammarum, quæ Media sui parte acutissimo, recurvo, atque ad caudam spectante aculeo muniuntur, octonis ordinibus; unde sicuti asper totus ita octangulus creditur. Quantum ad *internas partes*, *ventriculum* habet parvum, cum parvis & paucis appendicibus. *Hepar* pro corporis ratione magnum, album, & in eo fellis vesiculam. *Splenem* parvum & subrubrum. Carnis porum, ideo facile exsiccat & sit levissimus.

Vesicula

Aristot. H. Al. 9. c. 9. Vescitur maris excrementis. Plures capi non solent. Vocem grunntui similem omittit, seu attritu brachiarum, seu suis anterioribus, quas circa ventrem habent. Spiritus enim inclusus in his est, quem dum attulerunt atque agitant, sonos illos elidunt.

Utraque quia dura est, damnari ferè in cibis solet.

ARTICVLVS IV.

De Phagro & Erythrina.

TAB. XVII. 13. Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 8. PHAGRVS seu Pagrus, *αἰὶ τὸ φάγειν*, quia vorax est Græcis; à colore fragorum, rubeo enim est, Italis ita dicitur. Cave cum Paguro confundas.

Tanta est inter ipsum & Erythrinum similitudo, ut, cum eiusdem sunt magnitudinis, etiam peritis imponant. Distinguuntur tamen eo, quod Pagrus *hyeme* à ruffo ad caruleum magis vergat, toto corpore sit latiore & retundiore, Sargi instar recurvus, rostro spissiore, rotundiore, & ad aquilini nasi figuram accendente. Habet insuper *tergoris* pinnam crassiore: *oculorum* pupillam crystallinum, iridem rubram, peculiaremque lituram, nigricantem, tactu asperam, in lateribus circa cervicem, ubi linea est, quæ corpora piscium interfecat, latam. *Squammas* gerit rotundastenues & latas. Superior *maxilla* in tubi modum cervici veluti infarcta est, neque cranio inhæret. Cum oscitat exeritur, postea contrahitur. *Dentes* quoque habet acutos; quatuor exteriores parum falcantur; molares, qui rotundi & obtusi, duplici ordine disponuntur. *Interiora* si scruteris, sunt ei lapides in cerebro, *lingua* in ore veluti rudimentum, *hepar* sine felle. *Cor* angulatum, vesica aere plena. Numenius *λοφίαν* quasi cristatum dixit, quod ea corporis pars, quæ cervici responderet, sublimis sit & alta.

Quem Aldrovandus exhibet, is *pinnis* omnibus tergo & cauda rubet. *Oculorum* ambitus ruberrimus, argen-

teis lituris conspergitur. A *branchiis* ad caudam linea excurrit, aurea, serrata. *Ambigit* inter littorales & pelagios, inter hos Mnesitheus locat. Oppianus in saxis degere scribit. Quod ex Indico mari salitum afferri Oribasius prodidit, de illo potius, quæ Syenitæ in Ægypto sacrum habent, eo-que, quod una cum crescente Nilo apparens, incrementum eius denunciet, abstinere, intelligendus est.

Vivitat alga & luto, sed & sæpiolas, squillulas, loligunculos appetit. Echinis an vescatur, quod nimis aculeati sint, dubito. Isidorus tam duos ei dentes tribuit, ut & ostreis in mari aliqueat. Hyeme prægelida, quod lapidem in capite habeat, latet. Incutatur channis sive hiatulis.

Quid sibi Aristoteles velit, dum citante Athenæo Pagrum *ἀντιόξειν τὸ εἶναι* id est *vere vigere* scribit, difficile ter intelligi potest, nisi *τὸ εἶναι ἄγεος* parere vere innuatur.

Archestratus Syrio exoriente comedendas esse suadet. Suaves & mediæ carne Hicæsius posuit. Gellius inter delicatos habuit Sanazarius ex Dicarchi, nunc Puteolos vocant littoribus, celebrat.

ERYTHRINVM, qui peculiare hoc nomen à colore invenit, moderni Græci *λέθρινον*, Cyrenæi auctore Zenodoto apud Athenæum *δύκινον*, auctore Clitarcho *δύκινον* vocarunt. Theodorus satis ambigue *Rubeculam*, Plinius rectius *Rubellionem* dixit. Idem ne cum Ruburno & Ruscupa, de quibus Murmelius, non disputo.

Palmi mensuram raro excedit. Ruber est ut Mullus, dilutior tamen, unde fortè *ξανθὸν* Oppianus dixit, latus ut Aurata. *Rostrum* habet acutum, sed non valdè extensum. *Os* parvum, mediocribus dentibus munitum. *Caput* utrinque compressum. Ante oculos, qui magni, foramina patula. *Branchia* quæ in dorso unica est, multis *aculeis* horrescit. Bellonius duodecim, quindecim Rondeletius, viginti duos, Salvianus, novendecim Gesnerus numerat. *Cauda* in lunaram pinnam definit. Intus candidissimus est.

Peculiaris est mari, hyeme in alto

Arist. H. A. degit, æstate circa littora capitur.
L. 4. c. 11. l. Diversus est ab isto ille qui in lacu
6. c. 13. Suerinum alluente, non procul O-
l. 2. de ge- ceano Germanico visitur.
ner. An. c. 4

Plin. H. N. Carnivorus est. Cancellis & aliis
l. 9. c. 16. pisciculis insidiatur, nec locustis &
 cicadis parcat. Gregalem esse Athe-
 næus Aristotelis autoritate memi-
 nit. Sexu non distinguuntur. In om-
 nibus enim reperiri ova Aristoteles
 author est. *Pariunt* ineunte æstate.
 Cum sesquipalmm excesserint in-
 dentices seu Synodentas abire, fal-
 so Iovius credidit. Ad formam dun-
 taxat coloremque accedunt, minus-
 que solito ruffi, canescunt veluti.

Quantum ad *usum* copiosum ali-
 mentum præbent Xenocrati: nunc
 inter mediæ substantiæ pisces nume-
 rantur, si sint recentes, frixi & frigi-
 di inter saporis iucundi cibos. Ace-
 to & aromatibus in Gallia consper-
 gere mos est. *Plinius* in cibo sumptū
l. 32. c. 10. Venerem concitare & alvum sistere,
 quod à Xenocrate mutuatus est, scri-
 bit, in vino putrefactus, vini tædium
 adfert, cui illud propinatum fu-
 erit.

ARTICVLVS V.

De Acarnane & Orpho.

TAB. XVIII. **P**iscis quem Hicesius apud Athe-
7. 8. næum Acarnanem vocat, Di-
Athen. l. 7. philo ἀκάρην, Athenæo alicubi ἀχάρην
c. 8. ex Gallia, Ethymologo ἀχάρην, Pli-
Dipnos. nio *Acarne*, dicitur. Scribitur quo-
Arist. H. A. que ἀχάρην, ἀράχην, & ἀγάρην, sine
l. 8. c. 9. dubio mendose. Mugilibus infe-
Plin. H. N. stum esse, siis est, quem Aristoteles
l. 32. c. 11. annuit, & æstate extenuari, veteres
 prodidere.

Rondeletius pro eo piscem exhi-
 bet, album, squammis argenteis, ore
 mediocri, tenuibus dentibus, rostro a-
 quilino Pagri modo, spacio quod in-
 ter oculos est compresso, oculis pro
 corporis proportionem magnis, aure-
 isque pinnis candidis.

Erythrino adeo similis est, ut pro
 eo vendatur. Capitur æstate & hye-
 me; illa extenuatur, & laborat.

Carne est candidissima, media

substantia, facile concoquitur & di-
 stribuitur, & bonum succum gignit.

ORPHUS Polluci ὀρφος, vel quod
 magis Atticum est ὀρφις, Gazæ Cer-
 nua, quis apud veteres piscis fuerit,
 difficile est conicere, pauca enim
 quæ ad cognitionem eius faciunt, re-
 perias. Benedictus Tincis similem
 credidit. Alii Capitonem ab oculorum
 aspectu & rubro colore dixere, qui-
 dam quia maiorem Capitone opi-
 nantur, sui generis piscem esse tra-
 dunt. Gellius ab eo qui hodie in
 Græcia ita vocatur, non distinguit.
 Rondeletius maiorem hunc veter.
 Orpho, qui à Mullo devoratur, (vi-
 ginti enim libras pendet) nec litto-
 ralem postquam dixisset, piscem Pa-
 gro similem, colore ex purpureo ru-
 bente, oculis magnis, dentibus serra-
 tis, podice adeo parvo, ut rinula vix a-
 nimadverti possit, seminis meatibus
 carentem, pro eodem ponit; eidem-
 que omnia quæ veteres de suo dix-
 ere, competere scribit. Bellonius de-
 nique alterum compressum magis
 quam teretem, squammis asperis, &
 corpori firmiter inhaerentibus te-
 ctum: Capite rubeo; pinnis tergo-
 ris, laterum ventris, & caudæ variis colori-
 bus insignibus; labris scabrosis, mac-
 culam in radice caudæ gerentem,
 quem Cretenses Cheluda, Acheluda, &
 Petroparo nominant, pro eodem ob-
 trudit.

Ut ut sit, de veterum Orpho sci-
 mus, Aristoteli & Athenæo littora-
 lem, Æliano marinum, Ovidio pe-
 lagium esse. Numenius thalamis &
 cavernis delectari; Oppianus in pe-
 tris cavernosis, quæ plenæ sunt Cha-
 mis & patellis; degere scripsit. Car-
 nivorus idem. In Myrinenfi Lyciæ
 sinu ad Apollinis templum, ad spar-
 sas vitulinas carunculas adnotant,
 easdemque comedunt; brevi tem-
 pore adolefcit, hyeme latet; in bien-
 nium vitam non prorogat, & tarde
 moritur, ideo ὀφιοφάγος γένος Oppiano.


In ciborum fuit deliciis. Nam &
 Dorion Opsophagus inter cæteros
 veluti expiscibus, Deos ponit; &
 Lynceus Samius Attico Glauci-
 sco, Ellopem & Orphum Rhodios
 oppo-

Sphyraena, siue Suid. ein art meer hecht




Pisces gutturosus.

3 dickhals.





Alauda non cristata. meerlerch ohne Kam.



Herundo Plinij.

4


Mullus imberbis. glatter rotbart.



rother meer brasmen.


Engrastrinus.

6



Acarnan.
fleck brasmen


7



müneh brasmen
ein ander rother
meer brasmen

8


Orphus.



Dentex.


Synodus.

9




10

Synagris. zin brasn
ander art




Sparus.

11



Scorpius *Scorpius minor*
Scorpena *Planer*
meerscorp.

12



Aristoph. in Vespis. Opposuit, & Aristophanes inter re-
gios pisces retulit. Athenæus *ἐυχυλον*,
πολύχυλον, *γλίχρον*, *δυσφθαρτον*, *πολύτροφον*,
& *ἐρηπιδόν* facit, quæ sequuntur trans-
posita esse, ut Rondeletius obser-
vavit, videntur, qui enim potest a-
liquid esse *γλίχρον* & *ἐυπεπτον*, gluti-
nosum, & concoctu facile. Phi-
lotimus tamen inter duræ carnis pi-
sces reposuit.

ARTICVLVS VI.

De Synodonte sive Den-
tice.

TAB. XVIII. 9. **S**YNODON piscis *ὅστις τὰς ὀδόντας ἰσχύει* nomen invenit, quod si prima syl-
laba per iota scribatur, *ὅστις τὸ σινεῶναι*
καὶ βλάπτεν τοὺς ὀδόντας, quod dentibus
noceat, ita vocatur. Gaza *Denticem*,
Albertus *Dentatum*, alii *Dentalem*
nominavere. Plinius Græcam no-
menclaturam retinuit. In Adria-
tico mari in insignem magnitudi-
nem excrescit; in littore Auratam
non superat. Vulgarium pondus
trium aut quatuor librarum esse so-
let: decem librarum pondere ob-
servavit Salvianus. *Dorsum* habet
rependum; latera satis compressa.
Caput nonnihil fastigiatum, in quo
lapides, qui *Synodontides* vocantur,
gerit; *rostrum* acutum, *Os* satis am-
plum, valdeque denticulatum, præ-
ter minores ac serratos, superior
maxilla quinque aliis, inferior octo-
nis permagnis, caninis simillimis ar-
matur. *Oculi* sunt magni, bran-
chiæ utrinque quaternæ. In *dorso*
pinna unica viginti aculeis muni-
tur. *Cauda* est falcata. *Venter* ar-
genteus, unde album Numenius
vocavit: latera & dorsum ex al-
bo rubent. Unde ruber Ovidio *ἐυ-
ροσκοκίλῳ* Epicharmo.

Aldrovandus duos alios fortè con-
generes huic addit; quorum priori
tergus viride, *Synciput* aureum,
branchiarum ossa violacea. *Alteri*
os intus & extra subatrum, supra
id macula cærulea: sub branchia-

rum pinnis macula insignis; pur-
puraceis, aureis decorata squam-
mis. *Venter* flavus, *squamma* ar-
gentea.

Pelagium quidem Columella fa-
cit cum Ovidio, sed Aristoteli & Columella
Oppiano, quibus littoralis est, suf-
fragantur piscatores. Probantur ex
Dalmacia & Illyrico, præsertim
Salana atque Tragurio. Colu-
mella Punicas & indigenas nomi-
nat.

Carne tandem vescitur, & tanta
cum aviditate, ut venter in os pro-
cidat. Polypi carne inprimis dele-
ctatur, quem cubili suo extrudere
non possit, ante ostium tanquam
mortuus fluctuat, brachium exten-
dentem, arripit, sed & in ostrea ac
pisces innoxios grassatur: nec Bo-
ce, quod ab Oppiano proditum,
parcit. Gregales sunt, & *συναγελά-
ζονται κατ' ἡλικίαν* solent: per adolescen-
tes κατ' ἡλικίαν νεχόντας, separatim à re-
liquis natant. *ἐντελέστεροι πάλιν γινώ-
σκονται* firmiori ætate inter se vitæ com-
munitate junguntur. Cibo à pi-
scatore demisso, in orbem consi-
stente, & signum quasi eo arripiatur,
dant.

Ab Antiphone inter lautissima
obsonia recensentur. Hiccius co-
piose esse alimenti, & difficulter ex-
cerni scribit. In Italia peculiare
condimentum quod amarinate vo-
cant. In Dalmatia concisus & se-
micoctus multo croco & perspicuo
gelu conditur, detestatum Aponensis
obsonium.

ARTICVLVS VII.

De Synagride & Chro-
mi.

DE SYNAGRIDE pisce diversæ
sunt apud Authores opiniones. XVIII.
Theodorus Gaza pro eodem cum
Synodonte sumit. Massarius & Gel-
lius ad eum similes, ut vix discerni que-
ant, volunt. Rondeletius sola æta-
te distingui iudicat. Diverfos pisces

I 3 vel 6 13.

vel ex Aristotele colligas, qui diversis in locis, duobus his nominibus utitur. De Bellonio tacebo, qui & modernos Græcos distinguere scribit. Antonius Gigas sequentem iconem pro Synagride misit.

Piscis erat insigniter dentatus, squammis undique latissimis, & facile deciduis reclusus. *Capite* superius sanguineo, inferius ex albo & cæruleo variante. *Ventre* ex albo flavescente, lateribus candicantibus. Bellonius Synagridem Cyprini in modum, veluti circino ita circumductum, ut pro longitudine ac latitudine magis crassus appareat, facit. Caput, inquit, utrinque compressum habet &c.

TAB.
XVII.
14.

CHROMIS & Cremis *χρῆμις* idem esse piscis, vel propter nominum similitudinem esse videtur. Agronitu, quem edit ita dictus est, quod & apud Isidorum qui eundem cum corvo marino facit, legimus; sed is, ne, quem Rondeletius describit, pinis, spinis & figura Metaurino similis, oculis tamen minoribus absque macula in cauda, toto corpore nigricante; anis, quem Bellonius, Chromis sit, dubitatur. Accedit tamen huic Aldrovandus, sola grunnitus ratione habita. Tenuibus autem is squammis vestitur ex auro nitentibus, ac cæruleum interdum colorem concinnè vibrantibus. Binas (verba sunt Bellonii) *pinnas* gerit in tergore, quarum anterior quæ minor est &c.

In herbosis degere Ovidius auctor est, quia immundum nominat, & luto gaudere credibile est. Virentibus herbis vescitur. Parit quotannis semel. Exquisito esse auditu apud

Aristot. H. Aristotelem legimus. Grunnire su-
A. l. 5. c. 9. perius dictum est.

l. 4. c. 7.
& 8.

Vilem suam Chromin Rondeletius facit. Bellonii inter laudatissimos censetur.

85

ARTICVLVS VIII.

De Aurata.

Aurata, seu Orata, Græce *αὐράτος* TAB. XIX. 2.
φρύς, quod iis in locis, ubi in cæ-
teris animantibus supercilia esse solent, aureo colore resplendeat, Ephesiis teste Archestrato *αὐρίστου* & Hesychio *ἐπῆλιν* dicitur. Ad denas libras cum maximè adolevit, vix unquam pervenit. *Dorsum* habet repandiusculum, ex cæruleo nigrescens. *Latera* compressa, argentea. *Ventrem* lactei coloris. *Partes oculis* superiores auro, in adulto maximè, resplendent. *Dentes* anteriores sunt longi, rotundiusculi, ferrati, internæ utriusque maxillæ partes, plurimis ossibus tuberculis duris & inæqualibus muniuntur. *Ventriculum* habet amplum cum paucis, ut Aristoteles notavit, appendicibus. *Intestina* ampla pinguedine involuta. *Tecur* magnum & pallidum, à quo *fellis* vesicula, longa, pinguedine obducta pendet. *Splenem* subatrum.

Aristot. H.
A. l. 3. c. 17.

Sic est marinus piscis, ut & in lacubus etiam marinis nascatur, quod tales convectis marinis seminibus. Romani replessent. Commachium Athen. Di-
Bonnoniensibus eas subministrat, & *pnos. l. 1.*
olim Velimus, Sabatinus, Vultinensis, & Ciminus eas procreabat. Sed & circa Berenicem Libyæ fluvium, qui *αἰθων* dicitur, inveniuntur. Aristot. H.
A. l. 8. c. 2.

Cibus ipsi sola caro. Tellinas & conchyliis robustis maxillis frangere; Menide tanquam eius esu vehementer oblectetur capi, certum ferè est Scari modo *ruminare* asserit, sed fortè sine auctore, Rondeletius.

Æstate circa fluviorum ostia *parit.* *Æstus* impatientia, mediis fervoribus, sexagenis diebus latere à Plinio proditum est: tempus Aristoteles non expressit. Timidissimos esse captura ostendit. Recedente maximè sub Arcturi tempus mari, arborum ramos frondibus vestitos, in arenam piscatores disfigunt: accedente plurimæ attrahunt.

Aristot. H.
A. l. 8. c. 19.

Ælian. H.
A. l. 13. c. 28.

huntur; reciprocante ramorum tu, quiescunt, & ab imperitissimis quoque capiuntur.

Macrob. In precio fuere olim, Ephesiæ imprimis, quas Arcestratus celebravit. Sergium Romanum patritum, cognomentum inde sibi adscivisse, quod carissimæ ipsi essent Oratæ, apud Varronem Columellam, Valerium Maximum, & Macrobium legimus. De nutrimenti qualitate non convenit inter veteres. Mnesithæus difficulter coqui, concoctam multum alere. Celsus duriores esse. Diphilus cum Melanuro, qui succi bonitate Sargo, Hicestio iudice, minus nutriente, inferior est, proportionem habere, asserit. Ideo Rondeletius carne media esse pronuntiavit, saxatili duriore. Notra ætate marinæ & quæ hyeme capiuntur, laudantur. Lacustres pinguiiores quidem, sed lutum, quod in eo degant, olent. Apparatum in Aldrovandò vide.

ARTICVLVS IX.

De Sargo.

TAB. XIX. **I.** Σ *Agzds* an *σάρκιν* dicendus sit piscis, dubitatur. Is quem Melanuro Hicestius accommodat, vnde *Piscibus* catur *σάρκιν*. Rondeletius geminum nomen agnoscit, à multa carne id habere iudicans. Sparo squammis tenuibus, lato corpore, linea à branchiis arcuata, pinna continua affinem Bellonius pronuntiavit. *Rostro* acutiore, *dorso* magis repando, *ventre* prominentiore, *dentibus* latis humanisque simillimis, lineis quibusdam, unde *πολύγεγμ*, & macula juxta caudam nigra, unde *μελανόγεγμ*, & *ὀρροπυρόσκη* Aristoteli dicitur, distinguitur. *Colore* aliàs est argenteo. *Pinna* quæ ad branchias sunt rubescunt. *Branchiarum* exterius tegumentum spineum est. Hepar subrubescit: ab hoc *fellis* vesicula pendet. *Lien* subniger est, & ferè circinatus. Ad multam magnitudinem excrescere assolet.

Aldrovandus binos exhibet. Prior

ὀρροπυρόσκη, pinnas omnes, præter eam quæ ab ano est, habet aureas: maculam juxta Uropygium violaceam, totum caput ad eundem colorem vergens.

Alter *πολύγεγμ*, aureis & argenteis quæ ferræ figuram exprimit lineis, elegantissimè condecoratur, pleræq; ad rubiginem vergunt. *Gefnerus in mortuis* lineas evanescere tradit. *Ægyptio* eum mari vendicat Festus, sed & in Adriatico nascitur. Pelagius nescit an, saxatilis vel littoralis inter Ovidium, *Ælium*, *Oppianum*, & *Aristotelem* non convenit. Ita littore gaudere dicerem, ut & cautes sæpè frequentet, quod radiis solaribus ibidem commodius fruatur. Sæpè quidem *cæno* à Mullo excitato contentus est, sed & carnivorum esse certum, quia *Lycostomo* pisce inescatur. *Gregalem* *Ælianus* facere videtur: dum confertos capiscribit. Ad motum ut ut benè *ωρῆς*

Oppiano dicatur, in evitandis tamen piscatoriis insidiis *λινοπληγίσαι* est, seu quòd lineam ad scopulos terat, quod apud *Plinium* legimus: seu quod vel retibus proximus spei piscatorum illudat, *λιπὸν* sanè & pro voti, & pro linea cui hamus affixus est, sumitur. Plures sibi adsciscunt uxores, pro his tempore verno pugnant. Vere & autumnò *parere*, apud *Aristotelem* legimus, si quid aliter ab eodem dicitur, de Sargino non Sargo fumendum est. Tam vehementer capras amare *Ælianus* prodidit, ut ad illarum in aqua umbram, odore fortè illecti, adnarent, & saltu contingere conentur. Ne itaque mirere pellibus earum capi.

Fit eorum ab *Epicharmo* in nuptiis *Hebes* mentio. Et sanè grati esse stomacho creduntur, pro bique succi. Cæterum ægriusculè, quia durioris carnis, concoquuntur. *Hydropicis* *Garyopontus* præscribit. *Dentes* gestatos dentium avertere dolores. *Kiranides* fabulatus est.

Adiungit *Aldrovandus* Sargo *piscem, quem pro Melanderino*, *Athenæo* nomi-

Ælian. H.
A. l. i. c. 23.
Aristot. H.
A. l. 8. c. 17.

Oppian.
Halieut. l. i.
v. 132. l. 4.
v. 267.
Plin. H. N.
l. 9. c. 59.

Aristot. H.
A. l. 5. c. 9.
Ælian. H.
A. l. 11. c. 11.

nominato, si exemplar mendosum non est, (Causabonus Melanderini nomen ab aliis exemplaribus exulare scribit.) Rondeletius depinxit. Melanuro iste similis est. Toto corpore nigrescit, circa caput ex nigro purpurascit. Cauda saxatilium more in unam latam pinnam definit. Hepar habet ex rubro candidum. Splenem nigrum, felaqueum, lapides in capite.

ARTICVLVS X.

De Sparo.

TAB.
XVIII.
II.

Quem Græci ἀσπρον ὀπὸ ῥ σπάρειν, quod est palpitare, ut Eusthatus author est, Latini Sparum, seu à spargendo, seu aliunde vocant: hunc eundem cum Rhyade Aristotelis, & Æliani Aspargo, sed perperam, Rondeletius facit. Nec enim vel ῥ σπάρειν speciale alicuius piscis nomen est, quod Salvianus opinatur; nec videtur isto vocabulo in singulari uti. *ῥ σπάρειν* verò, quos Aristoteles, fugere quoties vel piscium lotura vel navis sentina eiecta est, quasi fœdo tactos odore scribit, & quos Gaza modo *flutas*, modo *Spargos*, aliquando *fusaneos*, id est, *χύτας*, quod fusim retibus capiantur, vocat: ii sunt, qui frequentes quidem & simul natant, fusimque & retibus capiuntur; ducem tamen, quod ἀγέλας proprium, non habent.

Ælian. H. A. l. 9. c. 46 De Aspargo nihil apud Ælianum invenies. Gyllius duntaxat Rhyades Aspargos interpretatus est, & multis errandi occasionem præbuit. Haud parvam cum Aurata & Sargus habet similitudinem. Ab illa, corpore minore & magis rotundo, rostro acutiore, & quod circa branchias nullam neque purpuream, neque nigram maculam gerat, distinguitur. Ab hoc verò, quod ex auro refulgeat, lituram in cauda habeat, capite sit magis protenso, tres *aculeos* sub spina quæ est ano vicina ostendet, lienem rubrum, gracilem, oblongum, rectum, in dextro latere habeat, differt.

Littoralem Oppianus facit, Plinius inter marinos recensuit. Ovidius pelagium voluit, sed & marinis stagnis gaudet, inque iis frequenter capitur. Gregalis est, *carnivorus*, venatur & marinos pulices. Æstate circa saxosa littora parit. Haud olim ignobilis in cibo. Coquus apud Antippum inter lautissimos recenset. Epicharmus inter eos ponit, quorum ne stercorea quidem fas sit Diis abjicere. Diphilus acrem esse ἀπαλίστατον ἄβρωμον, εὐστέρμαχον, pronunciat, elixum coctu facilem, τὰ ζῆνιστον. difficilem addit. Raro ob parvitatem elixatur.

ARTICVLVS XI.

De Mormyro & Cantharo.

DE Mormyro, qui Oppiano μορμύρο, Ovidio *Mormyr*, Gazæ *Mormur*, pauca prodidere veteres: Quem Bellonius describit, Constantinopoli & alibi, nomine veluti per manus tradito, Mormyrus dicitur, videturque notas ab antiquis traditas. (αἰολον seu maculosum Oppianus, *pictum* Ovidius nominat) sibi vendicare. Piscis est corpore quam Aurata, Sparus, Sargus, & Melanurus longiore, & minus ad latera compresso. Capite item (utor verbis Aldrovandi) tenuiore & cæato, rostroque acutiore. Os mediocrehabet, dentes exiguos, labia crassa, oculosque medios, brachias utrinque quaternas &c.

Littoralem esse, præter Archestrati apud Athenæum & Oppiani auctoritatem, Cottidiana piscatorum experientia testatur. Nullum non cibum attingit, parva animalcula, conchulas, & minora crustacea venatur; nec à terrestribus sordibus abstinet. Parit æstate, capitur verriculis, & plagulis, ut Plutarchus ait. Retibus inclusus, imis in vadis, fulco, crebro caudæ motu (depulsis arenis facto, subterlabitur. Τροφιμώτατον Hiccius facit, quia lutum olet, vilis nostro tempore habetur.

CAN-

TAB.
XIX. 5

CANTHARUS Græcis antiquis *κάνθαρος*, & genere fœminino *κάνθαρις*, modernis *στάρταρις*, *Gazæ Scarabæus*, Plinio & Ouidio *Cantharus*, forte à coloris bætici & ferruginei similitudine, dicitur. Squammis integitur parvis, ex indico splendentibus. Caput & circa oculos partes ex nigro rubescunt. Labrum superius veluti in calva infarcitur. A branchiis ad caudam lineæ ducuntur subaureæ. Bellonius lineam armatam utrinque in lateribus, cyaneam esse tradit. Observati sunt lineis albicantibus, cyaneis, ex luteo nigricantibus, rectis quidem, sed non ita conspicuis variegati. Internis partibus non differt à Sparo, & lapides habet in cerebro. *Versatur* in cœnosis littoribus ac prubus, in quæ loca maris fordes fluctibus pelluntur. *Pamphagus* esse creditur. Nam carnes, panis, caseus, aqua & stercus in cibum ipsi cedunt. Turgent amore fœminarum, & quia Zelotypi acerrimè pro suis conjugibus pugnant, sed non aliter, quam Menelaus cum Paride, pro una tantum, quod ab Oppiano & Eliano proditum est. Inescantur Polypo, aut Carabo in nasam vimineam indito. Ingratum succo Ovidius dixit. Mollis & præhumidæ carnis fecit Rondeletius.

ARTICVLVS XII.

*De Salpa & Stromatheo.*TAB.
XIX.
76..

SALPA Græcis *σάλπη* & *σάλλη*, Hefyschio & Phavorino quoque *βῆς βοσ* vocatur, quod nomen ipsi ab Halisonorum (maritimi sunt populi Cariæ vicini) piscatoribus inditum est, si bene Pancratis versus apud Athenæum, correxit Gesnerus. Posset & *Chrysopleuros* ab aureo, quo per latera Salpa resplendet colore, dici. A ceruice in caudam per argentea latera, aureis rubentibusque lineis, certis intervallis distinctis, decentissimè pingitur: Unde Aristoteli apud Athenæum *πολύρριβοι*, *πολύγραμμοι* & *ερυδρόγραμμοι*, Oppiano *αἰολόνοισι*, hoc est, ut Lippius reddit, variis distincta tergora signis, dicuntur. Caput habet parvum & rotundum, dentes in superiore

maxilla sedecim, in inferiore octodecim serratos firmos. Oculos aureos supercilia quodammodo virentes, pinnam in tergo unicam longam, multis spinis asperam. Caudam bifurcam, linguam mediocrem. Squammis tegitur latis & varii coloris. Ventre & lateribus candicat, dorso ex cinereo nigricat. Interanea nigerrimo peritonæo continentur. *Hepar* est magnum, subrubrum, in tres lobos divisum, cui felle vesica appendet. Splen nigricat. Vulva bifida est, ovis innumeris plena. Bellonius rarò duas libras excedere scribit. In nullo piscium genere exactiorem servari magnitudinem Salvianus, ideo forte à Pancrate *ισομνηνέες*, æquales magnitudine longitudineve, quamvis Dalechampsius facta ad pisces, quos nominaverat comparatione, id fieri credat. *Duo ipsorum* videntur genera, commune unum & omnibus notum quod descripsimus. *Minus alterum* quod in Narbonensi Gallia *Virgadelle*, id est virgis seu lineis distinctum nominatur, quodque in stagnis marinis reperiri, & non nisi ætate à communi differre ex Rondeletio habemus. *Lorum* si attendamus, herbosa laxantur arena apud Ovidium. Oppianus *Πέτρας ἀμφιάλως φύκει μεδαλίας*, *scopulos* Oppian. *mari cinctos, musco humidos*, illis adscribit. Arist. in mari & stagnis marinis locat. *Cibus* ipsi alga marina, porrum, ut apud Philosophum extat, stercus & alia fœtida. Unde *σκάππαρον*, & *βδελυχὴν* merdivoram, & fœtidam in nuptiis Hebes Epicharmus, obscenum piscem Plinius nominat. Semel anno & quidem autumnopaulo ante æquinoctium parit, quibusdam in locis & ætate, si Aristoteli habenda fides est. Turmatim ab imo gurgite ad littora ferri, moxq; alga, aliisq; marinis herbis pastos, celerrimè in mare demergi, tradit Bellonius, rarò unâ, plerumque plures simul capi Salvianus. Cucurbitâ capitur, quod ea delectetur nimium, idque uni ei ex omnibus venire Aristoteles docuit. *Auditum* valere apud eundem legimus. Nul- lum ferè inter cibos habet pretium. Arcestrato semper mala, Diphilodura & insuavis est. Platinæ syl-

K velbre

vestre quid & ferinum resipit: circa Ebusam tamen capta haud spernitur. Alexandrina pariter maxime si in Autumno nata fuerit, humidum quid & album, idque non virosum emittit, ut Diphilus refert, sed & circa Mytilenem tempore messis capta haud ingrata est. Omnium tamen dura caro est, ut Plinius percoqui posseneget, nisi ferula prius verberetur.

Plin. H. N.
L. 9. c. 19.

TAB.
XVI.
Athen.
Dipnos.
l. 7.

Huc STROMATEUS pertinet, piscis in rubro mari teste Athenæo nascens, Salpæ similis, & universo corpore, aureis lineis productis distinctis, unde nomen invenit. Rondeletius pro eo subsequenter piscem pinxit, sed non descripsit.

ARTICVLVS XIII.

De Fiatola Romæ dicta.

TAB.
XIX.

8. Piscem qui *Fiatola* Romæ dicitur, quidam veterum Callionymum, alii *Ellopon*, nonnulli *Lycon*, Bellonius καλιδον esse opinatur. Aurei est & argentei coloris, multisque lituris variegatur. Latus item est ac planus, ut Bellonius scribit, rotundum ferè & compressum, Seferino non valde ab similem, Rondeletius facit. *Lingua* habet carnosam Delphini modo, ad humanam accedentem, suisque partibus omninò absolutam, quod inter cæteros branchiis præditos solus habere videtur. Vendicat & hoc sibi peculiare, quod *pinnis* sub ventre careat, sitque omninò inermis. Gerit quoque branchias utrinque quatuor superiorem maxillam immobilem, Caudam, lunatam, lineam à capite sub ventre ad umbilicum extensam, atque utrinque in cervice maculam nigram, Squammis in eo duntaxat lineæ ductu, qui piscis latera distinguit. Hepar ipsi unius lobi nullo felle præditum. *Stomachus* in litteram V. efformatus, cuius infima pars, in mucronem terminatur, & ad pylorum tam numerosas *appendices*, ut nulla arte numerari possint, habet. Intestina fulcit glandulosum pancreas. Lien stomacho subest. Benè in hunc pi-

cem καλιδον Bellonius vocet, non disputo, hoc tantum addo, Cetaceis hunc ab Oppiano annumerari, dentes feratos habere & gregatim degere, quod fortè *Fiatolæ* non competit. Adjicio tamen Bellonij in iconè Callychtin, quem Gesnerus pro Hepate primo habebat. Quod reliquum est, frequens est Romæ *Fiatola*, alibi rarus & incognitus. Rondeletius suis littoribus nunquam visum asserit. Fertur ex pulmone marino nasci, & optimi saporis esse.

ARTICVLVS XIV.

De Scorpio & Scorpide.

Scorpius piscis, qui Plinio aliquando *Scorpio*, ab insecto nomen traxit, non quod vel corporis figura id, vel colore æmuletur; sed quod, ut aculeo Scorpius terrestris, quem habet in cauda, ita hic spinis quibus in tergore & capite armatus est, venenum vulnerando infligat. Putatur à Scorpide sexu duntaxat differre, ut hic sit femina, ille mas: sed videntur specie distingui, & Scorpiis cum Scorpionæ pro uno pisce habebuntur. Tribus quandoque datur; in mari rubro ad duorum & trium cubitorum magnitudinem excrecere, *Ælian.* nus: ad tantum & apud Ineos Tzetzescus scribit. Corpus habet rotundum, anteriore parte crassissimum, posteriore teniæ. Squammas tam exiles & tenues, ut nisi advertas, iis carere videatur. Solo ventre albicat, cætera rubet, unde Plinio rufus, Numenio ζευγος, Hicesio πυρρος, Diphilo κερρος nominatur, quia nigras quasdam propius notas habet, benè Epicharmus πικρίλον dixit. Caput ipsi magnum, angulosum, durum, osseum, plurimis acutissimis aculeis munitum. Os magnum, dentes confusos, densos, in inferiore maxilla triangulares, superciliorum loco aculeus acutissimus Cuculi instar, cum appendice cutacea molli, branchiæ utrinque quaternæ, osseo aculeatoque exprimento contritæ: juxta eas binæ latæ pinnae, rotidemque ex harum regione in ventre sed minores, in dor-

TAB.
XVIII.
12.
TAB.
XIX.
9. 10.
TAB.
IV. 7.

Ælian.
H. A. l. 17.
c. 6.
Tzet. l. 7.
v. 144.



so uni-

Sargus.


Gelb Braßma. Tab. XIX.

Aurata.


Gold Braßma.




Mormyrus. 3. Marmel Braßma.




Julia. Salu. 4. Doncella.




Cantharus. 5. Braun Meer Braßma.




Salpa. 6. Goldstein.



Scorpius Major. 9. Meer scorp.




Scorpius 10. Minor.




Fratola. Meer Teppich.

Blenius. Meer Gropy.




Stromateus. Teppicher.



Aphia Rhalarica. Schnelbling. 12.




Aphua Cobiter. Cepola. 15. Meer Gropy.




Meer Seilen. Meer Grundel. 16.




Hephetus. Meer Bimbele.




Membras. 14. Kleiner Hering.



Eneraficholus. Meer Gall.



Atherina. Kleiner Hering.



13. Apua Vera.



Spirling.



so unica à cervice ad caudam usque excurrent, anteriore sui parte undecim vel duodecim firmis aculeis horrida, cætera obtusa & innoxia. Cauda unica ac lata pinna constat. Duo ipsius genera posuere veteres, *λεγωνόδης*

Athen. Dipnos. l. 7. nempe, & *pelagium*, ut apud Athenæum legitur; sed videtur idem utrinque esse. Alii fortè duntaxat sunt littorales, & nigri; alii rufi, & in altum quoque se efferunt. Inter littorales ergo ne sit, an pelagios ambigitur, cum & Mnesitheus apud Athenæum saxatiles esse testetur. *Carnivorus* est & Aphyis, Spatulis, Gobionibus, Cancris imprimis vescitur, nec algam spernit. *Fætiscat* in alto mariteste Aristotele; bis, eodem aut

Athen. H. A. l. 8. thore, *parit*, vere & autumnò, secundum Oppianum *ἀντιπρόκειν φέρε βέλῳ*, *ἀδινεωσι quaternis sustinet telum partus doloribus*. Ictum eius venenatum pestiferumque apud Dioscoridem

Aristot. H. A. l. 5. c. 9. *Plin. H. A. l. 9. c. 51.* *Oppian. Halieut. l. 1. v. 590.* & Avicennam legimus. Gravissimos infert dolores, quandoque & inflationem ventris accersit. Mullum dissectum & impositum remedio esse Aetius & Paulus tradidere. Rondeletius cum ipsius Scorpionis hepate, & lentisco contuso, ad vulneris ambitum applicato, expertus est. *Vsum & in cibis* & in Medicina invenit. Hicetius apud Athenæum abstergere, excoctum facilem, multi succi, plurimi nutrimenti, quod *χονδρώδης*, id est, carnis solidæ, firmæ, callosæ, ac velut cartilagineæ (malè inter *σελάχη* & *χονδρῶκαυθα* referres) sit, facit. Commendatur, qui hyeme, locis saxosis, & puro mari captus est. Duritiem diuturna mortui asservatio emendat. Calore naturali evanescente, externo colliquante humidior efficitur. Archestratus in Tháso non longiorem pygone (viginti digitorum mensura est) emendum censet. *Medicinam* si spectes, jus alvum

Plin. H. N. l. 32. c. 9. *Hippocrat. de morb. mulier. 1.* apud Plinium & Dioscoridem emollit. *Fel* ad menses vel secundas tam exceptū ab Hippocrate usurpatum. Plinio verrucas tollit, & unguis scabritiem emendat. Marcello à nebula & caligine liberat. Lapis, qui in capite è stranguriōsis utiliter bibitur.

SCORPIDEM & SCORPÆNAM pro eodem pisce Aldrovandus sumit. Specie à Scorpio, ut supra dictum, quod colore & succo differant, ut Athenæus ait, distinguit. *Scorpidium* Psellus vocare videtur. Cinericia est Bellonio, & multo Scorpio minor, de cætero (tam etiam vivax, ut exenterato & corde carens moveri non desinat) Scorpio in omnibus ferè similis. *Vescitur* algæ & sordibus marinis. Castitatem immaculatam generis suo servat, itaque habet pudicitiam sui generis, sed venenum sui generis non habet. Non enim percutit Scorpæna sed reficit. Apud Athenæum Scorpio in cibo posthabetur.

Ambros. Hexam. l. 5. c. 2.

ARTICVLVS XV.

De Blenno & Pectine Romanorum.

BLennus Oppiano *βλέννῳ* contra *Βαῖν* à *βέλεν*, Athenæo fortè *βαίων*, quod præ corporis crassitie brevis (*βαῖος* idem quod minutus) Sophroni *καὶ ὅ* potius qui idem cum Gobio, quam *καὶ δι* specie similis, dicitur. Corcyrenses & Zacynthii *Cepolam* à Cepæ similitudine propter turgidū ventrē appellant, exinde *Bulbum* Plinii esse Bellonius coniicit. Rarò Gobium magnitudine superat. Colore est vario. Licet totus ferè liveat, plærisque tamen locis rubet, quibusdam etiam flavescit. Squammis paucis, tenuibus, & tam facilè deciduis regitur, ut tum ad hoc, tum quod ob plurimum mucum, quo oblitur, adeò lubricus sit, ut vix manibus adstringatur. Caput habet magnum, oculos eminentes, nigros.

Labrum superius capiti ceu tubum quendam infixum. Dentes serratos, sed adeò exiguos, ut os asperum potius, quàm denticulatum appareat. *Linguam* albam conspicuam. In latiore pinnæ tergoris parte, macula nigra, albicante circumdata circulo, parvi argentei numismatis magnitudine, oculorum in cauda pavonis figura conspicitur. Reliqua in icone

TAB.
XIX.
II.
TAB.
XXXI.
3.

Oppian.
Halieut.

l. i. v. 109.

visuntur. In algoso littore *versatur*. Romæ rarus, in Græcia frequentior. Non longè à loco, quo degit evagari solet. *Vescitur* apuis, squillis, similibusque pisciculis, horum inopia ipsas depopulatur herbas. Gulosus est; sed & stultus Plauto, nisi Blennium ibi melius pro mucoso & pædido sumferis. Carnis est mollis glutinosæ & excrementiæ. Cinis cum ruta vesicæ vitia & calculos sanat.

TAB.

XXVII.

1.

Plin. H. N.

l. 32. c. 9.

Plin. H. N.

l. 32. c. 2.

Quem PECTINEM Romæ vocant, hunc *Novaculam* Plinii Rondeletius esse suspicatur, quâ tacta ferrum olent, quod dorso sit cultellato; Gesserus *Parvonis* nomine sibi transmissum Româ scribit. Piscis est latus, & Fabri instar compressus. Tegitur magnis squammis, & variis pingitur coloribus. Caput maxillæ & branchiarum opercula plurimis cæruleis lineis insigniuntur; Synciput coloris est punicei saturati, latera albicant. Imis ventris & caudæ pinnæ subflavis & virentibus lineis inter se cancellatim commissis decenter admodum depicta sunt. Pinna dorsi rubra nonnullis cæruleis conspergitur maculis, dorsum ipsum est puniceum, cætera ex albo flavescit. Palmi mensurâ excedere nō solet. Capite est magno, valdè cōpresso, & prorsus omni rostro carente. Linea nāq; anteriore capitis totiusque corporis partem terminans, longa sit & recta, atque fere ad perpendicularum, è summo capitis vertice ad inferiorem usque maxillam defertur; in cuius inferioris atque ferè perpendicularis partis loco inferiore, os positum est parvum, dentibus acutissimis, recurvis, exiguis munitum. Branchias utrinque habet quaternas. Ventriculum mediocrem. *Intestina* valdè pingua, multis gyris circumacta: hepar pallidum, cui vesicula fellis annectitur. In saxosis & arenosis littoribus degit. Rarus in Italia, in Rhodo, Siculo, & Hispano mari frequentior. Solus vagatur; & quia parvo est ore, loligunculis, sepiolis, & Apuis duntaxat vescitur. *Carne* aiunt esse tenera, friabili, boni succi, & concoctu facili. Nullis ferè aliis spinis quam iis, quæ dorsi

spinam constituunt, interciditur, planorum more.

ARTICVLVS XVI.

De Aphyis seu Apuis in genere.

APua, siue pro parvo piscitio, siue pro peculiari aliqua specie tantum accipiat, *ἀφύη* potius quam *ἀφύα*, ut Suidas & Aristophanis *Ischo-* TAB. liastes pronunciant, dicitur, Atticos XIX. in plurali, in singulari rarissimè pro- 12. 13. tulisse; quod cumulatim edi soleant, Eustathius auctor est; nec aliam ob causam *ἀφύδα* vocavit Aristophanes. An vel *ὡς ἀν' ἀφύεις ἔσται* quasi non natæ, quod Rondeletio & Aldrovando placet; vel quasi *δυσφύεις*, bis natæ, quod malignè & nimis pusillo corpore nascantur; vel *ὥς τῷ ἔνι*, quod ex pluvia generentur, quod Plinius videtur velle, unde Gaza *Apluas* Latine reddidit; vel quasi *ἀφρόνη*, id est spuma, ex qua ab imbre excitato oriuntur, dicantur; non disputo: nec an *ἰψετις*, cum Apuis quas *Cobites* veteres nominant, specie iidem sint, inquirō: hoc certum *λιπαρὸν* à pinguedine Varino; *γόνιον θαλάσσιον*, quod cum semper sint exigui, semper fœtus recens esse existimari possint, ab Athenæo dici: nec fortè à vero aberrant, qui *ἐγγεγάυλεις* Oppiano vocari, credidere. *Plura ipsarum* à veteribus recentur genera, quorum ferè nomina sunt, *Apua vera*, *Apua Gobitis*, *Engraulis*, seu *Encrasicholus*, *Apua Phalerica*, *Apua Mugilum*, *Mœnidum*, *Mullonum*, item *Hepsetus*, *Atherine*, & *Membras*. Commune omnibus, candido colore esse. Caput majusculum & oculos elatos & nigros habere. Archippus apud Athenæum *σεργγύλας* vocat; veteres, quosdam ex femine, alios sponte nasci prodiderunt. In scopulis, quorum sinus multiplices unda excavavit, ad littora *versantur*, tamque densis natant agminibus, ut tam *γλαυκὴ* Oppian. *λευκάδεν ἀμφιπέριτη* cæruleum mare al- Hal. l. i. v. 290. bum reddi videatur, ita aliquando se Oppian. implicant, ut earū compactarum oc- Hal. l. i. 4. v. curso, 470.

curfu, vel navis retardetur, ut de aliis quæ Oppianus ponit taceam. Quantum ad *Generationem*, spontè sine coitu ex imbris spumefcente marinasci; alias èlimo putrescente scilicet & ipso, vel quicquid in fundo collectitum est oriri, prodidit Oppianus. Nec aliter Aristoteles, illud si excipias, quod quandam è piscibus oriri addit. Nam apud eum quod apud spumam vocant, prodire legimus. Argumentum ortus, quod frigidis temporibus non capiuntur; & traheis sculptrahumo, sæpenuero & copiosiores & præstantiores sint prædæ. Oriuntur autem opacis tepidisque locis, όταν ἐν νημείας γενόμενης ἀναβραδύνεται ἡ γῆ, cum calis clementia terra concalescit, veluti in Atheniensis agri Salamine, ad Themistocleum, & in Marathone. Ejusmodi omnes sunt, ut neque gradescant, neque generent, neque diu durare queant, priore turbâ abolitâ altera succrescit. In nullo apud Athenienses patinarum honore erant, si Chrysippo apud Athenæum credimus, fortè ob copiam. Archestratus μίνθας seu oleti instar aspernabatur. In mediterraneis expetebantur, inde pinguium Athenis nomen. Nicomedes eorum desiderio flagrans, cum haberi non possent, figuris ex rapis fœminis ad earundem speciem ab Apitio dissectis, ex oleo coctis, & sale atque papavere conditis, ventrem explevit, referente Suida. Apparatum apud Aldrovandum vide. De cætero humidum & flatulentum alimentum præbent. Diphilus gravis & difficilis coctionis esse putabat.

ARTICULUS XVII.

*De Apuis in specie, & in primis Vera, Phalerica, Membrade, Cobite, & Hep-
teto.*

TAB.
XIX.
12. 13. 14.
15. 16.

Genera Apuarum præterito recensuimus articulo.

prima est APUA VERA, cui, quæ generatim de Apuis dicta sunt in primis conveniunt, quam Græci propriè ἀφρον, Athenæus ἀφελιν, aliqui ἀφρύνην à spuma nuncupant. Suidæ ἀφρύν ἢ ἀφρυνή, quasi nullis orta parentibus dicitur. Pisciculus est vix auricularis digiti longitudinem adæquans, oculis nigricantibus. Duo eius genera. *Album* in Hollandia frequentius; & rubicundum, *Aphyia Triglitis* Bellonio.

*Alter*a est *APHYA PHALERICA*, vel ab Atticæ portu qui Phalereus appellabatur; vel ἀπὸ τῶν φαληρέων (alba hæc est & spumea Græcis) ita dicta. Sardinis est similis, minor, tenuior. Squammas in mari habet, sed statim excidunt remanentibus earum vestigiis, & iis quæ ventrem firmant. Adeo est mollis & pinguis, ut si aliquando digitis tractetur, liquefiat; aut si magna copia in navicula vehatur, supernatans oleum piscatores colligant. Vidit Rondeletius unius diei capturam, quinquaginta coronatis aureis venditam. Erat apud vetetes in precio si Polluci credendum.

Tertia est MEMBRAS. Has Phrynichus apud Athenæum βεβραδίας, Epicharmus & Sophron βεβραδίας, Attici μεμβραδίας, Trallianus μεμβείδας appellasse videtur. Aristoteles ex *Aphyia Phalerica* nasci author est; & inter μνήμις pisces, id est haud migrare solidos recenset. Cum verò Phrynichus χρυσοκεφάλως cognominer, ac Aristophanes πολλόγρωλας, id est, cano corpore, Rondeletius eos pisciculos esse conjicit, qui Gallis *Celerias* vocantur. Sunt corpore admodum candido, capite auri colorem æmulante, Sardinis valdè similes. Coquantur ex præcepto Dorionis, mutilato capite, si corpulentiores fuerint, & lotæ sale minuto & aqua. Contemptos fuisse Antiphanes ostendit.

Quarta est APHYA COBITES, καβίτης Græcis, Theodoro Gobionaria. Putatur ab ignobili quodam & terram subiente Gobio procreari. Rondeletio est ille quæ Galli *Logis de-mer*, ad differentiâ fluviatilis vocant.

Nunquam ad Gobionum magnitudinem accedit, alioqui marinis Gobionibus simillimus. Corpore est rotundo, pellucido, dorso latiusculo, colore candido, nigris aliquot maculis asper, so caudâ variâ, oculis quodâmodo supra caput positis. Pinnæ eadem illi, quæ Gobionibus, maximè illa, quæ his peculiaris, barbæ instar ex ea ventris parte, in qua binæ sunt in aliis piscibus, propendens. *Hepar* est lactei coloris, & in eo felle vesica, splen, rubet, *intestina* & peritonæum ex albo nigricant. *Cor* ex albo rufescit. Gravis est, & difficilis concoctu.

De *Encrasicholo* sequenti capite agemus. De *Aphyis* *Mugulum* inter istos agetur.

Apua **MULLORUM** exiguos admodum *Mullos* arbitratur *Rondeletius*, qui in stagnis marinis ex putredine nascuntur.

Aphyas **MÆNIDUM** verò pisculos *Mænidium* specie sine mare & femina sponte nascentes esse iudicæ, etsi contra sentiat *Aristoteles*.

HEPHETI seu *Hepseti* nomen, ad multos parvos pisculos extenditur; peculiarem aliquam speciem esse, exinde, quod apud Athenæum pro parvo pisciculo *Aphyarum* generis ponatur. *Rondeletius* à *Gallis* *Iouil* appellari credit. Est digiti magnitudine, argentei coloris, corpore pellucido, dempta ea virgâ, quæ à branchiis ad caudam extenditur. Oculos habet depresso, pro parvitate corporis magnos. Os ita scissum, ut inferior maxilla superiori sit prætenfa, sitque velut oris operculum.

ARTICULUS XVIII.

De *Encrasicholo* & *Atherina*.

ENCRASICHOLUS, Græcis ἐγκρασίχολος, quod *χολήν ἐν τῷ κεφαλεῖ ἔχει* πεφασθῆ, seu *bilis folliculum* in capite gerat, hoc est, quod eius caput impensè amarum sit, unde eo mutilari assolet, dictus; aliis *λυκόσμο*, quod dum oscitat, amplum os aperiat, ut serpentis potius quàm piscis videatur; *Plinio*, multorum eruditorum iudicio *Lupus*

nuncupatur. An *Chalcedoniis* *ἰεῖν* *μ* dicatur, quod *Callimachus* apud Athenæum prodidit, *ἰγγεῖν* *λ* *εῖν* quoque *Ælianus* vocat. Magnitudine est plerumque digiti, palmi longitudinem nunquam assequitur. Argenteo colore micat, tergore ad ceruleum accedit, si soli opponatur transparet, dempta argenteâ lineâ, quæ spinæ vertebrae comitatur, quæ sanguinem continet. *Squamis* carere falsum, vel in sale adservatis argenteæ micant. Rostrum habet acutum; os amplum, utramque maxillam feræ modo asperam, branchias parvas duplices. *Cor* oblongum & acutum, *hepar* rubrum, maculis rotundis conspersum. *Ventriculi* appendices multas & nigras. Ventrem molliissimum, ideoque plerumque absumptus in salitis conspicitur. *Ovis* scater rubentibus. Spinis caret, eâ exceptâ, quæ in dorso est, & ipsa tenuis, adeo ut vix dentibus negocium faceffat. *Arenâ*, spurcitiis, atque cæno vescuntur. Capiuntur hyemæ à Decembri ad quadragesimam usque, in Provincia numerosissimè, noctu ingne è naviculis accenso. Quam confertis turmis densi, metu insidiarum natent, de *Aphyis* in genere dictum est. Hanc tam confertam *Lycostomorum* natationem, *βόλον* à peritis nominari, *Ælianus* tradidit. De *Ortu* dissentiant *Authores*. *Suidas* & *Athenæus* ex *Apua* *Cobite*; *Aristoteles* ex *Phalerica* oriri tradit. Satius est sui generis piscem statuere, quàm vel species in infinitum multiplicare; vel ex *Apua* *Phalerica* duos diversos pisces generari, concedere. Nam & ex hac *Membradæ* oriri *Philosophus* author est. In magno plerisque in locis habentur precio. Comeduntur & crudi & sale asservati. Minutatim concidunt, capam pariter tritam addunt, sic ex oleo & aceto asperso pipere sumuntur, saliantur truncato capite, & fel aufertur simul. De *Garo* quod ex iis, vide *Rondeletium*. Huc referunt nonnulli *λυκόσμο*, cuius effigiem exhibet **TAB. XLVII.**

Ælian.
H.A.L. 8.
c. 18.

ATHE-

TAB.
XVII.

15.

TAB.
XIX.

17. 18.

Plin. H. N.

l. 31. c. 8.

ATHERINAM, Græci ἀθερίνην, & per pleonasmum literæ ῥΑΘερίνην, seu & transverso, quem alterum Atherinæ genus in ventre habet aculeo, quod Gillio placet; seu ab aristis (ἀνθερίξ idem est quod ἀθήνη, id est, arista, pars spicæ acuta, seu ut Erotianus explicat, tenuissimum illud, quod in hordeo acuminatum est) per metaphoram pro spina sumpta, quas multas & Sardinis duriores Atherinæ habent, quod Rondeletius voluit, dicunt. Posset & ab ἀθερίξεν, quod pro καταφρονεῖν, floccipendere & contemnere deduci, quod nimirum ἀθερίξ ἐστὶ πῶς καὶ αὐτὴ ἄλλο τὸ ἐντελὲς ob vilitatem negligatur. Gaza *Aristam* & *Aristulam* vertit. Callimacho, in nomenclaturis diversarum gentium ἰκτίες & ἰκτῆς, sine dubio à parvitate, (ἰκτῆς Adverbium Græcis sonat propè) vocatur, Romanis Laterina. Quid per suum Acerinam Plinius Medicus intelligat, difficile est dicere. Bellonius recentiorum Cernuum esse credit; ego mendum esse, & Atherinam legi debere iudico. *Descriptionem* si attendas, ita de eo Rondeletius. Pisciculus est marinus, litoralis: reperitur & in marinis stagnis, Aphyis similis, dodrantali magnitudine, parvi digiti crassitudine, dorso spisso, ventre leviter depresso, ore parvo sine dentibus, oculis magnis. *Colore* est vario: nam venter argenteus est, dorsum fuscum, circa caput, ex flavo rubescit Sardinarum modo. Locus qui inter oculos est, cælatus videtur. *Pinnas* habet quatuor, duas ad branchias, duas in ventre, aliam à podice, præter has, alias duas in dorso. Omnes candidæ sunt. Cauda duabus pinnis constat. (contra ostendit apposita icon) Pro linea medio corpore à branchiis ad caudam protensa, spissum quid habet sub cute, q̄ non possum aliter quam fasciam per similitudinem vocare, quæ cum cocta Atherina editur, evidendissima est, & cum lumini obiiditur; quia reliquo corpore pellucida est, hac parte opaca. An Aphyæ Meletæ mas sit, quod piscatores credunt, dubito, tum quod illæ sine

mare & fœmina nascantur, hæ distinguantur sexu: tum quod molissimo & depresso corpore sint illæ; istæ solidius & spissius habeant. Bellonius suum, quem vulgus Cræcum, Romani Latharinum, Massilienses Sencle vocant, ita describit. Pisciculus est digiti crassitudinem excedens, neque extenso digito longior: Argentei coloris, translucente corpore, & quod soli objectum, ut vitrum transpareat, lineamque ostendit internè obscuram, rectam, à capite ad caudam, à sanguine, qui in spina profunditur, proveniente. *Oculis* est grandibus, lingua candida. Pinnam utrimque in lateribus & geminam alteram habet sub ventre, quæ piscem in partes æquales secat: ac præterea tenuem aliam, & parvam fert in medio tergo pinulam. Cæterum *Cor* gerit, ut semen oxalidis triquetrum & oblongum, pericardio perbellè inclusum: branchias utrimque quatuor: *Costas*, item utrimque decem omni capillamento teneriores: vertebrae adeo exiles, ut vix ab acie oculi perspicacissima discernantur.

Pascuntur in algofo litoro, ἀνὰ πᾶσι *Oppian.* ἐχέουσιν ἐπὶ χλορείαις βοτάνησι, ut *Op-Hal. l. 1.* *piani* verbis utar. Quam Rondeletius descripsit, non tantum in vicino Monspelio mari, ubi Melet dicitur, sed & Massiliæ, & in stagno quod Martegne vocatur, frequentissimè capitur, & nomen Sancelez obtinuit. Aristoteles gregales facit, eodemque teste inter Rhyades circa æquinoctium vernum *Aristor. H. A. l. 6.* αἰῶς c. 17. τῇ γῇ juxta terram, alvum arenæ atterentes pariunt. Vilem in cibo Phavorinus fecit, & contemptum; delicatissimum suum Rondeletius, nisi spinæ negotium facessero.

Bellonius quoque quætuosissimam suarum ob suavitatem piscationem scribit.



ARTICVLVS XIX.

De Lavarono Bellonij.

Piscis, quem Romanum vulgus Lavarorum vel Lavonum, seu à beata quæ Lavarono, quod non videtur, cum marinus sit, seu aliunde, Massilienses Cabassonum, Genuenses à capitis magnitudine Capassonum, vocant, ita à Bellonio describitur. Grandiore sunt capite, quem Atherinæ, magis recurto ac compressiore ad ventrem corpore, & paulo latiore transparent, ut Atherinæ, maximamque habent cum iis affinitatem. Squamis multis integuntur, quæ detectæ argenteum colorem præ se ferre videntur. Duas intergore gerunt pinnulas, utrimque ad latera unam. Dentibus carent, ut Harengus: Cor exiguum, oblongum, triquetrum, habent: *hepar* pallidum, cui stomachus subest, pisciculis & Cardibus parvis nonnunquam refertus. *Intestina* ad anum tribus revolutionibus reflectuntur. *Fel* ob eius exiguitatem conspicuum non habent: *spinæ* quoque ferunt nullas. Carnem albissimam & levissimam. Calculos duos in capite gerunt, Sesamino minores: squamas paulo quam Atherina latiores & numerosiores. Magnam cum fluviatili Lavareto affinitatem habet.

ARTICVLVS XX.

De Sarda seu Sardina.

TAB. XX. **S**ardæ nomen, sibi nē ex Galeno colligo, omnibus pisciculis, qui ad saliendum apti sunt, competere videtur; idque inde sortitas apud veteres credo, quod ex Sardinia in alias regiones, eveherentur. A Sardinis & Sardellis magnitudine duntaxat & ætate differunt. Cum nondum adolevere, Sardinæ & Sardellæ dicuntur, adultæ Sardarum nomen capiunt.

1. 2. 3.
Galen. Facult. A. lim. l. 3. c. penult.

Plin. H. N. l. 32. c. 11.

Unde Apicius Sardam farciri solere dicit, Sardenam ob parvitatem non posse. Fateor tamen, & Pelamydi longæ apud Plinium Sardæ vocabulum impositum inveniri. Qui *Trichias* & *Trichides*, quas Dorion apud Athenæum non distinguit, Aristoteli dictas, cum nullibi tam vulgaris pisciculi tam diligens naturæ explorator meminerit, credunt easque ἀπὸ τῶν τριχῶν, quasi à capillis, seu parvis illis & capillaribus quibus abundant spinulis, à quibus etiam *deliosas* dicunt, quas recentiores *Alofas* nominant, deducunt, vix falluntur; nisi fortè hoc obster, quod idem ex Membradibus *Trichides*, ex his *Trichias* nasci dixerit. Nam quod * alibi *τριχίαις*, * *Aristot.* (Sardas Gaza vocat) quædam adscribit, quæ Sardis nulla ratione comperunt, ea *deliosas*, seu *Alofis*, cōpetunt, ut mendū subesse, & malè Gazam vertisse sit evidentissimum. *Chalcidas* quoque marinas Sardinas nuncupari, vel ex Callimacho colligitur, hæcque Columella intelligit, dum dicit, *Piscibus in piscinis præbere oportet, tabentes Haleculas, & salibus exesam Chalcidem putremque Sardinam.*

Arist. H. N. l. 6. c. 15.

* *Aristot.* H. A. l. 8. c. 13.

Invenio & à Dorione χαλκικὴν dici. *Eritimum* vocari, vix ex Epereti apud Athenæum loco χαλκίδας τὰς (legendum αἱ) καλσιχησάρας ἐλαπίδας, *λέγεται*, inquit, colligi potest. Bellonius etiam cum Chalcidibus easdem ponit; sed dum fluviatiles à Celerinis sola magnitudine differre, specie convenire putat, argumento sumpto, quod Galli qui ad Oceanum sitisunt, nullum piscem Sardinæ nomine agnoscant, præter eum, qui aliunde sale asservatus, ad eos perfertur; Celerinus verò in Gallia tam sit popularis, quàm in mari mediterraneo ipsa Sardinia, ex Aldrovandi opinione fallitur. Sunt enim Gallorum Celerini (verba sunt Aldrovandi) ab Allobrogum Celerinis diversi, illi marini sunt, & nostro & Rondeletii etiam iudicio marinis Membradibus in Aquarum genere nō Chalcidibus sive Sardinis iidem;

iidem; hilacustres, & Chalcides Aristotelis, Sardella, & Aquo Fracastorii. Anglorum Sprat, & Hollandorum Sprot, ad quos fumoficatus adferri solet, haud aliumputo quam Sardam aut Sardinam sicuti & illum quoque, quem Rondeletius scribit Agathopoli magna copia capi solere, nominariq; Calliques vel Lachez; & Massiliæ Garengades, licet ipse Membradem esse velit: ut enim Calliques ex Chalcis corruptum esse videtur, ita etiam Lachez ex Laccia; quo nomine in multis Italiæ locis Alofa appellatur, cui simillima est Sardina, & ipse quoque eum Alofa similem esse profiteretur. Harengades verò etiam dici videtur, quod & Harengo similis sit, & similiter salita per mediterranea loca venalis effertur. *Icones & Descriptiones* diversas quinque apud Aldrovandum invenies.

Prima, pisciculus est Aphyæ Phalericæ omnino similis, nisi paulo major, & spissior esset, à parva Alofa, ore, branchiis & oculis, pinna- rum numero, situ, squamis, caudâ minimè discrepans, sed in hoc tantum quod Alofa sit latior. Sardina igitur squamas magnas, tenues habet: colore est vario, nimirum capite aureo, ventre albo, dorso cum viridi cæruleo, utroque splendido, rutulanteque dum viva è mari extrahitur: una enim cum vita viridis evanescit, cæruleoque manente, eoque hebescente & splendorem suum amittente. Intestina habet parva & recta, Alofarum intestinis similia.

Altero loco picta, in qua pictor pinna- nas nullas expressit, capite est rubicundo, corpore toto subviridi, præter duas quæ in ea conspicuæ sunt, lineas, quæ sunt cæruleæ. Cauda ad castaneum in extremo vergit. Sardæ Flandricæ nomine misce est.

Tertia eodem quoque nomine, sed majoris cognomento commu-

nicata, pinna- nas habet nigras, quantum situs (dum modo pictor rectè expressit) alterius speciei piscem esse indicat. Colore est vario, viridi nimirum violaceo, paleari & ruffo. Maculæ in lateribus sunt nigræ: in pectore crocæ.

Reliquæ duæ species, dorso sunt viridi, ventre argenteo. Prior in extremitatibus ossium, quibus branchiæ reguntur, rubent. Oppianus *Oppian. Hal. l. 1.* dum scribit:

*Chalcides & Thrissa passim Abrami-
desque feruntur,*

*Et curvis habitant scopulis & littora
visunt,*

*Atque cætervatim percurrunt equo-
ris undas,*

*Alternantque imas ponti, curruntque
per aquor,*

*Hospitium mutant semper, pontoque
vagantur.*

iis qui vagabundam vitam agunt, accenset. Capiuntur Malsâ exervis frictis & myrrha vino odorato excepta, confecta; aliquando foliis betæ, quâ impensè delectantur. Adhibentur quidem *in cibis*, sed revera, ut Hicetius apud Athenæum dicit, ἀχυρώδεις καὶ ἀλοπεῖς καὶ ἀχυροί, id est squalidi, nec multum pingues sunt, nec copiosum succum in alimentum præbent. Apicius far- *Apic. l. 9.* circas docuit, Galenus ad salien- *Gal. de c. 10.* dum aptissimas dixit. *Medicum u-* *Gal. de facult. Alim. l. 3.* sum quod spectat, in prima men- sa sumptæ, alvum subducunt. Capite, in puero quodam, loco balani feliciter usus est Brasavolus. Marcellus exustas sine osse, vel salsamen- *Marcell. c. 11. 19.* tum, & confrictas, si varicibus supponatur, statim prodesse scribit. Idem Sardæ caput combustum, medicamento ad gingivarum tumorem, foetoremque admiscet. Privatum contra presteris mor- sum valet, si Plinio credimus.

§

L

ARTI-

ARTICULUS XXI.

De Mæna.

TAB.
XX. 4.Plin. H. N.
l. 31. c. 18.Columel-
la R. R.
l. 18. c. 15.
Martial.
Epigram.
l. 3. & l. 11.

Mæna, Græcis *Μαῖνις*, Theodoro Gazæ Halec est; metuo ne perperam. Alecis enim nomen, vel omnibus pisciculis qui muriâ condiuntur, quod Rondeletius docuit, competit; vel illis, qui apud Græcos Anthracides, seu Carbonarij vel prunarij pisces, quod in pruna & craticula commodè coqui possint, dicuntur, quod ex Hermolao discimus; vel ipsi piscium fœti, unde Plinius. *Laudatur & Clazomenegarum, Pompeiique & Leptis: sicut muriâ Antipolis ac Thuria: jam verò & Dalmatia. Vitium huius est Alex, imperfecta nec colata fax:* vel denique pisciculo fluviatili seu dulcium aquarum, quem Plinius, ad ostreas, echinos, urticas, cammaros & mullorum jecinora pervenisse scribit.

Columella inter parvi incrementi fluviorum animalia reponit, & piscibus maioribus præberi jubet, ut de Martiali taceam. *Descriptionem & Differentias*, quod spectat, Mænam inquit Gillius, non modo speciei, sed etiam generis nomen esse conjicio; quod varium & multiplex est earum genus. Aliæ in utroque latere nigram maculam orbiculatam habent, quas ii, qui Adriaticum sinum accolunt, vulgò Mænas sclavas appellant: aliæ leucomænidæ, hoc est, albæ Mænæ à Græcis sive Smarides nuncupatæ: itemque sunt Mænæ Boopes appellatæ. Bellonius duas observavit differentias in colore: alias enim luteo, alias lituris cyaneis aut azureis conspersas esse ait. Speusippus Mænidi similes facit Boacem & Smaridem: idem tradit Rondeletius, nec non Bellonius, nisi (inquit hic) paulo latiores & breviores cernerentur, & squamis Smaride tenuioribus conregerentur, breviorique essent capite, rarif-

sime siquidem palmum excederent; (Antiphanes quoque Mænas exiguos pisces esse dixit, & Martialis breves) lineam in lateribus rectam habere, quæ in Smaride arcuata est: pinnas tergoris, laterum, & caudæ diaphanas esse, & maculatas. Os si clausum contineat, minimūquidem apparere: sed dum hiat, rictum magnum ostendere, labrumque superbius tubi in modum, ut in Harengo infractum esse: Oculos habere rotundos, iridem subrubram: maxillæ asperitatem quandam dentium vicem præ se ferre: si desquametur albissimam argenteamque spectari: sed tergus livore quodam sub oculis in purpureum gemmante depingi.





Addit Rondeletius, utrimque magnam & rotundam maculam habere in medio corpore, quam etiam in icone expressit, Bellonius omisit, & in descriptione non meminit, nisi eam intellexerit, dum inquit, utrimque lituris notari, quod tamen non assero, quandoquidem icon mea cum Belloniana satis convenit, & eiusdem coloris lituras habet, item circum oculos. Pinnæ omnes etiam versicolores. Venter candicat. Cauda fusca est. Idem Rondeletius hyeme candidam esse scribit, vere & æstate variam: maculis cæruleis toto corpore & potissimum in capite & dorso sparsis: item lapides habere in capite, maremq; in eo fœminæ dissimilem, quod latior sit & porrectior, fœmina rotundior: cum fœtura fœmina impleri incipit, maris colorem in varietatem quandam & nigrorem mutari. Aristoteles verò hanc mutationem temporis adscribit, & de Mæna simpliciter id tradit, nec fœminæ nec maris facta mentione.

Mæna & Smaris (inquit) mutantur, ut ex albedine rursus æstate ad nigredinem redeant, idque maxime suis pinnis & branchiis declarant. Ita & Plinius: Mutant colorem candida hyeme Mæna, & fiunt æstate nigriores. Quem locum

Sarda Flandrica maior



Section Tab. XX.

1 *Sarda. Sardthum.*





Smavis. alia. ein ander Bizling.



Smavis. Meer Bajer Bizling.




peregrina. Smavis.





Boops peregrina fremder Hauteng.



Solea lingulata. Meer Zünglein.




Citharus. Meer. Harpf.





Rhomboides. Winkelbrutt.

Citharus flavus. sine Asper. Raiche Meerharpf.



Solea. alia.





cum Massarius explicans : dixit, inquit, ætate nigriores : quia fuscipiunt colores cæruleos, qui quod ad albedinem sunt obscuriores, & nigriores.

Et rursus: Mæna pisculus est digitalis longitudinis, hyeme candida, ætate varia, picturis cæruleis obliquis. Quomodo autem colores mutant, in Merula ac Phycide (ni fallor) explicatum est. Testatur denique Rondelerius, cum aliquando Româ Venetias venisset, Mænas feranta colorum varietate conspexisse, ut vix primo aspectu agnosceret, quod suo in littore minus pictæ sint. Quod ad *partes internas* attinet: Mænæ *hepar*, ut Bellonius observavit, fungosum ex lacteo pallefcit: sub cuius lobo dextro fel luteum oblongo vasculo includitur: *Splen* niger, *stomachus* oblongus. Rarò in Oceano capiuntur: in mari tam supero quàm infero frequentes esse, nomenclaturæ apud utriusque maris accolæ indicant. Mænaria insula ab earum frequentia nomen sortita est. Inter herbas in littore algofo, seu ut Ovidius, in herbosa arena *visitare*, Oppiani fide tradimus. A carne non omnino abstinere, quidam prodidere. Gregales esse apud Aristotelem legimus. *Parit* brumâ, vel ut Bellonius, post brumam, & omnium piscium fecundissima esse censetur. Cum foetu foemina impleri incipit, ob malignum foetorem, *redy* seu *Hircus*, ut apud Aristotelem extat, dicitur. Singularem cum vespis sympathiam habere ex eo quidam colligunt, quod illæ nassa, in quæ mænna cum Chalcide reperta est, capiantur, prodente Æliano: singulari in Xiphias odio ferri, ex eo nonnulli, quod eam balænx metu, gladio suo in terra hærentem, conficiant, ut Oppianus testatur. Inter plebeios *cibos* reputantur, adeò, ut acervatim, vitato etiam emptore Venetiis vendantur, tum quod parvisint, tum quod cum uterum fe-

runt, exquisiti foetoris. Unde Martialis

*Fuisse gerres aut inutiles mænas
Odor impudicus urcei fatebatur.*

& in Majali L. Pomponius Atellanarum Poeta, ut dicitur Agellio

*— Cænam quaritat, si nemo eum
Vocat, revortit mæstus ad manam
miser.*

Succitamen bonitate Gobiis præstare Hicæsius, teste Athenæo author est; quod forte delis, qui in littore petroso aut arenoso, & suo tempore capiebantur, sumendum est. Nam aliàs, Gobius friabili est carne, & saxatiliū non multò inferiore. Li-quamen seu gari speciem ex ipsis fieri solitam, Plinius innuit, dum scribit. *Saleriam* è muria *salsamentorum recoquitur, iterumque consumpto liquore, ad naturam suam redit, vulgo è Mænis incundissimus.* Apud Perlium quoque aliquid simile invenies, sit visceribus piscium in vas aliquod iniectis, & sale conditis. *De usu in Medicina* hæc habero. Jus assumtarum alvum solvere; ut & salsas, si umbilico illinantur. Capitibus inveteratarum ustis ad sedis fissuras, & columellam inveteratam Galenum uti: ad uvam diu jacentem, cum gallæ & floris æris, denariis duobus, Marcellum Empyricum: ad Anginam cum melle illitis eundem. Plinius earundem cinerem, admixto sale & cunila, oleoque, vulvæ mederi, & suffitione secundas extrahere, testatur. Cum alio tritus verrucas tollit, & verendorum pustulas discutit. In dysenteria quem præbeant Mænæ usum, apud Galenum invenies.

Martial.
l. 12.
Epigr. 32.

Plin. H. N.
l. 31. c. 7.

Plin. H. N.
l. 31. c. 9.

Galen.
simpl. l. 11.

Plin. H. N.
l. 32. c. 10.

ARTICULUS XXII.

De Smaride.

Smarides qui & *Marides* apud A-Tab. Sthenæum dicuntur. (Bellonius XX. Græcos Anconæ se convenisse scribit, qui etiam Maridas appellabant) ex Mænarum sunt genere.

L 2 Vocan-

Vocantur & *Leucomanides*, nempe, quia semper albæ sunt, cum Mænæ colorem immutent. Eum docti pisciculum esse volunt, quem Antipolitani hodiè *Garum*, Veneti hirulam seu herrulam, Massilienses hiaret, Galli Narbonenses & Hispani Picarel, quod fumo induratus & salitus, linguam acrimoniâ vellicet, Neapolitani Cerrum, quod vocabulum Gaza retinuit, nominant. Rondeletius *Garum* veterum esse putat, tum earundem nomenclaturarum affinitate, tum quod ex eo *garum* fiat, idque teste Plinio, optimum. Trium descriptionem Aldrovandus tradidit.

Plin. H. N.
l. 31. c. 7.

Primus, Mænæ & Boopi simillimus est; notis tamen quibusdam ab iis distinguitur. Boops enim lituris caret; quibus prædita Smaris est. Boopi rostrum quasi recisum, Smaridi longiusculum. Boops item quam Smaris rotundior est corpore, quam obrem Rotundetus Romæ nominatur. Differt vero à Mænâ etiam, quod & asperiores & paulo latiores squamas habeat. Lineæ laterum utrique rectæ, sed in Smaride quadam serie, in Mænâ nullo plane ordine dispositæ: suntque argenteæ & subaureæ, obscuræ, à capite ad caudam ductæ. Estque Mænâ minor, digitum nimirum vix superans, corpore item strictiore. Est denique peculiaris ei nota, quâ & à Mænâ & à Boope discernitur. Cum enim os aperit, labia exerit tanquam ex tubo pyxidatim infarcto. Pinnis alioqui, aculeis, cauda, partibusque internis Mænæ similis est: eodemque modo colorem, teste Bellonio, mutat.

Altero loco exhibitus piscis, Smaris Bellonii videtur. Capite est ferè violaceo, prono nempe, nam supino albicat. Eodem colore totum corpus, sed multo dilutiore tinctum est. Lineæ quinque insignes flavescentes à capite ad caudam perferuntur. Pinnae etiam flavescent. Exiguam habet & vix conspicuam lituram.

Tertius Smaridis peregrinæ nomi-

ne missus, tergo est cæruleo, cætera subviridi, nigris & argenteis punctis cōspersus. Prono capite ad violaceū vergit, supino vero candicat. Pinnae omnes fere crocei coloris sunt, punctis conspersæ nigricantibus. *De gunt* inter herbas in algofo littore; eodemq; cum Mænâ cibo vesci, verisimillimum est. Inter fecundas recenset Ovidius. Pastâ, ex pane, caprillo caseo, & purissimo polline, infcuntur. Optimos pisciculos esse Hesychius scripsit. Optimum & suavissimum ex iis gaviū, apud Guilielmum Pelicerium Episcopum Monspeliensem Rondeletius vidit. *De usu in Medicina* proditum, caput tostum ad pilorum defluvia cum adipe ursino conferre; excrescentes ulcerum oras, ab eisdem pulvere reprimi, thymosque & clavos absumi. Plinius alicubi cum pifana sumptas, vel cum feniculo decoctas mulieribus lactis copiam facere scribit, alibi, tritas illitas, verrucas tollere, & verendorum pustulas discutere tradit.

Plin. H. N.
l. 32. c. 11.

ARTICULVS XXIII.

De Boope, seu Boce.

Piscis, quem nos *Boopem* dicimus, is *Tab. Aristoteli* citante Athenæo *βωξ*, XX. Numenio *βόνξ*, qua etiam appellatur. *8. 9. tione* Oppianus utitur, Speusippo & *Tab. aliis* Atticis *βόαξ*, seu *αἰγὴ τῆς βονὴς* à voce XXII. ce, ideo Mercurio sacer habetur; seu 6. quod *βόος ὀφθαλμοὺς ἔχει*, id est bubulos *Athen. oculos* seu magnos habeat, dicitur. *Dipnosc. Tertia* est Mænâ species, pedis ut *l. 7. Rondeletius* scribit magnitudine, qui etiam *tres* describit. Prior piscis est marinus, littoribus gaudens, ex Mænarum genere, pedali magnitudine, corpore satis forundo, non cōpressus, quale fere est Mugilū. Capite brevi, & parvo. *Oculis* maximis, p corporis magnitudine, utpote qui totam fere capitis regionem occupent. Colore est varius. In dorso à branchiis ad caudam lineas ductas habet, alias aureas, alias argenteas, minus quam in Salsapa illustres: ob quas ab Aristotele in libro

libro *ἡ δὲ ἰχθύων, ὡς ἑκάστη ἐστίν*, id est, in dorso pictus cognominatus est. In ventrenullæ apparent lineæ; sed hic squamis tegitur argenteis. Pinnae sunt Spari, Canthari, Sargi, pinnis similes. Cauda subaurea. *Ventriculus* magnus cum multis appendicibus: intestina tenuia admodum, hepar rubrum, splen ex rubro nigrescens. Nutritur alga, carne, luto. *Altera species* in multis priori similis; suis Bogueravel appellatur, cuius cognominis significationem, non omnino assequi se potuisse ait; peritiores tamen piscatores credere, sic dici quia cum Ravallevulgo vocatis piscibus, id est, (inquit) minutis, quique simul elixantur, & apponuntur, nec propter parvitatem seliguntur, capiatur, & vendatur. Boopi (inquam) vel Mænæ similis est; rostro magis acuto, dorso ex cæruleo rubescente: oculis magnis & variis, nimirum circa pupillā nigrā circulo ex aureo nigrescente corpore toto latiore q̃ Boops sed brevior. Boopis hæc nostra species peregrina dorso fere est violaceo, aut amethestino, lateribus & ventre candicantibus punctis amethistinis, conspersis: pinnis omnibus flavis præteream quæ intergo est, cuius quidem aristæ flavæ sunt, membrata vero viridescit. *Tertiam*, quia squammis caret, huc pertinere non iudico. Bellonius quoque *duas species* describit, dum dicit.

Dua huius piscis cognoscuntur *differentia*: siquidem earum *altera* minor est, & perpetuo parva, *altera* paulo maior. Boces à Mænis ita distinguere poteris, quod Mænam videas esse latiori corporis compage, nigriore colore, & utrinque lituram unam habere. Boca perpetuo parva est, & pro sua magnitudine crassiori constat capite, corpore magis tereti. Boces & Mænæ seu Gerres eandem corporis constitutionem, hoc est, pinnae, squamas, & capita habent. Boopes nullā liturā variantur, sed ambo tereti cor-

porpore præditi sunt. *Giruli* autem seu Smarides magis nigricant, & lituris variegantur. Boces teretiores sunt. *Giruli* magis plani. Bocum color hilari ac quodammodo aureo fulgore nitet, ut tergora colore ad aurum inclinante micare credas. *Gregalis* est, & litoralis piscis, herbosus gaudens. Piscis est parvus, oculos pro corporis ratione grandes habens. Duos habet in capite calculos non prorsus rotundos, ut in Paseribus, sed oblongos, ut in Merlangis. *Alter Boops* Orpho autalicubi ex rubris cognatus est. Littoralis, (inquit) pisciculus, qui Bogue & Renæu (cum iconē scriptum est Bogue Renæu sine copula) Massiliensibus dicitur, is Genuensibus Ruello vocari solet. Coloris est eiusdem cum Erythrino pisce, dentibus, pinnis ac capite consimilibus, sed reliquo corpore differunt. Nam Box vulgarem Bocam refert, eodemque circino tornata esset, nisi magis ad Erythrinum accederet. Verum linea quæ corpus Erythrini intersecat, per medium utrimque arcuata est. In hoc autem recta prætenditur, neque Erythrini gibbum habet: Dentes præterea anteriores breves & acutos ostendit, sed tam superiores quam inferiores molares sunt, ut Sargo, quod etiam Pagro & Erythrino accidit. Hanc quoque peculiarem notam insignem habet, quod eius branchiarum exterior spina ad radices nigra est. Putat Ovidii Bogyrum esse, q̃ Massilienses à Boopa & Gyro, id est Smaride, nomen ipsi indiderint, sed mendum est in Ovidio, & Cercyrus legi debet, qui apud Oppianum, circa petras conchulis plenas degit. *Hal. l. i.* cum Mænis locis gaudent, eodemque cibo vescuntur, *De Car. Athen. Dipnos.* *ἡ δὲ ἰχθύων, ὡς ἑκάστη ἐστίν*, id est, in dorso pictus cognominatus est. In ventrenullæ apparent lineæ; sed hic squamis tegitur argenteis. Pinnae sunt Spari, Canthari, Sargi, pinnis similes. Cauda subaurea. *Ventriculus* magnus cum multis appendicibus: intestina tenuia admodum, hepar rubrum, splen ex rubro nigrescens. Nutritur alga, carne, luto. *Altera species* in multis priori similis; suis Bogueravel appellatur, cuius cognominis significationem, non omnino assequi se potuisse ait; peritiores tamen piscatores credere, sic dici quia cum Ravallevulgo vocatis piscibus, id est, (inquit) minutis, quique simul elixantur, & apponuntur, nec propter parvitatem seliguntur, capiatur, & vendatur. Boopi (inquam) vel Mænæ similis est; rostro magis acuto, dorso ex cæruleo rubescente: oculis magnis & variis, nimirum circa pupillā nigrā circulo ex aureo nigrescente corpore toto latiore q̃ Boops sed brevior. Boopis hæc nostra species peregrina dorso fere est violaceo, aut amethestino, lateribus & ventre candicantibus punctis amethistinis, conspersis: pinnis omnibus flavis præteream quæ intergo est, cuius quidem aristæ flavæ sunt, membrata vero viridescit. *Tertiam*, quia squammis caret, huc pertinere non iudico. Bellonius quoque *duas species* describit, dum dicit.

In Provincia etiam agris apponitur. Anconæ, Bellonii prior, multis modis condita, carnis privi tempore, potissimum Anconæ, Illyrico more, ex gelu conservata divenditur. Psellus tamen inter excrémentitios pisces retulit.

CAPUT II.

De Squammosis planis.

ARTICULVS I.

De Piscibus Psittaceis spinosis in genere.

Pisces, qui in latera compressi, latera ipsa in tenuem & latam extremitatem degenerantia habent, & quorum dorsum spina, non in dorsum & ventrem, ut in piscibus reliquis, sed in latera, suas pinnas seu apophyses transmittit, Plinio *Planis*, Columellæ, *jacentes, prostrati, & cubantes*. Doriani apud Athenæum *πλατῆς*, id est, lati; quibusdam, quod spiniâ parte candidi, prona verò terreisunt, ut passeret aves, *Passeres*: aliis *Psittæ* vel cum Aristotele *Psittacei* pisces, dicuntur. Duo ipsorum genera, Spinofum unum, Selachæ seu Cartilagineum alterum, non eo tamen sensu, quo *Ælianus* & *Artemidorus*, inter Cartilaginea, quæ squammis carent, ut *Muræna*, *Conger*, *Torpedo*, & cætera, referunt. Spinosi ovipari sunt. Cartilaginei ova quidem intus concipiunt, sed viperæ more fetus, postmodum vivos excludunt. Sethorum alii levi cute præditi sunt, alii squammis teguntur. Videntur omnes e duabus pellibus compositam habere corporis speciem, & spina per medium dividi. Omnes item quaternas pinnas habent, more squamosorum, duas in prona, totidem in supina parte, sed præter aliorum

morem pinna earum in gyrum circumvallantur. *Branchia* utrimque quaternæ, *lingua* nulla, *oculi* in supina corporis parte. *Dentium* loco maxillæ in plerisque rugosa quædam scabritie asperæ sunt. *Gula* veluti ingluvieri cuiuspiam per-similis, ventriculo contigua est. *Os* quamvis pro corporis portione exiguum omnibus, qui tamen in hoc genere maiores sunt, nullum non concharum aut crustatorum genus deglutiunt integrum, sicuti minores, qui in utroque genere minoræ sunt. Nullæ ad pylorum apophyses: *Cor* ab una parte gibbum; huic quædam caruncula atra quadrangula pulvini modo sub-fidet: ad cuius superiorem partem vesiculam annexi Bellonius testatur, & pulmonis officio fungi arbitrat. *Hepar* latum est & ventriculum amplectitur. *Vesicula fellis* ab eius extremâ parte dependet. *Lien* ater, sub ventriculo situs, qui latus est, & cum intestinis anfractuose circumducitur. *Degunt* in mari, sed & stagna & fluvios, quod lutum appetant, & commodè ibidem pariant, frequentant. Ideo Columella, *Cænosa regionem planum educare piscem* scripsit. Quia in arena & limo latent, ideò reciprocante mari facillimè capiuntur. In Belgii officinis tanta eorum copia, ut universo orbi sufficere posse videatur. Quia ova in omnibus reperiuntur, ideò sexu masculino care-re scripsit Aristoteles; quod tamen de certo duntaxat genere sumendum est. Conchyliis & crustatis, piscitibus item vescuntur. *Pariunt* teste Aristotele semel in anno.

De natatu eorum ita Aristoteles. *Aristor.*
Pisces Psittacei eo modo nant, quo Coclites, alteroque ocu- *H.A.I.5. c.9.*

lo capti incedunt, quia natura eorum transversa, distortaque est: itaque transversim natant, convolvuntque se strabonum more, suaque prorsus latitudine, quam pinnarum ad-miniculo, cursum dirigunt. Ingenium resipit,

Plin. H. N.
I. 9. c. 20.
24.
Columel.
R. R. l. 8.
c. 17.
Aristor.
H. A. l. 4.
c. II.

Aristor.
H.A.I.4. c. II.

Aristor. de Anim. in-cessu.

Aristot.
H.A.I. 9.
6.37.

resipit, quod se arenâ obruant, & postquam se totos occultaverint. Τοῖς ἐν τῷ ῥόμβῳ οἱ καλεῖσθαι οἱ ἀλιεῖς ῥαβδία, *oris sui virgulis*, ut vocant *piscatores*, verberant; τὰ δὲ μικρὰ ἰχθυῖδια προσέρονται ὡς πρὸς φυκία, ἀφ' ὧν τρέφονται, id est, ad quas pisciculi adnatant, tanquam ad algas, quibus vescantur. Certissimam securitatem esse Plinius tradit, vidisse planos pisces, quia nusquam sint ubi maleficæ bestiae, eaque de causa, ab urinantibus *sacros* appellari.

ARTICVLVS II.

De Planis Squamosis in Specie.

PUNCTUM I.

De Solea.

TAB.
XX.
10. II. 12.
13.

Planorum piscium alii sunt *squamosi*, quos fortè Aristoteles *σπινθες* vocat; alii *leues*, quos *ψήπια* dici conijicimus. Illi iterum vel sunt oblongo corpore, vel rotundo. Inter illos est *Solea*, à figura, quæ solo pedis ita subiicitur, dictæ, quæ Varroni *Lingulaca*, Gallis teste Bellonio, *Perdix marina*, fortè, quod in lautioribus conviviis magnam obtineat claritatem, nuncupatur. Græci hodie *γλῶτταν* linguam appellant; veteres *βέγλωττον* aut *βέγλωτταν*, non tam ob bubulæ linguæ figuram; quàm ob longitudinem, dixere. Quidam sub nomine *συνδαλῖς*, ab Alciphronè in epistolis piscatoriis nominari opinantur. Matroni Parodo, in descriptione Cœnæ Atticæ, *συνδαλῖον* generis vocabulum est, quod omnes planos delicatiores exprimit. Sex ipsius *species* Rondeletius exhibuit.

Prima, quæ *Solea* simpliciter dicitur, longiore contractioreque corpore est quàm *Passer*; & si in

stagnis capitur, à marina, parvitate, & odore lutum respiciente differt.

Alteram oculatam vocat; quod licet corporis habitus, & internis partibus superiori sit similis: in plana tamen parte, magnas habeat maculas, oculorum effigiem cum iride & pupillâ referentes, squamæ tam tenaciter hærent, ut nisi diu in aqua calida maduerit, desquamari non possit.

Tertia à prima, ut *Rhombus* à *Passere*, situ corporis differt, si enim juxta eodem situ componas, os eius in sinistrum, prioris in dextrum latus vergere conspicies. Haut tamen ex *Rhombis* aut *Passeribus* esse, forma ipsa, quæ planæ *Soleæ* similis est, satis arguit, Galli *Polam* dicunt: ipse *Epicharmo* apud Athenæum *Cynoglosson* appellari conjicit. Vel si *Cynoglossos* huius non sit: (nihil enim certi ex tam paucis verbis, quæ citat Athenæus, colligi potest) optimo tamen jure, ut à cæteris *Buglossi* generibus distingatur, *Cynoglosson* appellari posse, neque aliud esse genus, cui hoc nomen aptius quadret. Nam cum vera *Solea* suavitatè saporis *Perdici* comparetur, hanc ferino planæ esse sapore, viscidamque duram, contumacemque coctioni, insuaveque quid & grave olere. Nec probat Rondeletius eos, qui pabulitantum ratione differre credunt, quandoquidem pabuli varietas, etsi saporem succumque immutare potest; ad corporis tamen habitum formamque immutandam nullam vim habet. Frequens est in Oceano. Bellonius in Mediterraneo mari etiam *capi* scribit, & à Massiliensibus *Servatin* appellari, quod tamen falsum esse Rondeletius asserit. Totus, ut ipse etiam ait, fusco colore est.

Quarta eidem Rondeletio *Arnoglossos* sive *Arnoglossus levis* dicitur, quod

quod quemadmodum plantagini herbæ à figura vel foliorum lævitate Arnoglossi, id est, agninæ linguæ nomen impositum est; ita species isthæc Soleæ, Arnoglossus à levitate vel figura rectè (inquit) nominabitur; squamis enim carere videtur, prorsusque lævis esse. Suis Perpei-revocari ait, & ex Solearum genere esse, ex corporis habitu, figuraque cognosci: Differre autem ab aliis, quod multis squamis tenuissimis & statim deciduis, integatur: corpore esse valde gracili, candido.

Quintam diminuto nomine *Ligulam* dicit, quod sit in hoc genere omnium minima; negatque maiorum Solearum foeturâ esse, quandoquidem semper parva sit: nunquam dodrantalem magnitudinem excedens. Lineam quæ corpus dirimit, spinamque firmat vel tuetur, huic ex squamis ait esse compositam longe eminentioribus, quam in toto corpore, dempta eâ parte, quæ circa maxillam inferiorem est: durior carne esse quam Buglossus lævis, *glutinosusque* non nihil habere: satrarum esse piscem, & ob corporis tenuitatem vilem.

Sextam ac postremam Gallis *Fletam* dictam quod fluitando natet, antiquis (ut putat) incognitam, folisque Oceani accolis notam, Græcorum imitatione, qui rei magnitudinem βε & πωο particulis indicant, Hippoglossum appellat, quod cæteras non solum Soleas magnitudine vincat, verum etiam quatuor digitorum longitudine quandoque inveniat. Esse autem ex Solearum genere vel ex primo aspectu judicari posse scribit: oblongo enim (inquit) contractoque est corpore, parte altera candida, altera nigricante, in qua oculi sunt. Ore est contorto, dentibus munito cithari modo, quibus Buglossificarent. Carne est dura, sed suavi, ad Rhombi naturam proximè accedente. Ossa habet spongiosa, quibus inest medulla; quæ à cupidiarum amatoribus expetitur. Pi-

scis est maris Oceani, Antverpiæ salitus, & in frusta dissectus venditur. Capitur etiam sæpe in Oceano juxta Galliæ Bononiam. Ibi huius frusta farinæ massæ probe subacta & pasta inclusa, aromatisque condita in furno coquantur, ut diutius servari possint & exportari. Aldro-^{Aldrovand.} vandus, non tantum aliud Hippo-^{Histor. Pi-} glossi genus, squamis præditum mi-^{scium.} noribus, undique sibi concolor, fla-^{lib. 2. c. 43.} vescentis scilicet; quodque à latere uno liturâs nigras, pinnam & caudas in extremo cæruleas, habet, exhibet: sed & alterius Soleæ genus, quod squamis tegitur latissimis, estque unicolor & albicans. Quam Bellonius *Teniam* vocat, illa tenuis gracilisque piscis est; & quod Athenæus de Tænijs prodidit. Alex-^{Aristot. H.} andriæ, Canopi, & Seleuciæ in ^{A. l. 2. c. 13.} Antiochia, frequentissimè reperitur. Benè ab Aristotelis & Ron-
deletii Tænia, in qua pinnarum numerus cum Anguillis convenit, distinguitur. Omnium ferè marium piscis est, sed cum Rhombis Pontum ingredi Plinius negat, flumina ingressos multum pinguescere, Londini Bellonius didicit; in stagnis deteriores evadunt. *Littorales* sunt Oppiano, Ovidio in herbosa arena ^{Oppian.} degunt. Terrâ, hoc est vado ma-^{Halieut.} ris excavato per hyemem condi cre-^{l. 1. v. 99.} ditur.

Nam quia lapides in capite habet, & corpore est tenui, frigus exhorrescit. Quantum ad *usum in ci-*
bis, Matron Parodus apud Athe-^{Athenæ.} næum, mediocrem succum præbe-^{Dipnos. l.} re, ut saxatiliū vicem supplere possint, scribit. Galenus Passere ^{Galen. de} molliorem, perperam asserit. ^{Alim. fa-}

Duram enim esse, vel exinde, ^{l. de Cibis} quod diutius servetur, longa vectura ^{boni es-} putrescat, sic melior reddatur, colli-^{mali succi} gitur. Facile tamen concoqui & ^{e. 3.} minimè excrementitiam esse, apud

Rondeletium lego. Patinam
ex soleis apud Apicium
vide.

^{Apic. l. 2.}
^{c. 4.}



PUN-

PUNCTVM II.

De Citharo.

TAB. XX. 14. **C**itharus, Aeliano *κίθαρις*, Op-
piano, cui littoralis est, *κίθαρη* di-
15. citur. Nomen à lineis quibus à sum-
Ælian. H. mo capite vertice, ad extremam uf-
A. l. 11. c. 23 que caudam distinguitur, invenit.
Oppian. Gaza, ex Aristotele, qui inter eos,
Halieut. l. quibus complures appendices cir-
8. 98. ca ventriculum exeunt, numerat,
Arist. H. A. *Fidiculam* vertit. Quatuor eius no-
l. 2. c. ult. minis pisces, ex planorum genere
omnes, esse, Rondeletius luculen-
ter ostendit. Galenus planum &
Rhombum similem facit, & quod
Philotimus eum inter *μαλακότερους*
omiserit miratur. Aelianus Buglof-
fo seu soleæ assimilat. Galeni Ci-
tharum, Rondeletius eundem esse
arbitratur cum eo quem Athenæus
ex Aristotelis libro de animalibus &
piscibus sic delineavit: Citharus fer-
ratis est dentibus, solitarius, alga ve-
scitur, linguam solutam habet, cor
album & latum: esseque illum Pfit-
raceum piscem, qui Romæ satis fre-
quens, *Folio* nominatur. Cum enim
lingua piscibus à natura data sit of-
fesa, & non soluta: vel dura, spinea &
adhærens: isque unicus sit ex planis,
cui lingua soluta sit teste Aristotele,
contra omnium aliorum piscium na-
turam: haud temere sese iudicasse
existimat, cum ex hoc, tum quod re-
liquæ memoratæ notæ ex asse re-
spondeant, hunc verum ac genuinum
Citharum esse. Quod si verò quis hunc
Rondeletii piscem pro Citharo non
accipiat, quoniam squamosus cum sit
ex Rhombis ut pote lævi cute prædi-
tis, quibus à Galeno assimilatur, esse
nequeat; huic responsum esse volo,
assimilationem ad Rhombum, non
ad corpus, sed ad carnis qualitatem,
referendam esse. Aelianum vero suos
Citharædos squamosos facere: quã-
obrem etiam admiror Rondeletium
suum hunc piscem Rhombo quodã-
modo similem esse dicere, cum neq;
regumento, squamosus enim est; neq;
figura, oblongus enim; respondeat:

quare prudenter subiunxit, Buglofso
similiorem esse, si squamas excipias,
quæ Citharo magnæ sunt, Rhombi
instrumenti figura. Ab hoc Aristote-
lis Galenique Citharo differre putat
idem Rondeletius, eum qui Arche-
strato apud Athenarum rufus sive sub-
flavus cognominatur, assandusque &
caseo multo, oleoque condiendus es-
se dicitur, quiq; sine sumptu apparari
non potest: esseq; eum quem alii ve-
rum Buglofsum esse volunt, non ob
figuram solum, sed etiam ob asperita-
tem: Est enim bovis lingua magna &
aspera, quomodo buglofsum herbæ
etiam nomen invenit. Superiori simi-
lis est figura, lingua magis soluta, oris
scissura magna, dentibus ferratis,
squamis integer rotundis, aquarum
asperitate *Citharum asperum* etiam ap-
pellari posse existimat, buglofsiq; no-
mine comprehendendi. Virgam habet à
capite ad caudam protensam, latius-
culam, maioribus squamis constan-
tem. Partibus internis superioribus
similis est. Venetiis optimus reperit-
ur. Carne est inter duram & mollem
Galeno media. Stomacho ingratus
malique succi Xenocrati. A Diocle
assus commendatur. Rondeletius,
quod salpæ modo alga pascatur in-
suaviorem prodidit. Apollini qui Ci-
tharum invenit sacrum, apud Athe-
næum legimus.

Athen. Di-
nos. l. 7.

PUNCTVM III.

De Rhomboide Rondeletii,
& Passeribus squa-
mosis.

RHOMBOIDES Rondeletii, TAB.
Rhombi nomine Romæ ab ich-XX. 16.
tyopolis venditur. Fortè melius, Aldrovand.
rotundus Buglofius, vel *rotunda solea de Piscib.*
aut *lingulaca* vocaretur. Squammis
parvis integitur. Oculi multum invi-
cem distant. Linea à capite ad cau-
dam per medium corpus ducta ini-
tio sinuosa: dein recta, corpus in
duas æquas partes dirimit. Cor-
pore est exiguo & brevi: nunquam
M enim

enim palmi magnitudinem superat, quantum Rondeletio licuit observare. Internis partibus à Rhombo non differt. Carne est media, neque molli nimium, neque dura. Eius nullam à veteribus mentionem factam fuisse credit. Junius in suo nomenclatore Belgicò vocat Scarde. *PASSERVM SQVAMOSORVM* tres idem Rondeletius species ponit. *Priorem Limandam* Galli dicunt, ob corporis tenuitatem, ut Bellonius conjicit, quam cum diffisis dolabra asseribus communem habet. Angli un Brut. Hic, teste Iunio, Batavorum Grieta est. Ego enim id non satis memini. Flavas in pinnis, quæ corpus ambiunt, & in reliquo corpore maculas habet. Linea corpus interfecans, sinuosa. Magnitudine ad Quadrantulum (de quo mox) accedit. Lucidiori aeri expositus, pellucidus videtur. Dentes teste Bellonio inter cæteros sui generis pisces, longiores habet: squamas conspicuas valde tenues atque asperas, quæque difficillime cûti adimuntur: quod cum solea quidem magis, cum cæteris vero minus, commune habet. Vento indurati ingenti quæstu ad mediterranea loca Germaniæ superioris venales feruntur. Gallis ex Britannico littore recensentes adducuntur. Italiæ planè ignoti sunt. Carne aiunt esse candida, humida, molli, parum glutinosa; non multum Buglossis sive Soleis inferiori.

Alterâ species Gallis Flez. Anglis Phlonder teste Bellonio, qui *Flesum fluviatilem* vocat, verum improprie; & contra piscis naturam: non enim in fluminibus nascitur, sed in mari, ex quo in flumina migrat, cæterorum planorum more. Corpore est, quam vulgaris passer, paulo longiore, & ubi adolevit, crassiore. Squamis integitur parvis: colore est nigro. In corpore pinnisque in ambientibus maculas rufas habet. Officulis munitur in capite, medioque corpore in parte supina.

Tertiam Britanni *Helbut* dicunt, Hollandi *Heilbut* vel *Eelbut*, Germani *Heiligbut*, Galli *Fletelet*, nomine (ut apparet) diminuto à *Flez*, cum alioqui sit maior, cætera similis est. Utræque in Anglia & Belgio frequens: nobis, Gallisque & fortassis antiquis etiam incognita, quia ad Oceanum usque non pervenerunt, nec in Oceani piscibus cognoscendis multæ operæ studiisque posuerint. Utriusque caro candida & mollis, salubris & delicata: *Fleteletus* tamen paulo durior est.

CAPVT III.

De Piscibus littoralibus levibus.

ARTICVLVS I.

De Piscibus littoralibus non planis.

PVNCTVM I.

De Sandilz Anglorum.

Piscis, quem jam descripturi sumus, Anglis *Sandilz*, id est *Angl. XXI. I.* guilla de arena, tum quod longo *Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 49.* sit corpore, tum quod sese occulturus sub arenam se citissimè mergit, dicitur. Gesnerus *Ammodonten* vocabulo Græco vocavit. Capite est tenui ac rotundo, rostro longiufculo. & acuminato: ore parvo: corpore reliquo oblongo, si latitudini conferatur. Nam cum eius medium (caput enim & cauda arctiores sunt) pollicis crassitudinem non superet, longitudo ad palmi mensuram extenditur. Quamobrem sicuti longis, sic etiam & parvis annumerari piscibus debet. Cum neque pollicis latitudinem, neque palmi longitudinem excedat unquam. Dorso præterea (in quo pinnæ duæ reperiuntur, in eo medio

medio una, ac prope caudam altera) subcæruleus. Ventre verò in quo præter binas, quas utrimque habet pinnas, una etiam alia post excrementorum orificium subsistit argenteus conspicitur. Frequentissimè in Britannia littoribus capitur. Sæpè etiam in Bononiensi, ubi idem nomen obtinet. Quibusdam anni temporibus, seu maiorum piscium iniurias fugiens, seu naturæ impulsu, aqua derelicta, sub arenam penetrat: inde pedibus & pectinatim incisus lignis, ab incolis extrahitur. Pauperum duntaxat necessitatibus inservit.

Huc pertinet alter piscis *Mersuyn* id est, *Porci* marini nomine missus, quod Porci more rostro terram fodiat. Lituris & specie corporis Lucium imitatur, sed aculeum rectum in fronte gerit. Lituræ omnes nigrae sunt. Pinnæ ventris, caput supinum & cauda rubent: cætera flavescit. Marinusne verò, an dulcium aquarum piscis sit, non satis memini, quamobrem historia ad priorem piscem pertinet. Marinum tamen esse nomenclatura docet.

PUNCTVM II.

De Dracone.

TAB.

XXI.

2.3.4.5.6.
Aldrovand.
de Piscib.
l.2. c.50.

DRACO piscis, Græcis veteribus *δρακων θαλάσσιος*, modernis *Δράκων*, unde Siculi, Neapolitani, & Romani suum Trachine deflexerunt, dicitur. Iovius Trachurū, qui in cauda, non cervice aculeos habet, perperam vocavit. Plinius qui Draconis marini nomine duos diversos pisces, ut ex libro nono capite vigesimo septimo colligi potest, intelligit, quorum unus serpens marinus est, quem Aristoteles libro nono capite decimo septimo describit, ab Araneo male specie distinxit, quem & Isidorus, qui Araneum ita describit, ut Draconi huic marino omnia competent, securus est. Quod ab Araneo Aristotelis distingui debeat,

mirum non est, cum eius Araneus, à nullis Græcis authoribus venenatus esse tradatur: hunc omnes post Pastinacam venenosissimum asserant.

Salvianus duo ipsius generæ ponit. *Primus* piscis est oblongus, & ut Bellonius ait, forma pugionis modo compressa, unde à quibusdam Gallis Poignastre vocatur quasi pugio. Salvianus squammis carere dicit, item Bellonius, vel saltem exiliores habere, quam sint serpentium. Rondeletius parvas ei tribuit ac tenues, Ælianum (ut apparet) secutus, qui asperas habere scribit *φολιδας*, quæ fere serpentibus tribuuntur, & ipse etiam Rondeletius sine squamis & planè nudum Draconem pingit. Percam marinam quodammodo refert capite, magno scilicet & rotundo. Os non in longitudinem, sed in obliquum, nec recta sed curva scissura fissum habet: Connexa enim latera inferioris maxillæ (quæ paulò longior est superiore, nec recta nec oblique sursum porrigitur) à concavis superioribus lateribus, dum illud clauditur, suscipiuntur. *Dentibus* ut in Dracone serpente id communitum est. *Oculi* magni sunt, quibus magnitudine supercilia respondent, sursum spectantes, ac adeò splendide virescentes, ut smaragdum pulcherrima viriditate superent, iidem brevi intervallo à se distant, in quo triangulum expressum & aculeos parvos cernas. *Branchiæ* utrinque quaternæ, quarum exteriora opercula aculeo ad caudam spectante armantur, ut dictum est: quæ opercula post articulationem cum ossibus capitis, tenui membranæque simili substantia potius quam ossa constant, quamobrem Draco ea cum extra aquam aerem trahit, inflat, non aliter quam nos buccas inflamus. Ad branchias *pinnae due*, eo situ, ut in fluviatilibus, hoc est, inferiores multo quam in marinis esse solent: inter has & scissuræ oris finem, in parte superna, duæ aliæ minores, candidæ. In cervice vel dorso principio quinque ha-


bet *aculeos* tenues, nigros, præacutos, tenui membrana anteriori parte nigra, posteriori vero alba connexos, quibus venatum vulnus infligit, multoque perniciosius quam branchiarum aculeis. Ab hac, pinna incipit ad caudam usque continuata, quæ magna est, lata, atque adeo bifurca, Alia denique est à *podice* ad caudam etiam usque: qui diverso in hoc quam in aliis piscibus loco situs est: cum enim alii in medio cum habeant ventre, alii vero inferius versus caudam, in Dracone non procul à branchiis distat: unde fit quod brevis admodum ventris eius sit capacitas interna, cum tamen carnosus sit & satis amplius *ventriculus*. Colore est vario. Dorso enim fusco est, ventre candido, lateribus lineis aureis transversis pulchre distinctis. *Alius* qui fortè non malè *Dracunculus* Plinii vocari poterit, quemque Salvianus minorem vocat, in nonnullis à priore differt. Cum enim maior crebrò ad libræ unius & duarum etiam aliquando magnitudinem excreseat, (Rondeletius in Oceano aliquando cubiti magnitudinem attingere tradit) minor ne dimidiam quidem libram implet: præterea capite & corpore reliquo non rotundo, ut maior; sed in latera compresso est: cuius denique latera non subluteo solum colore, quò maior ille insignitus est, sed frequentibus etiam & obliquis ad cæruleum colorem vergentibus lineis pulcherrime depicta sunt. Aldrovandus *quatuor* Draconis *species* exhibet. Prior aculeo ad branchias, pinnarumque numero cum præcedenti convenit, colore vero & maculis lineisque differt. *Offa* branchiarum colore sunt roseo, sed in extremitatibus aureo. Aculeus item aureus, sicuti & pinnae, quæ sunt ad branchias: quæ vero in pectore conspiciuntur, albicant, cæteræ subvirent. *Os* pronè quoque viride, supinè albicat, Dorsum ex subviridi fuscescit, maculis rotundis ad castaneum vergentibus densissimis conspersum, *Venter* argenteis lineis crassiusculis contrario invicem ordinæ oppositis decoratur.

Aldrovand.
l.c.

Cauda tota ex cæruleo ad amethystinum tendit. *Altera* species in vertice insignem habet aculeum; colore est in dorso subcastaneo, ventre albo, valde maculosa. Pinna cervicis inter quatuor priores aculeos in summitate atra est, cætera fusca: quæ verò ad caudam usque protrahuntur, & cauda etiam ipsa, coloris ferè sunt violacei. *Tertia*, capite est castaneo, præter os quod pronè supinèque ferè violaceum est. Oculi, in vertice ferè ut in Callionymo, inter duos locati aculeos, Pinnae branchiarum & pectoris, item quæ in ventre est, roseo sunt colore: Quæ verò in cervice cernitur, ad quartum usque aculeum violaceo, cætera albicat, & rotundas, fusci coloris maculas ostendit, quemadmodum & subsequens, quæ ad caudam usque excurrit. Dorsum ad castaneum vergit, & nigricantibus maculis insignitur. Latera & venter viridescunt. *Quarta ac postrema*, magna ex parte castanei est coloris, dilutioris in capite, intensioris in dorso. Lineæ quæ à branchiis sunt ad caudam usque plane ferrugineæ. Tota pars supina candicat. Pinnae ad branchias & ad pectus, rubrae sunt: cæteræ cæruleæ, sed aristæ habent rubras. Cauda præterea in extremo ferruginea est. *Locum* si spectes, Bellonius pelagium æquè ac littoralem scribit. Aristoteli simpliciter talis est. Oppiano in petris, & arenis pascitur. Loli-gunculis & aliis minutis piscibus vescitur, ideoque Nicander ἀλιφαῖον, *maris vastatorem*, Epicharmus ἀλιμιον nominat. Gregalè non esse vel inde cõjicies, quod nunquam plures capiantur. Mirum etiam, si verum est, si manu dextra attrahere coneris, violenter reniti; si sinistra, cedere & capi, quod Ælianus prodidit: nec minus, eo tempore cum piscium genus amore tenetur, in vulnere quod iste inflixisset, pisciculos illi similes procreatos fuisse, quod multorum piscatorum testimonio narrat Gillius. Ictum eius venenatum esse, piscatorum periculo certum est, sæpe nomas, sæpe febres & inflammationes excitat, plusque à vivo quàm mortuo periculi. Remedia varii varia ostentat. Plinio Mullus


Ælian. H.
A. l. 5. c. 37.

Sandich Anglorum.




Tab. XXI.

Draco marinus. maior




Großer Meer Drach.

Dracunculus. araneus Species



Ein Art Meer Drach.


Draco minor. Araneus Randal.



Kleiner Meer Drach.


Araneus minor.

Araneus.



Meer Drach.

Dracunculus.




Kleiner Drach.


Vronoscopus.

Stanscher.

Meerpyff.




Scomber.



Macrell.

Tachurus.

Bastard Macrell.




Macrell.

10

Lacertus peregrinusul Rubei


maris.

12




Meer Heydex.

Scombrus. alius.



Saurus.

Meer Heydex.





Mullus illitus aut in cibo sumptus prodest. Dioscoridi & Galeno Dracoco proprio ictui applicatus placet. Aeginæta cerebrum piscis in potu præscribit & sulfur cum aceto imponit. Aetius locum affectum cum plumbo fricari iubet. Piscatorum experientia jecore illito dolor mitigatur, foliorum lentisci affricu punctura curatur. Genuenses exiguum Thlaspios genus, quod in ipsis litioribus nascitur, admovent. Recentis piscis è capite cinis, contra omnia venena prodest, mirabili discordia, si Rondeletio credimus. Plinius, ossibus gingivas scarificare iubet, ut dentium dolores sedentur.

PUNCTUM III.

De Dracunculo.

DRACUNCULI Plinius inter veteres meminit. Inter Recentiores à Rondeletio describitur. Est piscis marinus inquit, dodrantali magnitudine, cotto fluviatili non multum absimilis, rostro acutiore, & capite latiore, Ranæ etiam piscatrici quodammodo similis; sed Rana piscatrix ore est majore, pinnis concoloribus, quæ in Dracunculo variæ sunt. *Capite* est magno, compresso, *rostro* prominente, *ore* parvo sine dentibus, sine ulla ad branchias scissura, sed huius vice supra caput utrimque *foramen* est, ut in Hippocampo, quod, nisi dū piscis vivit, eoque aquam trahit, & emittit, manifestum est. *Oculos* magnos supra caput positos habet: capitis os in aculeos definit ad caudam spectantes. *Pinnas* longissimas pro corporis magnitudine habet, partim aurei, partim argentei coloris emulas. Quæ ad branchias sitæ, aureæ sunt, in radice argenteæ. Quæ in supina parte, à cæterorum marinorum piscium pinnis, situ magnitudineque dissident: nam & ori propiores sunt, & longiores ijs quæ sunt ad branchias. In dorso duæ eriguntur: prior (hac in pictura vix apparet) parva est, aurea & argenteis lineis distincta; posterior magna admodum in medio dorso, papilionum alis non valde dissimilis, radisque quinq; hordei aristis similibus,

membranaque constans. Radij priores longiores sunt, posteriores breviores, contra quam in membrana, quæ singula radiorum intervalla, veluti intertexta occupans paulatim crescit. Eadem quoque varia est, lineis etiam argenteis in medio duarum nigrarum fitis distinguitur. Hæc in medio dorso cavo veluti in vagina conditur. *Alia* est à podice ad caudam, etiam aurea demptis eius fimbriis, quæ nigricant. Corpustotum sensim gracilius fit, & in pinnam longam terminatur, cuius fimbriæ nigricant. Est & picto corpore: nam ab huius medio, argenteæ lineæ ad ventrem ductæ sunt. In maxillis partibusque anterioribus veluti punctis argenteis notatur. *Ventre* est lato, plano, candido, cuticula tantum tegitur. Capitur in Agatesi littore, in primis Caniculæ vigentis tempore. Venuetas & summum Dei in eo artificium pretium ei fecere. Carnis substantia Gobionibus parvis similis est, iisdem alimentis vescitur. Ictum minus venenatum habet.

Icon Dracunculi Tabula XIV. 2.

PUNCTUM IV.

De Uranoscopo.

PISCIS, quem *Uranoscopum* seu cœli speculatorem dicimus, Aristoteli, Dioscoridi, & Aeliano καὶ ὀφθαλμοῦ, Theodoro *pulcher* dicitur, nō tam ob corporis pulchritudinem, deformis enim est; quam vel quod Uranoscopi nomen sit pulchrū, & hominē quā pisce dignius; Massilienses *Tapecon* quod, cum pessi instar conformatus sit, aliquam cum pudendis similitudinem habeat; & *Raspecan*, quod caput ob asperitatem ad scalpenda pudenta muliebria accommodari possit vocant; Oppianus ἡμεροκόπον, quod interdū dormiat, noctūque vigilet, Hesychius & Varinus φαρμαδοτὴν seu Arenarium dixere, quidam Ἀγρον, id est, castum, Athenæo vocari credūt, sed mendum subesse putat Gesnerus. Piscis est levi cute, eaq; dura, & quæ facile excoriari potest, præditus corpore fere rotundo: *capite* magno osseoque & duobus aculeis ad caudam spectantibus aspero, quo Ranam pi-

TAB.
XXI. 7.
Arist. H. A.
I. 8. c. 13.
Ælian. H.
A. l. 13. c. 4.

Aetius l. 13.
c. 36.

Aldrov. de
Piscib. l. 2.
c. 50.

TAB.
XXI. 6.

scatricem quodammodo refert: ver-
rice admodum lato.

Roſtro quodammodo caret. *Os* alio
quam in aliis piſcibus fieri ſolet, lo-
co ſitum eſt, nimirum ſupra caput, &
(ut Oppianus ait) inter medios oc-
culos; eſtque magnum & valde pa-
tulum & inferiore maxilla ſuſum
maxime attrac̃ta clauditur. *Dentes*
habet exiguos, *linguam* brevem ſed
latam, quæ internas oris partes ita
occupat, ut niſi digito eam compri-
mas & ſubmoveas, non videantur.
Ex ea parte quæ inter linguam eſt,
& maxillam inferiorem oritur, teſte
Rondeletio, *membrana* in principio
latiuſcula, ſenſim in carnoſam rotū-
damque apophyſin deſinens, extra
os propendens qua piſciculos allicit,
allectos devorat. Eandem cum vult,
retrahit, & exerit, veluti ſerpens lin-
guam. Pars inter oculos interiaccens
depreſſa eſt & concava. *Branchiæ* u-
trimque quaternæ ſunt, quarum of-
ſea opercula, poſteriore parte acu-
leo robuſtiſſimo ad caudam ſpectan-
te horrent. Iuxta branchiarum ſciſ-
ſuram *pinnae* duæ magnæ & robuſtæ,
cræſſæ, & mucosæ & variæ exorin-
tur. Subſunt in parte ſupina duæ aliæ
minores, albæ, maxillæ inferiori
propinquæ. Haſ pinnaſ ſequitur os
veluti ſternum, quod tribus aculeis
horret. Succedit pinna alia à podice
ad caudam. In dorſo duæ ſunt, qua-
rum prior capiti propior parva eſt &
nigra, ut in Araneo: poſterior ad cau-
dam eandem uſque porrigitur, dorſo
concolor.

Cauda in pinnam latam deſinit,
Pavonis caudæ dum piſcis vivit, æ-
mulam, ſimbriæ purpuraſcunt, *Ven-*
ter eſt ſubalbidus: dorſum vero ac
partes reliquæ ex cineraceo fuſcæ
apparent, qui colores, dum vivit
manifeſti ſunt, alioqui una cum vita
pereunt.

A capite lineæ duæ ex ſquamulis
conſtantes ad caudam protendun-
tur. *Ventriculus* amplus eſt, craſ-
ſus & carnoſus, cum appendicibus
plurimis, *inteflina* ter revoluta, *he-*
par, candicans, à cuius exteriori par-
te fellis veſica pender, admodum
magna pro corporis ratione, felle

valde diſtenta, quod ſubſtantia &
colore oleum æmulatur: cuius rei
meminit Plinius, nulli piſcium hoc
copioſius eſſe ſcribens: citat autem
Menandri authoritatem in comœ-
diis, immemor fortaiſſis eiufdem mē-
tionem fieri ab Ariſtotele, qui nem-
pe Callionymo in iccore fel ineſſe
tradidit proportionem corporis om-
nium copioſum: addit Ælianus hunc
philoſophi locum recitans, jecur i-
pſum tradere ad dextrum latus col-
locatum eſſe Menandrumque, huic
rei teſtimonio eſſe in Meſenia, hiſ
verbis: *Facito te fel habere Callionymo*
copioſius: item Anaxippum in Epidi-
cazomeno dicentem, *niſi moveas &*
ſic ut Callionymi fervere efficias omne fel.
Lien exiguus, rotundus atque ru-
bens ventriculo hæret. *Vulva* bifida
eſt & longa.

Non multum excreſcit, & raro
pedalem longitudinem excedit. *Lit-*
toralem eſſe Ariſtoteles prodidit, poſt
eum Rondeletius, *Carne veſcitur*,
& piſciculis apophyſi illa quam ex-
tra propendere diximus, inſidias
ſtruit. Adnatant tanquam ad ver-
mem, & capiuntur. Si cibum capto
obieceris, eo uſque ſe infarcit, ut ci-
bus ad ipſum os redundet. Adeo vi-
vax eſt, ut ſi omnibus internis ſpoli-
es, moveatur adhuc. Comeditur
à plebeis, quia viroſi odoris eſt, unde
βαρύς gravis Diphilo apud Athenæū
vocatur. Nec mirum, cum cœnoſis
aquis veſcatur. Hippocrates ramen
non ſolum non improbat, ſed & in
victu præſcribit. Nonnulli felle oculoſ
Tobiæ curaros fuiſſe volunt. Ci-
catrices ſanare & carnes oculorum
ſupervacuas conſumere Plinius tra-
dit.

PUNCTUM V.

De Trachuro.

Τράχουρος ſeu ut Oppianus & Ga-
lenus ſcribunt *τραχούρος*, quo no-
mine apud Latinos veniat, ignora-
tur. Lacertum malè vocari vel exin-
de patet, quod iſte *κοιλιάς*, ſi pro pe-
culiari ſpecie accipias, vocatur. Ma-
lè & *σαύρον* dici Oppianus; qui tan-
quam

Ariſt. H. A.
l. 2. c. 15.

Ariſt. H. A.
l. 6.

Aldrov. Hi-
ſtor. Piſcium
l. 2. c. 51.

Hippocr. l.
de affect.
intern.

Tab.
XVII. 12.
Aldrov. de
Piſcib. l. 2.
c. 52.
Oppian.
Hal. l. 1. v.
106.

quam diversos pisces appellat, testatur. Forma eius nisi paulò longior esset, *ovata* dici posset. Cum enim eius medium corpus latiusculum sit, deinde utroque versùs arëatur, donec rostrum ore clauso, atque extrema pars caudæ carnea, acuetur. Inferior autem maxima, quæ superiore paulo longior est, cum os clauditur, non recta sed oblique sursum excurrit, unde os etiam non in longitudinem, sed in obliquum scissum est, dentibus adeo paucis & minutis munitum, ut edentulum videatur: revera tamen maxillarum pars denticulata est. Est autem ut Scombri admodum magnum: item oculis, ut in Melanuro. *Branchia* utrimque quaternæ. *Pinnis* natat quatuor, quarum duæ maiores ad branchias sitæ sunt, duæ aliæ minores in ventre: aliæ item duæ in dorso eriguntur; prior latior & brevior, in eminentiore dorso: altera paulo inferius arëtiore, sed longior, nam per dorsum reliquum fere usque etiam ad caudam porrigitur. *Podex* in medio ventre est, à quo alia denique pinna ad caudam usque demittitur. *Cauda* autem bifurca est, similis Acus vulgaris. In medio corpore *lineam* habet à capite ad caudam deductam, multis officulis, ita horridam, ut ferra esse videatur, non rectam quidem sed mediâ sui parte inflexam & obliquam, in cauda eminentiorem, asuperioremque quam in aliis partibus, quæque ob id *caudam quadratam* efficiat. Squammis caret, *levi* tantum cute præditus. Dorso subcæruleus, ventre verò & lateribus argenteus est, purpureoque aliquantulum ementitur, ut inde *αἰδοπύην*, id est, varium forte dixerit Numenius. Trachurus, cuius hic iconem damus, colore fere est albicante, aureis ubique lituris varius. Cauda ex violaceo fere ad cæruleum vergit. Ad pedalem magnitudinem perraro excrescit. Versantur circa littora. Numerosi omnibus anni temporibus seu nassis, quod veteribus apud Oppianum suetum, seu retibus quod hodie in usu capiuntur, ut inde gre-

gales esse coniciias, & Romæ *Fricturne* nomine venundantur. *Ælianus*, *Hist. Nat. 13. c. 27.* equam in utero habentem, si ei cauda Trachuri appendatur, piscis mox liber in mare dimittatur, non multò post arborum pati, prodidit, vere an falso non dicam. Inter duræ carnis pisces, à Philotimo censentur, ideo Diocles apud Athenæum aridos vocavit, nec dissentit experientia, nisi forte externa pinguedine, aut iusculò tener aut iurulentus fiat. *Æthensium* *Dipn. l. 7.* *Galen. de Alim. facult. l. 3. c. 31.*

PUNCTUM VI.

De Scombro.

Qui Græcis *σκόμβος*, is Latinis *Scomber* & *Scombrus*, *Horat. XXIV. 9.* *Piscis Iberus*, plerisque nationibus, *9. 18. 11.* *Macarel* & *Maquereau* non tam à Græco *μακρίλα*, quod Scaligero placet, hoc enim nomen is potius conveniret, qui veteribus *Opsophagis* *Dii* vocantur; quâ, leno, quâsi, quod verò tēpore parvas *Alaufas*, quas virgines dicunt, subinde subsequi solent, dicitur. *Corpore* est terete, denso, carnoso, utrimque in acutum desinente, *rostro* scilicet atque corporis extremo, cui cauda annectitur: & si parva magnis cōparare licet, *Thynn*o (ut *Scholias*tes *Aristophanis* scribit) similis. *Oris* scissura ingens pro corporis portione; *dentes* exigui; *caput* rotundum; inferior maxilla in superiorem recipitur, & clauditur pyxidis modo. *Oculi* magni, aureo colore micantes. *Branchia* utrimque quaternæ: juxta quas pinnæ binæ, totidemque in ventre. A *podice* alia est, eique supra posita in dorso similis: quas ordine certisque intervallis, aliquot aliæ pinnulæ subsequuntur, quod tamen huic soli proprium non est, sed cum *Thynnis*, *Pelamydibus* commune. Alia denique est in dorsi initio aculeis nonnullis horrida.

Cauda in lunatam pinnam degenerat. In ipsiis aquis sulphurei coloris est, extra non qui cæteris, (ut *Plinius* ait) sed ferè cærulei, sulphureum autem colorem quem intelligat, a-

lias

lias explicat, inquiens : Fulmina & fulgura, sulphuris odorem habent, ac lux ipsa eorum sulphurea est. Est vero cæruleus ille eorum color potissimum in dorso: nam venter lateraque argentea sunt. Totus lineis nigricantibus, obliquis, insignis est: squamisque caret, licet apud Athenæum squammatum esse quispiam velit, negandi vocula videlicet librariis omissa. Ad cubiti magnitudinem accedit. Sunt *mari peculiare*, & aliquando iuxta arenosa littora degunt, sæpe in petris, quæ chamis & patellis plenæ sunt. Et si autem tam in Oceano quam mari mediterraneo, sinu Adriatico, & Hellesponto, capiuntur: iuxta Herculis tamen insulas, prope Carthaginem novam tam copiosi & frequentes sunt, ut una earum Scombraria teste Strabone dicatur: In Oceano tanta crassitudine proficiunt, ut paricum Pelamydibus magnitudine, auctore Bellochio evadant, in Adriatico parvi sunt. Existimavit aliquis in minore maris ambitu frequentes prædas excerci, ideo non crescere. Vix ad Tergeste ac proximum sinum comparent Scombrarii: atque ilico capiuntur. In Oceani laxitate fuga moram, mora parit incrementum, ideo grandescunt quia non capiuntur. *Gregales* † sunt, & à locis † frigidioribus calidioribusque, tanquam Thunni, ut qui imbecilliores, dulcioris pabuli gratia, discedunt. *Beneficii* memores esse, Ælianum exemplo singulari, prodidit. Mane à piscatoribus cibati, ferarum Scombrorum gentiles suos cogunt, & corporum suorum abiectione ita concludunt, ut fuga sibi consulere non possint, hinc capiuntur. *Inserviunt & mensis*. Diphilus leves esse, & facile è stomacho descendere dixit. Hic cesius multum nutrire, minus verò facile excerni iudicavit viscosiores & crassiores, concoctu difficiles, & excrementitios esse, experientia eos docuit. Venetiis verno tempore quo pinguiores sunt, in delitiis habentur. Romæ ob siccitatem inter ignobiles reposuit. Quia graves & ventriculo refractarii, ταρχέουσι, id est, sale in-

Scaliger in
Exercit.

† Arist. H. A. l. 9. c. 2.
† Arist. H. A. l. 8. c. 12.
c. 13.
Plin. H. N. l. 9. c. 15.
Ælian. H. A. l. 14. c. 1.

veterari scripsit Athenæus, habenturque inter ταρχέουσι optimi. Veteres ex iis *garum* quoddam habebant, de quo ita Plinius. Est etiam numliquoris exquisiti genus, quod garum vocavere, intestinis piscium cæterisque, quæ obicienda essent, sale maceratis, ut sit illa putrescentiū sanies. Hoc olim conficiebatur è pisce quæ Græci Garum appellabant (ut supra ostendimus) Nunc è Scombro pisce laudatissimum in Carthaginis Spartariæ cæteriis: sociorum appellatur; singulisque millibus nummum permutantibus cōgios peno binos: Nec liquor ullus pene præter unguenta maiore in pretio esse cœpit, nobilitatis etiam gentibus. Scombrorum quidem & Mauritania, Bæticaque & Carteia ex Oceano intrantes capiunt, ad nihil aliud utiles: Laudantur & Clazomenæ garo, Pompeiique & Leptis, sicuti muria Antipolis ac Thurijs: jam vero & Dalmatia, Vitiū huius (garinempe, non muria, ut Rondeletius vult) est alex, imperfecta nec colata fæx. Cœpit tamen & privatim ex inutili piscicula, minimoque confici, Apuam nostri vocant: Foroiulienſes piscem ex quo faciunt Lupum (super quo nostrum iudiciū supra diximus) appellant. Transiit deinde in luxuriam, creveruntque genera ad infinitum: sicuti garum ad colorem mulsi veteris, adeoque dilutam suavitatē, ut bibi possit. Aliud vero ad castimoniarum superstitionem, etiam sacris Iudæis dictum, quod sit è piscibus squama carentibus (legendum apparet non carentibus, nam Iudæi hodieque nisi squammosos edunt, & non squamosis, abstinent, ut duo gari sint genera, unum è squamosis, ut ex Lupo sive Encrasicholo, Manag, & Smaride consimilibusque alterum ex lævi cute præditis, ut ex Scombris) hic lex pervenit ad ostrea, urticas, gammaros, Mullorum iecinora, innumerisque generibus ad saporem gulæ cœpit sal tabescere. Hæc obiter indicata sint desiderijs vitæ, & ipsa tamen nonnulla usus in medendo. Huius usus apud nos desit, apud Turcas Constantinopoli non item: quia pisces plærof-

Plin. H. N. l. 3. c. 8.

plerosque frixos vendunt, iis intestina & branchias eximunt, immituntque muria, ut in garum vertantur. Sociorum verò Garum vocatur, seu quod ganeones & lurcones eo sociatim uterentur, ut quidam Galeni scholiastes putat, seu quod à sociis populi Romani, Hispanis nempe deferretur. Fæcolum ac plane fœtidū fuisse, facillè Martialis indicavit, dum dicit

Vaguentum fuerat, quod Onyx modo parva gerebat,

Nunc postquam olfecit, Papilus, ecce garum est.

Ælian. H. 4. l. 12. c. 46. Plin. H. N. l. 32. c. 10. *Usum in Medicina si spectes, arquato morbo correptis comestos opiculari* *Ælianus scribit, in aceto putrefactos mulieres strangulatu oppressas excitare Plinius.*

PUNCTUM VII.

De Colia sive Lacerto.

TAB. XXVIII. 12. Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 45. Arist. H. A. l. 9. c. 2. l. 8. c. 13. Columell. R. R. l. 8. c. 13. Arist. H. A. l. 5. c. 9. Arist. H. A. l. 8. c. 13. Galen. l. Alim. facult. Martial. Epigr. l. 7. Athen. Dipnos. l. 3. **P**iscis quem *κολιας, κοιλιας, & κοχλιας* in vulgatis Aristotelis exemplaribus, seu a. pica varia, quam *κολιον* aut *κοιλιον* dici, nescio quo authore Bellonius credit, quod variegata latera habeat, unde *κολιόγαστρον* Athenæo, seu aliam ob causā vocatur. Theodoro *κολά*, seu *Monedula, & Graculus*, Latinis ut C. Celso, Columellæ, ac Martiali, *Lacertus* audit. Magnam eorum cum Scombris affinitatem esse, non tantum inde colligere licet, quod ab Aristotele & Columella semper simul nominentur: sed etiam quod Lemni incolæ magnitudine duntaxat à Scōbris differre asseruerint, & Plinius Coliam Lacertorum minimum faciat, quod & apud Athenæum, qui Sardam Coliæ magnitudine esse scribit, habemus. Pariunt semel † anno. In cibis laudantur, qui in Propontide † antequam pariant, Amyclani, Hispani; quos † Sexetanos (Sexi authore Plinio, Beticæ Hispaniæ oppidum est) Martialis vocat, ex quibus forte Salfamentum. Gaditanum, cuius apud Hippocratem mentio, & Parij seu Pariani, unde Parium apud Archestratum nutrix Coliarum dicitur. De Carnis qualitate non conveniunt Authores. Xenocrati est

stomacho ingrata, arida, mali succi, excretu facilis, & copiosè nutriens. Athenæo glutinosa, acris, mordax, & deterioris succi. Cornelio Celso, gravissimi alimēti. Saliri solitas apud Martialem invenies. Muria ad dentium dolores Medici utuntur. Patenam ex Lacertis apud Apicium vide.

PUNCTUM VIII.

De Sauro.

Quem Saurum Græci vocāt, hunc *TAB. plerique Latini Lacertum* vocant, XXI. 13. A Trachuro distingui vel exinde patet, quod & Oppianus de Trachuro Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 55. & Sauro tanquā de diversis piscibus agat; & Speusippus apud Athenæum Acui & Sphyrænæ similem esse, quod Trachuro non convenit, scribat. *Duo* eius esse genera Ælianus tradit, videlicet *nostras*, & *peregrinum*, in rubro mari nascens: *Nostras* caput habet *Ælian. H. A. l. 2. c. 25.* (inquit Salvianus) tenue & rotundum; rostrum oblongum, & acutum. Os magnum plurimis atque exiguis dentibus munitum: *Oculos* mediocres, rotundos & aureos: *Branchias* utrimque quaternas: prope quas binæ & parvæ sunt *pinnae*, utrimque scilicet una: aliæ duæ & maiores in ventre; in medio dorso una haud magna quinis senisve aculeis horrida erigitur, aliaque una multo minor in medio dorso caudæ vicina reperitur: è cuius regione abano, qui in hoc pisce caudæ satis proximus est, alio paulò maiorimo ventri hæret. *Cauda* in unam lunatam pinnam degenerat. Corpus oblongum est & rotundum. Unde non ineptè à Speusippo in secundo similiū, Sphyræna, Acus & Saurus similes esse dicantur. Sphyrænæ enim satis similis est hic noster Saurus: similis & Acui, si Acus illam rostri dempseris tenuitatem. *Ventre* est subalbido, lateribus luteis, dorso ex viridi nigricante, maculis quam plurimis virentibus, rubeis, cæruleis, luteis atque nigricantibus, dorsum, caput, & latera, nonnullorum serpentum instar, variè admodum pingentibus: *Quamobrem* non solum ore, rostro, capite, atque reliqua corporis figura, sed colorum et-

iam varietate proximè adeò ad terrestres Lacerti accedit similitudinè, ut ei simillimus, si pedes exceperis, videri possit. Ventriculum habet oblongum & satis magnum: appendices non multos: intestina media: hepar bifidum, & subrubeum: Lienem subatrum. Pedali mensura maiorem adhuc non vidimus. Ab hoc nostro Sauro aliquantulum diversus est, qui in rubro mari reperitur, quem his verbis describit Ælianus: Rubri maris Saurus (interpres reddit Lacertum) est, cuius magnitudo ei qui nascitur apud nos, æqualis est virgatus, spectatur, lineis nimirum aureolis circumdatur à branchiis ad caudam pertinentibus, quas media argentea distinguunt: ore est hiante, maxilla inferior eminet in superiorem, virides oculos habet, quos aureo fulgore palpebræ ambiunt. Ab hac delineatione non omnino abhorret peregrinus iste piscis, supinè subviridis, prone castaneus, lineis si velituris, maculisque orbicularibus subviridibus decoratus. Rictum oris habet maximum, Lacertorum terrestrium plane æmulum, & validissimis dentibus instructum. Branchiarum opercula flavescunt, punctis referta ferrugineis. Pinna tergoris & branchiarum, & cauda ex ferrugineo rubent. Quæ vero in ventre sunt, eiusdem fere cum ventre sunt coloris. In mari vivit, & cœnosis locis delectatur. Carne vescitur, nec à putridis abstinet. Aristoteles inter gregales reposuit: sed cum in mari mediterraneo singuli capiantur, solivagos melius dixeris, tam raro capiuntur, ut vix annis singulis Romæ in foro piscario bis deni capti videantur. Inter pisces molli carne præditos Philotimus reposuit: inter molles & duræ medium, Galenus. Editur assus & frigus. Alexis apud Athenæum, branchiis exemptis, cæsis spinis, lotum atque incisum, & laesere probè pulsatum, caseo, sale, & origano implendum esse docet.

Athen.
Dysnops.
l. 7.

Ælian. H.
A. l. II. c.
49.

† Oppian.
Halieut.
l. 2.

Galen. A-
lim. facult.
l. 3.

PUNCTUM IX.

De Corace Rondeletij, Mil-
vo ejusdem, & Boopis
rara specie.



CORAX Rondeletij, Romæ no- TAB.
mine cum Lyra communi, Ca- XXII. l. 2.
pone vulgò à capitis magnitudine di- Aldrov. de
citur. Piscis est marinus, corporis Piscib. l.
forma Milvo Rondeletij similis, a- 2. c. 56.
culeorum pinnarumque magnitu-
dine discrepans, ossa, branchias inte-
gentia, cæolata, in aculeos desinunt.
Pinna quæ ad branchias, minores
quàm in Hirundine Rondeletij, majores
quàm in Milvo sunt, ex viridi nigricantes
parte interiore, exteriori albescunt,
cum maculis rubescentibus. Dorsum
ex cæruleo nigricat, latera rubescunt,
Venter lactei est coloris. Caput est ma-
gnum: locus inter oculos cælatus. In
dorso virgas ex officulis contextas,
instar Cuculi habet: in eodem pin-
nas duas: prior est brevior, cum a-
culeis longioribus, acutioribusque, po-
sterior longior, cum longè minoribus
aculeis. Linea simplex à capite ad
caudam ducta est. Palato minus est
flavo quam Milvus. Ventriculum par-
vum habet cum multis appendicibus,
intestina tenuia, hepar ex albo rube-
scens. Carne est, si Athenæum sequi-
mur, durior: si Celsum, tenerior, dura
tamen. MILVUS Rondeletij, Aldrov. de
qui Gallis Lucerna, quod noctu luce- Piscib. l. 2.
at, piscis est marinus corporis forma c. 57.
Corvo per similes, corpore magis ru-
bro, capite minus lato, utrinque com-
presso. Pinnarum numero caudaque
similis, magnitudine & colore dissi-
dens. Quantum ad colorem attinet,
parti pinnarum quæ ad branchias
sunt externæ, nullæ maculæ rubræ
insunt: interna ex viridi non nigri-
cat, sed pinnæ istæ partim flavescunt,
partim nigricant. Linea à bran-
chiis ad caudam ducta simplex non
est, neque lævis ut in corvo: sed ex
acutis brevibusque aculeis horret.
Non squamis, sed cute aspera con-
tegitur. Partibus internis Multo im-
berbi

Corax seu Coriux

Meer Rapp.

Milvus alius


Fliegender. Roffisch. Tab XXII



Milvus


3

Fliegender Fische



Milvus alatus


geflogelter fisch.



Milvus


Schwabfisch.

4



Boops


Glatte Houtink.



Pajser

Blatteis. Meer-butte.


7



Pajser alius

8


Meer Butten ander geschlecht.



Rhombus

10


Platteis. oder Meer-butte.



Pajser


9

Blattfische 3 geschlecht



Rhombus alius

11




Rhombus Lævis uerus.

Glat butte.


Rhombus aculeatus.

Platteis. dornbutte

12



13





berbi similis. Palatum parvum flavum est. Carne est dura & sicca.

TAB. XIX. 6. Boopis species ita à Rondeletio describitur, Rarus est piscis, cuius nomen neque à piscatoribus nostris neque ab aliis potui unquam extorquere propter raritatem. Palmi maioris est longitudine, totus à squamis nudus, ore parvo, oculis valde magnis pro corporis ratione; in pronis partibus pinnam habet ad caudam usque continuam, cauda laeta spissaque est. Ad branchias & in ventre binas pinnas habet. Sapore, carnis substantia, oculis Boopem refert.

ARTICVLVS II.

De Piscibus littoralibus lævibus planis.

PUNCTUM I.

De Passere lævi.

TAB. XXI. 7. Passer lævis, Aufonio Plateffa, alijs *Pecten*, quod eius pinnæ rectæ & parallelæ pectinis speciem præ se ferant, Hollandis Schølle, dicitur. Bina eorum apud Gallos genera. Vnum, quod communiter *Plya* vocatur, & magnitudine excellit. Alterum, quod alibi Cariet, alibi à quadrata corporis figura Quarrelet, *Quadratum* nomen sortitum est. Etate tantummodo differre, à quibusdam proditum; ex corporis forma, quæ Quadratulo magis quadrata, & pluribus maculis ruffis sive subflavis, ostendit Rondeletius. A Rhombis situ differunt. Si hos ita in latus componas, ut oculi in cælum suspiciant, & mentum deorsum versus spectet, pars supina erit dextra, si Passerem similiter constituas, supina pars erit læva. Ita *marinus* est, ut & dulcium quoque aquarum sit studiosissimus: In Oceano tamen numerosior quam alibi reperitur. Iuxta Livoniam sunt pinguiissimi, & inde vento indurati ad mediterranea exportantur. Saxatilibus Mnesitheus accenser. Ovidius in herbosis. Oppianus ἐν πηλοῖσι καὶ ἐν τεγανίσι degere credit. Vadum,

ubi piscatorem sensit petere, terræ adhærescere, aquam, ne videatur, turbare, Alberti M. fide habemus. Carnem eius mollem Philotimus dixit, sicciorē Diocles, duram & probi succi Xenocrates, mediam Galenus. Optimi marini, qui etiam nigriores, secundum qui in stagnis albidiores & lutum resipiscentes, locum fortiuntur, molliissimi & insipidi, qui in fluvijis vixere. Nonnulli in cibum, cum iam putrescere, & malè olere incipiunt sumptos, alvum perturbare asserunt.

Gesner. de Aquatilib.

PUNCTUM II.

De Rhombo.

Rhombus piscis, à figura quadrata, cuius latera omnia sunt æqualia, anguli verò obliqui, nomen sortitus est. Nonnullis *ψῆτλα* dicitur, ut ex Plinio & Athenæo, qui Romanis Rhombum vocari testatur Græco nomine piscem, qui aliis Græcis *ψῆτλα* nuncupatur, colligimus. Duo sunt ipsius genera, *Aculeatum* unum, *læve* alterum. Illud prona parte multos habet aculeos, circa caput, quod grandius & elatum est, & ab hoc caudam versus maximè. Magni in Oceano & mari mediterraneo capiuntur, ideo forte Rhombus latior est patella Martiali Rondeletius vidit, qui quinque cubitos longus erat, latus quatuor, spissus pedem. Optimos Adriaticus sinus maximè circa Ravennam alit, & hos veterum exornasse mensas arbitratur Platina. Celebrantur & Attici circa Eleusyniam, quos Lynceus Samius Psettarum nomine dignatus est. Ei qui *verus esse* putatur, pinnæ & cauda in extrema rubescunt, cætera est unicolor, subviridis, rotundis punctis stellulisque undique plenus. Omnium locorum & temporum piscis est. Ovidius in herba algosa, Iovius circa pinguiorem terram extremosque littorum margines versari scribit, in fluviorum ostiis frequentissime piscibus insidiantur. Voraces sunt, & piscium, cancrorum inprimis avidissimi. Abditi

TAB. XXII. 10. 11. 12. 13. Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 48.

† Plin. H.
N. l. 9. c.
42.

† pinnae exertas movent, specie vermiculorum. Terra, seu vado maris per hyemem condi, à Plinio sub nomine psettae proditum. Tardissime propter corporis latitudinem moventur. Inter delicatissimos olim fuisse cibos, ex Horatio, & Iuvenali potest colligi. Tempore Iovij, *Aquazilem Phasianum* quidam appellare erat solitus. Galenus inter pisces mollicarnes retulit, sed aliter Xenocrati, & Villanovano visum. Ille duræ esse carnis, & difficulter concoqui ait. Hic inter crassos viscidos excrementitios, reposuit: nisi forte superiores de lævi, cuius pulpa candida & pressa quodam humore succulenta; hos de aculeato, qui revera durior; locuti sint. Vivus impositus medetur lieni, si remittatur in mare, si Plinio credendum.



HISTORIÆ PISCIVM

LIBER II

*De Piscibus, qui in mari
& fluminibus degunt.*

TITULUS I

De Squamosis.

CAPUT I

De Salmone.

TAB.
XXXI. 12.



ISCIVM, qui in mari æque ac fluminibus degunt, alij quam longissime à mari recurrunt, & ad fluviorum origines usque penetrant, alij in marium proximis morantes, mox ad id regrediuntur. Utrorumque qui-

dam sunt *squamosi*, alij *Læves*. Ex illis sunt *Salmo*, *Lupus*, *Latus*, *Alosa*, *Ziga*, *Albis fluvij*, *Mugil*, *Capito* *Anadromus* *Gesneri*, *Caper*, *Sturio*, *Galeus* *Rhodius*, & *Cataphractus*.

SALMONIS solus inter veteres Plin. H. N. Plinius mentionem facit. Aufonius l. 9. c. 18. hoc nomen adultæ ætatis ut Sario- nis seu quod melius Farionis mediæ, & Salaris primæ imposuit, illud tamen Truttae convenit. Circa Rhenum & apud Helvetios ætatis tempore ad Iacobi usque festum vocatur, *Salm*/ inde ob festum Andreae Lachsi *Lachs*/ nomine gaudet. Cum *Essoce* Plinij eundem, quod Georgio Agricola placet, vix credo, cum alibi eum suo nomine appellet, & per *Essocem* Lucium intelligere videatur. An *Anchorago Cassiodori*, difficile dictu, nam à Rheno duntaxat venire scribit. Apud Græcos nullum invenio nomen, qui aut *Salangem*, cuius piscis tanquam delicati mentionem facit Helychius aut *κατανάδρον* vocari posse putant, suo iudicio fruantur. *Descriptionem* si spectes. Piscis est sat magnus, Bicubitalis quidem ut plurimum est: apud Missenos tamen & Dessavia à XXIV. libris ad XXXVI. accedit, in Helvetia circa Tigurum graviores capiuntur. Basilea quinque aut sex pedes longos dat, nec temerè Cetaceum piscem dici posse Bellonius reliquit. *Squamis* tegitur exiguis, & maculis ita notatus, ut totus ferè piscis subrufis & luteis notis insignis videatur, quia verè in capite ijs caret, ideo *frontem lubricum* Poëta dixit. Os habet amplum, & valde denticulatum; nam præter id quod maxillæ magnis & validis armatæ sunt dentibus, palatum etiam quadruplici eorundem ordine munitur, linguaque hamatis dentibus horret. Hunc quadruplicem dentiū ordinem Bellonius huic pisci præter aliorum fluviatilium morem, peculiarem esse ait, & cum cerasse serpente communem: additque plures esse in inferiori maxilla, quam in superiori. *Tergus* colore fere est cæruleo, aut ex cæruleo nigricat. *Oculi* magni sunt. *Narium* foramina utrimque gemina:

Cassiodor.
l. 12. Ep. 4.

mina : *Branchia* utrinque quaternæ, quarum opercula lata, & rotundis puniceis maculis plena sunt. *Pinnæ* juxta easdem binæ, rotidemque in dorso, quarum prior in medio fere dorso est, altera caudæ proxima, cutacea, carnosaq;. In *ventre* tres sunt, binæ fere in medio, tertia à podice qui in imo ventre est. *Caudam* in unam latam, & rotundiusculam pinnam definire Salvianus ait, Rondeletius verò bifidam esse testatur, indeque Salmonem jure *ματιςγον* nominari posse putat. Quoad *internas partes*, *Cor* angulatum est, ventriculus oblongus & angustus : hepar in nullos lobos divisum : rubrum Rondeletius tradit, Salvianus & Bellonius pallefcere dixerunt : huic vesicula fellis ex viridi nigricantis annexa est, *Splen* ex rubro nigricat. Alvus ipsi prodiga nutat, & opinato abdomine fluit venter. Gesnerus à faucibus patulis *duos* se observasse *meatus* scribit, deorsum protensos, unum ad ventriculum, quem œsophagum vocant; alterum anonymum, (cuius usum ignorat, quandoquidem nihil in eo reperit, nisi forte ruminat (inquit) hic piscis & alimenti sui partem ibi repositam habet) qui cute candida & tenui constat. De *Maris & fœminæ* differentia ita Aldrovandus. Fœminam à mare differre Rondeletius & Salvianus volunt, quod illa rostrum habeat magis aduncum, hami modò, indeque vulgo in Gallia Beccard appellari. Bellonius verò dum dubitat, num sit diversæ species: fœminam esse interea insinuat, inquiens: Est & alius prægrandis Salmo (fœminam esse autumant) quem vulgus Gallicum ab eius ore prægrandi Beccard vocare solet: alii à ferendis ovib; *Bortiere* (Portiere forte nimirum à portando.) Differtis à mare Salmone, quod labrum inferius in hami modum aduncum habeat. In superiore enim labro foramen est ad palatum tendens, in quod hamus maxillæ inferioris sercipit, pixidatimque in tubi modum insinuat. Alii aliter de hac rostri curvitate sentiunt. Gesnerus testatur suos piscatores in mare tantum

incurvari insigniter; in fœminâ parum. Rondeletius quoque mari recurvum esse ait, sed fœminæ magis. Quidam vero eruditus in epist. ad Gesnerum, in qua de Albis fluvii piscibus ad ipsum scribit utrumque sexum id ceu quid præter naturam pati arbitratus inquit: Salmo in Mil-da (hoc flumen ex Albi ingressus) si obstaculum seu præcipitium aquæ juxta Dessaviam, secundo ac tertio frustra saltu superare conatus fuerit, vadum petit, eoque in loco sub lapidibus & saxis delitescens, emaciatur, & contabescens maculis ruffi seu ænei coloris impletur & rostrum inflectit in magnum hamum, eo quidem maiorem quo diutius manserit. Verumtamen credit vir ille doctus idem ei tandem contingere, etiam si obstaculis omnibus superatis ad summas fluviorum partes eluctatus fuerit. Ex rostri itaque curvitate sexus non satis turò distinguetur, tutissime vero ex ovib;. Addit Bellonius fœminam crebrioribus mare, iisque subrubris & ruffis orbiculis in cute variegari: atque in Lepradis (de quo suo loco diximus) modum multis coloribus sugillari. *Marinus* magis quàm fluviatilis piscis est. Nam & in iis duntaxat fluminibus quæ in mare se exonerant reperitur: & observatione notum est, si supra annum in eis perseveraverint, insipidos fieri; si diutius, post annum secundum ceu fideratos interire. Observatus in Albi adeò tabidus, ut exanguis & nullis ferè intestinis appareret; nati verò ex eo pisciculi, nec longiores nec crassiores digito evasere, quamdiu ibi vel juxta stagnantibus aquis immorabantur. Uberrima eorum in Bothnico mari versus Lappones captura, circa solstitium in extremis littoribus circa Thornam tanta magnitudo capitur, ut fortissima retia pondere suo rumpant. Apud Vestrogothos quoque, in provincia Vermlandia, in qua dulcium aquarum locus certum millibus passuum in longitudine, & quadraginta latitudine patet, magna Salmonum est copia.

In Albi quoque Vistula, Duna,

N 3 Multa-

Rondelet.
de Piscib.
l. 22. c. 17.

Multavia, Sala, & Milda apud Misenos habentur. Rhenus & Mosella gratissimos alunt. Minus commendati quos Scaldis, Thamesis, Garumna, Sequana, & Ligeris exceperunt. In Rhodano qui capi existimant, falluntur. Hoc præter Rondeletium & Scaliger pater prodidit. In Occidentalis quoque Indiæ fluminibus numerosissimi capiuntur. *Cibum* ipsi Salvianus pisciculos tribuit. Alii ante XXV. Iulii pediculis aquaticis vesci, à partu obvios pisciculos comedere, eosdemque in ventre repertos, prodidere. Nonnullis in dissecito spissus quidam humor, subflavus, & lapillus candidus, visus. Quidam in maioribus nihil unquam, in parvis nescio quid reperiri tradunt, illos sola aqua turbidiore visitare opinantur. *Vitæ* est tenacissima, sub uno corde pulsante, recenter captorum indicio, plures in frusta disseciti à piscatoribus venduntur. Robertus verò Constantinus, exenterati, aquosa sanie aspersum, ultra diem vivere vidit. De *Partu* proditum, per autumnum & hyemem, ad veris interdum initia, in fluviis, & minoribus rivis lubentius parere. An & in Oceano nemo tradidit. Scrobis excavatur. Ova pisorum magnitudine foemina ponit: mas rore genitali irrigat. Ova paulatim augescunt, & spiritu vitali inflata, ultro per aquam deferuntur, & Salmulos producant. Salmulos mares aliquando genitura plenos reperiri, & cum foeminis adultis coire, eorumque ovarigare, cum in Salmulis foeminis nulla ova reperiantur, admiratione dignum est. De eorum *Saltu* ita Gesnerus. Mildam flumen præ cæteris diligit Salmo, & (ut quidam putant) ab aqua Albis fluvii qua cum permixta in mare se exonerat, discernit. Itaque plurimi eo in loco, ubi in Mildam in Albim influit (Deffaviam vocant, quod oppidum est principum Anhaltinorum) capiuntur, hoc modo. Ad Mildam in Albim ingressum principes vallum sive obstaculum quoddam excitant, ut ita redundans aqua ad molendina revertere-

tur, octo cubitis aliquando altius vallo graves & magnas arbores imposuerunt, & perticis magnis intus cancellarunt, ne Salmo transiliat. Inter perticas alicubi nassæ sunt collocatæ. Hunc locum cum attigerit Salmo, qui per Albim ascendit, saltu adversus aquæ præcipitium se proripit in altum, ubi vel in nassam incidit, & capitur, vel arborem perticasve contigit, indeque violenter in Mildam se trajicit. Hoc si prima vice non successerit, secundo etiam tertioque experitur, & si ne tum quidem transilire aut assequi altitudinem valli poterit, vadum petit, inibique sub laxis delitescens emaciatur ac contabescit. Si tamen flumen Albis augeatur & crescat, adversus illud subinde fontium & originis cupidus ascendit, parit, & consumptus tandem macie ac siccitate moritur. Ad eò verò natus huic pisci saltus est: ut Salmunculi etiam, si in vase aliquo venales cum aliis permixti in aqua fuerint, aqua eis adempta exiliant, unde & ab aliis piscibus dignoscuntur. Alii saltus causam in Robur, quidam in Hirudines, à quibus mense Iunio & Iulio infestantur, nonnulli in loca abrupta conscendendi libidinem, conjiciunt, quod apud Hectorem Boethium invenies. Singularem *in cibis* habent gratiam, ita ut omnibus piscibus præferantur, suavitatem si spectes. Habenda tamen ætatis, loci, & temporis anni ratio est. Salmunculi, qui sex vel septem digitos non excedunt, Aprili & Maio in deliciis habentur: adulti, tenuiores in fluviis evadunt, si ea non longè subiere. Moderati tum exerciti, si longius progressi sunt, nimio labore tabescunt. Plinius Aquitanicis palmam derulit, *Plin. H.N. l. 9. c. 18.* Rhenanis Albertus, qui mense Maio suavissimè eduntur. Miseni post Pentecosten placent. Partui vicini, cum & rostrum curvatur, & maculas ærei coloris gerunt, damnatur. Salitos & infumatos bona Europæ pars distrahit.

N. Icon. Salmonis Salviani ad Tab. 31.

CAPVT II.

De Lupo & Lato.

TAB.
XXIII.3. 4.
Aldrov. de
Piscib. l. 4.
c. 2.Aldrovand.
de Piscibus
l. 4. c. 2.
Athen. Di-
gnos. l. 7.

Quem Latine à voracitate *Lupum* vocant, Lucill. Catillonē vocavit, is Græcis *λάβραξ*, aut *λαβρα* τὴν λαβρα-
ται, ut Athenæus author est, ab ipsa
vehementia: aut quasi *λίανθρος*, val-
de vorax, ut Eustathio placet, vel *λαβ-
ρα* πὲρ χύων αὐτὸ τὸ φόβος, καὶ ἀθρόως καὶ ἐν χύρῳ
ἀλίσκειται, quod illi os hiet, & repente cum-
que impetu auide voret, ut Suidas vult,
dicitur. Nec *Lucium* esse, quod Phi-
lelphus voluit, quod hic in fluviis
& lacubus degat; nec *Sturionem*, quod
Volaterraneus & Poggius Florenti-
nus tradidere, quod hic squamis ca-
reat, nec carnivorus sit; nec *Lacciam*
seu *Chiepan*, quod hæc dentibus de-
stituatur, certum est. Piscis est squa-
mosus, squammæ argenteæ sunt, me-
diocres, & serratæ, quæque carni &
inter se validissimè coherent. *Rostrum*
habet oblongiusculum, *Os* cum hiat
valde patulum. *Linguam* oblongam, si
Athenæo ex Aristotele fides, ossileam,
& adhærentem. De *dentibus* non con-
veniunt scriptores. Carere *Massa-
rius*, & *Rondeletius*, quod ob oris
magnitudinem facilè prædam devo-
ret, tradiderunt; tenues confuso or-
dine undecunque Bellonius posuit,
plurimos, tenuissimos, multiplici ac
vario ordine dispositos, pectinum in-
star, quibus lanarii utuntur, *Salvia-
nus*, *Oculi* sunt magni. *Branchiæ* utrim-
que quaternæ. Harum operculum
duobus ossibus constat, quorum su-
perius postrema sui parte squamatim
committitur. A summis brachiis per
utrumq; latus linea fere recta ad cau-
dam ducitur. *Pinnas* Aristotele teste,
binas habet parte prona, totidemque
supina. Quæ prona parte capiti pro-
xima est, octo vel novem acutis & in-
æqualibus aculeis tenui membrana
colligatis horret: altera unico tantū.
Contra supina parte caudæ vicina a-
culeos habet ternos. *Cauda* in unicam
pinnam degenerat. In parvulo, ut di-
ximus, nigræ apparent *maculæ*, quæ in
paullo adultiore prorsus delitescunt,
Grandiusculus enim argenteus est,
dorso tamen paullo minus quam vē-

tre cādido. Locus etiā *colorem* mutat,
nam qui in mari capitur, ex caruleo
candicat, in ostiis fluviorum, totus al-
bus est. *Carnem* habet secundū Ioviū
lacteā, secundum Bellonium rube-
scentē, seu is diversæ speciei, sive O-
ceanus aliquid mutat. *Cor* triquetrū,
ut Athenæus ait: *ventriculū* amplū,
& longum: appendices binas maximè
conspicuas, *jecur* subflavum, in duos
lobos divisum, quorum dextro fellis
vesica committitur; *Lienem* rubrum
& longum, *intestina* lata nec multis
complicata anfractibus: *folliculū* plu-
rimo aere tumidum, spinæ dorsī vali-
dissimè annexum. Bellonius è pusillo
magnum ac cetaceum, Salmonis mo-
re evadere solere testatur, ut ex O-
ceano libras quindecim non nunquā
pendere visus sit. *Salvianus* ad viginti
libras, aliquādo excrescere observa-
vit. Quomodo *Columella* quosdā si-
ne macula, varios alios faciat; & quid
Plinius persuum *Lanarū*, intelligat,
facilè huc colligi potest. Ita marinū
esse piscem, ut & *λινοβαλιδας*, & ostia
fluviorum nō refugiat, *Galenus* præ-
ter *Oppianum* author est. Sed & in
dulcibus, *Letho* nempe *Lybiæ* circa
Berenicē fluvio nasci, Athenæus me-
morat: nihil de *Columella*, qui *Veli-
num*, *Sabatinum*, *Vulsinēsem*, & *Ci-
minum*, eosdem procreare innuere
videtur, dicā: secus n. in sequenti sen-
tire creditur capite. In dulci portu
quē *Phanarium* vocant, longè maio-
res vulgaribus reperias, apud *Miletū*
quoq; prægrandes & plurimos, ut a-
pud *Aristophanis* *Scholiastē* & *Suidā*
legimus. *Archestratus* apud Athe-
nāū *θεοπαίδας* vocavit. Solet & mediæ
cryptum penetrare saburræ. Qui in
fluviis capitur. *Lanei* à *Martiale* nomē
accepit, & expressè de iis *Plinius*. In
Lupis in amne capti præferuntur. In
Tyberiamne inter duos pontes tanti
precii, ut *Philippus*, apud hospitem
Cassino in oppido, authore *Colu-
mella* *Lupum* sibi in cœna appositum
gustabundus expuerit, dicens, *Per-
eam* nisi piscem putavi: quasi in-
nueret, solos Tyberinos lupos pi-
scis nomine dignos esse. *Lucillius*
isti Catillonis quasi Catillorum li-
guri-

Columell.
R.R. l. 18.
c. 17.
Plin. H.N.
l. 9. c. 17.
*Galen. A-
lim. l. 3.*
Oppian.
Halieut. l. 1
Columell.
R.R. l. 8.
c. 16.

Colum. R.R.
l. 8. c. 16.
Varro R. R.
l. 3. c. 3.

guratoris nomen, teste Macrobio, imposuit. Solent enim cloacas subire, & obvia quæque devorare. In India exundantibus in agros fluviis, † in planis camporum vagantur, & ab aqua destituti prædæ sunt. *Vescitur* carnibus præcipuè, nec piscibus, vel corruptissimis escis parcat. In exenterati ventre serpens aliquando inventus est. Tangit & † algam, & stercorea: *Ἀλγίμων Ἰχθύς* Oppianus vocat. Iis maximè locis † qua flumina in mare exeunt, ova parit ætate † & hyeme, ideo alicubi bis † idque inter fusaneos solus facere creditur, sed posterior partus infirmiorum. Sublimes natant. Athenæo sunt *μυρίγεις* folivagi, Aristoteli *χύμι*, fusiles seu fusanci. Mugilum, Luporumque capturam uno retis jactu centum aureis coronis venisse, Rondeletius oculatus testis est. *Solertia & ingenio* non destitui, docilesque sequentia docebunt. Rete circumdati harenas arant cauda, atque ita conditum transeunt rete. Et quamvis minus in providendo solertiæ quàm mugiles habeant; magnum tamen robur in pœnitendo habent. Nam ut hædere in hamo, laxant vulnera, donec excidant infidiæ, quod præter Plinium, Oppianus, Ovidius & Plutarchus tradidere. In Eloro amne tã mansuetos esse, ut è manibus porrigentium cibum capiant, Nymphodorus author est. Et quia lapidem in capite hyeme sibi infensissimum se habere sentiunt; id eò in abditos se tum gurgites demergunt, qui in sublimi natant, frigore congelati moriuntur. Cur inter alios pisces cum Mugile, Salpa & Chromide *clarissime audire*, post Aristotelem Plinius scribat, & in vado vivere addat, nescio, nisi fortè sublimem natatum in causa ponat. *Capiuntur* sæpe numero dormientes fuscina. *Inimicitias* cum Mugile & Squillis gerunt. Caudam illi prærodere Nigidius apud Plinium author est. Pugnantes invicem sæpe Puteolis, præfente Bessarione, Perottus vidit. Statis tamen mensibus concordēs sunt, & in unum gregem, si abundè cibarii, coeunt. Ab his cornu quod fronte exit, punctus

interimitur, quem Oppianus & *Ælian*us describere: Magni olim apud Romanos Opfophagos æstimii erant. Plinius post Elopen & Acipenserem præcipuam iis & Afellis auctoritatem tradit. Arcestratus Milesium *θεόπειδα* & quidem *ἰχθὺς τὸ πολύπυμον* vocat, & Tripatinum summam cœnarum luxuriam ingrediebatur. Sed maximi, lactes, cerebrum & epar fiebant. Illo Eliogabalus rusticos in mediterraneis pavit. Huius gratia, Hermaus Ægyptius piscium institor, non nisi exenteratum vendebat. *Carnis qualitas* non nisi loci, temporis, & Ætatis ratione habita, definiri potest. *Locus* si spectetur, in mari puro qui sunt, boni sunt Hicesio succi, sed pauci nutrimenti, † sanguinem consistentia tenuiorem gignunt, & diutissimè citra putredinem, inprimis si nive circumdantur, servantur. Inter duos pontes Romæ capti, ob vitiosam aquam, graviter olent, & facillè putredinem concipiunt. Illaudati, qui in piscinis habentur. *Tempus* si respicias, deteriores sunt dum in utero habent: summa hyeme & Ianuario captis gratia, nisi fortè nimio exercitio soliditatem carnis acquisiverint, *Lanatas* Plinius dixit, si ventrem attenderis, quo mollitie & pinguedine blandiuntur. *Ætatis* ratione, tenelli suaves & stomacho grati sunt, copiosè nutriunt, & facillè per corpus descendunt: mediocres optimo se commendant callo. Apparatum alibi vide. *Ægris* in albo jure aut ex aceto optimè elixantur. An quod *περὶ μολόγοι*, à Pythagora reiecti fuerint, dubito. Plutarchus certè postquam sic sentientium sententiam exposuisset, patrocinari ipsis videtur. *De usu in Medicina* pauca occurrunt. Tantæ est, si Marcello credimus, adversus strumas efficaciam, ut ad quamlibet corporis partem ad motus, earum vitium perfanet. Lapilli capitis dolorem levare, Euporistæ author tradidit.

LATVS, inter Nili pisces à Strabo bonè numeratur. Esse & marinum *Geogr. l. 13.* Arcestratus apud Athenæum prodidit. Candidissimus est, ducentarum sæpe librarum magnitudine, & quo-

Juven. Satyra 5.
† *Ælian*. H. A. l. 16. c. 12

† *Arist.* H. A. l. 5. c. 10.
† *Aristot.* H. A. l. 6. c. 17.
Idem l. 5. c. 9.
Plin. H. N. l. 9. c. 51.
Aristot. H. A. l. 5. c. 2.
Plin. H. N. l. 32. c. 2.
Oppian. *Halicut.* l. *Plutarch.* l. *utra animal.*

† *Galen.* de *Alim. facult.* l. 3.

Aristot. H. A. l. 3.
Plin. H. N. l. 9. c. 70.
Plin. H. N. l. 9. c. 62.

Strabo *Geogr. l. 13.*

quovis modò paratus suavissimus. Rondeletius pro eo, Coracino ac Umbræ simillimum substituit Tarentinus *Latili* piscis meminit.

CAPVT III.

De *Alosa*, & *Ziga Albis*
fluvii.

TAB. XXVII. **A** *Losa* nomen, huic de quo jam aucturi sumus pisci, post Strabonē Aufonius ex vulgari imposuit, Gregorius Tiphernas in Strabone, & Theodorus Gaza in Aristotele, *Θελόσαν*, quam moderni Græci *φελόσαν*, fortè quod spinis seu aculeis aliquando soleat inhorrescere, eius nomine donarunt. Rondeletius Archippo & Mnesimacho *Θελήαν* appellari tradit; quam tamen à Thrissa diversam, ut Trissam cum Trichide eandem, Gesnerus, *varium* ut Panthera & Panthera Aristoteles facit. Nec *Lupus* est, quod Platina voluit; quod hic Mugili caudam prærodatur, illam edentulam sciamus; nec *Clupea*, piscis magnus, qui crescente luna albus est, decrecente nigrescit, corpore minimum aucto à propriis spinis interimitur, in Areni Galliæ fluvio nascitur, in capite lapidem grano similem, qui ad quartanas sinistro lateri decrecente luna alligatus facit, & Attilum Padi, venam quandam in faucibus eius mira cupiditate appetens, morsu exanimat, ob rationem eandem. Universi corporis figura, si cum latitudine conferatur, ob longiuscula apparet, & in latera ita compressa, utimus venter, rectâ lineâ præacutis aculeis & constructâ, & propterea non asperâ solum, sed serræ etiam modo fecante (si adversâ deducatur manus) terminetur. *Spinis* sive *aristis* etiam scatet innumeris, & inter vescendum admodum molestis; quod cum Trichidibus quoque commune habet, unde Albertus, & Murmellius latinum eius nomen

Aristosium sive Aristosum confinxerunt. *Caput* habet in latera valde compressum, *rostrum* acutum. Os cum maximè hiat, admodum patulum, edentulum, atque omnis asperitatis expers. *Branchiæ* utrinque quaternæ. *Squamis* regitur magnis, tenuibus & facillè deciduis. In capite supra oculos, utrinque veluti gemmæ smaragdinae relucunt. *Lingua* nigricat, superiores mandibulæ deorsum prominent. *Ventre* & lateribus argentum æmulatur. *Dorso* verò & capitis vertice ex albo flavescit. Romæ cum maximè aucta bipedalem mensuram non superat. *Marinus* est † piscis, sed ex mari ineunte † Strabo vere cum in utero habet, subintrat, *Geogr. l. 15.* inchoante ætate revertitur. In Tyberim delapsæ strigosæ sunt, & quadam marinæ saluginis ariditate parum amabiles, paucorum dierum mora, Tyberinis undis pinguescunt. Laudatas Arnus & Umbro in Hetruria, Liris & Vulturnus in Campania præbent. Galliæ & Hispaniæ flumina maximas, Mosa in Hollandia suavissimas. In Aquitania ob frequentiam *plebis obsonium* Aufonius vocat. In Arvernæ fluvio juxta Marignensium oppidum, supra mille ducentas uno retis jactu capi, Rondeletius auctor est. In Euripo reperiri negat Aristoteles. Burdigalæ & Lugduni succulentiores quàm Massiliæ venduntur. *Pariunt* in fine ætatis in mari. Athenæus *μολύβδους* Thrissas dixit, Oppiano, alternant vias Ponti curruntque per æquora, Hospitium mutant semper, Pontoque vagantur. Figulus veris adventum Mossellanis nunciare, & mense Maio tonitrubus, adeò terreri, ut plurimæ in ripa exanimatæ reperiantur, scribit.

In Arvernæ Oppido Maringnesio ad testudinis tonos adnasse, & saltasse Rondeletius vidit, quod & de Thrissis Eliano & Porphyrio proditum, nec de mendo in Athenæo, qui Trichidi hoc quicquid est adscribit, dubitandum est. In nullo apud Veteres fuisse

Oppian.
Hall. 2.

Elia. H.
A. l. 6. c. 32.
Porphy.
Dei Som.
χρ. l. 3.
Aufon.

precio, Aufonius testatur. Postquam pingues evasere, succum mediocriter bonum, & qui facile distribuitur gignunt: sed quia glutinosioris alimenti excrementa non facile atteruntur, ideo ab ipsis exhalationibus, intempestiva somnolentia inducitur, & sitis excitatur. In pisculariis Bavarorum legibus, teste Gesnero, interdicitur, ne duobus palmis vel septem digitis, propter aristarum & parvitatem & multitudinem capiantur. Vida prudentissimum, quod non nisi obesus, maximeque idoneo tempore, cum esu carniū interdicitur, appareat, dixit.

Aldrovand. de Piscibus l. 4. c. 5. Zige ab Albi fluvii, qui & Goldtsch ab aureo circa caput colore dicitur, sic à Kentmanno describitur.

Zige piscis est tenuis & siccus, paucæ carnis: colore pulchro, argenteo, dorso tamen subfusco, oblongus est, non ita latus, ut solent esse pisces Goldtsch dicti, qui in Marchia capiuntur: longitudo enim eius ad latitudinem quintupla est. Caput eius si foris aspicias, Harengi capiti non dissimile est, nisi quod in parte superiore oris scissuram habet. Lingua eius parva, quæ colore nigricat. Dentes utrinque ad latera in faucibus, mandibulis duabus duri adnati: sicut in eiusdem fluminis piscibus (de Capitonum fluviatilium genere) Ieseno & Diabelo, ut vulgo nominant. Caput & oculi ad aureum colorem, paucoviridi permixtum, accedunt. In summis lateribus utrinque maculæ quaternæ nigræ digeruntur, quarum prima ad summas branchias, ultima paulo sub initio pinnæ dorsi. Ex Oceano in Albim subit hic piscis & paulatim consumitur ac deficit. Capitur ut plurimum in hoc flumine, à festo Pentecostes usque ad Divi Iohannis diem quo tempore Sturio migrat.

A Sturione enim è mari in Albim pellitur. Quanquam autem ad velocitatem & fugam præ omnibus in Albi piscibus, comparatus sit; mollis est tamen & quam primum ex aqua


in aerem subductus perit. Maximè huius generis in Albi apud nos (Misenos) duabus cum dimidia libris (sedecim unciarum) ad tres cum dimidia (quod tamen rarum est) perveniunt. Sive assus sive elixus, non boni saporis est. Si tamen præparatum, sale intus aspergas, tum in fumo aut sole leviter siccæ, & ita butyro unctum super craticula assès, melius (ut in hoc genere) sapit. Et quoniam aridi hi pisces sunt, sunt qui in aqua elixant, deinde exemptos condunt jure è butyro, zinzibere, aqua & modico aceti, sicuti etiam alios quosdam pisces siccatos condire solent, ut Truttas, Thymallos, Lucios, & Cyprinos latos. Quomocunque paretur, nullus tamen in Albi piscis æque ferini aut virosi saporis est; & à quo etiam nomen ei impositum conjicio, ut Zige, id est, Hircus dicatur, hircum enim præsertim insolatus, olet. Capitur & in lacu Sverinenfi. Alosam Gesnerus credidit, metuo ne perperam.

CAPUT IV.

De Mugilibus.

Historiam Mugilum, nomenclaturarum diversitas obscuram facit. TAB. XXIII.
 Hic *κερδός*, *λδκίσκη*, *κέραια*, *νήσις*, *περδός*, *μυξίν*, *σάργ*, *χελών*, *βάνχ*, *σφλωδός*, *δακτυλός*, *κεφαλίν*, *βλεψίας*, *αλδός*, *πες*, quæ apud Aristotelem, & Aldrov. de Piscib. l. 4. c. 6.
 thenæum, ex Hicelio, Dorione, Eutydemo, Polemone invenies, præcipuæ sunt. *κερδός*, Aristoteli & Hicelio & speciei nomen est. Hicelio & speciei, Dorion generis duntaxat mentionem fecit, & in *marinum* & *fluviatilem*, illum iterum in *Cephala* & *Nestini*, divisit. appellationem *δωδ* & *κέρδ*, seu telo, belli Perfici tempore invento, sortitus est, quod eo reli modo in anum immisso apud Athenienses publicè adulteri pœnas luerent. *Leuciscis* seu Alburnis & Albulis ab albo colore nomen impositum est, perperam *γλαυκίσκος* dicuntur; Galeno

1




Salmo. albus

Salms. Ein

ander geschlecht.


2



Mugil


Meeralet.

4




3


Lupus. Meer Wolf.



Mugilis. Species alia.




Capito Anadromus. Ellbnasen Meernasen.



Caper. capri-
Scus

7


Sawfish.



Acipenser

Zeelandicus.


11



Stoer. Sturio.

Acipenser. 1.


8



Stoer.

Acipenser seu.
Sturio. 2.

9




10

Acipenser. seu

Sturio. 3.





Galen. de
Alim. fa-
cult. l. 3.

Galenus sunt fluviatiles, κεφαλῶν & generis quidem nomen est: sed quia κεφαλῶν τὸ βαρύτερον τὴν κεφαλὴν ἔχει nomen obtinuit, nec id omnibus magnum, non omnibus etiam competet, nisi forte idem dictum esse putes, quod in metu capite abscondito totum se occultari credat. Aristoteli, sanè

Aristot. H.

A. l. 9. c. 17.

† Arist. H.

A. l. 8. c. 2.

† aliquando peculiaris & unica *Mugilum species est*; aliquando duas † sub se species complectitur: nec fortè malè *Mugiles marinos* in *Cephalos* & *νησιος* distinxeris. *νησιος* epithetum est omnibus *Mugilibus* commune, quod omnibus carnibus abstineant. *Πεσέρας* speciei nomen est, sed speciem *Cephalo* alteram, quæ mucosuo vivit *Epithetum*, & idem cum *μυξίν* videtur. *Sargus* seu ut apud Aristotelem *σαργόν*, quid sit, dubitatur, *Rondeletius* eundem cum *νησιος* seu *ieiuno* facit, *Aldrovandus* discernit. *Chelones* cum *Bacchis Hicesio* iidem, & *Plinius* *Banchos* inter *Mugiles* recenset, sed cum *Myxone* eisdem facit. *Rondeletius* *Bacchum* quintam quandam speciem *Hicesio* esse, insinuat. *Σφινγίς*, *Salviano* cuneatus, *Gesnero* *Cunealius*, quod *λαγάρδος καὶ πεσέρας*, *gracilis* & *quadratus* sit, ita dictus, à solo *Eutydemo* inter *Mugiles* reponitur. Alii *σφηκεάς* legunt, ut à *σφή* vespa, non *σφῶ* cuneo, isti pisces dicti fuerint. *Δακτύλιος* nomine *Salvianus* minorem aliquem in eodem genere ab *Eutydemo* poni putat, alii *διδακτύλος*, sed perperam legunt, cum duos in latitudine digitos non excedat: nec alii fortè fuerint, quàm quos *Padi* accolæ *Canistrellos*, quod in *Canistris* vanales ferri soleant, vocant.

Plin. H. N.
l. 32. c. 7.

Cephalinus quibusdam cum *Blæpsia*, teste *Dorione* idem, nisi mendum sit, & pro *Blæpsia* *βλέπια*, quod idem quod *μύξα*, ut *Galenus* scribit significat, legi debeat, & sic *Cephalinus* inter species *Nestium* numeretur.

Pletarum nomen *Cestreis* à quibusdam imponitur, si *Polemoni* libro de fluminibus *Siciliæ* credimus. Atum de illis in capite de *Murænis*. *Species* *Mugilum* seu *Cestriorum* sunt

quinque, apud *Aristotelem*, *Cestreas* nempe propriè dictus, *Cephalus* cognomento *Chelon* seu *Labeo*, *Cephalus pereas*, sive *translitoranus*, *Sargus* sive *Sargo*, & *Myxo* seu *Muco*. Caput nonnullis est magnum & depressum, rostrum breve ac retusum, ut *Capitonibus*, aliis minus & rotundius, rostrum magis extensum & acutius, ut *Cheloni*, Os omnibus parvum, rotundiusculum & edentulum. *Squamis* omnes teguntur. *Cestreus* magnas & crassas habet, quæ numismatis speciem mentiuntur. *Pinnas* utrinque binas gerunt, illos si excipias, quos *lacus Sipharum* gignit, quibus teste *Aristotele*, una tantum utrinque est, & supinis carent. Præter binas illas pinnas, quæ utrimque consistunt, unam habent ab ano; in dorso duas, quarum altera aculeata est, altera aculeis caret; ad caudam spectans. Omnes à branchiis lineas aliquot subobscuras ad caudam deductas habere videntur, etsi haud æquè in omnibus sint conspicuæ. Dorso sunt subnigro: ventre vero candido. *Ventriculus* teste *Aristotele* carnosus est: cui parte altera plures appendices exeunt: altera una tantum, ut idem ait. *Rondeletius* longè alium esse scribit quam in carnivoris piscibus, densum nempe & carnosum instar ventriculi avium, foris planum, intus rugosum, figura verticilli vitrei, quod mulieres fufis appendunt. *Intestina* quoque crassa sunt, pinguiæque & in gyros acta; in quibus splen latet, ut idem observavis, & sub pinna locum aere plenum reperit. *Hepar* pallè; parvum, & tanquam manū ventriculū amplectens. *Fel* rufum sive flavum, aqueæ consistentiæ. *Cestreo* eiusdem *Rondel.* *hepar* ex albo rubescit: caro mollior, laxior, minus candida, minusque pinguis quam *Cephalo*, additque gulam habere; ventriculum in longam appendicem desinere, semper inanem esse, uti & intestina. *Lapis* quem *Cestreus* in capite gerit, *Echinus* & *Sphondylus*, ab echinata specie dicitur. *Lineæ* quæ à branchiis ad caudam ducuntur, *Cephalo* breviores sunt. *Chelon* sive *Labeo* nigricantes à capite ad

Arist. H. A.
l. 6. c. 13.
Arist. de
part. l. 4.
c. 13.

Galen. de
usu part.
l. 8. c. 6.

caudam æqualibus spaciis distantes protensas habet. Habet & labra crassa, spissa, prominentia, unde *χελών* & *Labeonis* nomen. Capite est paulo minore quàm Cephalus, oculis prominentioribus, sine pellicula illa concreta, quam veluti palpebram habet in capite. Marinos pisces esse nullum dubium, sed an omnes fluviis & stagna subeant, incertum. Capitonum alius translittoranus Aristoteli, quasi in alto mari degat. Galenus in stagnis quoque nasci scribit. Ut ut sit, Cestrium propriè dictum esse iudico, qui longius à mari, ut in † Nisum ita in alios fluviis recedit. Cephalii in eiusdem vicinia, propter dulcem aquam & limum morantur. Et si autem aquas amēt, ab imbribus tamen adeò vehementer læduntur, ut visum amittant, ut Aristoteles prodidit. Cephaloni in primis oculi per hyemem albescunt: ipse tum & macer & cæcus, quod in Nauplio terræ Argivæ agro accidit, capitur: in primis, si hyems asperrima fuerit.

Marinos à fluviatilibus, spinarum numero & quantitate distinxit Galenus, plures his & minores innuens: certius indicium sapor ipse suppeditat. Acriorem & pinguedinis expertem Cephalum dicunt qui præstantior.

De *Cibo* non convenit inter auctores. Carne abstinere Aristoteles tradit, vivente duntaxat Oppianus & Ælianus. Idem Cestrium alga & limo vesci scripsit. Gulosus autem maximè est & insatiabilis, ideò in proverbium abiit, aviditas sæpè tanta, ut cauda verberando excutiat cibos.

Tanta iisdem salacitas, ut in Phœnice & Narbonensi provincia, coitus tempore è vivariis marem linea longinqua per os ad branchias reli-gata emissum in mare eundemque linea retractum, fœminæ sequantur ad littus, rursusq; fœminam mares par-tus tempore.

De ipsorum *Generatione* ita Aldrovandus. Quod ad ortum generationemque eorum pertinet: scribit Aristoteles esse qui omnes sponte oriri opinentur, quorum opinionem re-

fellit, quoniam unicum tantum eor-um genus sit, quod non coitu, sed ex limo arenave enascatur: cæterorum veræ fœminæ ova, mares semen genitale habeant. Pariunt autem eodem teste semel anno: sed an eodem omnes tempore, difficulter ex ipso colligas; alias enim Capitonem vere parere tradit ultimum, quoniam novissimè eius fœrus appareat: alias omnes Decembri mense gravescere ait, tricenisque diebus gerere, & in iis Capitonem quoque enumerat, alias Cestreos ait inter primos partum accelerare, parere hyeme, locis iis maxime quæ flumina exeunt, dum uterum ferunt, præcipue graviter laborare, ideoq; fieri, ut tunc potissimum ruant in terram ac excidant: feriri porro gravissimo agitato in terram, atq; omnino in temporis motu perpetuo incitari, donec pariant, sed requiescere à partu continuo.

De *Ingenio* & aliis hoc habet. Tam veloces esse, ut jeiuni transversa navigia superiarent, & ubi dispositas piscatorum sensere insidias, retia supervolent, ut veluti sagittæ arcu emissæ videantur. Curvos hamos habere suspectos, ideò postquam diu circumnavatare, cauda prius escam percellere, & quod avulserunt deglutire, mox ore in angustum collecto, summis tantum labris ac vellicatim escas stringere. Irritati, in sublime feruntur, & effugia quærunt: si aberravere, quiescunt, & necem prostrati expectant. *Vsum in Cibus* quòd attinet, Hicesius omnes Leuciscos & Mugiles boni succi esse, facile excerni, nec multum alere, scribit, nempe si mari puro capti sunt. Nam qui in cœnosis locis, quales tum illi, qui in Etruria in Prillino lacu apud Orbatellum ad mediterranea deferuntur tum hi, quos Padusæ atque ipsi luculenti Fof-sæ Clodiæ canales viscere prætere-ro, Ferrariensibus & Venetis copiosissimè præbent, pinguedinem humanæ naturæ infestissimam habent. Aristoteles in fluentis & lacubus, quod pinguiore fiant, præstare dixit. Lynceus Samius hyeme post partum laudat.

Æsta-

Aristot. H.
A. l. 8. c. 2.

† Strabo
Geogr. l. 15.

Aristot. H.
A. l. 8. c. 19.

Ælian. H.
A. l. 1. c. 3.
Oppian.
Halieut. l.

Plin. H. N.
l. 9. c. 17.

Plutarch.
Lutra ani-
mal.
Oppian.
Hal. l. 2.

Ætate lutum quod stagna exsiccentur, olent. Septembri, quod luto putrescente pinguiores evadant, insalubres sunt. Optimi qui circa Abderam, deinde qui circa Sinopem capiuntur. Romæ maxima ovorum gratia, quæ teste Iovio, geminis folliculis circumcisa parte seminis, recentibus Cephalis eximuntur, & nomen ὀών τεύχεων, *ovorum salitorum* apud Græcos obtinere. Quantum ad *Medicinam*, Ventriculus Mugilum, seu in cinerem redactus, seu in fumo siccatus, & vel vino albo, vel aqua absynthij ablutus, & in cibo sumptus, ventriculi exsoluti vires non minus quam ventriculi gallinarum potus internare facit. Elixir in vino & ex aceto sumptus vomitum compescit, prodente omnia Rondeletio. Lapilli in cerebro contra Nephritim valent.

CAPUT V.

De Capitone Anadromo
Gesneri.

TAB. XXIII. 6. *Capitonem Anadromum, Gesnerus & Kentmannus describere.* Aldrov. de Piscib. l. 4. c. 7. **C**apitonem Anadromum, Gesnerus & Kentmannus describere. Natus, inquit, ille, videtur, prominente & carnosâ superiore oris parte, ut in nostris fluminibus, is quem Nafi nomine descripsimus: cui etiam reliqua corporis specie per omnia adeo similis est, ut discrimen nullum animadvertam, ne colorum quidem ferè, nisi quod Albinus hic Nafus magis albicat, noster fluviatilis, vero magis fuscus est, Sed noster plane fluviatilis est, Albinus è mari ascendit: præterea noster vilis & plebeius est, Albinus vero inter laudatos, præsertim assus. Hoc etiam notandum, cum Albinus alio nomine *Blicca* dicatur, longe alium piscem eodem nomine à nostris vocari, de quo egimus inter albos pisces. Miseni etiam Zertam dicunt, quod nomen etiam Polonis usitatum audio. Zerta inquit Kentmannus, piscis longiusculi, argentei nitoris, squamis

parvis tegitur, dorso subfusco: *pinnis* quæ ad branchias sunt & parte superioris rutilis, paucò cæruleo admixto. Linea utrinque à branchiis ad caudam tendit, in qua puncta fusci coloris digeruntur. *Caput* crassiusculum, oculi pulchri, magni, albicantes, nares magnæ non procul ab ore. Os molle prorsus, in quo nec dentes sunt, nec alia asperitas, sed ab initio gulæ seu faucium, maxilla utrinque valida, dentibus senis oblongis vallata. Maximi huius generis pisces qui apud Misenos capiuntur, bilibres sunt. Libram XVI. unciarum dico. Anno toto ex Oceano in Albim ascendit hic piscis, maximè vero circa Pentecostem, qui tempore parit, migrare solet, tunc etiam ad cibum præfertur, quod fœminæ ovis plenæ sunt. Manent & pariunt in Albi, proficiuntque ipsi & soboles: augentur enim & pinguescunt. Vescitur omnè genus pisciculis, qui nullis præsertim spinis & aculeis rigent: item muscis aliisque insectis, quibus intra aut proxime supra aquam potitur. Habetur inter optimos qui in Albi sunt, assari solitos pisces. Caro enim eius optimi saporis est. Ritè etiam elixus non male sapit. Desquamatus nempe, exenteratus & elutus, in aquam fervere incipientem immittitur, conditusque ac salitus ad iuris ferè consumptionem coquitur, quo modo permulti etiam alij fluviatiles pisces elixari solent. Sunt qui iuri haud ferè cõsumpto copiosum butyrum addunt, eoque liquato piscem inferunt. Potest & aceti aliquid affundi, & Zinziber aspergi, pro cuiusque palato. Assus vel simpliciter, vel cum embammate è cœpis minutatim concisis, vino, croco, saccharo & Zinzibere, sapidissime estur. Nec displicuerit desquamatus, in frustra concisus, quæ in polenta aut secalis pollinevolvuntur, atque ita in butyro sive crudo sive liquato frixus. *Hac omnia Kentmannus.* Addit Gesnerus non in Albi tantum, sed Sala etiam apud Misenos flumine Zertam capi.

CAPUT VI.

De Capro sive Caprisco.

TAB.

XXIII. 7.
Aldrov. de
Piscib. l. 4.
c. 8.

CAprum & Capriscum eodẽm Salviãus, diversos Rondelerius facit. Maxima hic nominum affinitas, & uterque duram pellem habere traditur. An vere καπρίσκος, χοίρεος Strabonis, ὄς aliorum, & μύς Opiãiani & Æliãni sint ijdem, dubitari potest. Equidem Athenæus Aristotelis κάπρον χοίρον vocat; alij tamen σκάθρον, quidam σκάρον legi debere opinantur, nonnulli Chalcidẽm piscẽm vocalem & in dulcibus aquis habitantẽ credidere. Porcus etiam Niloticus Strabonis potius porca fluviatilis minor est, piscis rotundus, spinis in capite noxiis, ὅν vero φαμμάθιδα, quasi in arena fodientem facit, quod terrestribus suis more rostro arenam fodiat, Numenius facit, eandẽmque cum σκκίον, cui Simeon Sethi eas in nutriendo facultatis rationes attribuit, quas alii fere Rhombo tribuunt, Aldrovandus posuit. Salviãus cum καπρίσκος & χοίρεος eundẽm iudicat, μύν denique inter σελάγγη seu cartilaginea Athenæus ex Aristotele recenset, inter quos, quis Caprum nostrum retulerit? Athenæus eundẽm cum Capris, cum ait καπρίσκος καλεῖται μὲν καὶ μύς, esse censet. Descriptionem eius ex Salviãno, eamque accuratissimam damus. Caper, inquit, Molẽ piscis instar, caput utrinque admodum compressum habet: Oculos rotundos, atq; in superioris capitis parte locatos: Os parvum, & valde denticulatum: utraque enim maxilla octonis dentibus validissimis, magnis, latis, non ferratis, sed continuis, atque humanis simillimis minuta est. Branchiis utrinque quaternas non osseo & deatriculato (reliquorum squamatorum instar) operculo sed cute contectas, nec lata, sed modica scissura (Molẽ piscis more) pervias habet. Nec si Aristot. dicat: *Habent quibus paucissimæ sunt, singulas branchias utrinque easque duplices, ut κάπρος*, (sive Aper, ut Theodorus vertit) *aliis binæ utrinque sunt, altera simplices, altera duplices, ut Congro*. Suspiciari debemus hunc nostrum piscẽm Congrum non esse, cū

neque etiam verum sit, quod binæ utrinque branchiæ Congro sint. Et propterea mirari potius cõvenit, cur hæc ita tradiderit Aristoteles. Utrunque una tantum pinna & rotunda ad branchias conspicitur: nam illis, quæ in piscibus aliis utrinq; in ventre sunt conspicuæ, caret prorsus. In dorso fere medio tres, membrana inter se iuncti reperiuntur aculei robustissimi & magni, quorum prior reliquorũ duorum triplus est, quosque omnes non solum ubi vult, deprimit, sed in sulcũ etiam osseum, in dorso ob id sculptũ, recondit. Depressi autem & reconditi uti quam facillimẽ simul eriguntur, ita eorum unus dũtaxat erigi nequit. Et pari ratione erecti omnes deprimi possunt, cum eorũ unus nequeat; suntque ea arte fabrefacti, ut cum prior & maior quantumvis impulsus deprimi nullo prorsus pacto possit: postremi tamen depressione, quæ facillima est, statim deprimitur, non secus quam in arcubalistis vocatis, in quibus parvo ac inferiori ferro vecte compressus, tensus ilico remittitur arcus: ob cuius similitudinẽ hic piscis noster Romæ *Pesce balestra* vocatur. Et quod maiore dignum est admiratione, si postremus aculeus non prorsus deprimatur, sicuti prior quoq; proportionẽ duntaxat deprimitur, sic ibidem etiam ita rursus cõfistit atque obfirmatur, ut nullo impulsu ulterius deprimi possit, nisi reiterata postremi depressione. Hos ternos aculeos pinna sequitur, ad caudã usque deducta. Osse autem valido, lato & recurvo, ex cordis loco ad eam ventris partem, quæ è branchiarum regione est primum reflexo, deinde per ventrem sub cute usque ferẽ ad podicem extenso, ibidemq; postremo in acutissimum & conspicuum aculeum definente, tota anterior ventris regio roboratur atque munitur. Quæ verò inter prædictum aculeum & podicem, ventris portiuncula relinquitur, plerisque aliis longẽ minoribus, sed satis robustis atq; ferratis aculeis armatur. A podice per ventrẽ reliquum ad caudã usque alia singularis pinna deducitur. Cauda quæ non sensim, ut reliquorum pisciũ, sed repente

pente extenuatur, in unicam & latā pinnam degenerat: *Ventriculum* habet amplum, & crassum: intestina lata & valde reflexa: hepar subalbidū, cui fellis vesica hæret.

Corio regitur squamoso, cuius tamen squamæ serpentis potius quam piscis videntur; nam præterquam quod eo ordine sunt commissæ, ut lineas, cancellatim sese interfecantes constituent, firme etiam & valide adeo hærent, ut desquamari nequeant; unde ita durum & asperum efficitur eius corium, ut vix dissecari queat. Rondeletius sese expertum esse scribit, ne acutissimo quidem gladio penetrari posse, utq; ligna & ebora eo poliri possint. Quāobrem jure Ælianus atque Oppianus marino Muri pellem præduram tribuere; & Athenæus Aristotelis testimonio, etsi apud Aristotelem id nunc non legatur, inter pisces qui aspera cute teguntur, κατὰ πρός recensuit. Quod ad colorem attinet, ex livido virescit, nonnullis parvulis notis cæruleis & rubentibus maculis quam plurimis insigniuntur. Estque totius piscis figura valde compressa, & lata, atque fere orbicularis. Ad multam magnitudinem non excrescit, duas enim libras rarò excidit, unde merito Oppianus & Ælianus eum haud magno corpore esse dixerunt. Hæc ænus ille. Non maris duntaxat, sed & fluviorum accola est, ut Plinius & Aristoteles scripsere. In amne Acheloo grunntum habet. Vesceitur carne, cancris, squillis atque testatis. *Solivagus* est, & raro capitur. Pugnacissimum esse, tum quod pelle prædura tegatur, tum quod dentium robori confidat, Ælianus & Oppianus sub nomine Muris marini prodidere. Carnem habet duram & suavem. Virus namque olet. Athenæus inter σκληρότατα retulit.

CAPUT VII.

De Sturione.

Piscis quem nos Gothico vocabulo Sturionem, quasi στεινὴν, quod rostro suo proræ rostratæ speciem

gerat dicimus, is Græcis nostri temporis ὀξύρις, quasi Oxyrinchus, Cyprijs teste Bellonio *Morona* vocatur. Nec est veterum *Lupus* quod Poggio Florentino placuit, ut capite quarto huius tituli innuimus: Nec *Attilus*, ut Franciscus Philelphus voluit, cum Attilus sit, qui hodie ab accolis Padi, veteri servato vocabulo Attina, Adilo & Ladinno vocatur, piscis ipso Sturione amplior, effigie, sapore, pretio & tota fere natura ab eo dissimilis: Nec, *Turfo* Plinij, quod credidisse Theodorus Gaza creditur, cum hic Car-

Plin. H. N. l. 9. c. 9.

stratus apud Athenæum comprobatur, species sit, & cum Turfo sive Phocænæ in Ponto catulos pariat, hic oviparus sit, & ubique nascatur. Nec *Hycca* seu *Hycca* ut Hermolaus Barbarus in epistola ad Cortusium prodidit, cum vel ipse Athenæus, qui solus Hyccæ meminit, qui piscis Hycca sit ignoret, & duntaxat, à Callimacho sacrum piscem, à Cyræneis *Erythrinum*, ab Hermippo Smyrnæo Hyccam Iulidem vocari scribat.

Nec *Delphinus*, ut Carolus Figulus voluit, quamvis in multis quoad formam conveniant, quod iste omnium veterum autoritate, inter cetos referatur. Niloum tamen Delphinum, de quo apud Solinum leges, quemque Delphino potius similem, quam Delphinum Marcellinus vocat, Sturionem existimare, nihil forte oberit.

Nec *Oxyrinchus*, veterum, cum hic Carnivorus sit, & hamo, ut apud Athenæum legimus, capiatur. An pro Oxyrincho Caspio Æliani, haberi debeat, comparatio ostendere poterit. Circassi sane cæteri- que Mæotidis accolæ, Sturionem Oxyrinchum vocant, si Gesnero & Scaligero credimus. *Silurum* veterum esse Salvianus contra Manardum apud Aldrovandum ostendere conatus est, quæ prolixissime agentem vide. Aufonij esse nullum dubiū, & ita Sturio à Venantio Fortunato Pictaviensi Episcopo, qui duobus post Aufonium sæculis vixit, vocatur: Ve-

Ælian. H. N. l. 17. c. 32.

TAB. XXIII. 8.

9. 10. 11. Aldrov. de Piscib. l. 4. c. 9.

Arist. H. A. l. 4. c. 9. Plin. H. N. l. 11. c. 51.

Ælian. H. N. l. 1. c. 9. 41.

Iuvenal. tur : Veterum non esse, tum ex eo
Scalig. 14. colligas quod non tantum teste Iu-
et 14. venale & veteri eius interprete, sed
 etiam Antiphane & Theodoro Si-
Scalig. in nopenſi apud Athenæum, vilis apud
Leſſ. eos piſcis fuerit ; tum quod eum in
Auſon. l. 2. Garumna non invenias, quod &
c. 1. Scaliger monuit. γαλαζῖον ſeu γαλε-
Galen. de ζῖον vocari Galeno crederem, niſi
Alim. fa- eandem in Græciæ mari, in quo Stu-
cult. l. 3. riones dantur naſci, negaret. Acipenſerem eſſe, qui ab Elope & Anthia diſtinguitur, Rondeletius crudeſte oſtendere conatur, quem ſequitur Iunius: obſtare eius ſententiæ videtur, quod rarus inventu, & unus omnium ſquamus ad os verſis contra aquam nando meare, apud Plinium dicatur, & id Nigidius Figulus, referente apud Macrobiū Sammonico Sereno, confirmet. Aldrovandus Sturionem Acipenſerem Romanis cum recens & in Italia captus eſſet vocatum fuiſſe; Silurum Græco nomine cum ex peregrinis Græciæ in primis oris allatus, opinatur. *Deſcriptionem* eius Paulus Iovius hanc dedit. *Corpore* eſt tæreti oblongoque, inter rotundos & planos ambigente, ut qui ſubtus quodammodo planus ſit, dorſo verò ſemirotundo. *Caput* quadratum eſt, & ad effigiem parvæ pyramidis protenſum. *Oſ* illi eſt ſine maxillis, ſine dentibus, diverſum penitus ab reliquorum piſcium forma, idque ſub mento in ipſa prope iugilum parte, ad ſimilitudinem ſiſtulae arundinaceæ rotundum, ſemperque patens, & cartilagineum & ſummæ candidum; cuius hiatum in procerioribus haſta brachij haud facile impleret: cæterum totum caput dura potius & calloſa cartilagine quam certis oſſibus conſtat, quod ex lento quodam & præpingui mucore concretum eſſe videtur. *Naribus* omnino quæ illi prætenues ſunt ſupra roſtrum, refrigeratur. Sunt autem branchiæ utrimque quaternæ oſſeo operimento, non ſecus quam ſquamis piſcibus contactæ. *Oculos* habet parvos. Ex roſtro gemina barba, ut in Mullo dependet. Toto dorſo craſſiores quædam ſquamę oſſea du-

ritie certo numero ordineq; diſtin-
 ctæ, intercurrente ſpinæ acie, ad elegantiam eminent, ut in magnificē-
 tioribus valvis hodie videmus, quas ferrei atque inaurati clavi certa ſerie confixi decentiſſimè figurant. Cæteræ corporis partes cuticulari & ſcabo admodum operimento potius quam perpetuis ſquamis integuntur, idque ad ſubviridis attrique coloris ſpeciem. *Venter* cute levi & argentea tegitur. *Linguam* habet craſſam & duram, *gulam* unde quaque rugoſam. *Pinnæ* ſunt ad branchias duæ & totidem in ventre ad podicem: præter quas in dorſo prope caudam alia unica erigitur, è cuius fere regione i-
 mo ventri alia etiam una ſubnectitur. *Cauda* vero in duas pinnas degenerat, quarum ſuperior craſſior atq; duplo longior extat. *Ventriculus* eſt carnoſus ſoliduſque atque pertinaciter inheſcens tergori, ut niſi diſciſſus divelli inde poſſit. *Oeſophagus* in rugas contractus. *Hepar*, in duos lobos oblongos pallidi coloris dividitur, quorum dextro veſica fellis validiſſime connectitur. *Lien* ſubruber: *intestina* craſſa, & ternis gyris convoluta. Magnis piſcibus annumerari debet, cum crebro & plerique in locis centum librarum, & alibi longe maior capiatur. Ego aliquando Ferrariæ Sturionem mercatus ſum centum & quadraginta librarum, donavique Illuſtriſſimo pariter ac Reverendiſſimo Ioan. Baptiſtæ Cæpégio Epīſcopo Majoricenſi Dominæ meo nunquam ſatis celebrando, qui paucis ante diebus ut labores meos promoveret, mille aureos donaverat. † Quantum ad *Differentias* † *Hactenus*
 refert Bellonius, Ponticorum, Adriaticorum, Gallicorum, & Germanicorum inter ſe eſſe differentiã, quæ magnitudine, craſſitie, cutiſque aſperitate, & ſubnigro, ſubflavo, aut argenteo colore diſtingui poſſit: Sequanicum & Ligerinum adultum interdum tres orgyas excedere, Galeum piſcem pinnis & forma referentem, exili corpore, hirta fuſum pelle, deorſum plana ac levi: apud Ferrarienſes, & Bononiēſes argenteo colore

colore fulgentem, dorsum, & latera tribus veluti carinis distincta ostendere. Scaliger quoque tria Sturionum genera, in Occa Sarmatiae fluvio tradi scribit, & pretiosissimum illud, qui Bialarybitza vocatur ponit: sed Herbersteinus Bialarybitzam à Sturionibus distinguit. *Locum* si attendas, In Ponte, & circa Mæotidem plaudem frequentissimus est, inde ova in molem coacta, salita, & cadis conclusa, per Turciam & Italiam distrahuntur. Tyrreno & Adriatico mari si Bellonio fidis, raro visitur.

Maiores tamen in fluminibus, quæ non nisi quinque aut sex dierum itinere subintrat, quam Oceano, Tyberim si excipias, in quo parvi capiuntur. In Albi (hunc circa Penteosten gregatim, authore Kentmāno ingrediuntur) capti, ducentas inter dum libras singulas sedecim unciarum appendunt. Captus tempore Iohannis Friderici Electoris sexaginta supra ducentas librarum pondere, quem totidem florenis Princeps redemit. In Ligeri quoque & Rheno delicatior. In Tanai, Danubio, Rheno, Tibisco, Vistula, Garumna frequenter capitur. *Cibus* Sturioni non pisces & conchyliæ, edentulus enim, sed sordes & mucus, quidam sed perperam aeris tranquillitatem ei ad cibum sufficere crediderunt.

Dum escam quærit, suis more terram sub aquis fodere Isidorus prodidit. Cum branchiis omnino latet careat, naribus refrigeratur, & si quam hauriendo recipit aquam, eandem prono ore statim regerit. De eiusdem *Robore*, ex relatione Kentmanni ita Gesnerus. Sturio in aqua validissimus piscis est: & interra quoque cum ventri innititur. Cauda concussa hominem utcumque robustum prosternit, ubicunque contigerit, perticas etiam magnas & ligna per medium frangit. In terram extractus, lapides aliquando tanta vi cauda ferit, ut ignis exiliat, attritu nimirum ossiculorum, quibus toto corpore mucronatus horret. Quæ-

obrem cautè tractandus est à piscatoribus, ne vel crura eis confringat, vel retia disrumpat. Peritiores in aqua captum reti ad ripam impellunt, ita ut rete, non adversum, sed ad latus ei sit: secus enim rete vel sextuplex laniaret. Cum ripam attigere, caput eius omni contentione in altum levant, & piscem totum in latus declinant: sic enim robore suo nocere non potest. Videtur cum Salmonæ Amicitiam colere. Ducem enim istorum pisces vocant. Zigam è mari pulsam, per flumina persequitur, sed frustra. Agilis enim hic & velox prævenit. Tanti olim *in cibis* apud Romanos, Traiani tempore, † si excipias, æstimij, ut cum tibiis, † *Macrob.* † & coronis in cænis circumferre. *Salmon.* tur, & Gallonij mensa, teste Horatio, eo famosa fuerit. Mares tamen † *Arche-* † *strat. apud Athen.* foeminis præstant, hæ ovis plenæ probantur, Poggius Doctoris Poggij filius caput commendavit. *Caro* duriuscula est, præpinguis, viscosa, & ægrè concoquitur. *Hepar* adeo dulce, prodente Alberto, ut nauseam nisi felle tingatur, pariat. Græci sale inveteratos tribus nominibus insigniunt. *Rachis* ipsis dorsi portio pleura, costæ & latera; *hypocelium* alvus cum pube. Caviario, quod ex ovis paratur, Græci & Turcæ vescuntur. Iulio II. Pontifici mirifice idè placuit. Paratur & ex Cyprinorum ovis in Iudæorum gratiam. *De usu in Medicina* nil occurrit. Quæ enim de Siluro Plinius, huic vix competunt.

CAPUT VIII.

De Galeo Rhodio.

DE Galeo Rhodio ita scribit *Aldrovandus*. Rondeletius hunc piscem, cuius modo icon exprimitur, Galeum Rhodium esse eruditissime ostendit, propter maximam nimirum cum Acipensere sive Sturione similitudinem, non solum quoad corporis speciem & partes, verum etiam quoad gustum, & saporem, dempta, inquit, unica differentia,

P

quæ

TAB.
XXIV. 1.
Aldrov. de
Piscib. l. 4.
c. 10.

quæ non nisi ab ijs potest percipi, qui citra ingurgitationem huius cibum sumplerint, quique exquisito gustatu fuerint: ferinum enim quid respicit, quod tamen etiam non nisi paucissimum esse potest: nam Archestratus, qui in nullis non terrarum Orbis angulis gulæ cupedias diligentissime perquisivit, id observasse in eo non videtur, quandoquidem Acipenser plane eundem esse credebatur, ut Athenæus tradit, qui illius sententiam refellit. Athenæi verba non solum Acipenseris à Galeo Rhodio discrimen indicant, sed verum Galeum Rhodium hic depingi comprobant: Archestratus, inquit, qui Sardanapali vitam vixit, de Galeo Rhodio scribens, eundem esse opinatur cum eo, qui apud Romanos cum tibiis & coronis in cœnis circumferebatur, coronatis etiam ijs, qui gestarent, vocantque Acipenserem. At hic quidem Acipenser parvus est, & porrectiore rostro, & figura triangulari magis quam ille. Et paulo post, Archestratus de Rhodiensi Galeo loquens, amicis patrio more consulens, ait: Galeum in Rhodio quem Vulpem vocant, si tibi vendere noluerint, vel mortis periculo rape. Nominant illum Syracusani *νυδὴ πῖν-υα*, id est, canem pinguem. Hæc ille. Quod si Galeum Rhodium cum Sturione seu Acipensere contuleris, nullum planè comperies, (inquit Rondeletius) qui ei similior sit eo quem proponimus; his exceptis quod Sturio est longior rostro & corporis figura magis triangulari. Nam alioqui Sturionem totius corporis figura, tergi ossibus acutis, & clypeorum modo efformatis, aliis item in lateribus dispositis, pinnis, cauda, ore in supina parte sito, omnino refert. Is quemadmodum Sturiones, relicto mari, amnes subit. Reperitur enim in Pado, & Rhodano, & pro Sturione venditur; nec ab eo distinguitur, nisi ab exercitatissimis & exquisitigustatus hominibus. Hanc differentiam docuit ipsum Guilielmus Pelicerius Monspelienfis Episco-

pus, vir singulari doctrina præditus, tum ex capite crassiore, & rostro breviori, obtusioraque; tum ex gustu Galeum Rhodium sive Vulpem deprehendi. Ferinum quid recipit, quod de Sturione dici non potest, carneque est durior: à quo sapore Galei & Vulpis nomen habet, Galei enim & Vulpes ex Galeorum genere ferini sunt saporis & ingrati. Si tamen in dulci aqua diu nataverit, in cibis haud aspernandus est. A nonnullis eodem Rondeletio teste *Copé* vocatur, eoque nomine designatum atque optimè figura expressum ad ipsum Ferrariam misit doctissimus medicus Antonius Musa Brasavolus. Alij nominis affinitate decepti *Copio* appellant. Est enim id nomen alterius piscis.

CAPUT IX.

De Cataphracto.

Pisci huic Schonveldius nomen TAB. XXIV. 2. imposuit, sicque eum descripsit. Schonveld. Ichthyol. p. 31. Est palmorum duorum longitudinis ad summum, Capitis fere triangularis, depressi, angulosi, ac lati pollices vel digitos duos, cuius duo latera tuberculis plerisque horrent in ambitu, anteriora quæ os spectant cirrhus multos tenuissimos alunt; posteriora aculei, retrorsum spectantibus minacia sunt. *Rostrum* habet resimium, quatuor apiculis munitum, quorum duo anteriores instar Lunæ cornutæ vel semicirculi se rotundant, reliqui post hos suis aculeis retro conversis conspicui sunt. *Os* in supina parte semicirculare habet, parvum, ad incisuram eius utrinque binis, sub mento pluribus tenuibus cirrhis barbatum.

Truncus proxime caput depressior, octagonus est, prope caudam hexagonus, prona parte fuscus, nigris lituris intersparis, circa ventrem plenum, in cuiusque medio *podex* est, albicat. Totus *squamis* ossis contextus est, in quarum medio

tumore




Eperlanus.

Schmelt. Rodelin.


Gulus Rhodius.

Tab. XXIII.

ein art der Stör.



ad tab. 15.



Lampret. naia aug

5

Lampreta alia.

6



Aal.


Anguilla alia.

Aal.

Orbis. signeri

9

Meer Taube. Meerfisch. Kugelfisch.




Orbis Stellatus Sternfisch



Meer Taube. 10

Orbis. echinatus.

Gosiahielt





Species alia

Orbis.

Schnattfisch.

12




Orbis annumerandus. piscis

Schnottloff

13

Orbis britannicus.




Orbis annumerandus

piscis 2.


4

Seehas.




Huso
1

Hausen.




2

Huso seu. Antacæus stellaris.



3


Alius Huso. Hausen. ander art.



Antacæus Rond.

Ein ander art Hausen. Rond.

4





Orbis

Scutatus Rondel.
Schnottolff.


Ostracion prior Aldrou.
6 Schalfisch.

5



Schnottolff.

Ostracion alter Aldr.





Ostracion

Americæ

Holosteum Bell. Ostracion Nily.

7

8



tumor durus, reduncus, erigitur, qui in omnibus continuatus corpus angulatum efficit, quod versus caudam valde gracilescit. *Pinnas* circa branchias habet latiusculas duas, sub ventre totidem, sed longe minores, binis fibris constantes. In *dorso* inter squamarum extantias concavo, duas contiguas, parvas, omnes nigrescuntur pictas. *Cauda* in pinnam subnigram exiguam & rotundam definit.

Dentes nullos habet, sed horum locolabia aspera, & in faucibus officula aliorum in morem hirta. Frequenter circa Nortsländiam insulam Oceani Slesvicensi Ducatui subiectam frequenter & per totum annum, in ostio Albis & Ederæ sæpe capitur. Incolæ Steinbicker, Muller, & Bursbul vocant.

Vivunt squillis & aliis pisciculis. Habetur ob carnis dulcedinem in deliciis.



TITULUS II.

De Lævibus.

CAPUT I.

De Husone.



ACTENUS de πύλαμοθα-
λασσίου piscibus squam-
miosis egimus, sequuntur
non squamati seu *Læves*
Huso nempe, *Eperlanus*, *Lampetra*, *Anguilla*, *Orbis* & *Holosteus Bellonii*, *Husonem*, quem à domo quasi Hauso, Germanis dici Bellonius opinatur. Plinius fortè *Marionem*, quem Danubio Porculo marino similem extrahi dicit, vocat; quidam *Esocem*, appellarunt. *Æliano* ni fallor est Antaceus, Germanicus. Magnitudinis est viginti quatuor pedum, & tantæ, ut vix biga à tribus vel quatuor equis trahi possit. *Vadianus* magnitudinis pondo quadrin-

gentorum minimos quinquaginta, frequenter centum, ducenta, trecenta, vidit.

Dorsum habet asperum. Nullum os in capite, si Alberto fides, si aliis multa, in corpore parva & pauca, cartilaginea potius, quam solida. Loco *spinæ dorsī* cartilago est, quæ foramen habet magnum & vacuum, à capite ad caudam tanquam terebello perforatum. Adipem pinguedini immixtum sicut porcus. Similia de suo Antacæo *Ælianus*. Cum ætate processerunt, ad maximum Thunni magnitudinem, in Istro accedere scribit, & tam pingui abdomine esse, ut eorum ventrem lactentis suos fœtus scrophæ ubera dicas, sicque aspero corio tegi, ut eo perpoliantur hastæ. Addit item capitis medio à medulla ad caudam mollem & strictam membranam pertinere, ex qua ad assum solem exficcata, flagella ad concitanda iumenta efficere possis. E Ponto Danubium subit, & per centum quinquaginta millaria Germanica, adversis suavibusque undis progreditur.

De eius captura, ita quidam ad Gesnerum mercator. Mitto tibi, inquit, Husonis piscis effigiem vivam. Is in Danubio, nec ubique nec tempore quovis capitur, sed quando migrat. Terra argillosa & pingui gaudet. *Capitur* fere ab autumno usque ad Ianuarium, spacium decem milliarium inter Viennam & Posonium, Presburgum vulgo vocant: ubi ad insulam Schutam nomine, cum arce minutissima, ultimus huius piscis capturæ locus est.

Viennæ die Veneris plerumque quinquaginta vel septuaginta, & aliquando centum Husones, vœniunt, qui integri fere distrahuntur. Copiosissima eorum captura fit in Vualachia iuxta Chiliam non procul ab ostiis Danubij, quibus in mare Ponticum se exonerat. Indefalsi exportantur in remotas regiones.

Vadianus mensibus Octobri &
P 2 Decem-

TAB.
XXV. I.
Aldrovand.
de Piscib.
l. 4. c. 11.

Decembri capros Viennæ invehit. Timidus est, & à minimo etiam pisciculo in fugam vertitur. Sturio se ei per lulum affricare solet, in latebras profugum eijcit, & ventrem lacinat, dumque unus fugit, alter persequitur, aquarum agitatione se produnt, & capiuntur. Caprus lacte vel vino *potatur*, nō ut diutius vivat, nec citius inebriatur, quā sextarios quatuor ebiberit.

Gregatim natant, & tubarum cantum sequuntur, ad eum postquam accessere, irretiuntur. In aqua tanto robore pollent, ut piscatorem cauda ictum è navi deiciant, elato ex aqua capite, mortuis similem apparent. De Antacæorum captura, vide *Ælianum*.

Quantum ad *usum in cibis*, vitulinæ in dorso, porcina in ventre saporem habet, magna pars fassamentis cedit, lactibus nihil dicunt delicatius, sed & ova in cibum expetuntur.

CAPUT II.

De Eperlano.

TAB.
XXIV.3.
Aldrov.de
Piscib. l.4.
c.12.

IN fluviorum in Oceanum, (verba sunt Aldrovandi) in fluentium ostiis, ut Rhotomagi & Antwerpia frequens est piscis, teste Rondeletio qui *Eperlan* (quam vocem vulgarem secutus Eperlanum ceu latinum nomen fecit) dicitur, à nitido & splendido (inquit) colore, quo unionem (perlam) refert.

Cæterum si à perla ipsi nomen est, verendum est appellari een, peerl; nam Eperlan Belgi, cum vocabulum non est: & Bellonius Eperlanum nuncupat. Ait tamen etiam, Atherinæ modo transparenere. Hic Anglis *Schmelt* vocari scribit ab odore (violam enim gratissime redoler, quamobrem quidam *violam* vocari posse censent, argumento quod *Ælianus* ab odore thymi Thymalum piscem nominavit,) vel à pinguedine. Gesnerus priorem etymo-

logiam probat, quoniam Smelle Anglis sit odorari.

Smel tamen apud Belgas est liquescit, & proprie de pinguedine dicitur, à quibus Angli fortè nomen mutuaverint. Uterque *duo eius genera* esse scribit, *marinum* unum, *fluviale* alterum. Sed Rondeletius marinum litorale esse, Bellonius saxatile dicit.

Rursus Rondeletius Eperlanum in marinum & fluviale distinguit, figura corporis nihil vel parū differre innuit, ideoque unicam iconem exhibuit: Bellonius contra duas, admodum diversas; quare suspicari licet fluviale Rondeletii à marino non differre. Bellonius marinum item, partim marina, partim fluviali aqua gaudere tradit, & Rondeletius quoque ex mari ad fluvios ascendere insinuat, dum in Sequanæ ostiis optimum esse scribit, & in Angliæ fluviiis.

Apud Neustricos Caudebecanos Angliæ populos uberrimus est, maior tamen proventus circa vindemias, quo tempore est delicatissimus. Tereti ac tenui est corporis compage, nonnunquam dimidium pedem æquante. Rondeletius ad pedis magnitudinem aliquando accedere innuit.

Asinos parvos refert, unde ex eorum genere esse iudicarunt, quos refellit Bellonius, propterea quod glabro sit corpore. *Oris* hiatus satis magnus est.

Dentes habet in maxillis, & in lingua. Truttam præter cætera dentibus refert. *Lingua*, ut ait Bellonius quasi gemina, hoc est, (inquit) in cuius radice posterior quædam appareat, in quam multo plures dentes sunt, quam in anteriore. *Pinnas* habet easdem quas Salmonum genus, maxime posteriorem illam dorſi pinnam subrorundam & pinguem. Prior totum piscem in æquales fere partes dividit. *Cauda* bifurca est. *Branchie* sunt utrimque quaternæ, decolores, & *violam olentes*.

Transparenti est corpore, dēptalincani-

ne nigra quæ spinæ internæ parti in-
hæret. *Calculos* habet in capite rotun-
dos, albos, quosque facili forinsecus
propter piscis transparentiam per
cranium videri posse Bellonius tra-
dit (qui diligentissime de internis E-
perlani partibus egit) sub posteriori
cerebri partesitos, ubi medulla in
cerebro definit. *Cor* branchiis fe-
micircularibus & fimbriatis est ad-
modum vicinum ac scutiforme: de-
finit quoque in angulos, rubrumque
est, cui molles ac sanguineæ sunt car-
nunculæ, quæ huic tanquam aures
in terrestribus famulantur. Illæ en-
nim moventur cum corde, quod
septo ab hepate dirimitur: unius
tantum lobi, in longum demissi ad
secundum latus. *Stomachum* desinen-
tem in mucronem habet in V. lite-
ram efformatum: *Lienem* admodum
rubrum, seminis Atriplicis in modum
latum.

Cumque stomachi dextrum la-
tus sursum usque ad hepar reflectit,
illic geniculo intercipitur: ubi *apo-
physes* duas latas emittit, quæ veluti
secundum ventrem constituuntur.
Aliud post hunc subsequitur, quod
nec pylorum nec jejunum, neque
ileon commode nominare possis; si
quidem sine anfractibus recta ad a-
num procedit. Sed rectum geni-
culo intercipitur, estque ruberrim-
um. *Mesenterio* nullam admixtam
pinguedinem habet, quo stomach-
us & intestina obsidentur, ut ni-
hil aliud in ventre, quam adipem esse
dixeris.

Caridibus, culicibus, Aphyis, æ-
stro, lendibus, mille pedibus, pedicu-
lis & eiusmodi deiectionis *vesci-
tur*. Carne est molli & friabili. *Æ-
statis* fine vel autumnii initio ca-
pitur.

CAPVT III.

De Lampetra.

TAB. XXIV. **L**ampetra, non tam à lambendis
petris, quam ab *Alabeta* Plinii.
5.6.

Nilidis lacus piscis, qui *αλαβης*, quod *Aldrov. de
Piscib. c. 13
Plin. H. N.
l. 9. c. 17.* manu propter lubricitatem capi non
possit, dicitur, vocatur. Doctiores
Plinii & Aufonii Mustelam esse opi-
nantur, nec tamen vel ex *marinis
Aeliani* quas jecorino simillimas
esse pupillis oculorum ad cyaneum
colorem accedentibus, mento quam
jecorini maiori, quam Chremetis
minore, algas depascere, saxatiles
esse, & omnium cadaverum in quæ
incurrit oculos conficere, idem au-
thor scribit; vel ex *Mustelis*, qui Ari-
stoteli cæterisque *χαλκοι*, qui flumina
nunquam subeunt, & vivipari sunt,
esse iudico. Sed nec ex *Muranarum*
genere esse credo, quamvis Dorioni
apud Athenæum *Muræna* fluviati-
lis haud ineptè dicatur, quod illæ
Branchiis integris careant, quas
Lampetræ velut cartilaginem obti-
nent.

Lumbricum marinum Plinii non ef-
fe, exinde quod pinnis omnino ca-
reant, colliges. At ex *Vermibus aqua-
ticis* eiusdem esse, quos in Gange
Indiæ Stadius Sebosus, haud immo-
dico miraculo attulit, branchiis bi-
nis, sexaginta cubitorum, cæruleos,
qui nomen à facie traxerunt, eis-
que tantas vires, ut elephantos ad
potum venientes, mordicus com-
prehensa manu eorum distrahant,
Rondeletius credidit.

Idem ex *βδέγαρις* seu Hirudinibus
Strabonis, quas in quodam Lybiæ *Strabo
Geogr. l. 17* fluvio septenum cubitorum perfo-
ratis branchiis, ita ut respirare pos-
sent nasci scribit, quod sanguifuga-
rum instar faxis & navium clavis
hæreant, opinatur. *Tineas fontanas*,
de quibus apud Plinium, quod Her-
molao placet, non esse, certum,
quia illæ ex insectis. *Flutam seu Flo-
tam* quod quoque Rondeletio vi-
sum, dici posse, quod nisi in sum-
ma aqua natet, ut aerem attrahat,
facile suffocetur, concedimus. An
Anguilla copra sit, cuius Archestra-
tus apud Athenæum meminit, du-
bito. *Athen. Di-
gnos. l. 7.*

Quamvis enim sit ex ossis seu
ἀπὸ ὀστέων, quod Anguillæ vulgari non
competit: in eo tamen, quod An-
guillas
P 3

guillas Copaidas Agatharchides prodigiosæ magnitudinis esse scribit, diversa à Lampetra esse videtur. Echeneida Oppiani esse, Rondeletius censuit, nec abhorret ab ea Echeneidis descriptio, quam apud Oppianum vide. Bellonius quoque nautis præcipuè infestam esse ait, temonibus triduum fere inhærendo, caudamque in contrarium vertendo, recensque picatæ navis lateribus picem lambendo sic infigi, ut nautas ab itinere remoretur.

De *Generibus* ut dicam, non unum Lampetræ genus est. Sunt quæ è mari flumina subeunt, sunt quæ à salis aquis omnino abstinent.

Marinarum triplex genus est, maius, medium Germanis & Belgis Prick dictum, & minus à Salviano depictum, qui, licet ætatis ratione tantum differre quispiam suspicari possit, quoniam colore tantum & magnitudine à maiori differt, differre tamen, & specie ostendit, cum maiores semper & maculosæ & bicubitales; minores contra sine maculis & pedales tantum reperiuntur: Prick vero cubitalem magnitudinem haud superet, transversalibusque & nigricantibus lineis solum insigniatur.

Rursus ipsi maiores haud ubique æquè magni. Testatur enim Iovius in Arno & Tyberi ad generosum habitumadolescere: in omnibus autem Galliæ Cisalpinæ rivulis, ipsisque præsertim Ticini atque Adudæ emissariis multas reperiri pretiosas admodum, quanquam minimi digiti crassitudinem minimè superent.

Et Platina in Cisalpina (Gallia) parvas, in Hetruria mediocres, Romæ ex Tyberi permagnas capi tradit: nisi dicamus, haud recte ab his scriptoribus isthæc observata esse. Omnibus live marinæ sint live fluviatiles, commune est, Ceteorum more *sistulam in cervice habere*, per quam cum navibus aut saxis hærent, aquam ad branchias attrahunt. *Spina* item omnibus cartilaginea à capite ad caudam usque de-

ducta, chordam Galli vocant, quæ vere tenerior, ætate durior est, & insuavior.

Branchiarum numero, figura & ordine conveniunt, ore item & *pinnis* & totius corporis figura. Murænis valde similes sunt, si caput excipias. Os enim neque in longum neque in larum scissum est, sed excavatum velut in hirudinibus quas sanguisugas vocant. Gesnerus ab eo loculorum instar, qui ad servandos nummos loro contracti clauduntur, contracto lignum aut lapidem ita apprehendere ait, ut fugere videatur, idque tanta vi, ut ægrè avellatur, cucurbitularum medicinalium similitudine. Marginem item oris rotundum fibris quibusdam laciniosis esse, quæ nimirum ut firmitus hæreat, fugatque efficiunt. In cavo illo sparsi sunt *dentes*, plurimi flavi, acuti, hamati, quorum interiores maiores esse idem Gesnerus observavit, eosque circiter viginti ordinibus distinguere; & tanquam à centro ad circumferentiam digeri, ordinibusque singulis quaternos, quinos, senosve inesse. Esse & in ipso oris recessu duplicem *dentium* minorum ordinem, quorum maior, inquit, omnino feram denticulis utrimque denis refert, eos denticulos continuos esse, cæteros cutim habere interiectam. In eiusdem cavi imo teste Rondeletio particula est contraria occursum foramen interius occludens. *Cor* habent sub branchiis & foraminibus reconditum, cartilaginea membrana, spongiosa ac prætumida inclusum, subrotundum, ciceris crassitie: *hepar* oblongum, cæruleum, unius tantum lobi. *Felle* carent. *Intestinum* omnibus unicum, rectum, minimè complicatum; reliquum corporis in fœminis matrix ovis referta occupat. Pinnis lateribus carent; nullasque ad natandum habent, sed flexuoso corporis impulsu aguntur, & *pinnulis* membranaceis iter dirigunt, quarum una ferè supra caudæ extremum erigitur, altera paulo superior est. Lævi cute teguntur, quæ in maiori nigricat prone, supine candicat, ad la-

adlatera, & in dorso subluteis ac nigricantibus maculis confpergitur, quibus minor caret. Gesnerus maiori maculam ait esse albicantem in vertice, in medio oculorum interstitio; & contiguum ei anterius foramen parvum membrana parum prominente circumdatum. *Prickæ* cum maiori colore convenit, sed pro maculis quales diximus, transversales habet lineas. Omnes utroque gutturis latere *septem foramina* habent, quibus aquam acceptam reddunt. *Platina* *linguam* Lampetris tribuit, *Rondeletius* habere negat. *Salvianus* & *Bellonius* non inemerunt. *Oculos* rotundos & profundos habent. In maiori cæruleam pupillam aureus circumambit circulus.

De *Lampetrarum migratione* & hoc habe, Veris initio migrare, & circa *Donati* diem, qui est decimus septimus Februarii, nullas amplius apparere, sed aut recedere, aut corpore reliquo tabescente, licet capitis moles relinquatur, interire.

Initio Maii optimas, ab eo tempore irrequieto motu emaciari, & plerasque ante partum mori, parientium sobolem evanescere, nec unquam circa *Argentina* apparere; adultas, quæ non pereunt, cum fluvio aqua secunda, Maio mense auferri, *Argentinenſium* piscatorum relatio est. In mari & fluminibus parvas *parere*, eoque tempore quo in fluminibus capiuntur, in mari etiam capi, reliquisque anni temporibus vel in abditis locis latere, vel à littoribus in altum pelagus longè secedere; maiores in fluminibus rariores esse, *Salvianus* author est. *Vesuntur* aqua & musco. Quidam esca quadam composita in fontibus & aquis dulcibus eas nutriunt, & servant. Spumarum indiciis comperiri solent: captæque perpetuò in aqua immergi, cum qua ex longinquis partibus in urbes deferuntur.

Vsum in Cibis quod spectat, *Albertus* dulcem & insalubrem vi-
noque condiendum, *Alexan. Be-*

nedictus optimi succi, facit. *Salernitani* crassum & viscosum, minus tamen *Anguilla*, & quia veneni aliquid habent, in vino submergendas donec moriantur, posuere. *Romæ* olim proximam à *Scaris* quibus principatus debebatur habuere mensam. *Scribit Platina Romæ aule fortassis offensus*, bene à natura factum esse, quod *Romæ* ex *Tyberi* permagnæ capiantur, & delicatissimæ, quoniam vallatæ ibi gulæ inter se auctis pretiis certant. *Emi* (inquit) frequenter *Lampetras* quinque sex, septem aureis, & olim à *laticlavio* viginti, cum alter secum auctionaretur, emptam scimus: nec passa est ingenua gula tantam audaciam gratuitam esse. Dispensato enim, quod sui ipsius arrogantiam & factum (nolo dicere stultitiam) imitatus esset, centum aureos dono dedit, ne secundo ad certamen singulare provocatus, timidus ac infractus animo succumberet.

Cæterum non quovis anni tempore, nec quovis loco tanti fiunt. *Scribit enim Iovius Romanis*, id est, *Tyberinis* præcipuam nobilitatem à magnitudine & sapore esse adeò ut denis sæpè aureis veniant, ipso præsertim vere: & recte quidem, quoniam incipiente æstate, spinalis medulla iis nervi instar durior efficitur; & marinæ, hoc est, quæ in mari capiuntur, aridæ semper ac velut agrestes judicantur. *Iovius* delicatioris condimento, multo maiorem quam ab ipsis pulpis nobilitatem accipere scribit. *Necari* enim solere in vino *Cretico*, eiq; *myristica* nuce os claudi, & foramina illa (branchiarum utrimq; septem) rotidem *caryophyllis* adimpleri in reganoq; convolutâ in spiras, additis *avellanistris*, medulla panis, oleo, vino *Cretico*, aromatibusq; ad temperatiores prunas certis momentis sedulo excoqui, quo condimento, inquit *Leo x.* in minori fortuna, joci causa, ut convivium exhilararet, *Marianum* cucullatum, salsum, & ridiculum hominem decepit.

Namque

Namque funem instar Lampetræ incoctum, multoque illo jurulento immersum, grandi in patina appositum, ut notam omnibus eius edacitatem, gulamque eluderet: qui jam magna pultarii parte absumpta pseudolam petram aggressus, diu multumque cum ea maxillis ac dentibus inhaerente colluctatus, cachinnum cunctis tollentibus, facetissime respondit: utinam sic mihi sæpius illudatis. Nam in hoc condimento non modo funes, sed & ipsas carenas (quibus infani vobis similes vinciuntur) & cum voluptate quidem absumerem.

CAPUT IV.

De Anguilla.

TAB.
XXIV.
7. 8.
Aldrovand.
de Piscibus
l. 4. c. 14.

QVem piscem Latini Anguillam ab anguis similitudine dicunt, illa Græcis veteribus ἄγχίλος, ὅτι τῆς ἀλγῆς, quod commoto cæno felicius capiatur, modernis ἀχέλυς, vocatur. Lacedæmoniis ἀγκυλάτης dictas, apud Hefychium legimus. Est ex piscibus κατὰ θεομοίον, qui in aquis dulcibus geniti, ad mare descendunt.

Duo ipsarum sunt genera, Maius & Minus. Illi caput brevius, crassius & latius, color fuscus: in profundo degit, & aqua deficiente sæpe in limo, ut inde effodiatur, occultat. Ad mare nunquam descendere, sed semper in vallibus degere, quidam affirmant. Mares Rondeletius vocat. Huic, quod Anguilla simpliciter dicitur, caput longius & acutius, & in mare descendit. Læves sunt in universum & lubricæ, ut manu teneri non possint, si inclusæ tenentur, quacunque caudam exerere possunt. eadem totæ evadunt. Aristoteles eis quaternas utrinque branchias, sed simplices tribuit.

Alias quoque branchias pauciores minusque continentes habere scripsit. Athenæus verò ex Theophrasto exiguas. Cuticulæ quæ hæ-

reguntur, Parvula inest rima, quæ causa est, quod in turbidis aquis facile strangulentur, & in aere diutius vivant. Teste eodem Aristotele gulam quæ paucis piscibus contigit, habent, licet exiguum, ventreque sunt exiguo. Feljecori hæret. Hoc magnum est, illud aqueum. Pingue inest paucis, plurimæ eo carent. Hippocrates tamen pinguedinem habere scribit, eandemque naturæ hominis inimicam: cæterum hæc pinguedo à carne separata non est: quare alias dicebat Philosophus: seorsum enim à carne non pinguescunt: unde parvum eis in omento sebum esse solet.

Tergus earum quam Murænis crassius teste Plinio: cuius locum de pinnis huius piscis, ubi lumbricis pro lubricis legebatur, restitui in Lampetra ex Aristotele, qui longorum vel lævium alios ut Anguillam & Congrum binas pinnas, alios ut Murænam nullas habere scribit. Has juxta branchias hæere idem asserit, supinisque pinnis carere. A medio dorso & ab excrementi meatu veluti limbus cutis potius, quam pinnarum substantia superiores corporis partes ambit.

Ventriculus & intestina in longum protenduntur. Color omnibus haud idem. Variat enim aquarum in quibus degunt, ratione. Quæ puram & defluentem incolunt, ventre (inquit Salvianus) sunt candido, dorsoque cineraceo sive subcæruleo: quæ vero in impura & stagnante commorantur, ventre sub albo, dorso vero subviridi vel subnigro apparent: Os habent satis apertum, dentibus, parvis, acutis minutim, multiplici ordine. Magnitudo quoque non ubique eadem. Plinio atque Solino restibus in Gange ad tricenos pedes augmentur: & Athenæi Pausaniæque testimonio Copaidæ, item Strymonia eximia magnitudinis esse dicuntur. Archestratus Copaidas apyrenos quasi spinas & ossibus carentes vocat: Gesnerus & Dalechampsius Lampetras intelligi volunt: quoniam hæ prospinis cartilaginem

Aristot. H.
A. l. 1. c. 5.

Plin. H. N.
l. 9. c. 3.
Athen. Di-
gnos. l. 7.

ginem habent. *Magnas* vel ad brachii crassitudinem capi audio in aqua mortua (ut appellant) Galliæ Narbonensis. In Italia ad viginti libras aliquando accrescunt; sed quæ superant, nunquam inventæ sunt.

Locum, si spectes Marinarum quodque Diphilus & Epicharmus apud Athenæum meminere, non quod ibi nascantur, cum paucæ & nondum adultæ nunquam, magnæ & adultæ raro ibi reperiantur; sed quod, ut Plinius, Aristoteles & Oppianus firman, maria ex fluminibus subeant. In nullo amniū qui Danubium influunt, reperiri in omnibus, qui Rhenum, licet ex uno aliquando cum illis fontescantur, Naucerus & Albertus prodidere. Frigiditas Danubii fortè in causa, cuius aquæ ante fauces Alpium ab Occidente in Orientem fluunt; maior pars ex Alpibus descendit, & à parte Aquilonari, ante Alpes delabitur. Copaldum, quæ ἀπύρνοι, σπυρίδας, Polux & Aristophanes commendant. Prodigiosæ eadem interdum magnitudinis à Bæotiis hostiarum more coronabantur, asperæque mola, cum precibus Diis immorabantur. Regiæ, quas Lethus circa Berenicem fluvius sibi vendicat, sesquialteræ ad illas, quæ ex Macedonia & Copaide lacu habentur. Suus iis & qui in freto Rhegi, & in Mæandro fluvio capiuntur honos. Strymonia quoque, Elori amnis, & qui ad Euclea fluvium, in precio fuere. Pars Britannia Anguillarum terra à copia, quamvis ibi non degant, dicitur. Ad Aquas mortuas brachii crassitudinem æquant. In stagno Monspelienfi Latera dicto, trium vel quatuor cubitorum sunt longitudine. Ex Tarni fluvio, qui non solum augeat, sed efficit Garumnā, quæ parte in eum erumpit, tanta copia deferatur, ut una die xvi m. in nassis inventa sint. In Mintio amne quandoque mille glomeratæ capiuntur, ut apud Cardanum extat. Malè

ergo ἐν ταῖς ἀσθενέσσας λίμνας, in sta-

gnis promanantibus, ut Scaliger vertit, reperiri negat Aristoteles.

De ortu dissentiunt Authores. Plinius, Anguillas atterere se scopulis, ea strigmenta viviscere, nec aliam earum esse procreationem scribit. Secundum Aristotelem, in

dissectis neutrum sexum, nec vel ova vel semen deprehendas; in temporibus siccis, sed post imbres, idque ex iis, quæ vocantur γῆς ἐντέρα, terra intestina: quæ sunt in cæno & putredine; maritimis quidem locis, quæ algam producant; in stagnis verò & fluviis propè ripas, quia re-

por sive calor istic putredinem gignit. Plinio Athenæus & Oppianus ex veteribus, ex recentioribus Rondeletius adstipulantur. Illi complexas coire, & strigmentitium, quid emittere, ex quo cum in limo fuerit, ἐν τῷ βορβορῶ καὶ τῇ ἰλύι γενομένης σήψεως, animal generetur, prodiderunt. Hic inferiore ventris parte vulvam in fœminis, semen in maribus esse, multa pinguedine perfusas non apparere, corporum complexu coeuntes à se visas scribit. Utroque id fieri posse modo credo. Nam & Bernicia in Scotico Oceano ex vermenascuntur, post ova excludunt. Eadem & Rondeletii sententia. Addit enim, cum equus mortuus in stagnum Megaloniae injectus fuisset, innumerabiles paulò post ibidem visas Anguillas. *Nutrimētum*

ipfarum sunt, radices herbæ & cuncta quæ in limo offendant, visæ, ranis, vermibus & piscium partibus vesci. Paxamus hirudines, Homerus cadavera, quidam se ipsas invicem, Plinius edulia si quæ apponuntur, devorare, testantur. Purissimam tamen aquam impensius amant, ideò in quadam Britannia parte, ut Albertus ex Beda refert, in ortu Cosmico Plejadum hoc est xvii. Calend. Junii, quod tunc propter ventos, qui initio veris è terra erumpant oppositos aqua nunquam luto turbetur, ingens ipsorum copia; & à turbida abhorrent adeò, ut Athenæo teste, cum

Q veri-

Plin. H. N. l. 9. c. 61. Aristot. H. A. l. 6. c. 15. edit.

Athen. Dipnos. l. 7. Oppian. Halieut. l. i. v. 156.

Aristot. H. A. l. 8. c. 2.

Athen. Dipnos. l. 7. Aristot. H. A. l. 6. c. 14. Aldrov. de Pisc. l. 4. c. 14.

Athen. Dipnos. l. 7.

Scalig. ad Arist. H. A. l. 6. c. 15.

Aristot.
H.A.I. 8.
c. 2.
Plin. H.N. ventris turbatur suffocari, & quidem propter exiguas branchias, soleant. In exiguis aquis mori dixit Aristoteles, hyemem malè ferre, Plinius.

l. 9. c. 21. De reliqua ipsarum natura hæc habe. Noctupasci, interdiu limo quiescere, ideo separatim ab aliis degere piscibus; exanimis piscium more non superfluitare; ut apud Plinium legimus, quod ventres sint exigui, pingue paucis insit, plurimæ eo careant, ut Aristoteles tradidit, aqua tranquilla efflare, id bullarum indicio colligi eodem genere motus, quo serpentes in terra, id est cellerrimè, moveri, ita ut dum Phalacrocorax integras devoravit, mox per intestina delabantur, idque vel novies aliquando fiat, in sinu dentas, hominem aliquando ita circumplecti, ut nonnunquam suffocent. Annis septem vel octo, quod branchias pauciores minusque continentes habeant, & paucum humorem admittant, vivere, extra aquam ad quintum, sextumve diem siloco umbroso, & frigido; (si à sole tangantur in terra brevi moriuntur) reponantur, à motu non impediuntur, & ventus septentrionalis aspiret; excoriatas & in partes sectas sat diu. Tonitrua denique adeò timere, ut profundo ad superficiem enatent, frigoris adeò impatientes esse, ut cum Anno M C X X V. omnia gelu & glacie rigerent, in terram proreperent, & intra fœni cumulos se abderent.

Athen.
Dipn.
l. 7.
Aristot.
H.N. l. 8.
c. 2.
Plin. H.N.
l. 9. c. 21.
Disciplina non omninò expertes esse videntur. In Jovis Lebradii namque fonte Anguillas è manu vesci & in aures additas, à veteribus præditum Plinius refert; & in Arethusa Chalcidensi, Anguillæ & Mugiles mansueti in aures tum argenteis ornati accipiunt à largientibus cibos, à sacerdotibus viscera & caseos, ut Athenæus scribit, & *Ælianus*, item *Plutarchus*, qui facras hæc Anguillas vocari ait. *Nymphodorus* denique in Eloro annæ tradit Lupos esse, & Anguil-

las magnas adeò mansuetas, ut è manibus etiam porrigentium panem capiant: quod & Appollodorus scribit in *Chronica*. *Hospitaliter* eas tractant, Ardea, Corvus aquaticus Phalacrocorax ex avibus; ex quadrupedibus Lutra; quæ tamen amputato plerumquæ capite discedit, ut piscatores prodire.

Quantum ad usum in cibis, delicatissimas olim fuisse certum est. *Mænander* inter paucas sumptuosissimi convivii, quæ talentò ferè constarent cupedias enumerat. *Phitetarus* miseros divites, qui parcè viverent, & Anguillas non ederent, dicebat. Alii cœnarum *Helenam*, voluptatis reginam, præ Diis honorandam, &c. dicebant. *Sybaritæ*, iis, quæ eas piscatentur aut venderent, immunitatem, teste *Athenæo*, decreverant. *Hicæsius* denique succi bonitate cæteris præcellere, stomachoque gratas esse reliquit. At medicis quamvis carnem mollem habeant, succo tamen lento & pituitoso abundant; inflammationem pulmonis, quod pinguedine hominis naturæ maxime infensa oblinantur, inferunt; superflua humiditate, quam partibus alluunt, turbidam & sonoram vocem reddunt, & secundum quosdam, nescio quid, quod nisi eximatur in periculum vitæ conjiciat, habent; ideo fortè caput, cauda, & à quibusdam oblonga, quæ nigricans per dorsum fertur vena, abscinduntur. *Platina* ubi præparationem Anguillarum eximiam addit, subjungit acutissimè, sic paratas hostibus apponendas, quod nihil boni in se habeant.

His noxis infringendis, veteres betæ involutam, ut vitiositate sua humidum detergeret, comedebant; *Salernitani* vinum fortè hoc est generosum & crassum, quale est rubeum præscribunt, nam si tenuè biberetur, Chylus in venas anteperfectam coctionem abiret & in corpus raptus Cachexiam excitaret.

idem

idem accidit, nisi pedetentim, & parum velut pitissando hauseris.

De Vsu in Medicina tantum observavi apud Authores, *Pinguedinem* in elixatione supernatantem unguentum ad plagas ingredi, de tosta destillatam, aurium & nervorum doloribus mederi; glabro capiti illitam capillos restituere; cum pinguedine anseris, succo rutæ, absynthii, hederæ terrestris, & Cynoglossi subactam, ad vulnera præstantissimam esse: Fumum ex salitarum cute exceptum; tormina ventris ex dysenteria sopire; in vino putrefactam vini tædium parere. Evisceratam, tusam, & in olla vitrea coctam, cum pinguedine ac liquore, qui in fundo valis remanet, hæmorrhoidum cruciatus egregie lenire. Cingari Anguillas Equis per anum inferunt, ut obefiores, & agiliores videantur, Hippia tri quidam equo asthmatico Anguillam vivam ori inferunt, ut per intestina elaboratur. Alii & parvam imponi jubent purgationis causa. Nec propterea mortis periculum esse aiunt: quin Gesnerus asserit nautam sibi notissimum vivam integram deglutiisse, integram per alvum, vivam reddidisse. Idem author est, aliquos aureum & cholobaphicum colorem ex felle Anguillarum, aliorumve piscium vel boum parare: miscere autem aceti modicum & cum creta subigere in massam. Prætextatos earundem tergore verberari solitos Verrius teste Plinio tradit, & ob id multam his negat institutam. Prætextatos appellans impubes, eos nempe qui frugem aratro quæsitam nocte furtim secuissent, aut depopulati essent.

CAPUT V.

De Orbe.

HUJUS piscis solus meminit Plinius. Durissimum esse piscem, inquit,

constat, qui Orbis vocetur: rotundus est, & sine squamis, totusque capite constat. Gesnerus Apuleii, *Cranium* esse opinatur, quod ad crani formam magnitudine, rotunditate, & dentibus humanorum similibus accedat.

Tria ipsius genera descripsit Rondeletius, *quartum* addit Aldrovandus. *Primus* qui Orbis simpliciter figura, si caudam demas, sphaericus est. Squamis prorsus caret, cuteque regitur admodum dura; quam asperam efficiunt aculei duri, quibus tota cōspersa est. *Rostro* caret: *Capitisque* nullum apparet vestigium, quin (ut Plinius ait) totus capite (malim ventre) cōstare apparet. *Os* habet parvum, dentes vero magnos & latos, utrinque binos. Supra os duo exigua sunt foramina, olfactus, auditusve instrumenta: *Oculi* mediocres. Circa corpus medium unica est & semicircularis utrinque *branchiarum* scissura; prope quam etiam utrinque unam haud magnam, sed rotundam pinnam habere Salvianus ait, & in icona exprimit. Rondeletius unicam esse ait, ut in Caprisco. Hic & in summo dorso pinnulam pingit qua Bellonii icon & Salviani quoque caret, & ipse in descriptione non meminit. Eam tamen etiam videre est in icona ad sceleton efficta à Gesnero, quæ hic exhibetur. Posterior corporis pars in *caudam* brevem & rotundam, inque latam & fere lunatam pinnam desinentem degenerat; in cuius parte media atque superiore, pinna una erigitur, altera quoque inferiori parti hæret. Color ei cineraceus, lineis quibusdam latis & obscurioribus ex pisce medio exortis posteriorem eius partem ad caudam usque pingentibus. Est maris Ægyptii accola, ex quo Nilum quoque subit, & in eius ostio, quod Saiticum vocatur, capitur. Ob insolentem corporis detractum corium tomento impletur, & in domibus ornatus causa suspenditur; suspensus, rostro cæti partem à qua flat ventus indicat. *Alter Scutatus seu Scutifer* dicitur, & in Septentrionali Oceano capitur.

Q 2 Est

Est corpore terete, mucoso, capite magis exerto quam superior: oris scissurâ majore, dentes in eo sunt plures & minores; oculi parvi, & exquirit rotundi. Branchiarum rimam multo majorem habet intra has pinna duas. Subest prosterno os illud, quod scuti specie esse diximus. Neque prona neque supina parte pinna habet, cauda in unam latam definit. A capite ad caudam usque ossa ovi figura disposita sunt inter quorum intervalla aculei interjacent. Piscis est rarus & non edulis. *Tertius* est *Echinatus* seu *Muricatus*. Aculeis totus hic Orbis riget, ut manu tollere non possis, nisi cauda extrema apprehensa. Capite est multo minus exerto quam proximè descriptus, corpore magis rotundato & majore, in quo nullæ sunt pinnae præterquam in cauda, quæ in unam definit. Sunt qui Hystricem ab aculeis, non inepte appellent. Possit etiam nonnullis videri *Æliani Sagittarius*, quem rubri maris piscem esse scribit. Sagittarius in eo mari procreatur, & quoniam erinacei speciem & similitudinem habet; firmis & bene longis armatur aculeis. Sed de hac re judicentij, qui maris rubri pisces viderunt. Nihil temere de rebus parum compertis affirmare volo. *Quartus*, quem Aldrovandus dedit, quod ad oris figuram potissimum cum Scutato convenit, *Stellatus* sive *Asterias* cognominatur, quod totus conspersus sit stellis seu asteriscis: differtque à cæteris, quod neque ad branchias, neque in caudæ exortu pinna habeat, sed ultra tergoris medium, nisi pictoris id incuria factum sit. Pinnae etiam caudæ in extremo viridi sint colore.

CAPUT VI.

De duobus piscibus Orbibus annumerandis.

TAB.
XXIV.
13. 14.

O Blongi quidem hi Pisces sunt, Orbibus tamen, annumerari

posse censet Gesnerus, tū quod mucrones ut illi in corpore eminentes habent, tum quod à mucos, quem similiter ore emittunt, vulgò *Snottolf* quasi *Myxini* aut *Mucos* appellatur. In *prioris* effigie color erat circa dorsum, qualis in terrestribus ranis videtur: circa latera & inferius ex subcæruleo & viridi permixtus. Antverpiæ cinereo colore capi audio. Sic ille. *Alterū* & hic quoque depictum, *Snottolfi* nomine missum, ex icone, sive ea, inquit, naturalis, sive aliqd etiam in ea artificiosum est, sic delineavit. Longa est dodrantem & palmos duos, lata palmum unum, circa medium præcipue ad eaput attenuatur, sed magis ad caudam: *dorsum* medium fastigiatur, punctis notatur variis, subrotundis, & eminentijs exasperatur triangulis, per tres aut quatuor ordines digestis per intervalla. Oris hiatus, figuram fere ovalem refert. Pinnae ad branchias binæ, una in fine dorsi, altera in fine ventris, inter quas corporis pars extrema veluti discreta, & articulo distincta videtur. Cauda tripartita, sive natura, sive potius arte. Mucosus admodum est, inquit ille qui misit, non ossium, non carniū quicquam habet: mucoso tantum lentore expletur. Captu difficilimus. Nam ubi hamum vel retia senserit, suum illum mucum evomendo, lubrica reddit omnia, contractoque orbem exuvio proflit. Mollem quidem & mucosam carnem, & eminentias trigonas, cum aliis *Snottolfis* communes habere videtur.

CAPUT VII.

De *Holosteo Bellonij* seu *Orstracione Gesneri*, & *Catan*.

DE hoc Pisce sic ex *Gesnero* & *Bel-* TAB.
lonio Aldrovandus. Hunc quoque XXV.
è mari Nilum subire, etsi ignoremus, 7. 8. 9.
marinum tamen esse ex corii duricie
cōjicimus, quæ testā fere ostreaceo-
rum imitatur, unde cum ob hoc, tum
quod *ὀστέον* à Strabone inter Niloo
pisces

pisces numeratur (in vulgaribus Strabonis codicibus impressis legitur *ὑπερβαλόν*, sed interpret Latinus *ὑπερβαλόν* legisse videtur, vertit enim ex testaceis, imperite: & in epitome scribitur *ὑπερβαλόν*.) Gesnerus *Ostracionem* hunc piscem nominandum conjicit. Bellonius vero non aspernando nomine *Holotheon* appellavit, quasi totum osseum. Forma (inquit hic) ad pentagonum accederet, pedalis inter dum longitudinis. Incolæ ab interaneis protinus emundari curant, deinde vero testam eam duram (testaceum corium) qua contegitur, multos annos incorruptam servant, ut inde lucrum consequantur, quod a negotiatoribus externis novitatis gratia huiusmodi piscis emi sit solitus.

Cæterum dum vivus est penicillum in cauda habet, & pinnas supra & infra caudam: ac rursus pinnam aliam utrinque; oculos albos, os parvum. Color eius lactescit, & velut in pallidum languens. Is quem ego in museo jam multos annos inter rariora refero, & hic depictum ostendo, ab eo quod supra rostrum conspicitur tuberculo (nasum appellare liceat, piscem ipsum ab eo *Nasum Niloticum*.) ad extremam usque caudam vix implet duos doctantes. Torus est *pentagonus*, totusque item ex articulis ferme pentagonis (ut icon ostendit) constat, qui coctione, imo per se temporis diuturnitate dissolvuntur. Branchiarum scissura semicircularis: juxta quas utrinque pinna est, parva quidem si corporis magnitudini compareretur, sed perquam robusta: post podicem alia similis planè sed brevior. Uropygium totum cutaceo corio tegitur, ut quod mireris, in ostreaceum totius corporis tegumentum ita inseritur, ut a lateribus ei annecti non videatur; quin haud aliter corpori affixum est, quam navi clavus; oportuitque cutaceum esse, ut mortui promptus, idoneusque foret. *Oris* rictus pro corporis portione exiguus; in quo dentes utrimque fere octo, non ab similes dentibus murium. Utraque maxilla cutaceo etiã, non ostreaceo corio quod ad modum ineptum fuisset, constat.

Habes hic huius generis piscem alium æque duro tegumento præditum, sed qui dimidio minor est, non pentagono corpore, sed ventro triplo. quam tergo, latiore, lateribus quodammodo concavis: cuius item articuli non pentagoni, sed fere rotundi, & orbiculati, & in singulis asteriscus venustissime spectabilis. Eminentia quæ in medio dorso est, non pinna, sed plane ossa substantia gibbi specie. Pinna vero in eius conspicitur extremo. Cætera superiora similia habet, præterquam quod naso (ut vocabam) caret, & oculi sub majoribus tuberculis latent.



HISTORIÆ PISCIVM

LIBER III.

De Piscibus fluviatilibus.

TITULUS I.

De Piscibus fluviatilibus squamosis.

CAPUT I.

De Trutta fluviatili.



Antum de Piscibus *ἀντὰ* TAB. *ὑπερβαλόν* & *καταδ' ὑπερβαλόν*. Fluvia- XXVI. tiles sequuntur, & hi vel I. *mere tales, vel qui etiam in Aldrov. de aliis dulcibus aquis vivunt, vel lacustres. Piscib. l. 5.* Inter Fluviatiles eosque squamosos c. 12. primus est *Trutta*, Ambrosio *Trocta*, a trudendo *Platinæ*, quoniam semper in adversum & impetuolum flumen nitatur, adversas undas superare. Itali *Torrentinam*, quod in torrentibus & rivis montanis abundet vocavere. An veteribus fuerit cognitus incertum. *Theodonem* Aufonij Figulus putaris; Rondeletius, Gillius, & Bellonius *Salarem* eiusdem. Jovius *Lupum varium* Columellæ, Gesnerus *Athenæi pyrruntæ*. Figulo obest, quod Theodonem, Salarem, & Farionem unum piscem faciat. *Salarem* parvum esse *Salmonem* superius dictum, & Poëta

clarissimè indicat. Nec *Trutta Lacustris* seu *Salmonata* erit, cum hæc in lacubus nascatur. Lupos inter duos pontes in Tyberi capi diximus: *Truttas* suburbanæ amnes ex Reatinis Sublaqueanisque quotidie fuggerunt. Illi frigus vehementer pertimescunt, frigidiorib⁹ duntaxat locis gaudent.

Ælian. H. A. l. 15. c. 1. Quod verò *Ælianus* in *Astræo Macedoniæ* fluvio pisces τιν ῥέον κατὰ σῆμας gigni, & peculiare quasdam muscas circa summam aquam volitantes appetere; piscatores, pro his muscis purpurascente lanâ hamum vestire, & gallinaceas pennas duas cerei coloris addere, ut pisces decipiant, prodidit, egregiè *Truttis* conveniret, si nomen additum fuisset.

De *Pyranthibus* credit *Gesnerus* *Mnesitheum* apud *Athenæum* loqui, cum ait. Ex fluviatilibus optimi sunt, qui in rapidissimis fluviis versantur, οἱ τε πυρῶνες. Hi enim non gignuntur nisi in rapidis & gelidis fluviis & facilius quàm cæteri fluviatiles concoquuntur. Convenirentque ista *Truttæ* nisi *Causabonus* pro οἱ τε πυρῶνες scribendum esse οἱ τε ὀψιόεντες, ita, ut sensus *Athenæi* sit, optimos ex piscibus fluviatilibus illos esse, qui in fluminum locis, qua maximè aquarum imperus vergit, quæque rapidissima sunt, quod plus exercitii habeant, vivunt, putaret. De ipsarum Forma sic scribit *Aldrovandus*.

Sunt *Truttæ* & *Salmoni* multa cōmunia; forma nēpe tota, & corporis partes externæ & internæ: caro rubicūda, squamæ exiles, macula seu pūcta, magnitudo, formæ mutatio, circa rostrum præsertim, ac simul nominis: (in *Truttis Salmonatis* peculiariter) ascensus ad summam aquas saltuum vis & agilitas, suavitas in cibo: quamobrem non est mirum si ex *Truttis* illis, quas *Germani* *Lachsforen* appellant, aliqui ætatis progressu *Salmones* fieri putaverunt: *Pinnis* etiam quatuor natant, quemadmodū *Salmo*. *Cauda* vero maxime invicem distinguuntur. In *Salmonibus* enim ea gracilescit, in *Truttis* semper lata est: in illis pinna caudæ longa & bifida, ut in *Alofis*; in *Truttis* brevis &

non divisa. Hic accedit rostrum acutius in *Salmonibus*, quam in *Truttis*. Rursus partibus internis à *Salmone* & *Umbra* fluviatili non differunt, nisi quod ventriculi appendices plures & evidentiores habent. *Cardanus* formam *Truttis* omnibus communē esse tradit, quod quidem de fluviatilibus verum fuerit: nam quæ *Salmonata* cognominatur, non parum ab iis differt, ut cuilibet icones conferenti notum esse potest. Quæ flavescunt item & nigricant, ab *albis* differre *Rondeletius* testatur, quoniam illis rostrum sit acutius, & veluti in fronte macula nigra. Præterea *albas* minores esse & carne minus flavescētē.

Fluviatilis, corporis forma *Lupo* (inquit *Salvianus*) perfimilis est, rostro tamen minus extento, magis recto & paululum recurvo. Ore etiam paulo minore. *Alba* testante *Rondeletio* capite *Mugilem* quodammodo referunt: brevi nimirum, subrotundo, carnoso, vel potius pingui, coloris lactei. Maxillæ & lingua acutissimis dentibus armantur. *Sylvius* sex eorū ordines esse scribit, primum labris connatum, alios quinque à labro in pharyngem abscedentes: in quo tamen dentes sint in contrarium hamati, & qui cibum ex ventriculo regredi prohibeant. Idem ait, branchias utrimque quatuor dentibus humatis & asperis & duris contumaces habere: quæ verba non satis percipio. *Cardanus* & *Bellonius* sex inquirunt in lingua dentes habere: addit *Cardanus* & certo ordine dispositos: scilicet duos ante, totidem in medio, ad latera positos reliquos juxta radicem. Qui vero in oris rictu sunt, eorum *Bellonius*, quinque ordines in superiori parte palati facile posse scribit denumerari. *Pinnas* duas sub ventre superiori tergoris oppositas, & duas ad radices branchiarū habet, unā rursus versū caudā, proxime ad anū, quidē ē regione est superioris indorso, quæ longo minor est & cutacea. Oculos habet rubētes. Corpus squamis parvis tegitur, & cute quæ facile rugatur, & carne divellitur, absceditq;

Dorsum,

Dorsum, imo totus fere piscis ex albo flavescit guttis; quales diximus. *Cauda* in brevem & latam pinnam degenerat. *Pinna* tergoris, iisdem quibus corpus maculis conspersa est. Cubitalem magnitudinem non excedit.

Differentias à coloribus duntaxat sortiuntur. Bellonius ex Rila Neustriæ flumine variis notis pictas videri, aliis atque aliis multum diversas; tamen in eodem tractu cæperis, scribit. In Santonum & Boiorum fluviis, reperiuntur, ut Rondeletius prodidit. Captam allicubi flavi coloris & admirationi fuisse; apud Gesnerum legimus. Subnigræ; maculis rubentibus notatæ; quem colorem ex senio contractum; quodæ maximæ sint, Rondeletius putat, in Misiia sunt vulgares. Sunt ibidem *Lachsforen* dictæ; nomine ex Salmone & Trutta composito, quæ aureis maculis pinguntur. Subnigras rivi ad Crottendorfum, & fluvius quem Nigram aquam vocant, Suarceburgum oppidum alluens, alit. Multis in locis optimæ reperiuntur; & quamvis in maioribus fluviis reperiantur, in minoribus tamen frigidioribus, saxosis & inter montes delabentibus potius quam contra se habentibus, nasci & degerere constat. In altis item montium rivis, etiam tenuibus & exiguis aquis, Truttæ satis magnæ & pulcherrimæ habentur. Ascendunt enim altissimæ, cum & contra aquam luctari magna vi, & saltu se promovere, ad tres vel quatuor fere cubitos interdum, in ascensu queant. Ex quibus efficitur, ut haud falsa esse credamus, quæ de iisdem Paulus Jovius scribit; eas adversos amnes vel è præruptissimis etiâ cauitibus decedentes, incredibili impetu subire. Ab Nare enim fluviò in Velinum lacum, qui hodie Pedelucuse est, stupendâ velocitate voluerum modo ascendere credi: qui lacus ab altissimo montis vertice certis primo coarctatus angustis, & mox tota aquarum mole præcipitatus, nec subiectis quidem cautibus madefactis, veluti è cælo in ipsum profluentem Na-

rem effunditur. Idem in Gardonis fluviis fieri experientia docuit.

Vescuntur aquarum dejectamentis; phryganiis vermibus, locustis aquaticis, & piscibus. Percarum sobolem; Fundulos, & Phoxinos læves, tantâ sæpè aviditate appetunt, ut supra aquam elatæ in scaphas aliquando incidunt. *Auro vesci* vulgus credidit. *Pariunt* mense Octobri, in modicis quas excavavere scrobibus. Laudantur vehementer in *Cibis*, maximè si in frigidioribus & purioribus amnibus procreatæ sunt.

Quæ adverso eorundem imperii fatigantur, atque occurrentibus in æqualium vadorum petris illiduntur castigatiora sumina, & aridiusculas carnes ostendunt, sed recenter captæ comedi debent: mortuæ enim paucissimis horis, quia ob pinguem tenebritudinem ocyssimè putrescunt, saporis gratiam amittunt. In Malacea regione Indiæ, salitæ ad commeatus servantur; Cajuba vocant.

CAPUT II.

De Trutta fluviatili altera.

HVCH apud Bavaros (inquit Gesnerus) nūcupatur piscis boni saporis, Truttis non nihil cognatus, cū alias ut pictura ostendit, quam ad vivum expressam Achilles Pyrrminus Cassarus; præstantissimus Augustæ Vindelicorum medicus ad me misit; tum quod pinnulam illam adiposam similiter in fine dorsi habet, & punctis variatur: sicut & icon nostra, & quæ in libro Bavaricarum constitutionum publicato habetur, præ se ferunt: in quo etiam mensura huius piscis proponitur, duodecim aut tredecim digiti, quibus brevior vendi non debeat. Augustæ, ut audio hic piscis vocatur, *ein Rot/ Kottle* à colore rubicundo, quæ nomina nostri Vmbliis (ut Sabaudi nominant) lacustribus tribuunt. Voracem esse aiunt, in cibo Truttis inferiorem.

In

TAB.
XXVI.
Aldrov.
de Piscibus
l. 5.
c. 13.

In Carinthia Huchæ rubræ (Rot Huechen) quædam cognominantur in fluviis, eas Salmoni comparant: carne etiam rubrâ & boni saporis esse aiunt, & saliri ut inveterentur, solere: quod quomodo fiat Balthasar Stendelius ad finem lib. 4. Opsoptæjæ suæ Germanicæ docet. Colores huius piscis in pictura nostra huiusmodi ferè apparent. Aureolus color passim aspersus est, copiosius tamen circa branchias & oculos. *Pinnæ* circa branchias rubicundæ sunt: cæteræ omnes, sicut & *cauda*, fuscæ & maculosæ punctis partim nigricantibus, partim auræis. *Dorsum* fuscum est, utrimque ad Indicum vel cæruleum colorem vergens, ubi & punctis nigris creberrimis distinguitur. *Linea* nigra & recta fere à branchiis ad caudam fertur, Latera media maculis quibusdam subcæruleis per intervalla distinguuntur. *Venter* candicat. Circa *rostrum* & branchiarum opercula roseus fere color, &c. in capite etiam viridis aliqua ex parte. Huchas istas quidam iconè nostra inspecta in quibusdam Germaniæ locis ali, in piscinis nobis referebant: & in Traga flumine Carinthiæ reperiri, ætatis progressu in Salmones converti (specie rostri nimirum) sicut & lacustres Truttæ, quanquam & aliæ Truttæ Salmonum speciem præferunt.

CAPUT III.

De Thymallo.

TAB.
XXVI.3. 4.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 14.
Ælian.
H. A. l. 14.
c. 22.

Thymalli solus Ælianus inter Græcos, Ambrosius inter Latinos mentionem faciunt. A Thymo quem olet ita dici, Salvianus contendit. Bellonius Thymum vocavit. Itali Temarum, quasi temerarium, quod stolidus piscis, dicunt. Truttarum generis esse, cum pinnarum situs, tum totius corporis figura indicant. Eratque Ælianus Truttis, si eas notas sibi habuisset, potius quam vel Lupis vel Cephalis, quorum communem & mediam speciem similitudi-

nemque gerere scribit, assimilaturus: quanquam & his non ab similibus multum: similior interim Mugili, quam Lupo. Caput pro corporis ratione parvum, in acutum tendit. *Os* aperitur nō longo, sed quadrato ferè hiatu. *Ventre* est prominentiore. Rondeletius latiore, magisq; ventrosus pinxit, quam par est. *Pinnas* duas habet ad branchias, duas alias in ventre inferiore, à podice unam. In dorso prior magna est, maculis multis pulchrè variis; infra partim nigris, partim subrubentibus, supra rubicundis tantum. *Cauda* in duas latas pinnas definit. Rondel. corpore ait esse cæruleo: Bellonius verò tergus ex livido in opacum tendere, & Gesn. fuscum id, vel subcinereum facit. Atqui hic exprimitur, Rondeletius scribit: fierique potest, quod vel loci, vel ætatis ratione evariet. Lineas per latera rectas habet, quarum quæ ea dividit à superiori branchiæ angulo spineo oritur, & recta ad caudam defertur: sunt & aliæ per totum corpus non paucæ, singulæque per singulos squamarum versus, non rectæ, sed innumeris veluti arcubus, minimis triangulis undatæ; quod veluti operosum pictores nostri, inquit Gesnerus, non indicarunt. Obscurè sanè & in meo pisce quem ad vivum depictum in musæo reservo, pictoreas expressit. Latera præterea modo pluribus modò paucis punctis & lituris nigris temere asperguntur.

Vidisse se idem Gesnerus in fine Decembris aliquando singulis tantum utrimque ad branchias *lituris* insignem scribit; aliumque initio Junii, uno altero puncto vix apparente. *Squamæ* ex eiusdem observatione, singulæ fere *ρομβοειδεις* sunt, hoc est, rhombi figuram imitantur. Latera enim, inquit, earumque utrimque circuli segmentum referunt, supra vero infraque in cunei acumen tendunt, quod tamen in iconibus suis expressum negat. *Branchias* habet utrimque quaternas, & ut Bellonius addit, Harengi & Sardinæ modo, solidioribus horrent, uncinatisque officulis constant. Idè Bellonius *linguam* ostendere albam

albam scribit, dentibus carere; immo heullis quidē rudimentis eorū præditum esse: ē contrario Gesnerus pro dentibus, inferius superiusq; labrum exasperari, limæ instar, introrsum præfitetur: & Bellonius haud bene istæc exanimasse apparet: nam alias *Lavaretum* Gallice dictū piscem, ossicula ad fauces atq; Oesophagi ingressum utrimq; habere senis hinc inde denticulis ait, ut in Themolo cōminuta; cū alioqui in Thymallis, & in Lavaretis suis nihil quicquā tale reperiās. *Ventriculum* habet mediocre, intestina crassiuscula, pinguedine multa obvoluta; & ut Bellonius ait, apophyses plures ex pyloro dependent, à quo statim sequitur intestinū unū gracile, rotundum, q̄ ad rectū tendit, in quo excrementa recipiuntur, & ad anum deferuntur. Idē Bellonius, *cor* tā exigū habere scribit, ut ne inesse, q̄dem ei credatur. *Splenē* Salvian⁹ subrubrū facit, Gesnerus in suo quē manibus tractavit, ferē nigricare asserit. Bellonio teste hic tā magnus est ferē in hoc pisce; q̄ hepar, quod in nullo alio pisce (inquit) unquā viderā, oblongus rubra pinguedine mixtus. Unicus hepatis lobus est, ut idē Bellonius observavit, statim ubi gula finit, stomachū amplectens. Salvianus *felle* carere putat: Bellonius vero tam exigū id esse tradit, ut vix rudimentū aliquod eius appareat: & Gesnerus quoq; suū Thymallum felle caruisse negat, sed flavi vel subaurei coloris id habuisse. Bellonius folliculū piscium nationi accommodatum plenum semper vidit, ac per spinam delatū. Cum maxime augetur, ad cubitalem *magnitudinem*, teste Æliano, excrefcit: etsi qui crebrius capiuntur, minores sint, & ut Salvianus ait, libram non excedunt. Longitudo ad latitudinem ferē quintupla est, cauda etiam computata, ut Gesnerus advertit in eo quē manibus tractans descripsit, latus enim erat digitos tres, longus quatuordecim. *Gaudent* puris frigidis & saxosis aquis, in quibus circa saxa reperiuntur: nec ulli magis in mōtanis & præcipitibus fluvii, Truttas si excipias, capiuntur.

Gignunt eas in Germania Rhenus,

Limagus apud Helvetios, & Floha apud Misenos; in Italia Ticinus, Abdua & Ambra, In Pado rarius capiuntur. *Vicitant* insectis aquatilibus, dejectamentis millē pedibus, pediculis, caridibus, pulicibus aquaticis ac terrestribus. Ælianus alia quā culice escā capi posse negat. Volaterranus Thymallo vesci, & solus quidē inter scriptores, voluit. *ἄυροφάγος*, id est aurivori dicuntur, seu q̄ minutula auri fragmenta ppter splendore appetāt; seu quod cū majori pretio vāniant, oesophagorū aurum absument, & oculos exhauriant. *De odore eius ita Ælianus*. Eius capti odor non indignam admirationē habet: non n. ut ceteri pisces pisculentum quendā mittit odorem: imo vero existimes te ejus gentilem herbam, recentem ex terra lectā manibus tenere. Tanta sanē odoris suavitare fragrat, ut qui eum ipsum non videt, gratissimā apibus herbam, unde nomē duxit, in manu latere putet. Ambrosius de eo, qui gratam redolet suavitatem, dici facile scribit. Aut piscem olet aut florem: Omnibus sui partibus cōmendatur *in Cibis*: quibusdam tamen interiore tunicā maxime blandiuntur. Circa Albim præferuntur Truttis. In Athesi & Addua captos tenerrimos Salvianus fecit. *Majo* mense maxime appetuntur, & loco marinarum saxatiliū præscribuntur à Medicis.

In Medicina, Adeps hujus piscis laudatur, tum contra auditum gravem, si mense Majo in vasculū coniectus soli exponatur, & quod distillat, auri immittatur; tum contra oculorum pterygia, ungues, ruborem, fervorē, &c. si quotidie binæ guttæ cum pinna instillantur. Vidisse se puellā chemosi affectā Gesnerus inquit, quod malū aliquādo exanthemata puerorum sequitur, hoc remedio per septuaginta ferē dies continuato, (ut quotidie gutta instillaretur) curatam, rubore mox primis diebus sublato. Addit insuper, habere & pharmacopolas apud suos hunc adipem; & ab iis maxime ad oculorum remedia, ut maculæ in eis deleantur, peti solere, deinde etiam ad curandas igne vel aqua adustas partes.

Ælian. H.
A. l. c.

Ambrōf.
Hexam.
l. 5. c. 11.

CAPUT IV.

De Umbra fluviatili.

TAB.
XXVI.5.
Aldrov. de
Piscib. l. 5.
c. 15

UMbræ fluviatilis Aufonius ex veteribus in Mosella sua meminit, Gesnerus pro eadem cum Trutta fluviatili, quod ista in Mosella imprimis ubi se in Rheinum exonerat abundet, accepit. *Rondeletius ita descripsit.* Piscis est non solum nomine, sed & colore marinis (Umbris) similis, à quo utrique nomen. Corpus enim est opaci loci modo subfuscum & subobscurum, cubitalem magnitudinem non excedens. Galli Narbonensis, demptis Monspelienfibus, Umbram vocant. Piscis est ex Truttarum genere, Carpioni Italico corporis aspectu affinis. Pinnis & earum situ Trutta non differt. Duas itaque ad branchias habet, duas in ventre, ab ano unicam, in medio dorso priorem majorem, posteriorem minorem, subrotundam, & pinguem, squamas parvas, & maculosas similiter habet. Carnis substantiam, partesque internas omnes easdem. *Capite verò à Truttis differt*, quo Carpioni (Italico, Gesnerus) similis est: capite enim longiore est, quam Trutta, ore minore nec tam hiant, rostrum non acuto, sed obtuso, maxime in maxilla inferiore, sine dentibus, & sine magna maxillarum asperitate. *Oculis* est patulis, cornea tunica aurea, pupillâ nigrâ. Corpus à medio sensim gracilescit, in caudam latiusculam, & pinnam bifidam, latissimam deficit. A branchiis ad caudam linea recta (hanc in pictura non expressit) per medium corpus producta est. *Branchia* intus sunt quaternæ; *Ventriculus* longus & spissus pinguitudine quæ lacte candidior est, obductus, à quo multæ apophyses pendent. *Hepar* rubet, cui alligata est fellis vesica, *fel* nigerrimum est, *splen* longus & niger. *Intestina* sine gyris ullis ad anũ demissa sunt. *Vescitur* terrâ, aquâ limo, uriaque, cum his, & cum arena auri laminulas haurit: ob id vulgus auro nutriri Umbrâ credit: & revera in ventriculo & intestinis aurum reperiri certissimum

est. Carne est sicca & alba, qualis est Truttarum parvarum caro. Hyeme latet: æstate cum Truttis capitur: cui cum insucco & substantia, permultisque aliis similis est, Truttarum generi & tractationi subjecimus. Puta aqua maxime delectatur. *Hæc Rondeletius*, nulla coloris facta mentione, quem Bellonius non tacuit: totum hunc piscem sub ventre argentetum, esse scribens: dorsum verò terfissimum habere ex livido opacum.

CAPUT V.

De Barbo.

BArbi quoque solus inter veteres **TAB.**
Aufonius meminit. Nomen ei Cu. XXVI.
tacei illi Cirri quæ barbæ quodam-
modo similitudine ex utroque huius
piscis labro dependent, fecere. *Bel-*
lonius haud incongruè vocabulo
Mystum vocat, & Græcorum vulgo
Mystacatum vocari scribit. Sunt qui
cum Mullis marinis piscibus, qui & ipsi barbati, confundunt. Corporis figurâ Mugiles ferè refert, aut Squalos, nam si latitudinem spectemus, oblongiusculus est rotundus, in laterâ modice compressus. *Differt à Mugilibus*, quod pinna quæ in medio dorso, firmiori aculeo innixa est: pinne ventris magis sunt flavæ; caudæ pinna rubescit: Rostro item est longiore & acutiore, cartilagineo & pingui. *A Squalo* etiam perspicuis quibusdã notis differt. Nam cum in extremo rostro Squalo sit os, infra rostrum in inferiore parte illud Barbus habet; unde & superior eius maxilla paululum prominet: Labra item longè crassiora sunt quam Squalo, caputque compressius. Postremò è superioris rostri extremo duæ appendices, ex lateribus duæ aliæ propendunt: quibus & Squalus & Mugiles carent. Est autem appendiculorum earum substantia cutacea quidem, sed mollis, lubrica, teres, subrubra. *Venter* est colore lacteo, latera argenteo. *Dorsum* ex albo flavescit, nigrisque quibusdã ac parvis maculis conspergitur. *Branchias* habet quaternas: quarum rimas admo-



Trutta. Fario

Fordle Fore.

Trutta

Tab. XXVI

Rot Forol.





Äsche.

Umbrä.

Äsch.

Thymallus.





Barba.

Barb.

Thymallus.

Äsch.





Capito.

Alat.

Capito fluviatilis. rapax

Isling. Raubalat.





Orfus. Rutilus. S. Rubellus.

Uff.

Lauciscus.

Reisuglen.





Leuciscus. Comel.

Reisuglin.
hinn Schwaal

Lauciscus.



Bliecke. laugeler.



Oxyrinchus. Sphyrana

Hautin. Spitznase.

Corvus Niloticus





Gobio fluviatilis.

Kresling. Bachkreß.

Nasus.

Nase.



Gobio.

Krasen.



Asper


Psaculus.

Ruchling.

Asper Danubianus. Zindel.

Gobitar. Grandi

Stain bößer



Gobitar. Barbata

Bartgrundel.




Gobitar. aculeata.

21

Schmerlein.

dorngrundlen.



Bellon. de
Piscib. l. i.

admodum parva est: quamobrem extra aquam satis diu vivit. Ab iisdem linea ad caudam porrecta, minus evidense est, quam in aliis. *Dentibus* caret. *Oculi* parvi sunt, pupilla nigra, quam ambit aureus circulus. *Fel* adhæret jecori. *Intestina* in spiras contorta, plurima pinguedine oblita. *Vterus* oblongus est & bifidus, ovis innumeris refertissimus, cum prægnans est piscis. Pondere plerunque libræ unius, quandoque duarum, raro trium. Salvianus ad octo libras excrevisse observavit. Bellonius frequenter in Nilo capi testatur, sed quo modo Lucius Italicus, inquit, à Gallico differt, sic Nili Mystus à nostro dissidet. Noster enim Mystus oblongus est, & quasi teres: Niloticus vero crasso & recurvo est corpore: Eiusdem tamen coloris sunt: & eodem modo barbis quatuor, seu mystacibus exornantur. Niloticus nostrum Cyprinum ipsâ formâ ferè æmulatur: ventrem enim habet expansum. Tantâ crassitudine in Nilo proficit, ut eum Memphis libras viginti pendentem viderim; quo in loco Mythus vel Mystus dicitur.

De Loco eius & Natura hæc Aldrovandus habet. In lacubus quidem nascitur; sed cū multo frequentius nascatur in fluviis, fluviatilis potius, quā lacustris erit dicendus. Scribit Salvianus paucos esse lacus, qui Barbis abundant: plurimos vero esse qui eis carent: contra in omnibus fluviis gigni atque ali: ideoque iure inter suos Mosellæ pisces Barbum recenseri ab Aufonio. Albertus author est, à piscatoribus sibi relatum, ova ab eo custodiri, ne ab aliis devorentur: additque se observasse in cavernis domus suæ ad Danubium sitæ, quotannis post æquinoctium autumnale congregari hosce pisces, tantaque copia convenire ut manibus etiam capiantur, ita ut meo tempore, inquit, incolæ loci aliquando decem plaustra fere manibus eiecerint. Nam hoc genus piscis frigus non sustinet: quare semper languidus hyeme invenitur; æstate verò mundus & sanus est. Hæc ille. *Vescitur* algis, coch-

leis & piscibus, & ne suo quidem generi parcere dicitur, Albertus cadaveribus capi quoque scripsit. *Degunt* gregatim, *pariunt* ineunte ætate propellitor. Gesnerus ex piscatorum observatione sub collibus & ripis prominentibus libenter versari asserit, & porcorum instar fodere, ita ut aliquando in cavernis inhæreant, & pereant: pinnaeque eorum ab hircinibus nonnunquam infestari, quas saxis affricantes in fundo aque depellant, aut rapidiora fluminis loca petant, ut aquæ impetu elidantur. Apparet verò cum Squalis quandâ occultam exercere *amicitiam*. Nam quemadmodum in quovis lacuum, fluminumque Barbus, ibidem fere semper, & Squalus reperitur; ita è contrario ubi Squalus, ibi semper etiam Barbus, ut Salvianus refert. Claustra fert, & in piscinis æque & Squalus parit & pinguescit.

Quoad usum in cibo Cardanus eum omnino reiecit. Aliis, si in saxosis & puris fluminibus capitur benè sapit, concoctu est facilis, laudati succi, carnis candidæ & mollis, sed plurimis spinis firmatæ. Majo circa Rhenum ad Julium laudari, Augusto in Helvetia, Gesnerus prodidit. Salvianus in ineunte vere sapidiore dicit. Aufonio grandiores natu, majore in pretio. Nonnulli propter mollem carnem vino prius imponunt. *Ova* venenata, Majo inprimis mense Platina author est. Gazius scribit, cum experiundi gratiâ duos duntaxat de ovibus hisce bolos comedisset, nihil inde aliquot horis postea noxæ percepisse: demum sub horam cænæ, plurimam in ore ventriculi sensisse inflationem, quam ut dissolvere, inquit, anisum sumpsi, sed frustra. Post horam faciem apparuisse tanquam in syncope, ita ut astantes & admirari, & de mea salute timere inciperent. Se interim magnam non solum in stomacho & ventre, sed omnibus membris externis alterationem, & inæqualem quandam intemperiem in una quaque carnis parte sensisse. Tum supervenisse passionem cholicam, donec infra supraque simul pluries ova purga-

R 2 rentur,

rentur, magna cum anxietate & virium prostratione, & maximo vitæ periculo. Idem apud Gesnerum invenies. Sunt qui credant tum esse malefica, cum salicum, quæ fluviorum ripas obsident, floribus in aquam decidentibus vescuntur; sed quia nec salicibus nec aliis Barbi partibus istavis, præstat culpam in idiosyncrasiam conjicere.

CAPUT VI.

De Capitone.

ARTICULVS I.

De Capitone Ausonii, seu Squalo veterum.

TAB.
XXVI.
Aldrov. de
Piscib. l. 5.
c. 17.

Piscis quem hic descripturi sumus, à magnitudine capitis, *Capito* Latinis dicitur. Apud alias nationes varia invenit nomina, quæ apud Aldrovandum, Gesnerum & Bellonium vide.

Quis sit apud veteres, difficile est dictu, Bellonius *Thedonem* Ausonii, quem nullo spinæ nociturum acumine dicit, Rondeletius Capitonem ejusdem, Salvianus Alburnum Ausonii, & Galeni Lencegium, Aldrovandus Squalum ut Romæ vocatur, esse putat.

Marino Capitoni Mugilibusque aliis corporis figurâ similis est: dorso tamen minus lato & corpore compressiore. In dorso item unicam duntaxat *pinnam* habet, Mugilum verò genus duas, unam videlicet in eius medio, alteram inferius caudam. Mugiles denique lineas quasdam habent subobscuras à branchiis ad caudam productas, quibus carere omnino Squalum Salvianus scribit: unam tamen ei lineam esse Gesnerus profertur, sed quæ leviter appareat. Idem Salvianus ait habere parvum, Rondeletius contra crassum & magnum: id quod pleræque etiam vulgares nomenclaturæ

indicant. Rursus uterque dentes habere negat. Rondeletius os tantum asperum esse ait: Gesnerus verò dentes eius latere in faucibus asserit, maxilla ferè semicirculari, superne leviter aduncos, ordine duplici, exterius quinos, interius binos. *Dentes* enim ei tribuit Albertus his verbis: Piscium omnium dentes valde acuti sunt, exceptis perpaucis, qui in lateribus gutturis, mandibulas habent, ut pisces fluviatiles magnis vestiti squamis, Barbellus (at huic squamæ sunt exiguæ) Monachus, & alii quidam. Hi enim habent dentes latos aliquantulum, magis ad conterendum cibum, quam ad dividendum idoneos: quamobrem etiam omnes æquales sunt: & ideo naturâ abscondit eos in gutture, ut clauso ore aqua non suffocet mandentes hos pisces. Tales autem dentes maximè habet Carpo (ut Cyprianus) piscis, *Labra* sunt satis crassa, *Oculi* nigri, in circuitu aureoli; tempora subflava, *Os* rubicundum, *branchia* utrimque quaternæ, geminæ colore totus est argenteo: dorsum tamen minus quam venter & latera pollucet. *Squamæ* splendidæ sunt, albicantes, angulosæ, latæ, cute ultra medium obductæ, minimis variante punctis. *Aristis* in carne multis abundat, quarum etiam in Capitone meminit Ausonius, qui item à squamarum magnitudine squameum cognominavit, dum canit:

*Squamæ herbas Capito interlucet
arenas,*

*Viscere pratenero fartim congestus a-
ristis.*

Gesnerus cum circa Octobris calendas unum ovium gravidum magnum item & præpinguem inspiceret, nullas in eo apparuisse aristas testatur. Quare vel non omni tempore, vel non omni ætate in iis reperiri credendum est. *Ventriculum* parvum habet, intestina parva, *hepar* ex albo rubescens, fel in medio viride, *vesicam* geminam aëre plenam, *peritoneum* nigricans. Circiter libram plerumque implet, aliquando tres & quatuor, aliquando sed rarissime, octo

Bellon. de
Aquatilib.
l. i.

Varro R.R.
l. 3. c.

octo aut novem. Non tantum in fluminibus sed & in lacubus, sed & iis paucis *degit*. In Lario invenitur, in Constantiensi non item. Ab Aufonio inter Mosellæ, à Bellonio inter Strymonis pisces refertur; sed nec claustra refugit. Dulci piscina inclusus, crescit, pinguescit, & prolem propagat. Expresse Varro. In tertia parte quis habebat piscinam nisi dulcem? & in ea duntaxat Squalos & Mugiles pisces? Servari diu & in aqua pura potest, si eandem sæpius mutaveris, vas ad summum repleveris, nec quicquam aliud injeceris, alias suffocantur. *Vescitur* cœno & sordibus, ideo un Vilain in quibusdam Galliæ locis dicitur: scarabæis & animalculis, qui in aquæ superficie nant; gryllis quoque campestribus, & uvæ acinis, & muscæ genere, quod propterea Aletmuggen Helvetii dicunt; cerebro denique bubulo, ideo à piscatoribus hamo subtiliter alligatur. In locis littoribus proximis, in fine veris & sub æstatis initium *parit*. Mense Majo parere ab uno latere, ab altero Cerasa quæ Helvetii Amarella vocant, matura sunt postea, aliqui Gesnero teste prodidere. Inter gregales esse censentur. *Vsum in Cibus* si inspectes, inter viles censetur. Carne quidem est candida, sed insipida ac molli, & quæ mox extra aquam flaccescit, plurimis abundans aristis; utrumque tetigit Aufonius dum canit:

Viscera prætenereo fartim congestus aristis,

Nec duraturus post bina trihoria mensis.

Improbantur præ cæteris, qui in lacubus, & in magnis cœnosisque fluminibus capiuntur; quamobrem Romæ, quod vel ex proximis lacubus, vel ex Tyberi afferatur, parvi fit, cum aliqui Tyberinus in ligneis vastis diu vivus conservetur. Contra, in limpidis, parvisque ac saxosis fluviis torrentibusque captus, haud omnino aspernari debet, maxime ubi adolevit.

Major enim factus, minus mollis

est, ut hic etiam, sicut de Barbo diximus ex Aufonio in senecta præferendus videatur. Commendantur apud nos verno potissimum tempore, cum prægnantes sunt: Alii tradunt per totam hyemem admitti mensis posse, & vere etiam usque ad initium Maij: æstate non probari.

Gesnerus apud suos commendat: scribit mense Decembri, placeatque circa Calendas Octobris, quo tempore unum ovis gravidum, inquit, reperi: magnus is & præpinguis erat: ova quoque sapiebant palato: nec ullæ apparebant spine. Idem caput in eo præferri asserit.

ARTICULUS II.

De Capitone fluviatili seu Squalo minore.

FREquens in fluviis est, inquit Gesnerus, vulgo nominatus *cin Hasle* ^{TAB. XX VI.} in lacu juxta Tugium *Ganghasle* ^{7.} vel communiori nomine *Weißfisch* ^{Aldrov. de Piscib. l. 5.} *Mayfisch* à Mense Majo, quo præferuntur, quod nomen Alafris, quoque attribui putat. Italicum huius piscis nomen nisi *Stretta* sit, (à corpore longiusculo forte, & stricto, id est, minime lato) in Lario lacu, & in Verbano *Gravetta*, aliud se nescire profitetur. Hæc verò cum scripsisset, piscator Lucarnensis in Verbano vocari ei asseruit, *Letta* vel *Aletta*.

Conjicitq; eundem fortè esse qui Papiæ *Cabacello* dicitur. Germanicum *Hasle* videtur leputculum significare, fortè quod agilitate ac celeritate natandi lepores repræsentet. Ise Cephalos aut Mugiles fluviatiles minores vocat, quod fluviatilem Cephalum sive Squalum magis quam Leuciscos referat, adeo ut icone opus esse neget. Pisciculi, inquit, sunt molles, duos aut tres palmos longi, albicantes, per dorsum in viridi nigricantes, cauda & pinna dorsi glaucis; cæteris rubicundis minimè lati.

Squamulis tenuibus , argenteis , branchiis ternis. Caroeorum aristis referta est, ut & Mugilum fluviatiliū maiorum. Ex his qui in fluvio apud nos capiuntur , oculis rubere audio, qui in lacu non item. Observavi postea lacustres superna oculorum parte flavere.

Dentes in faucibus utrinque conditos habet , ut Capito fluviatilis, in mandibula curva, exteriori ordine quinque majusculos, interius binos minores, omnes fere in summo leviter ad uncus. *Parere* incipiunt medio Aprili, vel paulo ante. Suo tempore (Majo & Aprili præcipuè, deinde Junio & Julio : à Majo quidem mense etiam *Meysfisch* alicubi nominantur) satis grati in cibo, & salubres habentur. Aliquando verò vermes eis innascuntur, (*Ligulas* nostri vocant, & *Nestel*) & omnino insalubres sunt. Hyme macri sunt ac minime placent. Fluviatiles etiam lacustribus præferuntur. Elixari debent in vino fervido. Circa initium Novembris ova in hoc pisce reperi, quæ magis quam piscis placebant. Idem *Capitonem fluviatilem* CÆRULEUM cognominant differentię causa, quem Germani , Saxones potissimum, *Iesen* appellant. Quidam *Aulaus* interpretantur, sed male, quoniam è mari fluvios non ascendit: Capitur in Albi, & in Danubio quoque, ubi *Ientling* vocatur. Cum Capitone fluviatili similitudinem habet, sed colore est in dorso & in aliquibus capitis partibus cæruleo. Præfertur assus. Germani ad Viadrum *Jesitz* appellant, Marchici ad Viadrum *Jese* scribunt: alicubi *Bradtsch* dicunt, hoc est piscem assari solitum, per excellentiam. Poloni *Jaszcz*, Hungari *Zompo*. Non est in magno pretio; neutiquam salubris, quod pinguiusculus sit, & non, saxatili modo friabilis: suavis tamen satis, quantum ad gustum. Estur frigidus, assus potissimum, quamvis & elixus, & aliis modis. Longitudo eius cubitum non excedit, nec latitudo tres aut qua-

tuor digitos. Post Pascha potissimum capitur.

ARTICVLVS III.

De Capitone fluviatili rapace Gesneri.

HOc genus Capitonis, Miseni ^{TAB. XXVI.} Rappe vocant, id est corvum, ut Kentmannus Gesnero communicata icone significavit, quod is ^{Aldrov. de Piscib. 5. c. 20.} volucris instar vorax & rapax sit, quam obrem Gesnerus rapacem cognominavit.

Piscis (inquit Kentmannus) est candidus, argentei splendoris, dorso tamen fusco, & sub cæruleo, *Squamis* tegitur latiusculis, tenuibus & perspicuis, quibus pellicula tenuis argentei nitoris subternitur, quæ per squamas translucens, piscem velut argenteo illitum ostendit, quales etiam cæteri pisces, quos communi nomine albos cognominamus (*Weisse fisch*) apparent. Piscis est longus, crassus, & carnosus: caro *aristis* plena. *Longitudo* ad latitudinem quintupla. *Dentes* ei non in ore, sed in faucibus sunt (ut aliis quoque huius generis) longiusculi, utrinque septeni, è mandibulis prognati. *Ventriculus* & *intestina* simul, piscis longitudinem non æquant. Revolutio eorum triplex est, ita ut in summo ventriculus sit, inde tenuius intestinum incipiens revolvi, duas sub eo helicas efficiat.

Tegit hæc dextro latere *jecur* (in quo vesica fellis longa conspicitur) altero *lien*. Vesica in eo aëre plena, oblonga est, ut in Lucio, Cypri- no, &c. Maximi qui apud Misenos capiuntur, ad sex aut septem libras, (xvi. unciarum) accedunt.

Addit Gesnerus sese audivisse *branchias* molles esse, ut in Salmone: *pinna* coloris è fusco punicea. Nomen à rapacitate tulit.

Est

Est enim velut prædo vehemens in aquis: nec minus ferè quam Silurus (Glanis) & Lucius, aut etiam amplius, damnosus est vorandis piscibus: quos dum persequitur, in ripam aliquando expellit, & simul etiam ipse interdum impetu in siccum delatus, relinquitur. Hic piscis in Albi nascitur, non aliunde subit, & toto ferè anno (sed rarius & per intervalla quædam) capitur. A partu valde augetur, & pinguescit. Parit autem circa annuntiationem Divæ virginis, quo tempore à statationibus suis catervatim procedunt, magni & parvi: duobus aut tribus diebus ante aut post illum diem: idque ita fore certum est. Quod si nihil impediat, sexaginta, plus, minus, uno retis tractu, interdum capiuntur. Piscis est *callidus* & extra hoc tempus, quo propter partum gregatim natat, difficilis captu: nisi vel nimii ventorum flatus, quo minus piscatores & retia trahenda audiat, efficiat: vel aqua perturbata, visum eius impediat: alias enim inter scamna, quæ arenâ accumulant, manet, nec faciliè retibus includitur. Cæterum extra patiendi tempus hamo ferè *capitur*, hoc modo. Quoniam vorax est piscis, Phoxinus aliufve pisciculus hamo infigitur, & sic linea per aquam, ultrò citroque agitur, eo in loco, ubi huius generis pisces degere conjectura est: Hic cum pisciculo pariter hamum devorant, & capiuntur. Piscis est admodum laudatus & boni saporis, tum assus, tum elixus. A plerisque tamen parvi æstimatur, quod idoneum coquendi modum nesciant: nam nisi ritè coquatur, sive asses sive elixes, in partes aliquot dilabitur: quod si integrum servare velis, non in fervidam, ut alios plerofque pisces solemus aquam, sed ab initio statim in frigidam præparatum immittes, ut pariter cum aqua concalcat: tum condies, salietque, & ad juris ferè consumptionem coques. Assandum vero, desquamabis, exenterabisque similiter: deinde sale diligenter consperges & perfricabis, & per duas

horas in sale relictum, tandem assabis: ita bonus & grati saporis piscis erit.

Sunt qui pisces assari solitos, simpliciter assent, ovis (aut lactibus) solum non exemptis & salvia infarcta. Alii ova seu lactes, cum hepate & liene exempta, minutatim concidunt; adduntque multum piperis ac caryophyllorum, salem, uvas passas minores, vitellum ovi, hanc impensam in piscem infarciunt; & assant, putantque ita salubriores fieri.

ARTICULUS IV.

De Orfo Germanorum seu Capitone subrubro Gesneri.

ORFUM Germani vulgo *ein Orff* ^{TAB.} genus hoc Capitonis vocant, XXVI. (inquit idem Gesnerus) quod mihi ^{9.} videre nondum contigit, præter- ^{TAB. II.} quam Augustæ Vindelicorum o- ^{7.} lim in piscina quadam, ubi mihi in- ^{Aldrov. de} tuenti Cyprini colorem præ se fer- ^{Piscib. l. 5.} re videbatur, aqua forte visum meum ^{c. 12.} mutante. Ibidem depictam iconem clarissimus medicus Achilles Pyrminius Gassarus mihi communicavit.

Dorso est rubicundo, ventre albicante, *squamis* (ut apparet) magnis & latis. Alii laudantur, præcipue Aprili, & Majo mensibus. Linea à branchiis ad caudam, an probè adeo recta (præter plerorumque piscium morem) expressa sit inquirendum. Germanicus liber qui Bavaricas Constitutiones continet, eadem forma piscem hunc delineatum proponit, digitos 12. vel 13. longum, quâ longitudine inferiorem capi non liceat: cum vulgarem Aufonii Capitonem, vel novem digitos longum capere concessum sit: unde hunc (Orfum dico, qui tamen ab Orpho marino pisce toto genere differt) ad molem multò maiorem excrescere coniecerim.

In

In diversis Germaniæ partibus aliter atque aliter (proximis tamen se vocabulis) nominatur, *Orff* / *Erste* / *Norffing* / *Wurffling*: alicubi etiam *Elfr* / idem ni fallor. (Apud Hollandos *Elfr* est *Alofa*:) Intempestive captum, spinulis seu aristis redundare ajunt. Duorum *generum* hunc piscem esse audio: assatos alios carne alba esse, qui Augustæ vulgo *Weissfisch* appellentur: alios rubicundâ vel flavescentē, Truttæ Salmonatæ instar. Piscem Norinbergæ quoque in Begniza fluvio frequentem esse aiunt; præferri genus illud, cuius caro rubeat: in superficie discrimen nō apparere: *squamas* paulo latiores esse, quam in Thymallo: carnem siccā, & friabilem, salubrem, ut vel putpureis concedatur, minus suavem quam Truttarum. Bellonius quoque visa apud mehuius piscis effigie, forma ad Squalum (id est Capitonem fluviatilem) eum accedere ferebatur. Piscem audio lautum, & in pretio esse; muscis vesci. Cyprino minus lautum esse, sed crassiorē: non in aquis fluentibus, nec in lacubus, sed in piscinis fermè reperiri, apud Vindelicos, Norimbergæ, & alibi. Sunt qui *Pigo Picone* pisci Larii & Verbani lacus eum comparent: & similiter certo anni tempore e *squamis* ceu clavos quosdam emittere mihi retulerint. Ad Cyprinos neigitur magis an Capitones pertinet, judicandum illis relinquo, quibus in promptu hi pisces sunt.

CAPUT VII.

De Leucisco.

TAB. XXVI. **L**euiscis nomine omne Mugilum genus Hicetio apud Athenæum. venire superius, ni fallor, diximus. Galenus suæ speciei piscem *fluviatilem* & *lacustrem* facit. Salviānus Squalum esse, idē quod cum Galenus τῇν γαῖαν ὀξύτερον habere seri-

bat (sed perperam, Legendum enim *Alim. fa.* est; κεφαλὴν ἔχον μικρότερον καὶ ὀξύτερον) *cult. l. 3.* credit; Modernis Græcis *Leucorinus* dicitur. Bellonius, *Albicellam* Bellon. de commodè vocari posse scribit; apud *Aquatil.* alias nationes, Germanos inprimis, *l. 2.* varia sortitur nomina. In Germania, circa Argentinam *ein Lauch* / Helvetiis diminutiva voce *Laugele*, quo nomine Gelenus dici conjiciebat (inquit Gesnerus) quasi *λευκιδιον*, id est Albiculam, tanquam olim sic appellassent Græci, & ab iis mutuati essent Germani. In quibusdam Helvetiorum lacubus, ut juxta Tugium & Bielam *Vvinger* vocitatur, ut à Sabaudis circa Neocomum *Vengeron*.

Diversus tamen ab his piscis est Vangeton in Lemano dictus, cui Helvetii à rubore pinnarum nomen posuerunt. Brelenpes etiam *Onhoft*, id est, acephalos nominant hos pisces: amputatis enim capitibus, siccatos; alio venales mittunt: cum minimi densis agminibus natant. Helvetiis *Geelen* / id est animæ dicuntur.

Acronii lacus accolæ nomini- bus variant; *Grassig* Lindaniæ vocant: Vberlingæ *Laugele*; Constantiæ dum parvi sunt, *Zienfische* vel *Grasing*: adultiores, *Agonen*, *Agunen*, *Lagenen*. Aiunt enim pisciculos esse vix longiores palmō, *squamosos*, quibus multi abstineant, quod circa latrinas pascantur: suo tempore tamen commendari.

Æstate, inquiunt, innascuntur eis vermes, quos vulgus, *Nestel*, nominant, quo tempore insalubres habentur.

Ova gerunt usque ad Junium, deinde pariunt. Non solum autem inter se, sed cum illis etiam piscibus latis lacustribus, quos Helvetii *Rotten* vocant, & cum Scardulis sive Cyprinis latis *coeunt*, unde piscis genus enascitur, inter utrumque parentem medium, *ein Druffisch*.

Sed

Sed alius est Agonus in lacubus Italiae, & Germanicum nomen Graefling cavendum, ne quis cum diverso fluviatili piticulo confundat, quem Grefzling, vel Krefzling nominant. In Dunenfi Bernensium Helvetiorum lacu, *Blauwinling*, id est, caeruleus, hoc genus Leucisci dicitur: nostri longè aliud lacustre tantum genus sic vocant. *Glyssen* à splendore factum, commune est piscibus illis qui vulgo dicuntur Laugelen aut Suualen.

Squamis mediis tegitur, quæ lineolis distinctæ sunt. Nonnulli cum priore Rondeletii Leucisco confundunt, sed corporis, inquit hic, latitudine differt, rostroque est acutior, alioqui pinnis, earum numero, & situ similis est, Romani piscatores à Squalo, teste Bellonio, non distinguunt: neque enim adeò exactè pisces fluviatiles, ut Galli, internoscunt. Etenim Leuciscus aspectu multo hilarior, quam Squalus, minoribusque squamis contegitur. Albo colore nitet, & veluti inter squamas striis rectis interstinguitur. Caudam bifurcam & pinnas albas profert, neque ita latas, ut Squalus. Hic præterea Leucisco maior evadit. Alburnus eidem similis est Leucisco; tamen est paulo latiore corpore, & squamis elatioribus, ac labro inferiore melius infarcto. Est etiam nonnihil discriminis in linea, quæ utrinque corpus intersecat: si quidem Leucisco non tam arcuata est, quam Alburno, & Alburnus rotundiori corporis compage constat, ad Cephalum magis accedente. Bellonius nulla ait habere *dentium* rudimenta, verum fortassis haud diligenter inspexit, Gesnerus namque in faucibus utrinque mandibulam curvam quinque armatam denticulis reperit, ut in Bellerio. Albertus utrinque mobilem in faucibus mandibulam habere ait. In Pado (ut Gesnerus observavit) dodrantem nunquam excedit; crassitie fere æquali per totum corpus, à capite ad usque caudam. Os aperitur in oblongum, nec prominet mandibula superior. Addit

item Gesnerus apud suos paulo maiores capi in fluvio quam in lacu; longiusculos esse, non latos, Haselis non dissimiles specie, paulò breviores, si bene meminit: Dorsum colore esse fusco, flavo, & viridi ferè permixtum esse. *Pinnas* albicare, vel nimium rufi admixtum habere, lineam quæ terminatur laterum color, instar iridis resplendere ex flavo & viridi calore. Rondeletius quoque ex fusco partim viridem esse, partim flavum dicit, *ventriculumque* habere parvum, hepar magnum, & in hoc felle vesicam: denique multum *pinguescere*. Quo loco in cibus haberi debeat, apud Galenum legimus, qui conditam seipso meliorem effici, quod quicquid in sapore est mucosi abjiciatur; meliorem recentem, diutius in muria servato, scribit. Testatur Bellonius, *Bellon. de Aquatil. l. 2.* nondum provecti magnum numerum veris initio capi, modicoque sale conspersum atque exiccatum, Byzantium deferri, vendique Maio, Iunio & Iulio mensibus. Eorum capturam maiorem fieri ex Epiri lacubus, Venetosque his maxime uti, ad sequenavibus adferri curare, & eodem vocabulo cum Epirotica lingua, quæ Scouranicos dicit, Scourancas nominare: quæ cum Leucorinis, inquit, maiores sunt: ambo tamen pisces sale conspersi & fumo infecti atque exiccati, ad externos mitti, ut nostri Harengi foreti, consueverunt. Sic Bellonius. Gesnerus commendari scribit Aprili & Maio mensibus, Februarioque non insuaves invenisse, quo tempore lactes in mare pleni erant, eodemque mense à suis laudari. In Italia quidem, hyeme in primis capi. Veru tostos, sale, aceto, olivo, pipere, & cinnamomo conditos Grapaldus laudat: & Rondeletius denique molli suavique carne esse tradit, & pinguedinem eius aurium doloribus succurrere, & cum felle eiusdem permixtam oculorum caliginem abstergere.

MS
9

S

CAPVT

CAPVT VIII.

De Leucisco primo Rondeletii.

TAB.
XXVI.
II.
Aldrov. de
Piscib. l. 5.
c. 23.
Bellon. de
Aquatil. l. 2

HÆc Leucisci species, in Italia *Lascha*, in Gallia *Hardon*, quod facile per longum tempus in vasculis aquatilibus seruari possit, alibi apud Italos *Dorada*, quod in eo tractu caput eius autem colore fulgeat, Helvetiis *Roterigle*, quasi *trytrophthalmos* dicitur. Bellonius *Sargum Sargonemve*; qui inter marinos Mugiles fluuios subeuntēs, ab Aristotele recensetur, perperam voce cavit. Capitoni seu Cephalo fluuiatili corporis aspectu, pinnarum numero, situ, figura, squamis similis: sed capite est minore, corpore latiore. Dorso cæruleo cervice virescente, ventre candido, oculis flavescens. *Dentibus* caret. Imò palato ossa habet. Bellonius ad Cyprini magnitudinem unquam accedere negat: aitque corpore quam *Squalus*, compressiore esse, pinnaeque habere subrubras, parvos item Gardonos pinnae caudæ longiorem exere quam Leuciscum: (sic vocat piscem proximè præcedentem) & antequam in extremum pinnae, quæ bifurcata est, desinat, rotundari: Latiusculis *squamis* contegi, ipsoque capite magis ad Leuciscum quam ad *Squalum* accedere. Oblongius & paulò crassius habere corpus, quam *Abramis*, ac denique tergore esse magis quam *Squali* nigricante, & auri colorem referente. In Ambra Melegnarum alluente numerosè capitur. Sed & Peni sinus lacus delicatissimos profert. Alacres sunt & vividi omnes ova habere, & foeminae esse creduntur. Solidiuscula illa & ruffa. Partus Aprili inchoatur, & ad Maii pergit medium. Laudantur antequam pariunt, Ianuario, Februuario, Martio & tota hyeme medioeriter: sunt qui Aprili, & Maio commendant. In vinum fervidum

immissi elixantur. Rondeletius carne esse fluxili & parum nutritæ dixit.

CAPVT IX.

De Oxyrincho Rondeletii, Corvo Nilotico & Naso Alberti Magni.

OXYRINCHI nomen inter poly-TAB. semia cenferur. Diphyllo apud A-XXVI. thienæum Mugil est, fluviatilis; idem, 13. ut Rondeletius insinuare videtur, Aldrov. de cum superiori Gallorum Gardono: Piscib. l. 5. Srraboni, Æliano, aliisque inter Nili c. 24. pisces recensetur: eidemque Æliano rubri maris quoque piscis est, ac denique maris Caspii, ut in Sturione dictum est. A quibus omnibus differt, (ni fallor) Oxyrinchus iste Rondeletii, Antverpiensisbus *Hautin* vocatus, rostro longo, tenui & maxime acuto, unde Oxyrinchium rectè à se appellatum fuisse putat, nisi mavis, inquit, Sphyrænam fluviatilem vocare, quia marina Sphyrænae rostrum simile habet, molle & nigrum. *Squamis* melioribus tegitur. *Pinnas* in dorso tres habet, in æquali spatio à se distantēs: totidem in ventre habet, quot Barbus. Quærendum nunquid idem sit, qui Frisiis *Snepel* appellatur, à Scolopace ave, puto, quam *Snepan* dicunt; Galli verò à rostri proceritate *beccassam*. Gesnerus in Albi fluviio quendam quoque piscem *Sneppelsingen* vocari tradit, sed à superiori diversum, parvum nempe, & candidum, Capitoni fluviatili similem.

CORVUS Niloticus, corpo-TAB. ris figura Mugilibus similis est, sed XXII. caput pro corporis portione (longum enim dodrantes duos) parvum Aldrov. de Maxilla inferior superiore brevior. Piscib. l. 5. Pinna ad branchias, utrimque una c. 25. & 26. brevis: in tergore ultra medium alia oblonga: in supina parte à podice alia;

alia: in ventre una, de pisce hoc, quod præterea dicam, non habeo.

TAB. XXVI. 15. **N** A S V S ab oris figura seu naso valdè crasso, nomen sortitus est. Nasonem vel Nasutum benè dixeris: & quia labrum seu rostrum superius crassum, simum obtusumque habet, non malè Græce Pachyrinchus & σιμόν, Latine Simus vocabitur. Generè Squalo ac Leuciscis fluviatilibus adscribendum esse, & corporis totius figura indicat, & Albertus quoque attestatur Monacho, hoc est, Capitoni fluviatili similem esse inquit, sed tenuiorem, naso valde crasso. Et Gesnerus esse tradit, qui fluviatilibus Barbis hunc piscem comparant, quod ad corporis speciem: aliquos piscibus Erflen vulgo dictis apud Germanos. Ipsi vero specie, squamis & colore Capitonem fluviatilem referre videtur: sed ad eam magnitudinem, inquit, non perveniunt. Lonicerus duorum triumve palmorum magnitudine esse ait, & oris formam peculiarem habere. Venter eorum intrinsecus nigerrima membrana ambitur: unde joculari nomine Germani hunc piscem, scribam cognominant. Os modice deorsum vergit. Lapidem habet in capite, teste Alberto. Capiuntur in fluviis & rivis. Libenter enim in rivos ascendant, inquit idem Gesnerus, in lacum non veniunt, nisi ad initium eius tantum, præsertim vere. Albertus Danubii piscem esse ait, & aquarum in Danubium influentium. Cæno & spurciis vescitur. Caro alba & laxa est, spinulis referta, ut & Capitonis & aliorum multorum fluviatilium, præsertim circa caudam. Verno tempore præferuntur & pinguescunt. Apud Helvetios tamen Novèbri mense laudantur: si modo unquam laudandi sunt. Nam caro eorum semper laxa & insipida est: quam obrem assare eos potius quàm elixare coqui solent. In Rheno præstantiores habentur. In libello quodam Germanicè vulgato de piscibus, Febuario & Martio & cum salices stillant, eos præferri legimus. Hæc ferè Gesnerus.

CAPVT X.

De Gobio fluviatili.

ARTICVLVS I.

De Gobio non capitato.

G Obio fluviatilis est duplex. **TAB. XXVI.** 16. **U** nus non capitatus; alter capitatus. **NON CAPITATI** Dorion apud Athenæum inter fluviatiles meminit, fortassis & Aristoteles, dum eos in fluviis pinguescere scribit. Mediolanensibus Varira, fortè quasi varius. Ubique enim rotundis nigris maculis distinguitur, vocatur Germanis *Kresling*, aliis Leutesler, quod cadaveribus submersis vescatur. **A Gesnero** ita describitur. Gobio noster, ein *Gresling* / quem nuper captum in lacu, inspexi, mense Ianuario ovis gravidus erat: barbatulus, cirris singulis in angulis labiorum per brevibus. Pupilla oculorum nigra, ambitu candicante. *Macula* à capite caudam versus per media utrinque latera nigricantes, rotundæ, magnæ proportionē, circiter decem, singulæ deinceps digeruntur: & similiter per medium dorsum. Cauda etiam maculosa est, & dorsi pinna. Vesica bifida, magna proportionē. Longus est plerumque quinque aut sex digitos. *Fel* habet subviride, caudam bifurcam. *Os* cum aperitur rotundum & veluti è præputio se exerens, deorsum nutat. *Lapilli* in cerebro per exigui sunt. Hæc ille.

Squamis tegitur parvis. Quamvis ab Aufonio, qui cum *Barbi jubas* æmulari cecinit, fluviatilibus accenseatur, in lacubus tamen quoque capitur. Degit in fundo & cæno, unde Fundulos quibusdam vocari etiam diximus. Vescitur musco vel alga, item arenulis, & hirudinibus minimis lacuum. Creditur cadavera hominum submersa depasci, unde nonnulli anthropopha-

pophagum dicunt : quæ res aliis fortassis anſam præbuit , ut ex cerebro equorum procreari dixerint , quo quidem in aquas abiecto veſci , à ratione non eſt alienum , nam & Bellonius teſtatur calvariis bubulis in aqua proiectis oblectari , eiusque gnaros Ligeris accolas , calvarias eas ſtudioſè adſervare iis denique in Ligerima immerſis , Gobios allicere , ut facilius eos poſtea capiant. Idem teſtatur Rondeletius. *Capiuntur autem* facilè & magna in copia , inquit Gefnerus , circa ripas lacus noſtri retis genere , quod Stoſzbaren appellant.

Aliquando bis aut ter anno *pariunt*. Æſtate vermiculis quibuſdam in ventre vitari dicuntur , teſte Alberto. Rondeletius *carne* ait eſſe molli inſipida , virus nonnunquam reſipienteſ fallique medicos , qui Gobiones fluviatiles ægris apponi volunt , his eam in eſſe ſucci bonitatem exiſtimantes quam Galenus in marinis commendat , ab hiſce enim illos hac dote multum ſuperari. Cœnum aliquando reſipiunt. Author de natura rerum , ſalubriores eſſe ait , ubi aquas arenofas in nutrimentum habent. Et Gefnerus elixum ſatis ſolidum eſſe teſtatur , nec contemnendum in cibo.

N. *Ad Gobiones referimus piſcem Rheac Mœni alumnum variorem quem Obriſſ / ſeu Obreſſ / q. Obfreſſ / Piſcatores vocant. Ambire enim videtur inter Gobionem & Percam. Huius iconem, exhibet Tab. 31. ea figura ac magnitudine, quacum duobus ſociis captus eſt non procul Francofurto, 16. April. 1649.*

ARTICVLVS II.

De Gobio capitato.

TAB.
XXIV.
9.
Aldrov. de
Piſcib. l. 5.
t. 28.

GObio Capitatus nomen iſtud à Capite pro corporis ratione maximo accepit. Non tantum apud Italos, ſed & inter Germanos varias ſortitus eſt appellationes. *Gropp* dicitur inter Helvetios , *Cop* vel *Kop* in Ga-

rinthia, *Kaolrappia* Franconia: alicubi *Mul*, circa Tridentum (qua parte Germanice loquuntur) *Tholiman*. Saxones & Miſeni à capite, quod ferè globi inſtar rotundum habet, ſed compreſſum , varia ei nomina fecerunt: *Keuling* , *Kulingk* , *Kulheit* , *Kaulheupt*. Anglice à *Bulhed* , à capite taurino, quaſi Bucephalum dicas , nempe ob magnitudinem , non ſimilitudinem formæ. Rondeletius & Bellonius *Βόιταν* vel potius *Βοίταν* aut *Βοίταν* Ariſtotelis eſſe volunt; ſed cum is duntaxat in fluviis ſub ſaxis ſtabulari, quod & aliis competit ſcribat , nihil definiri poſteſt. Cremonenſibus *Bot* vel inde vocatur, quod Buſonem, qui Botto vulgo, deformioris riſtu referat. Piſculus eſt ranæ piſcatrici ſimilis, ſi parva magnis (inquit Rondeletius) conferre licet, corporis figura & colore. Capite enim magno eſt , lato & depreſſo. *Ovis* magno hiatu, ſine dentibus: ſed pro iis labra inſtar limæ aſpera habet ; *pinnas* binas ad branchias, rotundas, & ambitu pulchrè criſtatas: duas alias inferius parvas, longiuſculas , albicantes in medio ſummi ventris : aliam ab ano ad caudam: in dorſo quoque geminas , non ſingularem, ut Rondeletius ſcribit, qui aliam forè ſpeciem , inquit Gefnerus , nobis ignotam vidit : nam & cauda quam ſuo attribuit Cotto, proportionem multo longior eſt, quam in noſtro. Ex his dorſi pinnis brevior, quæ capiti propior, altera longior caudam verſus , quam tamen non attingit: idque in fluviatili & lacuſtri genere ſimiliter. *Oculi* ſurſum ſpectant. Branchias quaternas habet , *hepar* magnum ſine felle. Si corpuſculum ſpectes , ventriculum magnum. *Fœmina* *ovis* immodicè turget , quæ in pectore in globos collecta , geminas veluti mamillas præ ſe ferunt, & membrana veſtiuntur nigricante. *Lapillos* in capite habet. Qui in *lacubus* degunt, (ut Tigurini lacus exemplo oſtendit Gefnerus) non ſolum magnitudine inferiores ſunt *fluviatilibus* : raro enim ultra digiti medii longitudinem excreſcunt; ſed ſpecie etiam differunt.

etc

et si vulgus forte non discernat. Nēpe, colore magis albicant, cum illi nigriores sint. (Corpus varium est, partimque albicantibus partim fuscis punctis, & maculis etiam nigricantibus trāsverſis diſtinguitur) *Spimilis* circa branchias pluribus & acutioribus, brevissimis tamen illis, & visum pene latentibus horrent; quibus digiti etiam, si retro ducas, configuntur. *Pupilla* oculorum aliqua ex parte pulchrē virescit, & gemmæ instar resplendet, præsertim ad solem. Elacu in fluvium non migrāt: neque fluviatiles in lacum Gustus etiam suavitatem fluviatilibus lōge sunt deteriores. Icon quam dedit Aldrovandus Gesneri est, diversa nonnihil ab ea quam Rondeletius exhibuit, pinna dorsi singulari, & cauda penicilli instar, longiuscula: unde suspicari licet, aliud genus Cotti circa Monspelium haberi. *Degunt* in rivis frigidis ac montanis, & fluviis præcipitibus, sub lapidibus & inter Saxa. *Carnivori* creduntur, & à se mutuo devorari certum est. Mense Martio circa festum Paschatos *pariunt*. In aqua fundo non tam natant, quam subito impeditu teli instar se vibrant, & quo volunt traſciant. Gesnerus testatur, legibus piscatoriis licere, eos capi in flumine à Calendis Novembris usque ad Pascha: extra verò illud tempus, nec retibus, nec fuscina, neque alio modo licere: hamo autem nunquam. Nassis uti permisum esse, à die D. Marci usque ad exitum Maij, non arētius tamen contextis, quam ut Gobij capitati evadere queant. Cocta esse suavissimos & origratissimos cum ovis, quæ pingua, copiosa, & delicatissima, Matthiolus prodidit. Carne molli, Rondeletius, dura Albertus fecit. Apud Helvetios fluviatiles dūtaxat, & quidem circa brumam & Ianuario mense in deliciis sunt, quidam à Calendis Decembris ad Calendas Aprilis cōmendant; omnes, capita, quod spinis tantum cuteque constant, reiciunt. Placent & frixi.

CAPUT XI.

De Aspero Pisciculo.

Huius Rondeletius meminit, ei-^{TAB.} demque à maxillarum asperitate ^{19.} XXVI. 18. te cognominatum inditum, aitque Lugdunensibus *Apron* appellari propter squamarum asperitatem, Rhodanoque peculiarem, cæterum non quovis eius loco, verum in ea fere parte reperiri, quæ inter Viennam & Lugdunum interiecta est. Pisciculus, inquit, est *capite* latiore, quā Gobio, in acutum desinente: ore medio, *dentibus* caret: sed maxillas asperas habet, foramina ante oculos. Colore est rufo, maculis nigris latis, à dorso ad ventrem oblique descendentibus varia: Pinnae ad branchias, & in ventre similes cum Cottis habet, sed in dorso dissimiles: duæ enim sunt à se se iunctæ. Vulgus ait pisciculum hunc auro *vesci*, quia arenam cum qua nonnunquam aurilaminæ sunt, haurit. *Carne* est sicciore quam Gobio.

Ad hunc referri potest, & *is piscis* ^{TAB.} *Danubianus*, quem *Iulius Alexandrinus* ^{XXII.} ad Gesnerum dedit. De eo ita Gesnerus, 19. Forma quidam tota, & singulæ ferme corporis partes, inquit, in utriusque pictura cōvenire videntur, nisi quod pinna ab ano in nostra iconē nulla est, pictoris forte incuria. Nulli enim piscium, opinor, hæc pinna deest. Rondeletius *Lacertum* peregrinum suum sine ea pinxit, quam Salvianus eidem addidit. Bellonius in sola *Tænia* hanc pinnam se non reperisse mihi retulit. Piscis quem exhibemus, Germanicum nomen est *Zindel*: velut alij scribunt, *Zinde*, *Zindel*, *Zinne*, *Zingel*. Ungari *Kolcz* appellant. Icon ad me missa, digitos XII. longa est; quam longitudinem in hoc pisce mediocrem esse audio. Colore est, partim è fusco rufescente partim nigris *maculis* satis magnis per intervalla distinctus: quarum aliquæ à dorso ad ventrem, qui cinereus est, oblique tendunt. *Oculis* color Indicus: & ali-

quid sub eis rubri. Audio eum ad libræ pondus, id est, unciarum XVI. accedere: (alii etiam trilibrem fieri retulerunt) *caudam* adeo duram habere, ut vix amputari possit: pinnas in dorso aculeatas in capite *Percæ* instar, (icon nostra pinnas molles, non aculeatas, præ se ferre videtur) nostrum acuminatum; carnem candidissimam. Sunt qui forma & colore *Cani* marino comparent: alii *Lucio*, præcipue quidem capite: absq; *squamis* esse aiunt, instar *Anguillæ*. (*Rondeletius* *Asperum* suum à *squamarum* asperitate vulgo *Gallice* *Apron* dictum ait) Lautissimum esse addunt simul & *saluberrimum*, omnium *Danubii* piscium, ita ut vel puerperis apponatur, & divitum duntaxat mentas oneret: quod equidem miror, si *squamas* non habet: fere enim omnes qui *squamis* carent, minus salubres existimantur. *Ferunt* eum *Danubius* & *Tibiscus*. In *Danubio* prope *Bosoniâ* magna eius copia capitur. *Viennæ* etiam non deest; & in *Bavariæ* fluviis, ut *Isara* & *Leisaca*: hic quidem è latu *Ammelse* fluite in *Rachelsee* lacum, & inde rursus in *Isaram* fluviû. In piscinis servari non potest. Eiusdem piscis effigiem illi quam dedimus, similem, coloribus tantum diversam (ventre & pinnis albicantibus) *Raphaël Seilerus* Iuriconsultus doctissimus, comes *Palatinus*, clarissimi *Augustanæ* reip. archiatri *Geryoni* filius, ad me misit: in qua similiter nulla abano pinna, nullæ squamæ apparent.

CAPUT II.

De Cobitide fluviatili.

ARTICVLVS I.

De Cobitide Rondeletij.

TAB.
XXVI. 20.
Aldrov. l. 5.
de Piscib.
6. 2.

Triplex invenitur *Cobites*, fluviatilis *Rondeletii* nempe, *Aculeata*, & *Barbatula*. De illa ita ex *Gesnero*, & *Rondeletio* Aldrovandus. Idem *Rondeletius* fluviatilem hunc pisciculum antiquis, qui de fluviatilibus

parum fuere solliciti, in dictum, *Cobiten*, *Cobitidem*, fluviatilem nuncupavit, quod marinæ, inquit, persimilis sit; cum alioqui neque situ neque numero pinnarum cum marina conveniat; quare similitudo isthæc ad *Cobitidem* barbatulam potius pertinet: ad hæc *Cobitis* marina lævis est, uti & *Barbatula*; contra squamosus, quo de loquimur, pisciculus est, nisi figura exhibita nos fallat, quod quidem suspicari licet. Ipse enim *Gallis Loche franche* vocari asserit, vel quod totus lævis sit, & aculeis careat; vel quod mollior sit, & salubrior: quãobrem *Cobiten* forte hunc pisciculû, inquit *Gesnerus* vocat, quod ad *Gobionem* fluviatilem *Aufonij* accedat, non ad marinam *Cobitin*. *Degit* in rivulorum & fluviorum ripis, digitali magnitudine, rostro satis prominente. Corpus flavescit, & maculis nigricantibus notatur, subrotundum est & carnosum. *Pinna* duæ sunt ad branchias, duæ in ventre, unica ab excrementi meatu, unica in dorso. *Gesnerus* cum hoc piscitio idem putat, vel saltem simillimum, suis *Ryserle* nuncupatum; *Digitum*, inquit, longitudinem parvum excedit, colore per dorsum è cæruleo virescente, per latera & ventrem candido. In *Silo* torrente capitur ad *Tigurum* circa lapides: & ex eo *Limagum* amnem ingreditur, inter lautos pisciculos habitus *Rondeletio* suis *Cobites* carne est humida, & viscida: si in aqua sordida & cænosa nutriantur, pinguescit, sed multo insalubrior redditur. Pro *Cobite Rondeletij* nos aliam iconem dedimus, eiusdem ni fallor, piscis

ARTICVLVS II.

De Cobitide aculeata.

Cobites aculeata, quæ *Mustela* parva imberbis dici posset, *Gallis* est *XXVI. 21.* *Perce*, quod *Petras* quasi videantur perforare (duos habent in branchiis aculeos, utrinque unum, ad caudam spectantes, dentium cæstis longitudine, quibus sese impellunt, ut minima

TAB.

XXVI. 21.

3.

Aldrov. l. 5.

de Piscib.

6. 30.

nima

nima inter lapides foraminula subeant.) Germanis Steinbeis, seu Dacobythus, Oxyrinchus non incommode, aliis. Pisciculus est inquit Albertus, eodem colore quo Fundula. Non est autē rotundus, sed quasi columnalis compressus, & habet spinā acutam iuxta os, qua cum recurvato capite vulnerat manum se tangentis. Bellonius quoque & Rondeletius aculeum in operculis branchiarum utrinque unū habere tradunt. Albertus branchiis ipsum carere omnino ait; cuius errorem detegit nuper Georgius Fabricius, qui parva foramina circa oculos eis, sicut in Lampredis inesse observavit, teste Gesnero, qui pisciculum esse ait exilem seu tenuē, & oblongum, Fundulo, de quo mox, similem, paulo longiorem: nam quatuor aut quinque digitos æquare solere: maculosum, capite acuto & dorsum vergente. Rondeletius spinā internam duram quam in precedenti rigidiorē esse monet, ideoque inter edendum molestiorem esse: sapius vero etiam ichtypolas parū cautis imponere, & pro levibus vendere, cæterum imposturam inter edendū facile deprehendi. *Degit* in aquis fontanis & rivis præcipue. Ex his vero migrans cum aliis fluvios, tū Albim maxime subit, ut Gesnerus refert, qui & apud suos nullum aut certe rarissimum esse scribit, circa Argentinam vero frequentiorē, & ex Georgij Fabricij testimonio in Misena optimos capi in Mulda prope Doblā oppidum: in herbis, algis & cæno degere, atque inde *visitare*. Majo mense cū Fundulis parere; aliquando vel bis vel ter. Rostro lapidibus mordicus se affigere, & aliquando vas etiam, licet æneis, quibus in foro piscatorio à mulieribus, inquit, iniiciuntur, ita ut fugere videantur. Esse quando coplures gregatim hærentes inveniuntur. Rebus angustis, id est, quorū perangustæ sunt maculæ, capi, cum aliis pisciculis circa ripas fluminum. Bellonius pisciculum esse scribit admodum *vivacem*. Eidem delicatissimus est: contra insinuare nobis videtur Rondeletius in cautis pro lævi Coti-

tide obrudi inquit, fraudemque edendo detegit: & Gesnerus vilissimos vocat, carne tenaci, Fundulis multo ignobiliores. Aprili mense & Majominus improbari; præferri gravidos: frigi debere butyro: Misenos circa bacchianalia, & Martio mense eos commendare; antequam migrent, quod tum ovīs gravidæ sint: præstantiores apud eosdem non in Albi, sed in Mulda capi.

ARTICULUS III.

De Cobitide Barbatula.

Cobitis ista *Barbatula* nomen à Cir-^{TAB.}ris tenuibus è rostro barbæ mo-^{XXVI.}do dependentibus obtinuit. Alber-^{22.23.}tus M. Fondelam, Germani Grinde-^{Aldrov. l. 6.}la vocant. Gesnerus Mustelam flu-^{31.}viatilem dici posse putat. Indicis digiti crassitudine est, inquit Bellonius, quinque digitos longa (pinguis Lochia) tota puncturis seu punctis distincta: notæque in tergore & lateribus habet, nunc grandes, nunc parvas ac nigricantes, quibus ipsa etiam quoddammodo pulla apparet; sed ventre est candido. Pinnam utrimque unam in lateribus gerit: item in ventre duas, in tergore vero summo unā admodum parvam: item sub cauda ad anum alteram. Pinna caudæ rotunda est: reliquæ omnes, obtusæ & latæ. Cirris quaternis, utrinque, duobus (Barbi modo) tanquam mystacibus insignis est. Os habet parvum sub longo naso: ejusque *intestinum* statim à stomacho (quem hepār fovet) recta per ventrem ad anum ducitur. *Fel* dextro hepatis labo adfuturum: *Lienem* insignem, & rubrum habet. *Cor* sub branchiis, suo pericardio obvolūtū, *ova* singulari vesicula, ut aliis piscibus bicorni folliculo conclusa. Hæc illē. Duo genera esse huius pisciculi Georgius Fabricius Gesnerum in epistola monuit. *Vnum* commune, quod in deliciis habetur, & insigni magnitudine apud suos (Misenos) capitur in Flohi amne: alterū & tenuitate corporis, & colore & sapore diversum, quod à Saxiis nomē est consecutum, Stein-

Steinsmirlin. Limpidis & saxatilibus locis gaudent, quamvis & circa ripas & in cœno, unde Mosflgrundel dicuntur, reperiantur. Plurimi in rivis quibus maiora flumina ingrediuntur, capiuntur, idque præcipue Februario, Martio & Aprili. Gesnerus medio mensis Maij *captos*, ovis gravidus vidit; aitque post Pascha *parere* incipere: quamvis non desint, qui vel singulis mensibus eos parere asserant. De *Psuip* forum in cibis ita Aldrovandus. Tam delicatus pisciculus est, ut Lonicerus inter omnes ferè primatum tenere scripserit. Teneros tamen præsertim & nuper natos in deliciis haberi, Gesnerus ait, eosque cum iure coctos ex eodem, quod mireris, cum pane cochlearibus edi: quas delicias, inquit, aliquando circa summum Acronium lacum gustavi. Salubres vulgo existimantur, ita ut medici etià ægrotis alicubi eos permittant. Esse sanctiolidiuscula carne, & odore non pisceso, ut alij plerique; sed magis grato, idem Gesnerus asserit, & cum exigui sint, nec pingues, non multum replere: præferri à Misenis maiores, & qui à saxis denominantur: colore saporeque differre, corpore tenuiore, carne duriore, & quæ in elixis tenacius spinis hæreat: Commendari maxime à natali Domini usque ad Pascha, quoniã tum parere incipiãt: alios Februario, Martio, Aprili mensibus eos præferre, usque ad initium Maij. Teneros verò nunquam non laudari, maxime si cum apio, petroselino, edantur. Vino calido iniecto elixari debere, idque brevi tempore & sub finem modico aceto affuso, ad eius fere consumptionem coquendos, quomodo Gobij capitati etiam parantur.

CAPUT XIII.

De Phoxino squamoso.

TAB.
XXVII.
s:6.

Aristot. H.

Quid de Phoxino Aristotelis statuendum sit, ex ipsius verbis colligere difficile est. Statim enim ac natus est ova habere, & semel in an-

no in stagnis fluviorum & arundine-
tis lacuum, quæ πολυμνάδας vocant, o-
va ponere dixit. Rondeletius eo no-
mine *duos* squamosos *pisces* describit.
Vnus, quem in Picardia sub nomine
Rosiere vidit, dimidiati pedis longi-
tudinem nunquam superat. Corpore
est lato & compresso, oculis magnis,
colore luteo, bramis minimis, cor-
poris specie simillimus. Semper ute-
rum *ovis* refertum habet, ideo cum
illis nasci piscatores tradunt. *Alter*
vocatur à rubore caudæ, Rose. Reli-
quo inquit corpore cæruleo est, pau-
lo maior, minus læso corpore, *ovis*
semper plenus, etiam maximus. Cū
prior eundem esse conijcit, qui apud
Helvetios Bambela vocatur. Gesnerus. Pisciculus, inquit, est tres
aut quatuor digitos longus: sex qui-
dem digitis longiorem non vidi. Ca-
putei crassiusculum pro sua magni-
tudine, nigricans, iris oculorum cro-
cea: qui color etiam ad pinnarum i-
nitia omnia spectatur, in pinnæ dorsi
quoque initio, in maioribus & adul-
tis. *Pinnarum* ad branchias articulus
veluti carunculam quandam habet,
in aliis parum, in aliis valde croceam
(in aliis si bene memini, rubentem)
pro ætatis nimirum & sexus differen-
tia, fortassis & aquarum & regionum,
in quibus degunt. *Squamos* habet al-
bicantes. Linea fusca obliquè à capi-
te ad caudam fertur. Pinna in dorso
medio unica est, binæ ad branchias,
totidem in medio ventre, alia post
anum. In principio caudæ macula
atra notatur, & aliis minoribus, sin-
gulis, ad initia pinnarum utrinque.
Dorsum & latera nonnihil flavescunt.
Sapor in *cibo* subamarus: Reperiun-
tur influentibus solum aquis, ut au-
dio: non etiam in lacubus & cœno,
ut læves, quos è rivis, lacus & flumina
maiora ingredi diximus: unde eos,
læves, nostri à rivis Bachbâmele no-
minant. Idem in Glatto flumine apud
Helvetios, parvo ac cœnoso, ab
iis qui caneros captant, subinde in-
veniuntur, & abiiciuntur. A baccha-
nalia vel quadragesimæ initio usque
ad Calendas Maij nascias non angu-
stius contextas, quam ut Gobij capi-
tati

A. l. 6. c.
13. 14.

Gesner. in
Phoxin.

tati & Bamelæ ex ijs evadere possint, in flumen immittere piscatoribus nostris licet. Bamelam nostram Itali quidam, ut audio, eodem quo Gobium fluviatile nomine appellant, Varon. Verbanum vero accolæ circa Lucarnum Stornazzo, vel sterniculo.

CAPUT XIV.

De Bubulca Bellonij, & Rutilo fluviatili Gesneri.

PHoxino Bubulcam Bellonij subicimus, quia eum priori illi, quem Rosiere Piccardi vocat cognatâ Gesnerus facit. Ita verò de eo Bellonius. Sordidus admodum & vilis pisciculus Gallico vulgo è re ipsa Bouviera nuncupatur: aliis Peteuse, etymologia à bombis obscenis tracta. Piscis est Sequanæ alumnus, non tamen usquequaque frequens, ut qui nō semper appareat. Nam quomodo Verones pisculi nusquam Augusto, Sept. & Octobri tibi, aut saltem raro apparebunt: sic Bubulca sero in conspectum venit. Plurima vere capitur. Brēmam aut Castagnolam marinam toto habitu æmularetur, nisi corpore esset minimo. Planus enim & latus est: sed & argenteo nitore refulget, atque orbicularem magis habet formam, quam in longitudinem protensam. Trium digitorum longitudinē excedit, neque sesqui digitalem latitudinem. Soli obiecta, nigri nihil habere comperitur, quam in linea, quæ spinam comitatur ad caudam. Parvam in tergore gerit pinnulam; oculorum pupillam, omniæ nigredinē superantē. Squamis tegitur magnis, & latis. Carneum quiddam, ut Cyprinus (quatenus parvum magno licet conferre) in fornice palati ostendit, branchias utrimque quaternas simplices, ac sub ventre totidem, caudā bifurcam. Ore est parvo, dentibus vacuo. Pisciculos istos respui credo propter fellis magnitudinem, quod vix possint exenterari, quin eorum

fellis vesica disrumpatur: quo pertotum corpus diffuso, plurimum amari invescendo sentiuntur: id autem sub hepatis lobo dextro coloris Smaragdini, magnitudine pisi continetur. Folliculum vento plenum in utero gestat geniculo interceptū: lienem stomacho inhærentem, rubrum atque orbicularem. Huius etiam intestina multis in gyrum revolutionibus & infractibus circumvoluta sunt. Hætenus Bellonius.

Rutilo fluviatili à rubro pinna-
rum colore nomen Gesnerus, ad dif-
ferentiam Erythrini veterum imposuit. Circa Comum in Lario lacu, inquit, Piota, ut circa Verbanum quoque dicitur: à Germanis Oceani accolis Roddovu vel Roddau: Sabaudis circa lacum ad Bielam & Neocomum, Vingeron, vel Vengeron, unde Germanorū Vvingeron, vel contra, (quo tamen nomine Lucernæ accolæ Leucisci speciem intelligunt eam quam Vendosiam & Dardum Gallis dici in dicavimus) Anglis, Roche, Polonis, Pfstrega. Piscis è foro ad Gesnerum delatus, latus erat ad digitos quatuor, longus duodecim. Pupilla nigerrima, iride aurea labiis subrubris: colore in cauda, pinnisque in ventre & ab ano sitis, cinnabarinus: nam cæteræ minus rubri habent. Linea à summis branchijs caudam versus obliqua, cauda bifurca: Supercilia & circa branchias locus, aureo colore nitent. Squamæ latæ, striatæ, validæ. Dorsum fuscum, venter pallidus: pinna quaternæ: fel viride, vesica gemina: caro aristis plena. In faucibus maxillas utrimque habet, recurvas dentibus minutas quinis, qui ab anteriore parte singuli ferre instar asperantur: quod in aliorum piscium dentibus nondum memini animadvertisse. Piscis hic apud nos Helvetios, lacustris tantum est, satis vivax. In nostro & Acronio lacubus, abunde capitur. Piscatores Constantiæ, & circa Acronum aiunt cum aliquando cum Cyprino lato coire: inde Hybridam, (ein Halbfisch) gigni, qui inter utrumque ambigat, Rutilo maior aliquando, minor autem Cyprino

T. lato.

lato. *Parit* Iunio mense. Muscarum fluviatilium (sive lacustrium) genus est quoddam magnum, oblongo, terete, varioque corporis alveo, has insigunt hamis ad inescandos Rutilos. Februario Martioque mensibus apud alios Germanos, Novembri apud nostros *in cibo* præfertur. Majo rursus deterior fieri, & imminui incipit. Parari iubent peritiores instar Cyprini; & vino frigido immissum elixari. Hactenus ex Gesnero. Putatur cum Vangerone Rondeletii esse idem. Hic autem corpore Ballero, (de quo suo loco) rostro Mugilibus simile esse ait, rostro tñ esse longiore. Dentib. carere: piñas ad brachias duas habere subaureas, in medio ventre duas alias croceas; ab excrementi meatu unicam, in dorso aliam. Caudam in duas desinere hasque à squamis initio integri, etiamsi non adhæreant. Cyprino & corporis specie & carnis substantia succoque affinem esse, & vilem haberi.



TITULUS II.

De Piscibus fluviatilibus lævibus.

CAPUT I.

De Attilo Padi.

TAB.
XXVIII.

2.

Aldrovand.
de Piscib.

l. 5. c. 1.

Plin. H. N.
l. 9. c. 15.




Antum de Piscibus fluviatilibus squamosis, sequuntur Læves, inter quos præcedat *Attilus*, in Pado inertia pinguescens; ad mille aliquando libras catenato captus hamo, nec nisi boum iugis extractus, ut Plinii verbis utar. Piscis est Cartilagineus, Sturioni magna ex parte respondens. Huius enim more *ossa* gerit clypeata, sed ea tempore dicitur abiicere, idque in causa esse cur alii sine ossibus, alii cum ossibus depingant: post quæ, *pinna* dorsii est unica, cui parte supina subiacent duæ, quales omnino sunt Sturioni. Cauda et-

iam in duas deficit: *O*s clausum ad obliquam lineam incisum est, sed apertum & hians rotundum. *Anteil* lud pendente rostro *appendices* carnosæ & molles. Brachias operas habet, ad quas pinnae fixæ sunt. Quomodo vero à Sturione, quem Franc. Philephus Attilum esse credebatur, differat. Cælius Calcagninus perquam eruditè docet his fere verbis. Quod à me percontaris, an Attilus, quem Ladanum vulgaris nomenclatura solet appellare, is sit quem Italia Moronem, Usonem Pannonia vocat: paucis respondebo, me eundem non existimare, vel ex Plinii testimonio, qui cum Pado vult peculiarem esse; quo loco de propriis quorundam amniū piscibus ait. Sed ego, et tecum agam liberalius, non modo te ad Plinii, sed ad oculorum etiam tuorum testimonium provoco. Totamque itaq; Attili effigiem ac membraturam quantam potui brevitate perstrinxi. Et quia non satis perspicue id fieri posset, nisi noti alicuius piscis exemplo uteremur. Hyccam sive Sturionem, qui nullo ferme loco non nascitur, mihi proposuisti. Qui licet in mari natales habeat, solet tamen adversus amnes mira subire voluptate, donec iam præpinguis redeat. Moronis sive Usonis exemplo nondum dixi, quod neque ii pisces non cognoscantur, neque mihi eorum imago satis memoriæ inhæreat. Sic ergo accipe: Attilus hoc differt ab Hicca sive Sturione, quod Sturio pelagius est: Attilus amnicus est, & Pado peculiaris. Sturio non temere visus æquare quatuor talenta Attica, id est, trecentas libras: Plinius scribit Attilum ad mille libras, id est, supra XIII. talenta excrevisse. Quæ magnitudo sane insignis & raro perspicua. Attilus cum ad certam magnitudinem excrevit, *squamas* hispidas abiicit, quas per quinque versus dispositas gerit, in summa scilicet dorsii spina ex utroque latere geminatas, & sibi quasi parallelas, extremus versus pinnas attingit. His abiectis tactu lævis evadit, nec habet quod unguem offendit. Contra Sturio semper hispidas squamas

Ælian. H.
A. l. 14. c. 26.

Pecten.





Alosa.

Elyt.



Araneus minor.

Peternan.



Alosa seu Ciipea.



Phoxinus Squamofus Maior.



Phoxinus Squam minor.

Blicca Ballerus.

Blicck.





Glanis.


ein art Welsen.

Barbota.

Ein ander art Trüsch.





Cyprinus monstrosus.



Cyprinus Aluis. ein and art Karpff.

Cyprinus.

Karpf.





Phoxinus.



Weißer Barmhain.

Phoxinus.

Elviz.


Phoxinus: Latus.

Mylling Erling.



Athirus. Padi.

Ein art Storr.





Mustela.

Trijsche.

Antacarus Stellatus.



Gefhinter Storr oder hausen.



Mustela. fluviatilis. flus. Trijsche.

Mustela fossilis.

8



Mustela. alia.

Trijsche.

9




Mustela Barbata.

7

Lambrete.

Neinaug.

10



Lambrete.

Lambri.

Prisk.



11

Salmerinus.

Salmling.



Perca.

Persch. maior dicta.



Perca.

Persch.



Schwallus.

Schrollen.



Eplanus.


Pottelän.

Stichling.

Pungilus.

Stichling.






Lucius.

Hecht.

Tab. XXIX



Carpio.

Spiegel Karpf.


2



Cyprinus.

Karpf.

3




Cyprinus.

2.


4

Karpf.




Cyprinus. latus.

5



Lota. Gallorum.

10




Cottus ggn.

11

Gobio Capitat. Grobbc.


ad tab. 22.



Fundulus.

Grundel.


12



Alburnus.


Blicke.

13



Einart. Hausen.

14




16

Exosfius. Icthiocolla.

Tinca.

Schleie.


7



8


Perca.

Bersich.



Perca. alia


Bersich. ander art.



Salar. Salmo parvulus.

Salmling.

15



mas suas tota ætate retinet : Caro Sturioniscallum habet , & mirifice palatum oblectat. Attili contra, fluxa est, & mollis, & palato parum iucunda. Existimant piscatores *πρωτομύνη* , id est, partem priorem Attili, ad posteriorem vix eam habere proportionē, quam quatuor ad unum. Tota n. vis huius piscis sita est in *capite*, & parte capiti attigua. Quæ observatio etfi ad Sturionē etiam, aliosq; pisces pertineat, auctore Aristotele & Plinio: cuius verba sunt, videlicet capita piscibus portione corporum maxima, fortassis ut mergantur, tamen in Attilo nescio quomodo præter cæteros iuculenta est atq; admirabilis. Parvi sunt *oculi* Attilo, in tāta mole capitis. Sturio & Attilus habent os in parte prona, (supina dicere voluit) eo prope in loco, cui in cæteris perfectioribus animantibus, respondent, omoplatæ. Os utrique sine dentibus, sed Sturioni ferme orbiculatum. Attilo multo maius, & ad lineam obliquam incisum, quo aperto, vasto illo hiatu pisces devorat, quos respirando *κατὰ διασολὴν* (ita piscatores putant) contraxit. *Loca* pisculenta, maximè frequentat, hyberno præcipue tempore vorticosas voragines, ad quas pisces frigoris impatientes, temporis gratia se recipiunt. Rostrum Sturioni resimū ac latiusculum, ad imaginē fere Delphini & Oxyrinchi; Attili planum, & paulominus quam in mucronem definens, Attilo tergicolor albicans & lanosus. Sturioni vergit in glaucum. Hæc itaq; Cælius. De eius cum clupæa inimicitia ita Plinius. Minimus hunc piscis, appellatus Clupea, venam quandam eius in faucibus miracupidine appetens, morfu exanimat.

CAPUT II.

De Antacæo Borysthenis Rondeletij, & Stellari.

ANtacæi pisces dicuntur prægrædes, inquit Rondeletius, & vastæ magnitudinis in Mæotide & Borysthene; quos aliquando in ostiis in glacie concretos effodi auctor est

Strabo. (Nec alios, ut conicio. Soli Aldrov. de Piscib. l. 5. c. 26. nus intelligit, inquit: Apud Nuros nascitur Borysthenes flumen, in quo pisces egregij saporis, & quibus ossa nulla sunt, nec aliud quam Cartilaginistenerimæ. Nec dubito, quin Plinius de his loquatur his verbis: Et in Danubio Mario extrahitur porculo marino similis. Et in Borysthenememoratur præcipua magnitudo nullis ossibus spinisque interstitis.) Ex his salsamenta fiebant, præsertim ex maxillis & ijs quæ circa palatum sunt partibus, quod eę partes aliis suavitatem præstarent. Ex his igitur unus est, quem hic proponimus rostro oblongo, acuto, *oris* vasto & rotundo hiatu in supina parte Bellonius similem figuram exhibet Attili nomine, nisi quod unicam ei tantum in dorso pinnam appinxerit. Ingentis, (inquit) est magnitudinis: Cætera Sturionem tā internis quā externis partibus refert, hoc dempto, quod pro eminentioribus ac callosis illis elatis tuberculis, quibus Sturio quinis carinis præditus est; hic stigmatum tantum lividis fessilibusq; maculis in cute minus aspera, ad latera sit distinctus: Præterea unicam tantum *pinnam* ab ano ad caudā gerit. Sturio autem duas habet. Cæterum *Os* Attilo prominet oblongū, fistulosum, sublongo etiam naso. Hætenus Bellonius, qui deinceps non nulla de hoc pisce scribit, quæ vero Attilo conveniunt.

ANTACÆUS STELLARIS in Danubio prope Straubingam captus, & Aldrov. l. 6. d. c. 3. depictus, ad Gesnerū missus est. Colorem ubique ferè cæruleum ostendebat, venter erat candidior ad rostrum inclinans. Spinæ in dorso & stellæ pallidi coloris puncta etiam passim expallido albicantia, vel fuscisci Indici coloris. Cognatus huic est, qui Sick vel Tick vocatur, & in Danubio circa Pestam vel Budam capitur, mole corporis quæ ad XXV. libras accedat, cute varia undique stellata, sed rostro longiore & graciliore quam vel in Husone, anserino fere simili.

CAPUT III.

De Ichtyocolla.

TAB.
XXIX. 16.
Plin. H. N.
l. 32. c. 7.

Ichtyocollæ meminit Plinius ex veteribus dum inquit. Ichtyocolla appellatur piscis, cui glutinosum est corium, idemq; nomen glutini eius. Quidam piscem Iudaicum vocari scribunt, quod nomē Zygænæ apud Parisienses competit, alij Antacæum ab Herodoto, à Pomponio Magnum vocari dicunt, nonnulli Plinij Mariōnem appellant. Bellonius Tanais accolis *Barbotam* dici, quod quaternis veluti barbis ad labia sit cōmunitus, prodidit. Nec alium Dioscorides intellexit, cum gluten ventrem esse piscis cetacei, laudariq; candicans, ratione Ponticum scripsit. Tale enim & hodie ex ei⁹ intestino ex Pōto mittitur. Est autem Piscis cetaceus figura oblonga ac prope tereti. Ossibus ac spinis caret, capite est crasso & lato, ore magno & in promptu posito: è superiore maxilla quatuor apophyses carnosæ, velut barbæ dependent, unde *Barbotta* dicitur. Oculos parvos habet pro corporis magnitudine. Bellonius ait hoc à Sturione atq; Attilo præcipuè differre, quod rostro careat, magnum oris rictum præ se ferat, sitque sublurea, dura, lævi ac glabra cute convestita carne. Bina ante oculorum canthum, parva atq; aperta foramina habet: pinnas in tergo duas (quas aliter Rondeletius, aliter Bellonius pingit) ad caudam erectas. Branchiæ veluti spineo tegmine communiuntur. Sturionis modo: Cauda quā huic magis bifurca; præcipua à cæteris piscibus nota discernitur, quod paulo supra spineum operimentum branchiarum, quodam ad eius latera impresso foramine pervius sit. *Folliculus*, sive vesica, ex qua glutinum fit à capite ad caudam, per spinæ longitudinem extenditur. *Carne* est secundum Rondeletium prædulci, & glutinosa admodum, ob id salutaræ idonea, qua melior redditur & rubescens Salmonis modo, atque etiam durior, quam ob causam aliquādiu maceranda, priusquam coquatur. Eam Tanais & Ponti accolæ Romæ & Venetias transmittunt, illicque in

Diosc. M.
M. l. 3. c.
102.

Bellon. de
Piscib. l. 2.

foropiscatorio venditur. Ichtyocolla auctore Plinio epinyctides tollit, Erugat cutem, extēditq; in aqua decocta horis quatuor, denuo confusa, colluta & subacta ad liquorem usque mollis. Ita præparata in vase novo cōdicitur, & in usu quatuor drachmis eius, binæ sulphuris, & anchusæ totidē, octo spumæ argenteæ adduntur, aspersaq; aqua teruntur ūna. Sic illita facies, post quatuor horas abluitur. Idem alibi. Lethargicos (inquit) coagulum vituli adiuvat in vino polum oboli pondere: idē Ichtyocollæ. Valet ad conglutinandas omnis generis chartas, atq; instrumenta musica, reliquæque lignaria incrustamēta, quæ tessellato, imbricato, & vermiculato opere fiunt.

CAPUT IV.

De Glanide.

Piscis, qui Aristoteli & Pausaniæ Glanis, Plinio sæpe Silurus aliquādo Glanis, Glanus, & Glanuis vocatur. Ab Æliano Siluro explicatur. Veteres sequuntur recentium plurimi, interq; hoc Gesnerus & Schonfeldius, nos quid sentirem⁹, superius diximus. Nomen à Glanide Italiæ & Cuxæ fluvio accepit, si Stephanum sequimur, eiusdemq; vestigia apud Byzantinorum vulgus, qui hodieque Glangnū teste Manardo, vocāt, quasi Glanum, retinet. Descriptionem quod attinet, sunt ipsi spinæ pro ossibus non Cartilagines. *Corpus* fuscum, nigris maculis plenum, squamæ nullæ, corium satis crassum, & lubricum. Caput grande, depressum. *O*s obtusum. Oculi parvi. Rictus amplius & ad capitis latitudinē patulus. Labia superiora gemino, inferiora unico ordine denticulorum confusaneorū, introrsum reclinatorū aspera, quibus prædā retinet. *Fauces* binis utrinq; ossiculis, limæ instar asperæ sunt. A labro inferiore dependent barbulae quatuor, tenues, oblongæ, pallidæ, à superiore duæ, eiusdē coloris, duræ, longissimæ, prætenturarum instar, quas ante se modo exerit, modo cōponit. *Pinna* illi in dorso post cervicē unica est, parva, quatuor aut quinque fibris

TAB.
XXVII. 8.

Schonfeld.
Ichtyol.
p. 69.

fibris elata, post branchias duæ: quarum prima, faucesque proximè spectans, aculeo constat osseo, duro, quo infestos sibi pisces arcet, &c.

Venter magnus est, deformis, & subalbidus, obscurè fuscis lituris cōspersus. *Cor* inter branchias utrinque quaternas situm est, à reliquo diaphragmate separatum, quod gula ampla perforat, à qua ventriculus dependet, & intestina, quæ unica revolutione in anum desinunt. Ventriculo incumbit *Epar*, ex rubro pallens, duobus lobis distinctum, cui vesicula fellis dilutiaquei, adhæret. Dorso adjacet vesica simplex, peritonæum candidum est.

Ad multam magnitudinem excrescit: non solum enim ducentarum librarum, sed maior etiam capi solet. Gesnerus testimonio eruditi cuiusdam Ungari in Tibisco, qui Daciæ fluvius Danubio miscetur, aliquando captum fuisse scribit septem vel octo cubitorum, plaustrum occupantem: eum in fluvio annis sedecim sub culina Viri cuiusdam nobilis latuisse: hamo tandem inescatum esse, dum faturam suam custodiret: ubi se captum sensit exsiluisse; secutos impetum eius piscatores ad millaria duo, denique defatigatum cœpisse: barbas eum supra infraque os habere, rictum latum, caudam versùs attenuari. *Dentes* habere instar pectinis illius quo laneæ vestis depectuntur, à carduis denominati vulgo: squamis carere: in aquis cœnosis *versari*. Ipse vero Gesnerus dentes habere negat, sed labia limæ instar exasperari, atque ita prædam facillè retinere: retentam manderè & comminuere: ei opus non esse, sed faucibus & gula maximè patentibus integram vorare. Idem & in Viadro apud Silesios tantum esse scribit, ut captus, impositus currui, plerumque ultra currum emineat. Variat ab isto ille cuius Gesnerus Iconem sub Siluri tertii nomine ponit. Piscis, inquit, Similitudinem aliquam cum Mustelis fluviorum & lacuum habet. Oculi sunt parvi: barbulae fusca, non longæ, & crassiusculis paulatim attenuantur;

binæ superiore labro, ternæ inferiore. Pinnæ ad branchias binæ, in dorso nullam ostendit pictura, sed tantum carunculam quandam mucronatā eminentem, qualis & in Mustela palustri maiore, eodem fere loco visitur. In ventre vero una & continua longissima pinna ad caudam usque albicat, maculis distincta fuscis. Corpus à capite retrorsum subinde attenuatur; finis latiusculus & obliquus est, & quid mireris nullam caudæ pinnam habent. Os magnum & latum. Capitis colore caruleo subviridis; reliquum corpus viridi & flavo colore mixto pingitur, sed maculas etiam diversi coloris habet. Huius generis duos in suo stagno cavis quidam aluit, qui cum ante annos triginta sex, (verba sunt Stuibii ad Gesnerum) ad Hundselden in Rheno cum aliis piscibus illis quos Argentinæ vocant Rufelken, simul nassa capti essent, vix digiti longitudine, & Argentinā in forum advecti, à cive quodā raritatis gratia empti, in piscinam coniecti sunt, in qua alter ab eo tempore usque adeo excrevit, ut jam sex cum dimidio pedes meos (hominis mediocris proceritatem aut amplius) longitudine contineat. Caput quæ crassissimum est, filo complexus, duorum pedum & dimidii fere circumferentiam deprehendi. Alter huic per omnia similis, sed longitudine longe est inferior. Maior ille piscibus quibusvis, excepto carpione sive vivis sive mortuis, *vescitur*. Hyeme nihil quicquam gustare unquam visus est. *Cornua* quæ supra & infra os habet, quotannis decidunt, & rursus nova succrescunt, sicuti cervis.

Reperiebatur in pluribus fluminibus tempore Æliani; temporibus *Ælian. H. Plinii præcipuè in Mœno, nisi Rhe-* *A. l. 12. c. 29* num velis legere. In Aeno grassatum quem quidam Mœno & Rheno substituant prope Visbium, quod ad eius amnis ostia conditum Aventinus prodit, tanquam loco magis cœnoso, verisimile est. In Cydno Ciciliæ fluvio procreatos sed minutos, quod eius confluens nitidus & frigidus a-

Plin. H.N.
l. 32. c. 11.

pud Ælianum habetur. Pyramus, Saurus, Orontes plurimos producant, quia limosi; nec pauciores in Ptolomæorum fluvio, Apamiensi stagno. In Bubasto Ægyptia cicures aluntur plurimi. Strabo, & Athenæus, dū Siluros in Nilo esse scribunt, Glanides intelligunt, nō Sturiones. Nam qui è mari fluvios subeunt, præter Delphinum Mugilē & Alofam, nullus alius Nilum intrat propter Crocodilos. Plinius dū maris peculiarem facit Gladinē, fallitur. Expresse Schonfeldius. Fluviale hoc animal est, nec unquā aquam falsam ingreditur: ubi circa Håburgū capitur, statim Albis ex aquis pluviis aut nivalibus exæstuantis metus est, quas ut passim ex locis montosis, stagnis seu lacubus collectas, fugiens, Silurus cedit, & partes Albis spaciosiores sequitur. Reperitur & in Istro, Tibisco, Vistula. In Helveti. stagnis paucissime capiuntur in Bernensibus Neocomensi & Moretano aliquando. *Vescitur* carnibus, nec minoribus duntaxat pisciculis ventrē implet, sed & in maiores, imo homines & equos grassatur. Captū in Pannonia fama receptū, in cuius visceribus humana manus ornata annulis reperta sit. Puerum in Danubio ad Posoniam natantē ab hoc pisce devoratum, & in capti visceribus fragmenta eiusdē reperta, à fide dignis Pannonibus proditū est. In eius, quem sub culina viri cuiusdā Nobilis latuisse supra diximus ventre, caput humanum cum dextera manu & tribus annulis aureis inventum est. Aristoteles dentibus l. 9. c. 37. dūtaxat valere, & ἀγνιστοφάγος esse scriptum. Cauda cōcussa, pisces præsertim minores ori admovent. Caniculæ exortu sideratur, & alias fulgure sopitur. De Coitu & partu apud Aristotelē legimus. Cohærentes fœtus edere, sicut & ranas. Maiores profundis aquis parere, quippe nonnullos etiam ubi senum pedum altitudo sit: minores, locis brevioribus ferè ad radices salicis, aut alterius arboris cuiuspiā, juxtaq; arundines, atq; etiam muscū. Tardissimū eis ex ovis incrementū: atque idcirco assidet mas, quadragenos, quinquagenosq; dies, ne devo-

retur fœtus ab occurrentibus piscibus. Eodem quoq; die, aut etiā post, capiunt ova incrementum, quæ contigerit semen. Glanii ad erui magnitudinem. Quantum ad *sum* in cibis, Salvianus durā carnem habere scribit. In Germania & Polonia pinguis est, & boni saporis: laudaturq; in cibum recens, tum sale conditus. Circa festum Iohannis optimus est, trium librarū in primis. Obsonatores venā candidam, quam per spinam dorsī tenuissimo tectam involucro, transire, Benedictus Martinus scribit, tanquam venenatam eximunt.

CAPUT V.

De Barbotæ Gallorum.

A Glani, licet maximo pisce, non ^{TAB. XXVII.} malè de hoc parvo dicetur, ob corporis barbæq; similitudinē. Galli vulgo Barbotam vocant, non à barbis (inquit Bellonius) aut arunco, sed ex hoc, q̃ Galli barborare, cœnum & lutum rostro, anserum modo commovere dicunt. Ipse Clariam fluviatilem vocat, sed cum Lota Lugdunensi de quo suo loco, implicat. Anguillæ, aut Congri modo glabram *cutem* habet, atq; idem caput. Cirro recto brevique & simplici in maxilla inferiori barbatur. Continuā in tergo pinnam gerit mollem, ad caudam (quæ illi rotunda est) desinentē. In nonnullis duas pinna, ut in Icône quam à Bellonio missam ex Rondeletio exhibemus; in tergo videas: quarum exigua est, quæ capiti magis est vicina, sed & inter anum & caudam rursus aliam pinnam gerit: unam præterea utrimque in lateribus circa Branchias, quas utrimq; quaternas habet: duas vero sub vêtre capiti multum propinquas. Cæterum duos in inferiori maxilla habet denticulorum ordines admodū parvos: atq; in superiori maxilla totidem, ut nihil quam asperitas in eis sentiatur: nam alios etiam in fornice palatigerit. Tergus & latera fulvum vel sublividum colorem habet: *venter* autem albicat. Semipedalem non excedit longitudinem. *Hepar* lobum oblongū ad sinistrum latus demittit, sub quo ^{est}

Arist. H. A.
l. 9. c. 37.
Aristot. H.
A. l. 8. c. 20.
Aristot. H.
A. l. 6. c. 14.

est *Stomachus*. In pyloro apophyses, seu cæcos viginti quinque connumerare potes: *lienem* quoq; videas, neq; dextro neq; sinistro, sed in medio spina stomacho inhaerentem. *Anus* eius propinquior est capiti, quam caudæ. *Intestina* pluribus quam tribus inflexionibus non circumducuntur. *Ova* in bicorni vulva fert utrinq; permulta. Huc ferè Bellonius. Vita & moribus cum *Lota Lugdunensium* convenit. *Hepar* magnum habet ac delicatum; Carnem quam *Lota* glutinosiorem: mucore & cæno vescitur, in coque delitescit.

CAPUT VI.

De *Mustella fluviatili* & *lacustri*.

QVam nos *Mustellam* vocamus, illā Iovius inter Larii pisces *Trisium* Latine dixit. *Mediolanenses* *Botram* vocāt, seu quod utri similis sit, ut *Cardanus* scribit; seu quod capite rannas referat. In subr. alii *Botetrisias* dicere. Specie fluviatiles è *Lacustribus* apud suos differre *Gesnerus* asserit; Esse enim minores, colore nigricare, carne albiore, solidioreq; in cibo lautiores; duabus per dorsum pinis, quā obrem separatim etiam describit. Cæterum corpus ait esse utrisque lubricum sine squamis (licet quibusdā, inquit, squamulæ minimæ radendo appareant) flexuosum, quod caudam versus attenuatur veluti in tæniā. Coloris varietas maculosa, pinna ab ano ad caudam ferè, oblonga. Binæ omnibus ad branchias, & binæ aliæ eodem circulo inter caput & ventrē: pupilla *oculorum* alba, pars ambiens nigra. Branchiæ quaternæ simplices. Caput magnum, latum, & veluti compressum. In cerebro lapilli. Os grande rescissum. Barbulæ circa os infra supraque; numero & magnitudine differentes in diversis generibus. *Dentes* nulli, sed veluti in lima exasperatū os. Voracitas, piscium quos devorare possunt. Caro mollis & dulcis. *Iecur* magnum. In deliciis *Vesica* (aut folliculus) nulla, *intestinum* parum anfractuosum, fere simplex. *Stomachus*:

ab eo ventriculus, & in circuitu multæ appendices. Iā vero *Botarissiam fluviatilem* *fæminam* (eam intelligit quā nigricantem modo dixi.) Ianuatio mensē diligenter contemplatus his verbis (ex quibus tamen etiā nonnulla aliis huius generis speciebus conveniūt,) descripsit. Piscis est forma & flexibus serpentē ferme referens. Capite lato, caudam valde versus attenuatur. *Brachiæ* ei quaternæ. *Pinna* ad latera brachiarum utrimque una nigricat: & aliæ duæ paulo inferius in pectore parvæ albicāt à podice exorta una oblonga, paulo citra caudam desinūt; itē in dorso oblongior alia, ultra mediū dorsum continua tradit: & alia ante ea minor caput versus, quā pictor in *Icone* per in curiā nō expressit. *Pinnæ* omnes molles sunt & sine spinis. Carūcula sub mento pili instar prominet. *Cauda* non bifurca, sed circularis, nusquam omnino divisa, sed ubiq; sibi instar membranæ cōtinua: Colore vario, è fusco & nigro dorsum tenerum albicat: latera juxta dorsum minimis punctis nigris in colore subalbido distincta sunt. Os aperitur hiatus rotundo, totus piscis sine squamis & viscosus est. *Maxillæ* minimis *denticulis* serratæ. Color subalbidus (linea subalbā nimirum) à capite incipiens obliq; per latera caudā versus procedit. Nam cauda in colore nigricante variat. Membranea vero caudæ extremitas partim nigricat partim subflavā est. *Lapillos* duos in capite gerit, albißimos & bene duos, figura & magnitudine granorum oryzae. *Lacustris* modò in *Trissia* in *Griffio* lacu capta ab eodē considerata huiusmodi erat. Longa dodrantes, duos cum palmo: filum ambiens Ventrē triū palmarum. *Denticuli* minimi, frequentes, ut serpentū. Superior pars oris duos ordines dentium habet, unum scil. interius in medio, cui nullus respondet infra. Sunt & in intimo oris recessu, duo denticulorū ordines seu in maculis duabus. *Brachiæ* quaternæ. *Squamula*, rotundæ minimæ, quæ dū pellis cultro raditur, apparent, in parvis generibus v. tum fluviatili, tum *Lacustri* luteo minore nullo prorsus, per cutim passim

TAB.
XXVIII.
6.7.8.9.
Aldrov. de
Piscib. l. 5.
c. 7.
Cardan.
Variet. Rer
l. 17. 37.

passim ceu foramina, ceu puncta cava rotunda, conspiciuntur; quæ si quis caput versus validè radat, albissima videntur: sin iterū caudam versus, rursus obscurètur. In *ventre* meatos duos; unus excrementi, alter genituræ: qui compressus lacteo succo manabat. Et rursus alias *alia ex lacu* huiusmodi: subflava, punctis nigris, barbula à mento demissa, albicans. Ante initium pinnarum in *dorso* carnosæ particula, mollis, teres, intrusq; cava, prominet. Inde mox sequitur pinna brevis, longitudine pollicis: deinde una continua, octo vel novem digitos longa, ab ea nudum pinnis dorsum est, per tres fere digitos: cum sequuntur aliæ duæ parvæ, triangulares fere, inter quas digiti propemodum spatium intercedit: ex quibus infima & ultima, minor & caudæ coniuncta est. *Fel* subviride: vesicula eius tum jecori tum intestinis affixa. In ventriculo pisces duo integrierant, uterque digitos septem longus, tres latus: nec aliud quicquam. Pondus totius, uncia quinquaginta. Coctæ pellis subviridi & deformi colore erat, caro albissima, bona, satis solida. *Iecur* album, non ut in minoribus subruffum, grande, suavissimum. In *alia Trissia parva, fluviali*, forte digitos decem longa, pinnae dorsi inquit, sic sunt. Primum, caruncula illi brevis non est, sed pinnula digito brevior: & minimo spacio intercedente, alia duos digitos longa: deinde post spatium duorum digitorum, alia paulo brevior, media, & mox cauda. Rursus ab hac differt alia, paulò longior, (ut semel animadverti: non enim simpliciter hæc accipere debent, quod ad magnitudines & colores) cui minus erat flavi in corpore, plus nigri, & eius splendidiore. Primum enim pinna illi brevis est, deinde una longa continua usque ad initium caudæ: Ergo magna Trissia lacustris; præter carunculam illam, pinnas in dorso quaternas habet, ex minoribus, nigricans binas; luteola verò maior ternas, minor binas: si modo species duæ sint luteolæ: quod accuratius considerandum est:

Minoribus lacuum Trissis pinnae in dorso binæ, adeo propinquæ invicem sunt, ut unica putentur: Colore fusco, non pulchro. Differentia à pinnis certior: nam colores multas ob causas variare possunt. In Rheno supra Acronium lacum aliquando ad tres libras sedecim unciarum accedunt. Constantiæ tanta capta, ut drachmis duabus cum dimidia venderetur. Captæ & Pragæ aliquando, pulcherrimæ, coloribus distinctæ, flavo, croceo, candido, roseo, atro, oculorum pupilla nigra, parte ambiēte cærulea. Nigriores circa ripas fieri, magis in profundo flavas, quibusdam placuit. *Carnivora* sunt, nec ullus piscis pro sua magnitudine maiores pisces devorat. Profunda petunt, adeo, ut Albertus scribat, in lacu circa Constantiam ad trecentos passus sub aqua hamis extrahi: sæpe cum ranis extrahuntur; quæ quia illis ore adherent, tanquam ex fugendi cibi gratia, ideo ore cum ranis aquaticis coire, quidam prodiderunt. *Parere* incipiunt Decembri, alicubi & Ianuario. Solæ piscium senectute *obscantur*. Maxime commendantur *in cibis*, illæ in prunis, quæ in puris rapidisq; fluviis degunt, quod candidiorem ac solidiorē carnem habeant. In jecinoribus tanta saporis gratia est, ut apud Thuringos olim comitis cuiusdam Bichlingorum matronā, omnes, dicant, principatus sui redditus in eorum delicias consumsisse. Laudatur hæc præcipue ante Natalem Dominicū: circa partum improbantur, quod hoc tempore nonnullis in aquis grandinosa fiāt. *Ova* aiunt semper valde noxia esse, quibusdam in locis, ut circa Neocomensem lacum Sabaudia. Caupones aliqui excisis jecinoribus, pisces vivos aquæ reddunt, consuto prius vulnere. *Ventriculū* huius piscis cum suis appendicibus miras habere vires tradit Encelius. In veteratum enim, ut fit (inquit) in Saxonia à matronis, trahere mirifice secundas hærentes aut relictas in partu, in potu datum: & magni momenti esse ad omnia vitia matricis. In Suevia passim in Cauponis & diverforiis parietibus hærentes hi ventriculi

triculi circa Zetarum fornaces visuntur, ab edentibus illuc reiecti, ut exsiccati ferventur, & cum potione aliqua hausti à colios cruciatibus liberent. Colligaiunt & oleum ex hepate ad solem vel ad fornacis calorem suspenso, intra vas vitreum: clarum id & flavum esse, adversus oculorum suffusiones utile, item nubeculas & maculas, quæ ab angulis oculorum nasci incipiunt.

N. *Muscula marina* Iconem vide Tab. 46.

CAPVT VII.

De Piscibus Fossilibus.

TAB. XXVIII. 8. *Aldrov. de Piscib. l. 5. c. 9.* **P**iscium Fossilium & Veteres & moderni meminere. Ex illis ita de eorum natura & ortu Theophrastus. Pisces alicubi fossiles sunt, ut circa Heracleam & alibi in Ponto. Nascuntur autem circa fluvios, & aquosalia loca, quæ cum siccantur (certis temporibus) paulatim, pisces subinde humorem sectando terram subeunt: quæ demum siccata, remanent in ea, veluti vivi sepulti, vel ut animantia quædam in suis latibulis hyeme condita durant, sine sensu ferè & motu torpida. Quod si loca illa priusquam denuò aqua accedat, fodiantur, pisces illi moventur. Sic & in Ponto contingit pisces glacie & gelu occupari, neque sentire, aut moveri prius, quàm in ollas coquendi iniciantur. Præcæteris autem Gobio hoc accidere videtur. Ferè autem fossiles pisces fiunt, eo quod ab inundatione fluviorum, in locis quæ resiccantur, vel ova, vel alia principia gignendis idonea piscibus relinquuntur. Nonnulla enim non ex ovoriuntur, ut Anguilla & Centrisus. Et hoc in Heraclea, circa Lycum fluvium contingit. Principia autem hæc in terra relicta, perficiuntur, durantque. Neque absurdum est hos pisces durare.

Multa enim huiusmodi animalium exiguo egent nutrimento, sicuti serpentes quoque & quæ latibu-

lis se abdunt. Primum scilicet ipsa ova humore è terra manante, deinde eodem nati ex ovis pisces nutriuntur. Ad magnitudinem tamen aliquam eos excrescere neque verisimile est, neque fertur, cum & loci angustia & alimenti penuria impediant. Cæterum durare in aere hi pisces non æquè valent, ac illi qui ab aquis ad pastum egrediuntur; qui scilicet exigua refrigeratione, & quæ ab aère eis præstari possit, indigent; nam vel ipsa branchiarum angustia indicat, non multa refrigeratione eis opus esse; quomobrem & Anguilla tum in aere multum temporis vivit, tum in aquis turbidis illico suffocatur. Et similiter fossiles pisces à terra eos ambiente, quantum satis est, refrigerantur. Sed quod circa fossiles in Paphlagonia pisces contingit, peculiarem & additam rationem habet. Illic enim profunde admodum multos & bonos pisces effodi aiunt: cum neque inundare aquam animum iis in locis neque aliter colligi animadvertatur, unde semina & principia generationis relinqui dicimus. Reliquum est ut sua sponte nascantur, idque continuo. Neque enim coire inter se possunt. Aut igitur hoc fieri existimandum est ratione loci, qui humidus sit, & omnino ferax huiusmodi piscium propter certam humidi calidique commodationem. Oriuntur autem & alii quandoque quidam pisces spontè; aut humores quosdam alicunde manare cogitandum est, qui generationis principia secum adferant: quæ mox locus idoneus & recipiat & alat. Præterea hoc inquirendum de utrisque, tum illis qui in aere vivunt, tum fossilibus, utrum in aquam immissi vivere valeant, aut in proprio duntaxat loco, qui eis naturalis sit, sicuti sua & marinis & fluvialibus aqua. Nam ex his quoque non nisi pauci mutationem sustinent. Nam qui in aquis resiccat terram subeunt, & qui glacie gelati detinentur, iis familiarem esse humorem magis quam aliis (è fossilium genere) constat. Ergo piscium

alii simplicis naturæ videre debent, alii amphibii secundum Democritum, ut & aliæ quædam animantes. Utuntur enim aere quædam (ex aquaticis) ut prædictum est. Theophrastum sequitur Plinius, dum inquit: Circa Heracleam & Cromnam (aliàs additur, & Lycum amnem: probè nimirum, mox enim sequitur) eodemque Lyco amne, & multifariam in Ponto unum genus esse Theophrastus prodit, quod extremas fluminum aquas secetur, cavernasque faciat sibi in terra, atque in his vivat, etiam reciprocis amnibus siccato littore, effodi ergo: motu demum corporum vivere eos approbant. Circa Heracleam eandem eodemque Lyco amne decedente, ovis relictis in limo generari pisces, qui ad pabula petenda palpitent, exiguis branchiis, quod fieri non indigo humoris, propter quod & Anguillas diutius vivere exemptas aquis. Ova autem in sicco maturari, ut testudinum. Eadem in Ponti regione apprehendi glacie piscium maximi Gobiones, non nisi patinarum calore vitalem motum facientes. In his quidem, tametsi mirabilis, est tamen aliqua ratio. Idem tradit in Paphlagonia effodi pisces gratissimos cibis terrenos, altis scrobibus, in his locis, ubi nullæ restagnant aquæ, miraturque & ipse gigni sine coitu. Humor is quidem vim aliquam inesse, quam (qualem &) puteis arbitrat, cum in nonnullis reperiantur pisces. Quicquid est, hoc certe minus admirabile talparum facit vita subterranei animalis, nisi forte vermium terrenorum & piscibus natura est. *Neoterichis* est piscis fossilis ille, quem Germani *Beisher*, alii *Peisher*, quidam Meerputten vocant. Duorum sunt Agricolarum generum. Maiores nempe, & minores. Solum omnes edunt acutum. E fluminibus, quæ currunt in locis paludosis egressi, per riparum venas longius, & interdum in proximi oppidi cellas, neque subterraneas penetrant. Quidam Eruditi *Mustellam fossilem* vocant, eamque ita descripsit Fabricius. Longitudine est

palmi crassitudine digiti, quanquam multò maiores etiam reperiuntur. (Agricola palmos quatuor longos maioris esse scripsit.) Dorsum coloris cinerei: cum punctis multis, maculisque transversis, partim nigris, partim cæruleis. In lateribus linea utrinque nigra & alba. Venter flavus cum maculis albis, & punctis rubris ac nigris, ita parvis ac sic factæ essent. Ab ore carneæ particula eminent, quos nando extendunt, extra aquam contrahunt. In Misena trans Albim duobus locis, quod scio fodiuntur. Ad Polnitium amnem; prope Orlantem: & ad Dobram rivum prope Hanam oppidum. Item in pratis ad Rederam fluvium copiosè effodiuntur, si flumen inundet. Ex terræ cavernis etiam ingrediuntur lacus & paludes: Cum aquæ extra ripas excrescunt, è terra prodeunt: aquis autem resistentibus, in pratis campis relinquuntur, & ubi greges sunt, relictivorantur à suis. Sordes amant, & in cloacas, quæ alia purgari ratione nequeunt, iniecti, omnia consumunt. Cum in rivis paludibusque capiuntur recentes, solent à tenuioribus etiam mensis adhiberi. Serviunt imprimis fraudi agyrtarum, qui eos alunt, & vitris inclusos multitudini ostentant pro serpentibus, quia forma à parvo serpente non multum figura differunt. Sunt qui eos spirare putent. Ubi enim plures huius generis pisces simul sunt, spuma supra eos effertur. Vitro inclusi ore angusto, *crescunt*, & suo quodam succo vivunt usque ad semestrem.

CAPUT VIII.

*De Lampetra Fluviatili, &
Vario, seu Phoxino
levi.*

QVam nos *Lāpetram fluviatilem* dicimus, in Tholosanis Chatillou, à titillatione, quod cum manu tene-

TAB.
XXVIII.
10. II.
Aldrov. de
Piscib. l. 5.
tur, 6. 9.

tur, quasi titillationis sensu variis fluxibus videatur contorquere se & elabi; Germanis Neunaug seu *έννεόφθαλμος* dicitur. Marinis, inquit Rondeletius partibus internis & externis & colore similes, sola magnitudine differunt: quædam enim magnitudine: aliæ vermibus terrestribus crassioribus assimilantur. Caro est tenax, *σπινα* nulla; pro spina dorsi, unus continuus nervus cavus, quo *humor* albus continetur, simplex, absq; ullis nervorum costarumve ramulis. Intestina tenuissima. *Ventriculus* vix apparet: nec mirum cum solo suctu vivat. Foramen in capite supra, sicut Lampetræ maiores, habet. In fluviis & rivulis in quibus capiuntur, nasci vel indeliquet, quod nullis marinis Lampetris ibi aditus patere possit, cum neque illi in mare confluant, neque mare cum iis ulla parte sit coniunctū. Capiuntur sæpius reti cum Variis sive Phoxinis pisciculis. Vescuntur luto & aqua, iisdem Locis degunt quibus vermes: Autumno in brunam usque in Albi capiuntur, torrentur recentes in craticula, aceto condiuntur, & vasis ligneis exceptæ, in varia loca distrahuntur. Vernis quadragesimo jeuniis gratum delicatulis obsonium. Salitæ item leviter, fumo indurantur. Carne sunt satis molli & glutinosa, quod quantulumcumque est vitii, conditum & coctum facile beneficio corrigitur, nisi aquæ in qua vixerunt vitio, plus solito virosæ fuerint.

TAB.
XXVIII.
1.
Aldrov. de
Piscib. l. 5.
c. 10.

VARIVM seu PHOXINVM lævem, Romani *Morellam* quod nigris punctis & tenuissimis lituris sugilletur, Insuores Sanguinolæ à rubore, dicunt: Rondeletius à Græcis quibusdā *έννεόφθαλμον* vocari scribit. Germ. *Ελρίξ*. Diversis toto corpore coloribus depingi hunc pisciculum ex diversis in primis nomenclaturis ostendi potest. Dorsum (inquit Rondeletius) aurei splendoris est, venter argentei, *latera* purpurascent, Cauda in pinnam auream & latiusculam deficit. *Cutelævi* integitur, punctis notata, nigris nempe. Pinne laterum multum ad ventrem tradunt: quarum ra-

dices, quæ corpus pertingunt, rubro sunt colore perfusæ, inde sanguinaria dictus. Nigricat quoq; in tergoribus per intervalla. Linea quæ latera utrimque secatur arcuata est. Dignitatem longitudinem seu palmum, nunquā excedunt. Circa lacuum & fluviorum oras aquis stagnantibus capiuntur reticulis. Bellonius *ovis* semper prægnantes esse asserit, ideoque Aristoteles Phoxinum esse autumat. Gesnerus vero sexu distingui dum ait, coire invicem etiam insinuat; quin, quod si (inquit) Phoxini, minimi isti pisciculi sint; nil mirum si propter parvitatem mediocres etiam ex eis nuper nati videantur. Verum nec ipse Aristoteles simpliciter nuper natos, sed verbis *ὡς ἐπ' αὖν*, id est, prope dixerim, additis, gravidos capi tradit. Verisimile est autem tantillos pisciculos, sicut & mures inter quadrupedes, breviter tempore perfici & generare posse. Carne est molli & satis suavi: sed non nisi evisceratus coquendus est.

CAPVT IX.

De Salmerone, seu Salmerino.

TRidentini, piscem sibi peculiare, TAB. XXVIII. *Salmerinum* vel nomine ab Salmerone detorto, quo cum carnis rubedine convenit, vel quasi Salmonem lacustrem, nuncupant. Aldrovandus à Cardinale Madrucio acceptum ita descripsit. Corporis forma pinna- rum, numero ac situ cum Truttis ac Salmonibus fere convenit: Cæterum squamis caret; etsi squamosum esse profiteatur Salvianus: Capite est rotundiusculo, retuso rostro. *Oculorum* pupillam nigram aureus, qui in mortuo postea fuit ruberrimus, circulus ambit: ac quam maxime splendens. Ante eos foramina duo, auditus vel olfactus instrumenta, rotunda, manifesta. Oris maxilla inferior nonnihil recurva, Unco sursum vergente: estque tota ea mandibula alba. Lingua eiusdem coloris, item palatum.

Totum os insigniter dentatum. Piscis ipse rotundus potius, quam latus est. Pinnæ sunt numero septem, omnes sine aculeis: quinque supino binæ prono corpore, juxta branchias duæ, totidem in medio ventre, quinta ac postrema à Podice, longæ omnes à latæ. Quæ ad branchias sunt, triplici colore præditæ. Ubi enim longiores sunt, hoc est, in ipso exortu, albicant, mox totæ rubent, exceptis nervis, qui nigricant, reliquæ tres sicuti in exortu magis quam illæ alben, ita quoque rubedo in his intensior est, nigredine vero plane carent. Priores quatuordecim nervis constant, subsequentes novem, novissimæ decem: quæ vero in medio fere dorso cōspicitur, duodecim nervos habet, altera non longe à cauda, iis caret, mollis & cutacea, ut in Truttaceo genere: malè quæ ceu nervosa à Salviano expressa est: utraque dorso concolor, id est, nigricans. Cauda Lunata est, eiusdem coloris, non rubra, ut ille ait. Podex in imo ventre juxta exortum posterioris pinnæ. A branchiis ad caudam linea exilis, recta ad caudam usque fertur asperiuscula. Latera non nihil albicant, & nunc rotundis, nunc oblongis, iisdemque nunc maiusculis, nunc exiguis maculis subfulvi coloris consperguntur, Totus venter coloris fermè crocei, aut vulgaris minii. *Vterum* habet admodum procerum atque latissimum, utpote qui totam corporis capacitatem occupat, ovis refertus eiusdem fere magnitudinis, fulvis auroque resplendentibus, margaritis aureas diceret. Intestina alba, pluribus circumvolutionibus intorta. *Iecur* breve, latum, unico duntaxat lobo constans, flavescens. Vescicam fellis invenire non licuit. *Lien* maiusculus ex atro rubens. *Vertriculus* longus & carnosus. Caro, ut in Salmone, rubra. Longitudo totius piscis à capitis initio ad caudæ extremū, Spithamas binas explet. *Locum* si attendas, in lacubus Tridentinorum montium capi innuit. Salvianus in frigidissimis & saxosis fluminibus nasci prodidit. *Vescitur* pisciculis, & in horum defectu, recrementis. Quin singuli ca-

piuntur, ideo solitarios esse concludimus. *Coiit* in fine Novembris & Decembris. Piscis est, si quis alius delicatissimus. Caro ei tenera quidem, & quæ brevi tempore putrescit, sed minime viscida, satisque friabilis.

— — — — —

TITVLVS III.

De Piscibus, qui præter fluvios alias quoque, dulces aquas incolunt.

CAPVT I.

De Perca Maiore.



Antum de Piscib. Fluviali. TAB. libus, tam squamosis quam XXIII. levibus sufficiat, sequuntur 13. 14. Illi qui præter fluvios alias TAB. quoque aquas dulces incolunt: *Perca* XXIV. nempe *Maior*, *Perca fluvialis minor*, 9. *Scrollus*, *Pungitius Alberti*, *Alburnus Ausonii*, *Epelanus fluvialis*, *Lucius*, *Cyprius latus*, *Ballerus*, *Tinca*, & *Lota Gallo-*rum.

PERCÆ MAIORI, quæ Germanis Baers & Bersich, corporis figura lata & compressa est: rostro prominenti non aliter quam marina, verum non adeo acuto: Ore etiam ut illa mediocri, imò pro corporis ratione parvo. Dentibus caret, sed labia habet denticulis horridula, ut Bello- nius testatur. Squamis regitur parvis ac aridis, quæ difficillime à corpore avelluntur, maximèque ancillis fastidio esse solent. Color ei varius, veter nempe; Corpus reliquū fere cinereum; nigricatibus quibusdā ac latīs maculis à dorso descendentibus (non aliter ac in marina) latera depingentibus. Pinnæ ac cauda rubescunt. In *femina* v. nihil, vel parum saltē. Pinnæ in tergore duæ, quarū quæ capiti proxima, maior est & aculeata, posterior minor sine aculeis: totidē ad Brāchias quos Rondeletius altiores esse putat, quam

quam in reliquis fluviatilibus: totidē item in ventre: quæ vero ab excrementorum est orificio, aculeo crenato vallatur. Brachias habet utrimque quaternas easque duplices, id quod Aristoteles quoque vidit. *Candabifurcatim* dividitur. Ad maiorem *magnitudinem* excrescit, quam marina: nam & trilibris aliquando capi solet inquit Salvianus: in Lario lacu ad pedalem etiam teste Iovio magnitudinem. In Suerinenſi vero lacu ulnam id est cubitum æquare Gesnerus intellexit. Ventriculum habet mediocrem; intestina pauca & tenuia, *hepar* subpallidum: à cuius maiori lobo vesica pēdet, in qua seles est tenue & aqueum: *Lien* subrubet. *Lapillos* habet in cerebro. Plinius eam mari & fluviis communem facit, sed perperam. In dulci enim aqua vivere & usu, & Aristotelis Aufonitque testimonio, qui eum cum Cyprino, Glanide & aliis nominat, constat. *Ælianus* in Danubio capi scribit. Rhenus eo caret, forte quod altiores aquas amet. Præcipua in Verbano lacu & Pado flumine producit, prodente Platina. Fama est Larij lacus Percas fuisse advectitios & inquilinas, tralaticis scilicet è lacu Eupyli, qui Lambrū emittit amnem, seminibus. In omnibus *jecur* grandine affectum est, nec quoquam alio vitio laborant. *Devorant* alios pisces tum proprii generis sobolem. *Pariunt* circa littora & frutices ut Aristoteles prædixit, in Helvetiis lacubus verno tempore in profundo, Aprili & Majo mensibus, ut Gesnerus. Partus tempore facile capiuntur in Sleia, & frequenter, hinc à littoribus ad pastum excurrunt, vaganturque locis spaciosioribus. Circa Iohannis festum rursus capitur, dum littora ex profundo repetit. Lucio læso opitulari, fabulosum puto; nec ille huic parceret, nisi propter pinnas cogeretur. Gesnerus narrat, piscatores in Lemanno lacu observasse, Percas hyeme emittere per os *Vesiculam* quandam rubram ex ore pendentē, quæ vel invitas, inquit, supernatare cogit: coniectant autem id ab eis fieri præ iracundia, quod in retia incide-

rint: hoc enim tum maxime pati, cū retia trahunt piscatores: sed mirum esse quod hyeme tantum id ipsis accidat. De ipsarum *Salubritate* diversæ sunt Authorum opiniones. Rondeletius dotibus illis quibus marina instructa est carere, scribit. Gesnerus Rhenanas, & quæ in fluviis & lacubus maioribus purioribus versantur probat: quæ in minoribus minusque puris aquis degunt, non item. In Gallia summam alendis febricitantibus dignitatem obtinent, si Iovio credimus; In Italia quæ in Lario lacu laudatissimi, eadem ad pedalem magnitudinē crescunt, & maturiscentibus præsertim uvis, ab ipso pingui & præteneris interaneis cōmendantur. In Germania quovis anni tēpore, April. & Mart. mensem si excipias, laudantur. Aufonius in pretio habitam fuisse testatur alibi inertis gustu prodidit. Minimam quas *Hornas* cognomināt, coqui peritiores vino calido immerſas elixant. Maiusculæ propter spinas & aculeos pinnarum dorſi, vescentibus molestæ sunt: in minimis propter teneritudinem nō curantur. Parvulæ etiā, butyro frigi solent, frequentius quā ulli alii pisces. Circa Verbanum lacum Percas modice apertas, verubus ligneis transversas inserunt & assant: semissas butyro illinūt. Ibidem omne genus pisciculorum ad solem inveterant, maxime vero Perculas. Vulnus aculeis pinnarum dorſi inflictum, non facile sanatur.

CAPUT II.

De Perca Fluviatili minore.

Perca fluviatilis minor, quibusdam *Cernua*, & *Acerina* medici Plinij, Straboni *Porcus Niloticus*, quia porcū continente spinarum serie admodū setarum mentitur, Trago *Aurata fluviatilis*, quod extra aquameducta ac suo humore deterſa, aureo fulgore in Cæruleum abeunte insignis sit; Caio Anglo *Aspredo*; Pictorio *Aspretilis* dicitur. Piscis est toto corpore asper, pinnis spinosus.

Percæ forma & magnitudine, colore per summa fuscus, per ima cum pallore flavus; duplici per maxillas

TAB.
XXIV. 8.
Aldrov. l. 5.
634.

Bellon. A-
quat. l. I.

femi circulatorum ordine notatus: oculo ex dimidio superiori fuscus, ex inferiori subaureus, pupilla niger. Linea per dorsi longitudinem porrecta, & veluti filo transverso corpori affixa singularis: notis per caudam atque pinnas nigris maculosus: quæ, *pinnae*, cum ira subest, in hortescent: cum animo conquiescunt, resident. Bellonius scribit nullum alium *Channam* exanimum melius exprimere: mortuum n. hiare & oris rictum apertum tenere. Idem ait, recens *captum* hilari quadam ac subvirenti opacitate ceu pavonis torqueus, refulgere: imo vero extra aquam eductum, ac suo humore deterfum, aureo fulgore in cæruleum abeunte insignem esset. Perca plurimum æmulari, nisi transversis lineamentis (quæ Perca in sunt) careret: oreque magis esset recurto. Hoc potissimum signo dignosci, qui spineum branchiarum tegumentum, crenatum ut in Lupo & sua rima luxatum habet. Ubi autem linea quæ piscium latera secat, ad branchias incipit, ibi aculeum caudam spectantem ut in Dracone marino videri. Sed & hoc à Perca dissidere, quod perca duas in tergore pinnas habeat, Cernua (sic vocat) unicam tantum, nullisque dentibus, sed neque lingua manifesta præditam esse, *squamasq;* habere quadrangulas, robustas, crenulatis tenuibus in gyrum incis, quæ piscem Scabrum admodum efficiant. Radiis denique solaribus obiectam, *maculis nigris* per dorsum distingui percipi: at totam sub ventre candidare. Cæterum non advertit Bellonius extremis branchiis, id est, branchiarum margini alterum paulo inferius aculeum adiunctum esse, quod observavit Gesnerus, qui tamen neutrum in duabus quas dedit, iconibus expressit. Sunt n. inquit, perexiles: ut in mediis etiam branchiis denticulatae aliquot spinulae crenatim (ut ita dicam) apparentes, si de proximo intuearis: superius minores & frequentiores: inferius maiores, paucae & maioribus intervallis. Sunt autem illæ, inquit, digestæ in margine portionis cuiusdam branchiarum, quæ à parte

subiecta deduci & elevari potest. Est & supra branchias spinea pars obliqua, utrinque versus occipitium se colligens tantillis ferrata denticulis, ut tactui magis quam visui pateant. Item alia pars supina triangularis superinnata, à branchiarum scissura, statim supra pinnas ibidem, retrorsum spectat, & in brevissimum sed acutum spiculum definit. Idem Gesnerus squamas rotundas esse negat, sed rotundas esse fere ut in aliis piscibus ait. Pinnam etiam dorsi unam esse oblongam & continuam, ut Bellon. dixit, & Cajus in communicata icone probere præsentavit: differre tamen partibus: nam anteriorem aculeis constare quatuordecim, quorum primi duo breviores propius iuncti sint, medij longiores, longitudine paulatim ad ultimum usque decrescente: partem posteriorem, molliorem esse, fibris non aculeis distinctam, brevior, & ab anteriore intervallo quodam inchoato discerni. Iam v. tres esse pinnas in supina parte, unam postanum, & binas summo ventre quæ nigris lituris, ut cætera omnes non distinguuntur. Ferunt amare *torrentia*. In Hollandia copiose in stagnantibus aquis capiuntur. Rarus est in Tamesi, plurimum in Ranello, quod Oxonium præterfluit. Cum natus Gobij & Bottæ more universas pinnas movet, si Cardano credendum. In vivaria coniectus, pisces alios exurere, quod ipsis aculeis molestus sit dicitur. Hyeme latet, in quadragesima commendatur. *Lapilli* quos in cerebro gerit, adversus renum lapillos & pleuritici commendantur.

C A P U T III.

De Scrollo, & Pungitio Alberti.

SCROLLUS Danubianus piscis est. TAB. XXVIII. 15. 16. Aldrov. l. 5. c. 35. & 36.
Color in Icone, quam Raphaeli Seilero acceptam Gesnerus refert, dorso fuscus est, lateribus subviridis, plurimis punctis fuscis intervenientibus:

bus: quales etiam in pinna dorsi (cuius aculei albicant) conspiciuntur: venter candidus est. Initium pinnarum ad Branchias rubet, &c. Raro longior fit, quam figura ostendit. Quoquomodo paratus, in cibo optimus est.

PUNCTIUM Alberti, Rödeletius *aculeatum* vocat. Author de rerum natura *Spinochiam*. Pisciculus est, inquit Albertus, minimus, qui lanceolas (aculeos) binas habet in radicibus pinnarum ventris. *Mas* sub gutture rubet, *semina* rubore caret. *Squamas* non habent. Piscatores hoc genus piscium sponte *generari* ajunt, & ex ipsis alios omnes, hac observatione inducti, quod in lacunis novis primo statim anno inveniuntur, & postea sequentibus annis pisces alij diversi, quanquam nulli fuerint immixti.

CAPUT IV.

De Alburno Aufonij & Epelano fluviatili.

TAB.
XXIX. 13.
Bellon. Ag.
l. i.
Aldrov. l. 5.
c. 37. & 38.

ALBURNI meminit in sua Mosella privatim Aufonius. Bellonius circa Vercellas in amne Lagogna Ticinum influenti, *Scavardinum* à piscatoribus appellari scribit, Germani *Weißfischlin* / & *Rotaugen* / id est, ἐγὼ φθάλμιον dicunt. Piscis est & fluviatilis & lacustris, Alphyis albis similis, oculis magnis, rubescentibus, dorso virescente, ventre candido. Bellon. lineam utrinque esse ait arcuatam, quæ eius latera dividat. Sed Rondel. duabus distingui profitetur, altera à brachiis ad caudam ducta, medium corpus dirimi: alteram minus evidentem à radice pinnae branchiarum orta definire, priusquam ad caudam perducta sit. *Nare* est parum refina. Pinnae easdem habet quas Gobio. Capite est parvo: corpore latiusculo, sed depresso, vixque ad duorum digitorum latitudinem extenditur. *Felle* caret. Argenteis tegitur *squamis* ac tenuibus. Carne est molli & parum pingui. *Vox* est piscis, quam ob causam facile

homo capitur; unde Aufonius prædixit puerilibus hamis, recte dixit. Observavi Alburni duas alias species, quarum prior tergo fere ad castaneæ colorem vergit: altera ad cæruleum. Vtriusque pinnae & cauda etiam ad castaneum vergunt. Cætera argenteo colore resplendent:

EPELANUM fluviatile Bellonius TAB. XXVIII. Sequanicum cognominat, à Galliæ fluvio, ubi abundat, additque sic vocari quasi excellanum à præstantia, quæ cæteros sui generis pisciculos excedit. Ferrarienses *Borbolum* vocant, Alburno simillimum atque hoc tantum ab eo dissidentem, quod rufas radices pinnarum Gardonis & Veronis modo habet, ac lineam quæ latera ejus secat, versus caudam admodum inflexam & velut arcuatam. Quinque digitorum longitudinem, pollicis latitudinem interdum exuperat. Pisciculus est *odoratus*, de bonitate & principatu cum aliis omnibus contendens. Rothomagenes *Ovellameo* argumeto nominant, quod semper ovis prægnans sit. Epelanum si suas *Squamas* habentem conspicias, præ nimia albedine terstitudine tibi refulgere videbitur. Squamis autem exutus *tergus* ostendit variis coloribus emicans, in iridis aut arcus cælestis morem. Marino crassior est & brevior.

CAPUT V.

De Lucio.

LUCIUS vel *ἄλφις* à lupo, vel à TAB. XXIX. 1. lucendo dictus est. Nulla ejus apud veteres Græcos mentio, & ostendit egregie contra Philelphum Salviianus Oxyrinchus Niloticus quod Bellonius vult dici posset, nisi Plutarchus eundem marinum, tanquam è mari Nilum intraret faceret. Eodem Plinii, quem in Rheho magnitudine excellere putat, haud difficulter concedi potest, & videtur abinde Belgicum Snock originem suam traxisse. Apud Anglos & Gallos diversa, pro diversitate ætatum sortitur nomina. Corporis figuram oblonga est, eademque ideo oblongior videtur, quoniam piscis latera modice dilatantur.

Dor.

Dorsum latum est, & fere quadratum, perpetuoque æquale, donec ad postremas pinnas ventum sit: & cum reliquis fere *Squamosis* piscibus dorsum ipsum magis aut saltem æque atque venter extuberare solent: huic uni venter, quam dorsum magis extuberrat, potissimum ubi pinguior sit factus, quod tamen aliquando ichthyopolarum impostura etiam fieri Romæ observavit Rōdeletius, piscium quorundam ventres infarcire tradens vilibus herbis, atque ita ceu pinguiores carius vendere. Caput habet macrum, osseumque ac quadratum. Ossium seu *spinarum* in capite formas diversas reperiri ajunt: unam vulgo cruci comparant, aliam lanceæ, tres alias clavis seu paxilis, passionis Dominicæ instrumentis. Author obscurus de natura rerum scribit Lucium in cerebro lapidem crystallo simile gerere, sed hunc cum ævum in longum duxerit. Gesnerus vero testatur sese in capite Lucij etiam parvi, lapillos geminos candidos reperisse. Rostrum habet longum & rectum maximum, Anserino rostro comparat Rondeletius. *Maxilla* inferior superiore longior est, & cochlearis modo excavata. *Dentes* in eo plurimi, haudque uno modo dispositi, ut & Albertus ait, diversarum acierum; nam in maxillæ inferioris anteriore parte dentes parvi sunt, in os recurvi: in superiore maxilla nulli sunt, qui cum ea latior sit, dentes extra os prominentes & inferioribus non occurrentes inutiles forent. Horum igitur loco natura (inquit Rondeletius) duos dentium ordines palato infixit. *Oculi* coloris auri sunt æmuli, ante quos duo foramina in unicam cavitatem coeuntia: *Corpus* squamis tegitur parvis tenuibusve adeo, ut ijs carere videatur, & cum ijs coquatur, & inter edendum, si parvus sit piscis, negligantur: si major, duriores & evidētiore abiciantur. Venter albicat, dorsum vero ex subflavo nigrescit, à quo lineæ plurimæ latæ, non recte, sed multipliciter inflexæ, obliquæ potius quam transversæ, in aliquibus magis, in aliquibus v. minus & flavæ & conspicuæ deducuntur, totumque piscem pulcherrime pingunt. Pinnis natat quatuor, duo sunt ad branchiarum ima: qui pinnarum situs est fluviatilibus piscibus communis, ut facilius in aqua suspendantur & efferantur: contra alius sitæ sunt eadem pinnæ in marinis, quia dulcis aqua tenuior est, & liquidior, marina crassior & spissior: ob id hæc pōdus magis sustinet, illa min⁹: Inferiore vētris loco duæ alię sūt magnæ & validæ. In dorso nulla est, sed non procul à cauda duæ sunt, una superior est nigris maculis notata. Cauda brevis, in duas pinnas desinit similiter pictas. *Linea* medium corpus dirimēs vix cernitur, quia ex minutis punctis constat. *Ventriculum* ita gurguri continuatum habere Albertus scribit, ut aliquando eum rejiciat aviditate glutiendi piscem. Rondeletius permultas eius ait esse appendices, in quibus chylus cōfectus fervetur, ne ob gulæ laxitatem facile rejiciatur: Vidi ego magnitudine insigni Lucium, qui alium, & ipsum insigniter grandem ventre containeret, & hic rursus murem aquaticum, ut latissimum habere ventrem necesse sit hoc genus piscium. *Intestina* tribus longis convolutionibus cōstant. *Hepar* ventriculum cōplectitur, in quo vesica est felle viridi distenta. Nullæ pulpis earum *spinulae* intercurfant, ut aliis fluviatilium plerisque. In lacubus & stagnis ubique ferè reperitur, obscuras verò ulva cænoque lacunas obsidet. In mari nunquam visitur, in ostiis Rhodani & stagnis marinis aliquādo, sed tabidos capi Rondeletius auctor est, sed & in fluminibus nonnullis haberi Aufonius in Mosella sua prodidit, in Tiberi vix quotannis denos, Salvianus. Nec difficulter dignoscuntur. Arctiori enim sunt corpore, toti argentei, flavisq; illis lineis carent. Tam est vorax, ut non tantum in pisciculos alios, & ranas. Sed & in animalia quædā grassetur. Narrauit mihi, inquit Rondeletius, quidam vir fide dignissimus, vidisse semulæ, quam iter faciens in Rhodanum potatum duxerat, labrum inferius, à Lucio dentibus apprehensum, cujus

cuius demorsu cruciatam & territā inde fugisse, & crebra capitis quas-
fatione Lucium in terram deiecis-
se, quem ille palpitantem & in aquam
redire conantem cepit, domumque
tulit. Anseris pullos duos in eiusdem
reptos ventre se vidisse, quidā Po-
lonus testatur, idem & fulicam invē-
tam, & pedem ancillæ in piscina ab
eodem ad morsum prodit. Tā avide
piscēs persequitur, ut prae nimio ce-
leritatis impetu, supra aquas elatus,
in scaphas incidat quod me vidisse, cū
Anno M.DC.XXXI. in meo ex An-
glia reditu, Landsberga noctu scapha
vehere memini, A porcū seu mi-
nore perca abstinere quidam credūt,
alii apprehenso capite devorare, ne
si cauda arriperet, à squamis & spinis
laderetur, opinantur. Albertus cap-
tum dentibus conterere, mortuum
in ventrem propellere, vivum non
devorari, prodidit. Summam ranæ
cum Lucio antipathiam, eleganti Hi-
storia expressit Dubravius, quam vi-
de. *Vitam* ei longissimam ex Lucio
Friderici II. Imperatoris cognosci
potest, quem in stagno quodā vixisse
CCLXVII. annis ex annuli ærei,
quem cum stagno eum Imperator in-
deret, in branchiis sub cute abdide-
rat, inscriptione Græca colligitur,
quæ talis est. *Εγώ εἰμι ὁ ἰχθύς τῆς ὁλῆς λί-
μνης πάντων αἰώνων ἐπιτεθείς διὰ τῆ κοσμητῆ
Φιδερίκου β. τὰς χεῖρας ἐν τῇς ἡμέραις τῆς ὀκτω-
βρίου*, id est, *Ego sum ille piscis huius stagno
omnium primus impositus per mundi re-
ctoris Friderici II. manus, die quinto Oc-
tob.* Fuit enim inventus iste annulus
in capto eo Lucio anno salutis M.
CCCC.XCVII. ut testatur Conra-
dus Celtis referente Gesnero in sua
Epistola nuncupatoria. De eiusdem
vivacitate ita Cardanus. Mirum est
illud, quod à tot audi viris, ut impu-
denter fuerit tot testibus mendaciū
non credere, quam veritatem adver-
sus eorū auctoritatem tueri: Lucium
scisso vētre ostēdēdi lactis causa; in-
de confuto atque inter Tincas in vi-
variis reposito, sanare humore earū,
dū se illis Lucius vētre affricat. Mar-
tio Aprilique mensibus ovīs turgent
& pariunt, perguntque ad Iunium ul-
que. Alij è Tincarum semine genera-

ri credunt. Quidam & sponte & ex a-
lieno semine provenire, quod neque
soli neque sati procreantur in eis, o-
pinantur. Ex ovo editos, à quibūdā
piscibus intra Branchias foveri, En-
celli nugæ sunt. Quantum ad *Usū in
cibus* Iovius inter obsonia plebeja re-
censet. Poggius etiam ex Cymino la-
cu, & quidem præpingui, nullam un-
quam inesse gratiam scripsit, nisi cum
solum in maxima conviviarum inedia
prandiis apponitur. Thrasymenus la-
cus laudatior profert. Braccianus,
qui olim Sabatin⁹, inferiores. In Gal-
lia tamen, Germania & alibi tanta
putatur salubritatis, ut Adamus Lo-
nigerus èt puerperis concedat. Pin-
guiores tamē sunt Iulio mense & Oc-
tobri laudatior, quibus Cyprini
soboles: in piscinis esse deteriores cū
semina spargunt. Ab Arnaldo inter
duræ carnis pisces recensetur, sunt
qui caudam & partem posteriorem
præferunt. Mediæ ætatis meo iudi-
cio optimi sunt. Ova piscatoros circa
Argentinam tanquam medicata ab-
iiciunt. Gesnero sunt æque ut Barbi-
noxia. Apud nos absque periculo in
usu. *Usū in Medicina* quod spectat,
Mandibula in pulverem redacta in
Calculo, urinæ difficultate, & pleu-
ritide usurpatur. Saliti ossa pulveri-
zata spodij vicem præstant, & ulcera
exsiccant.

CAPUT VI.

De Cyprino.

CYprinus Oppiano *κυπρινός* dici-
tur. Nomen forte à Cypride, ut
Gesnero placet, quod fœcundissimus
sit, sortitus est, ut *λεπιδώτης* apud Athe-
næum, vel à squamis seu latissimis &
maximis, ut Rondeletio visum, seu
ita firmiter vallatis, ut lapidis ictus
facile repellatur ut Bellonius credi-
dit. *Carpam* Cassiodorus vocat, Bra-
savalus ob magnitudinem *Reginam*,
Carpionem alij. Crassior est magis quā
Tincæ similis. Superius enim labrum
rotundum est ac croceum, ex quo u-
trimque (Tincæ instar) gemina
barba

TAB.

XXVII.

II. 12.

TAB.

XXIX. 2.

3. 4. 6.

Aldrov. l. 5.

c. 40.

Cassio. l. 12.

Epist. 4.

barba pender, lōgior una, mollis flavescens, in acutum deficiens; *Musanas* (inquit Rondeletius) possis appellare: brevior altera, & ideo minus evidens, nigricans. Capite est brevi pro corporis ratione, Tincis hac etiam parte similis. Ore medio, labris adiposis, carnosisque; *lingua* caret: sed eius loco palatum carnosum dedit natura saporum percipiendorum causa: quod evulsum, linguæ formā adeo referte Salvianus & Rondeletius aiunt, ut non solum vulgus, sed etiam viri docti (Albertus linguam sapidissimam esu dixit, improprie itaque) linguam vocent, & linguam veram esse perfectè defendant. Imperfectam tamen piscibus esse linguam, & carnosum Cypriano palatum, non modo vetustati & Arist. visum, sed & experientia, quæ substantiam illam palato affixam inferiori parti nullo modo hærentem, nec ullo pacto solutam aut liberam testatur. Gesnerus tamen testatur sese linguam (ut vocant) separatam à palato, in parva etiam Carpa duos digitos latam vidisse, linguæ in quadrupedibus proprie dictæ figura: substantia quoque & gustu saporeve simili. Usus quoque eius & facultatem gustandi, similem esse, inquit, dixerim. Quare linguam appellare, nihil prohibere putat, quoniam ut lingua sit, vel dicatur, neque locus aut situs facit, cū aliæ etiam partes situ diverso nomen idem retineant. *Dentibus* carere hoc genus piscis Rondeletius asserit, horumque vice os palati medio infixū planum habere, læve, triangulare: ex adverso, in parte inferiore ossa duo incisa, in gulam recurva. Bellonius vero Cyprinum dentes quidem in ore non habere ait, sed tantum in ingressu faucium: & Gesnerus intra fauces eius dentes latere asserit, sed neque vel oculis diducto ore, neque tactui immisso digito apparere. Esse autem in maxillæ recurvæ medio dentes qui nos fere accumulatos, charadum instar, situ & magnitudine inæquales tres maiusculos, duos exiguos præduros, cavos, superficie summa lata sive plena, obtusa, sed li-

neis quibusdam exasperata, unum tantum & candidiorem cæteris & superficie lævi in mucronem brevissimum fastigiata. Idem Gesnerus lapillum in capite habere tradit iuxta linguam, candidum, durum, ad minimi numismatis magnitudinem, interdum paulo maiorem. Habere & in medio capitis substantiam quandam maiusculam, crassum, cordis fere figura, duram sed tenacem & flexilem, dum recens est, sub dentibus mordentis, tanquam in acetabulo quodam repositam, similiter ut Leuciscus fluviatilis, quem Gardonum vocant Galli. De hac forte sensit, (inquit) Encelius, & improprie lapidis nomine appellavit, his verbis: In Carpæ faucibus reperitur gemma seu *lapis*, forma triangulari, magnitudine proportionem piscis, coloris candidi extra, intus flavi, *Oculis* est mediis, ante quos sunt foramina. *Pinnis* natatis. Duæ fixæ sunt ad branchias magnæ, in medio Ventre duæ: inter quas & caudam alia est unica: quæ ferrato aculeo & valido innititur: inter hanc & præcedentes est excrementi meatus. Ex medio dorso unica erigitur, ad caudam ferè continua, robusto etiam incisoque aculeo fulta. Cauda lata est ex nigro rube-scens, ut & postrema pinna. Ipse vero colore est flavescente, maxime cum senuit. Iunior enim colore magis est ad fuscum inclinante. *Branchias* utrinque quaternas, duplici ordine, novissima excepta habere Cyprium testatur Aristoteles: Gesnerus vero quaternas in ea se reperisse tradit, sed omnes duplices. *Squamis* magnis, validisque tegi, ideoque Lepidorum Dorioni vocari. Eas etsi ἀργυρεῖς, id est, argenteas vocaverit Orpheus, docti haud necesse propterea esse putant, alias esse statuendum, cum de coloribus Poetæ sæpe loquatur improprie, & epithetis aliquando abutantur; creditque Gesnerus commune hoc squamarum epitheton esse, quod ut facile credo, ita hic ἀργυρεῖς si quis splendentes vertat, esse peccatum non puto. Ipsæ autem ad aureum inclinant. Sunt qui hunc piscem

Aristot. H.
A. l. 4, c. 8.

Bellon. A-
quil. l. x.

piscem pro sua magnitudine, plus sanguinis habere dicunt, quam ceteri pisces, ideoque minus frigidi temperamenti esse probabile videri. *Ventriculum* mediocrem habet; *Hepar* subrubrum, cui sub nigra *fellis vesica* haeret, & *intestina* admodum pingua, *splenem* magnum. Crebro quinque & sex librarum pondere reperitur, aliquando etiam viginti: Iovio vero teste in Lario lacu ducentarum quoque; Maximum enim aiunt, qui in eo nascuntur piscium. De loco non convenit inter autores. Plinius marinum facit, Oppianus littoralem, Aristoteles inter fluviatiles reposuit, Ælianus in Danubio quoque capi scripsit. Dorian inter fluviatiles & Lacustres collocat. In Lario lacu admirandæ magnitudinis capi, Iovius author est. Larius, inquit, lacus, ob longitudinē à Virgilio maximus nuncupatus, pisces longe omnium maximos gignit. Troctas (Trutas) centum aliquando librarum pondere, & Bulbaros ducetarum; Sed Bulbari illi ingentes videri potius liquidis ac perspicuis in undis quam capi retibus possunt, cū ea impotenti impetu plerumque dilacerent. Subeunt solstitij diebus, umbriferos specus in rupibus Licinianis, quæ sunt in adversa Larij ripa contra Insulam, Euripumque; illum gemmeū à Cæcilio Plinio celebratum. Eos industrius quidam sacerdos sagittis arcubalistis emissis, cum in profundo quiescentes fuscinis atque tridentibus attingi nō possent, vulnerare conabatur, neque tamen sagittæ longo alligato funiculo, nisi averſi officiebant, cum illa squamarum serie thoracati earū ictus facile repelleret. In lacubus Allobrogum maximi quoque proveniunt. Alicubi in piscinis & vivariis includuntur, alicubi in paludes & stagna coniiciuntur, in quibus plurimum proficiunt. Ut vero scribit Albertus: Hic piscis in aliquibus aquis generat, & in aliquibus grassatur & crescit, sed optime valet in fundo argilloso, tritico primo seminato, & postea argilla de super sperſa, & postea aqua superfusa. De partu & quæ circa ipsum eveniunt, isthæc fere Aristoteles prodidit. Cyprini &c. vide

Scaliger. Sponte etiam nasci & Rordeletius & experientia comprobant. Vidi inquit ille, in aquis, in cava loca & montibus septa receptis, & collectis sponte generatos Cyprinos, in quæ loca nec rivus, nec stagnum, nec palus, nec lacus, nec fluvius ullus, nulla denique aqua præter cœlestē influxisset. Fœminam lac ore suscipere, inde futura ova concipere falsum est. Herbis, luto, muro, & aliis vescitur. Athenæus carnivorū dixit. Astu plurimū valere, & ut reti capiendus evadat, varia machinari Albertus atque autor de natura rerum tradunt: primum n. circumeuntem, foramē quærere: hoc nō reperto transilire conati, vibrato in aerem corpore: aliquando sub reti, suffodiēdo sc. in fundo, effugium quærere: alias herbam aliquam ore tenere, atque ita retinere sese, ne trahatur à reti: alias caput fundo ingerere, haud ignarum, rete, dum nisi caudam tangit, elidi. Refert Gesnerus se cognovisse ex homine fide digno, in Palatini regione Germaniæ, in loco cui nomen à Michaele & campo vel agro, in fossa circa arcem Carpam esse, quæ centesimū vitæ annum attigerit, unde longævū piscem esse coniicere possumus. Carne sunt in universum molliore, nec tamen ita insalubres, quod humiditas non sit viscosa, præsertim eorum, quæ in rapidis & puris aquis nascuntur. Martio in primis cōmendantur. Majo & Iunio, quod geniturā vel emitat vel recens emisit, non item. Mas fœminæ præstat, maiusculus minori. Caput à ganeonibus expetitur, propter linguā forte, quæ si assletur, prædulcis est, & bene cum succo citri apparatus. Ex ovis Caviarium rubrum apparatus, quod Iudæis dicatum est. Medicinam si spectes, lingua vim augēdæ Veneris habet, Lapillus de capite, crudo pisce extractus, febricitantiū æstum sedat, & sanguinis è naribus fluxum cohibet.

CAPUT VII.

De Cyprinis Monstrosis.

Miram hanc piscis speciem Lugdunum in foro piscatorio vivam aliquando venditam, nullus fuit

TAB.

XXVII. 10

Aldrov. de

Piscib. l. 5.

c. 41.

quit Rondeletius) qui non demptis capite & Rostro Cyprinum esse iudicavit. Nam squamarum figura & Colore, pinnis earundem situ, cauda idē plane est cum Cyprino. Pinna dorsi initio aculeum incisum habet, ut in Cyprino. Eundem aculeum habet alia pinna quæ excrementorum meatum sequitur, quæ rubescit, item caudæ pars ei respondens. Tota cauda lata est, ut in Cyprino. Duas alias pinnas habet ad branchias, similiter duas in ventre. Caput habet non protensum ut Cyprinus, sed Delphini capiti simile, rostrum satis longum, sed obtusum, quale revera pictura repræsentat. Ex superiore rostri parte iuxta oris scissuram appendix carnosam utrimq; una dependet, ut in Cyprino, hac superior est alia brevis & vix apparēs, nisi propius inspicias utrimque ēt unica. Hæc Rondelet. *Similem huic monstroso Cyprino*, sed barbulis insignem, quas in suo Rondeletius non expressit, Gilbertum Cognatum Nozerenē ad se misisse testatur Gesnerus, in Nozerethano stagno repertū, anno salutis 1554. In Cognati vivario novem tantum diebus vixisse. Verum longe pulcherrimum fuisse nec specie colorib. ratum & admirandum Cyprinum illum, qui anno Domini 1546. Omburgi in Ditione Comitum Palatini, Marchionis Ioachimi Brandeburgensis captus & Augustā missus est ad Carolum V. Cæsarem in comitiis illic agentem, qui eum Sorori Mariæ donavit, coctum etiam colores retinuisse. Picturā eius sibi communicasse Io. Thannmyllerum iuniorem chirurgum Augustanum peritissimum, in qua longitudo, inquit, apparet trium dodrantum: latitudo digitorum novem, quæ est in medio dorso ad ventrem medium. Pinnæ dorsi initium partim aureo, partim rubro colore est, deinceps v. pulcherrimè cærulea: reliquis pinnis omnibus color aureolus, ut capiti ēt magna ex parte ac ventri, sed passim etiam rubedo intervenit, quæ barbulas quoq; quarernas tingit. Dorsum ex viridi cæruleum, latera superius viridia, inferius aurea, &c. In summa suavissimis floridissimisque coloribus vnde-

qua; adeo eleganter pictus atq; distinctans est, ut vel cum rubri maris elegantissimis quibusdam, maximiq; variis piscibus certare posset. Narrat item captum esse aliquando apud suos Cyprinum hermaphroditum, in quo utriusque sexus notæ (hoc est & genitura & ovorum vasa) comparuerunt. In piscinis vero contrarium quandoq; reperiri, nempe neutrius sexus Cyprinos, nec mares nec fœminas, & hos forte esse, quos sponte nasci Rondeletius author est. Idem Gesnerus hac quoq; forma Cyprinū alium captum esse testatur in Acronio sive Constantiense lacu, prope Retz, duos fere dodrantes longum in præsentia illustri & Generosi viri Comitum Wolff de Schamburg, anno salutis 1545. idibus Novemb. Picturā ad se misisse Archillum Pyraminium Gassarum medicum eo tempore præstantissimum. Pronam partem nigro colore pictam fuisse, latera fusco, supinam luteo. Spectabilem in eo præcipue faciem, æmulam humanæ latitudine sua, nec non oculis, ore, naso buccis ac mento. Hæc scripserat, cū eundem piscem Raphael Seilerus juvenis Augustanus clarissimi medici Geryonis filius, cum omnimoda eruditione, tum iuris scientia & comitis Palatini dignitate nobilis, pictum ad eum dedit, cum descriptione huiusmodi. Piscem hunc omnino qualē depictum mitto, fuisse captum in flumine Austriæ (quod vocant die Eris) in ditione comitis Iulij de Hardegg prope urbem Retz anno 1545. mense Octobri, viri quidam eruditi & graves, mihi veluti testes oculati confirmaverunt. Faciem non averfam, pro ut reliqui, vel obtusam sed repressam, ob aliquo in planum aspectu tendente, cum temporibus utrimque latis, oculis binis, naribus, ore, mandibula, omnia effigie humana habuit. Pinnis, squammis, cauda, totoque corpore posteriore, ipsaq; adeo magnitudine atque colore Carpam præ se tulit. Rete captus est solus, & obrarietatem ac maxime quod sensibus etiam ignotus esset, diu conservatus, & veluti miraculum quoddam passim asportatus.

CAPUT VIII.

De Cyprino Lato Ronde-
letii.

TAB. XXIX. **C**Yprinus latus Germanis *Bresem*, Italis *Scarda* seu *Scardula* dicitur. Bellonius *Abramidem* veterum nullo fundamento adiecto arbitratus est. Cyprino adiungitur, quia est squamis, corporis specie & vita similis. Piscis est maximus & latissimus, capite parvo p corporis magnitudine, dorso repando & cultellato, corpore compresso, squamis magnis tecto. Linea à branchiis ad caudā ducta curva est. Ad branchias pinnae duae sunt, in medio ventre duae aliae, ab excrementi meatu alia ad caudam continua. Huiusmodi pisces in lacubus maximis nascuntur. Vidit Rödeletius in Arverniae lacu quodā istiusmodi pisces, qui binum cubitorum, pedum totidē latitudinem aequarent. Nostro in foro copiosissimè prostant: minores *Scardas*, maiores propter dorsum insigniter repandū *Gobbos* quasi gibbosos nuncupant, suntq; pedales plerumq; bipedales rarissimi. Scribit Gesnerus *vadum* amare argillosum, vel albicāti argillae simile: ideoq; in lacu Tigurino nō passim, sed superiore eius parte capi. Stagnantibus a. aquis praecipuè delectantur, illicquemuco, luto, herbisq; *vescuntur*. Quare in iis tantū capiuntur fluviis, qui tardius fluūt, turbidaq; sunt, & crassiore aqua, qualis est Araris: multi itē in Gallia Belgica: nec in his ad eandem unquā magnitudinem accrescunt, ad quā in lacubus & stagnis. Mirum q; narrat idem Gesnerus, nimirum quēdā in Polonia permultos horum piscium coniecisse in piscinam quae mox superveniente hyeme tota congelata esset: & cum parendi convivii causa, remoto gelu pisces capere vellent, ne unum quidē invenire potuissent: sequētia. vere rursus omnes apparuisse. Ad hocce latus Cyprinos referri debet piscis huiusmodi ē Polonia missus, ubi Kłofcz dicitur, totus ex subcæruleo ad violaceum vergens, exceptis pinnis &

cauda quae albicant. Pinna quae ab ano est longiorem & in exortu latiorē quam pars est, à pictore puto, expressa est. Habentur à quibusdam in pretio in Arvernia imprimis, ubi in lacu quodam magni & pingues capiuntur. Nonnulli partem in eis mediam expetunt; alii plus molestiae ob minutissimas spinas inter edendum quam voluptatis afferre arbitrantur.

CAPUT IX.

De Cyprino lato alio, &
Ballero.

Gesnerus ex relatione Kentmani, TAB. XXIX. **G**tria huiusmodi piscis genera in Albi bi reperiri tradit. *Primi generis* pisces esse parvos, tenues, latus, colore sub aureo, cui circa dorsum fuscus admiscetur. Dupla eis ad latitudinem longitudo, caput parvum. Pinna dorsi & cauda fusci coloris sunt: reliquae verò quinq; pinnae, ē fusco puniceae. *Squamae* ut in Cyprino. Genus hoc Miseni parvum cognominant, *kleinkarass*, vel à colore *Giblichen*. Vivaces sunt admodum. E piscinis & stagnantibus aquis in Albim veniunt. Raro octo digitos longitudine excedunt. Vescuntur gramine & argilla, ut & reliqui huius generis pisces: quamobrem magis amant piscinas, quā fluentes & lapidasas aquas, propter vadum herbosum & argillosum. Itaque rarius in Albi reperiuntur. In piscinis quidem multiplicari eos non patiuntur domini, impediunt enim incrementa & saginationes Cyprinorum, quos à pabulo depellunt. *Alterius verò generis karas*, aliquanto crassiores & longiores sunt. *Squamas* similiter ut praedicti velut Cyprini, ē gilvo seu flavo nigricantes habent: vocantur autē *Halbkarass*, id est dimidii *Carasi*, quoniā ē *Caraso* & *carpa* veluti compositi videntur. Hi quoq; ut primi generis *Carasi*, & piscinis aut stagnantibus aquis Albim ingressi, pariunt in eo & crescunt. Vtrisque caro est subflava, & in cibo viscosa, quomodocunq; parata.

Quo diutius verò in Albi immorantur, eo lapidioris solidiorisque carnis evadunt. *Tertii demum generis* Carasii tenuiores & latiores sunt, quã dimidii nunc dicti, similes primis sed maiores & pulchri, cãdoris argentei, habentq; pinna parte supina rubentes, superior vero pinna cū cauda obscurius è fusco punicea est. Hi pisces in Albi nascuntur, non aliunde (ut prædicti) ingrediuntur. *Parium* primū lunio mense, secundò Ianuario, sicut & superiores, quibus temporibus etiam præcipuè capiuntur. Mediocriter augentur, ut sesquilibres aliquando aut bilibres capiantur. Aslari solent & in pretio habentur. Fœminę ovis gravidæ, elixæ etiam in aqua ad juris ferè consumptionem, vel copiose butyro ad jus sub finem adiecto, non displicuerint. Est in Frisia orientali piscis, quem *karutz* appellant, Carpa multis partibus minor, tergo magis arcuato & gibboso. Sexies in anno parere unanimitè affirmant, qui ipsum in variis servant.

TAB. XXVII. DE BALLERO ita Aldrovandus. Aristoteles Ballerum inter fluviatiles & lacustres bis meminit. Ballerus, inquit, & Cyprinus & cæteri fere omnes, cum parturiunt, undis se intrudunt. Et alibi: Ballero & Tilloni lumbricus canis ex ortu innascitur, qui debilitat, cogitque ad summa stagni efferri, quæ æstu intereunt. Hunc Rondeletius eum esse conjicit, qui à Lugdunensibus, & lacuum qui in Allobrogibus sunt, accolis Bordeliere nominatur, quod littora semper sectetur & quærat. Bordenim littus significat. Cæterum cur Ballerum faciat, nullum adducit argumentum, nisi quod vita & moribus à Cyprino, quo cum nominatur ab Aristotele, non differat. Vilis est piscis. Strymonis amnis accolæ vulgo *Plestyam* teste Bellonio vocant, in Macedonia ad Pischiacum lacum, ubi plurimus est, modo *Platanes*, modo *Plestyam*, modo *Platogniam*, Hollandi, apud quos cum ob copiam, tum quod per se insipidus sit, vilissimus habetur, *een Bleye*. Bramæ, inquit Rondeletius, tam similis est, ut parum cautis pro Bramis sæpè

vendatur, sed ab iis magnitudine corporis & squamarum differt & pinnae & caudæ colore. Est igitur Ballerus capite brevi, ore parvo, sine *dentibus*, sed horum loco ossa habet aspera: sine lingua, sed *palato* carnofo: Pinnae duas habet ad Branchias, duas alias in medio ventre, ab excrementi meatu unicam ad caudam usque in dorso aliam. Posteriores pinnae cum cauda rubro colore perfusæ sunt, ut in Percis fluviatilibus videre est; quæ in dorso est, nigricat. Linea à branchiis ad caudam curva producta est. Branchias quaternas habet, os in medio palato, ex adverso sita sunt ossa duo loco inferiore, altera parte serrata, quibus contrario occursu cum palati ossæ herbæ atteruntur. Ventriculum parvum habet, intestina pinguedine oblita, hepar ex albo rubescens, in quo fel viride splenem rubrum. Multis spinis abundat, frequentes *squamas* habet, rotundas & tenues. Tergus eius nigricat, venter candidat. Oculorum pupillam Bellon. non ut in aliis nigram, sed veluti crystallinam esse asserit, iridem vero albiissimam, ac tredecim squamarum ordines utrinque in lateribus habere.

CAPUT X.

De Tinca.

Tincam vulgatissimum ubiq; terrarum piscē, à solo inter veteres Aufonio memoratum, ab aliis quod nullo in pretio fuerit, neglectum, Iovius existimat. Bellonius Aristotelis *ψύλλων*, quæ Gaza *Fullonem* vocat Dionis apud Athenæum *γναφεῖα*, id est Fullonem dici, credit: metuo ne perperā. Non tantum n. Tincæ decocto, sed & aliorum glutinosorum pisciū, Ichtyocollæ, Anguillæ, &c. maculæ eluuntur. Fullo quoq; Aristoteli marinus piscis est, Tincā inter fluviatiles & Lacustres reponimus. *Manā* non esse, q̃ Platinæ placet, vel ob ultimā hanc rationem, quia marinus est, certū est. Quid si verò, inquit Aldrovandus, Romanam vocem esse dicamus, à qua

Bell. de Aq. l. 2.

TAB. XXIX.

Aldrov. de Piscib. l. 5. c. 45.

à qua sententia idem Iovius non videtur declinasse. Celebratur enim apud Ciceronē, quidam facetus orator Placentinus cognomine Tincā; fortassis, inquit, ab hoc pisce cognominatus, quemadmodum Florentiæ Laurentius Medices senior, uti erat perurbanus, cuidam celebris familiæ civi, se domi Tincā ingentem exquisita arte coctam falso jactanti, Tincæ cognomen, quod illi postea fuit æternum, indidit. Quemadmodum Merula ob similitudinē cum Tincā, item Callarias noster, Tincā marina vocari meruerunt, quid vetabit, si Tincam etiam Merulam palustrem dixerimus? Hoc sanē nomine usus est doctissimus Scaliger his verbis: Aufonius sui temporis secutus plebem, usitatis nominibus, pulcherrimū poemā non est veritus inficere potius, quam aut ipse in ambiguo versari, aut jactare Authorem in obscuro: sic Alosam pro Clupea sive Thrissa, Tincam pro Merula fluviatili posuit. Habet quibus cum Cyprino similis est, habet item quibus cum plurimum ab eo discrepat. Corporis enim specie, pinnis earumq; situ, & palato carnosissimo cum eo convenit: squamis verò nō item. Hæ Cyprino maiusculæ, Tincæ vero perquam exiguæ tenuesque & mucō semper obductæ: adhuc Tincā juxta oculos circulum habet rubrum qui in Cyprino flavescit. Color omnibus haud idem, aliquæ enim subalbidæ sunt; plurimæ ex albo flavescentes, nonnullæ virides, quæ verò in maris degunt paludibus, ut in multis Hollandiæ locis, subnigræ sunt. Aufonius viridem dixit, cū plerumq; flavescat potius. *Rostrum* habet breve ac retusum: os fere rotundum, ad venterem inclinans, planè edentulum, at pro dentibus serrata ossa. Ex utroque oris latere, ubi inferius labrum superiori committitur, appendix pendet, ut in Cyprino, cutacea, rotunda, brevis, mollis, ac lubrica adeò, ut nunquam explicetur, conspicuave fiat, in digitis comprehensa extendatur. *Oculi* sunt magni & aurei. *Pinnæ* binæ sunt ad Branchias, rotidem aliæ in ventre, à podice una, in dorso alia

brevis sine aculeo. Cauda in latam pinnam definit. Branchias habet quaternas duplices, lapillos in capite Auratæ & reliquorum marinorum more, binos exiguos. Stagnantes potius quam currentes aquas amat, id eoque in stagnis, lacubus ac paludibus quàm in fluminibus frequentior, & inter arundines ulvasque plerumque victitat, omnique anni tempore hisce in locis capitur. E rivis a. flumina maiora quandoque intrat, sed degunt maxinè, ubi vadosa sunt, vadūque ipsum limosum. Grægalis est, putrescentis limi sordibus vescitur, carne nequaquam. De *amicitia* eius cum Lucio supra dictū est, quibus si lubet, adde, q̃ cum Lucius in ceteros tyrannidem exerceat, à Tincā quasi beneficii memor, prorsus abstinet. Cū occiditur, diu supervivere fertur. *Vsum* in cibis quod spectat, insuavē habent carnem, quia impurum & damnatum alimentum: ideo commune est apud Italos mulierculas diverbium. *Nessuno mangia Tenca, che febre non sente*, & Aufonius vulgi solatia dixit. Diebus tamen canicularibus in primis noxiæ putantur, quanquam Marsicana è Tucino lacu, qui nunc Celanus, quæ labio inferiore trito, quod saxoso eius loco volutentur, à vulgaribus distinguuntur, laudantur: nec non illæ, quas parvus lacus quarto decimo ab urbe lapide, apud Bacanam sylvam, profert. Hac teste Iovio, nobilis quidam propinalis lautitiæ studiosissimus, autumnō captas, allio laridoque contritis, additisque odoratis oleribus & multo aromate, in teganis ad vaporem tepidioris furni felicissime percoxit. Laudatur deniq; Thrasymena Tincā, de qua idem Iovius: Cum in cœna Leonis X. Pontif. discumbentes, pelagios pisces vario iudicio certatim atq; impensius laudarent, nobilis quidā Florentinus Tincis fortasse solum asserus, extollatis, inquit, convivæ, ut lubet marinos pisces: ego certè Trasymenam Tincam conditam leucophago, his vestris Triglis, Spigolis & Rhombis prætulerō: quo suo insulto dicto lachrymas omnibus præ risu excussit.

Veteres medici (inquit Medicus quidam apud Gesnerum) ad sopiendos capitis & artuum dolores, torpedines admovebant, quarum loco à mediterraneis Tincæ forsan usurpari potuerunt. Sunt qui non febrientium modo æstus Tincis pedibus subditis, seu alligatis vivis temperari, sed idē remedium adversus arquatū etiam morbum proficere putent. Iovius quoque scissas per dorsi longitudinē, pedum & manuum plantis applicatas, ardentis febris ardoribus plurimum adversari, quosdam tradit putare ex secta Iudæorum, qui quam sordidæ admodum, inquit, & ridentibus aliis talia experirentur, aliquando tamen ipsis æstuantibus exoptata blandimenta feliciter attulisse comperti sunt. Monet vero Rondeletius, ut id opportunè fiat, quod alioqui non modo nihil profuerit, sed contra maximè obfuerit. Frigiditate siquidem intro repellente ac magis constringente augeri incendium. Alii ictericorum jecori aut umbilico vivam imponunt. Icterici aliqui Tincam viventem alligant umbilico, donec immoriatur, post die rursus aliā alligant, idque etiam certò die repetunt. Tinka immortua intus ac foris veluti croco tincta redditur, & plerique hoc remedio restituuntur. De felle hoc ex libro Germanico manuscripto habet Gesnerus: Fel de Anguilla, Thymallo, Tinka & porcello lactante, misce ad aurium remedia. Hoc enim infuso, pelliculas rumpes, fluxiones curabis, vermes aurium occides.

CAPVT XI.

De Lota Gallorum.

TAB. XXIX. **L**ugdunenses, inquit Rondeletius piscem qui in Arari invenitur, Lotam vocant, qui à Gebennensibus Mustella quasi Mustella nominatur. Si quis Mustellam lacustrem vel fluviatilem appellaverit, non ineptè meam quidem sententia fecerit, modo non eam accipiat, quæ ex mari fluviopetit, qualis est Mustella Aufonii, qui

TAB. XXIX. Aldrovand. de Piscibus l. 5. c. 46.

Mustellæ nomine Lampretam nostram describere videtur. Lota Piscis est fluviatilis & lacustris. Mustellæ marinæ vulgari, de qua alibi diximus, similis admodum, nisi esset corpore rotundiore & spissiore. Ex maxillæ inferioris extremo pilus unicus veluti ex mento barba propendet, nullus in superiore eminet, ut in marina. (Gesnerus tamen in suis putat etiam supra duos pilos esse, sed in mortuis ferè latere, ut in maxima observavit.) Pinnis quatuor natat, duæ sunt ad Branchias sitæ, duæ in ventre, ab ano unicam continuam habet ad caudam, huic æqualem & similem in dorso, quam præcedit alia pinnula. Cauda mucroni gladii figura similis est. Parvulis squamis corpus tegitur, quod è ruffo fuscum est, & maculis nigris undulatim dispositis conspersum. Dentes parvulos & tenues habet. Muco oblita & lubrica Lota est, ut Anguilla. Ventriculus parvum habet cum multis appendicibus, intestina convoluta; hepar albicans, in quo fellis vesica, quæ ex viridi flavescit, splenem rubrum, vesicam oblongam aere plenam, branchias quaternas & duplices. Nasitur in lacubus & fluviis leniter fluentibus, ut in Arari. Hepar pro corporis ratione magnum est, & delicatum habetur. Ova noxia, quemadmodum ova Barbi, quæ ventriculus lædunt & alvum turbant. Caro tota à Lugdunensibus habetur in pretio.



TITULUS IV.

De Piscibus lacustribus.

CAPVT I.

De Umbla vulgari, & Rondeletii.

Inter Lacustres pisces censentur, Umbla, Trutta, Lacustris, Carpio, Lavarelus Allobrogum, Bezola, Albulæ, Albus Salviani, Farra, Pigus, Sarrachus, TAB. XXX. 1. 2.

rachus, & Schilus. Umbla, quasi umbra, quod haud exiguum cum umbra fluuiatili similitudinem habeat, dicitur. Rondeletius *Salmonem lacus Lemani*, quod corporis specie, pinnarum numero, situque & partibus internis. Salmonem referat, vocat. Helvetii à Colore circa ventrem rubicundo, *Rotele* nomen indidere. Duo eius esse genera magnitudine maxime differētia in Lucernensi lacu Gesnerus tradit. Maiorem circa Bielam Rott, alibi Roote appellari: à Sabaudis *Routte*; circa Lemani vero Umble minorem diminutivo nomine Rotele privatim dici. (Est & alius in Suevia & circa Augustam Rotele dictus, sed fluuiatilis, non lacustris piscis, Truttis quoque affinis, Germanis cæteris ferè Huch nuncupatus, quo de suo loco diximus) Sabaudia circa Bielam *Ronsen* vel *Bondelle*, illo nomine colorem indicari, hoc forte bonitatem. Denique piscem qui in lacu Bavarie Ammersee vocatur, Germanice *ein Pissling*, non aliū quā Umblam minorem videri: conferri enim Salmoni parvo; & à dorso usque ad media latera coloris lutei esse dici, adeoque tenerū, ut statim extra aquā exspiret, nec in alio ullo eius regionis lacu inueniri. *Umbla maior* corporis forma partibusque; omnibus Salmonibus & Truttis similis est. Os habet magnum, *dentes* vero nō solū in maxillis, sed etiā sex magnos in lingua. Caput livescit, branchiarum opercula argentei sunt coloris in extremo aurei. Magis albicat quā minor. Nullis suggillatur lituris, unicā esse parvam tergoris pinnā Bellon. scribit: Rōdel, tamen nō lōge à caudæ exortu aliā sed admodū exiguā depingere videtur, & ipse Bellon. eandē in icone exprimit, & mox puto apophysim carnosam vocat. Idē Bellonius juxta vētrem, pinnā (in impressis codicibus branchia legitur sine sensu) utrinque unā esse ait, sed quā nec ipse, nec Rōdeletius quoque pingit: duas sub vētre huic oppositas, omnes sine aculeis: postremas piscē in duas æquales partes interfecare, sed partē quæ ad caput est, paulo lōgiore esse. *Cutim* adeo glabrā esse, ut squamis carere videatur. Tergus præ multo livore opacum

apparere: ventrē præ albedine uti argentū micare: apophysim carnosam habere supra caudā. Umbræ, Truttarū, &c. more. Quaternis præditā esse *dentiū* ordinibus in palato serpentiū more, *linguā* ostendere ad uncis in gyrum dentibus, crenatis, exertis & hamatis senis, vel eo pluribus cōmunitā, præter hoc maxillā etiā inferiorem parvulis aliis exertis & parū falcatis in ambitū vallari, brachias habere utrimque; quatuor: latera eius virgula recta secari utrimque; p mediū corpus, parū repandū versus ventrē. Tres aut quatuor dodrantes plerumque longa est. In Lucernensi lacu brachii fere longitudine excreescere Gesnerus testatur, & Rōdeletius duos aliquando cubitos longas à Lemano lacu Lugdunum advehi. *Minor Umbla* (ut idem Gesnerus refert) dodrantalis plerūque; aut brevior, pedē raro excedit, aut si amplius, increfcit. Vidi n. inquit, aliquando palmos quinque longā. Octobrimense in Lacu nostro captā corpore latiusculo, nunquā tamen Umblæ majoris magnitudinem attingit. *Ventre* turgidulo aliquādo spectatur, ppter *vesicā* nimii inflatā. Est a. velica ei oblonga, ut Albulis, non distincta per mediū. *Dorsum* totū cum dimidia laterū parte subrofeum: Inferiora latera albicat. *Venter* albiſſim⁹ est: caudæ color idē, q. dorſi pinnulam mollē & parvam, ut Truttæ, dorſo extremo gerit. *Maxillis* est dentatis. Spinæ etiā ceu dentes in lingua habet. Pinnæ omnes partim subalbēt, partim crocei coloris sunt. Branchiæ quaternæ. *Lappillos* in cerebro habet. *Mares* ventre, pinnis & caudā magis rubēt, fœminæ candicant: eadem capite superius & dorſo magis virent. Nō tantum in Lemani lacu, sed & in aliis capitur. *Vescitur* pisciculis, quifquiliis & aliis. Si vel parū *ſaucietur*, velut moribunda supernatat. Capta quā primum aquas reliquerit, exſpirare traditur. *Carne* est ſuavi, ſicca, & cū ſenuerit dura, & quæ multorū iudicio Afellis, imo ſaxatilibus ſuccedere queat. Pinguis potiſſimum apud Allobroges capitur tantique fit, (inquit Bellonius,) quanti ditiorū burſa æſtimare poteſt. Commendatur ab Helvetiis Novembri

Y menſe,

menſe, & aliàs circa initiũ Decẽbris: quo tẽpore Gefnerus *ova* habere ait bona & ſolida, tardius vero caro eius inſulſa, pinguiuſcula & flaccida apparet; & ova dilutiora ſunt. Tẽpore partus menſis inepta eſt. Cũ elixatur, vino prius fervido injicitur, ne nimis mollis reddatur. Apud Allobroges paſtitiis includi Bellonius refert.

Facit Rondeletius alterius mentionẽ, quã Lemani lacus accolæ *Umbles chevaliers* forte ob magnitudinem, præſtantiã & robur nominant. Neq; verò à ſuperiore ſolũ differt, vel ſexu, vel ætate, ut ex ſequenti deſcriptione perſpicuum fiet. Eſt igitur hic piſcis Salmonibus & Truttis, q̃ vulgo Salmonate dicuntur, ſimilis, *roſtro* recurvo, quo à ſuperiore differt, id n. longius habet & acutius. Maxillæ inferioris extremum incurvum in maxillã ſuperiorẽ, eius rei gratia excavatum recipitur ut in Salmonibus videre eſt. Maxillæ lineis multis diſtinctæ ſunt. *Dorsũ* ex cæreuleo nigricat. *Venter* aureo colore eſt. *Hepar* flavescit, in eo fel: *ſplen* nigricat. *Ventriculus* gulæ ſubjectus eſt, longus, ſpiſſus, cuius innumerabiles ſunt appendices, quemadmodum in ſuperiore. In inſignẽ magnitudinẽ excrescit. Carne eſt ſicca & dura: in aſſulas dividitur, q̃ Caryophyllis confixæ in craticula aſſantur, & oleo ſive butyro irrigantur Paratur etiam hic piſcis Truttæ modo. Caput maxime commendatur, ut Salmonis.

CAPUT. II.

De Trutta Lacuſtri.

TAB.
XXX.
3.
Aldrov. de
Piſcib. l. 5.
c. 59.

QUAM nos Truttã Lacuſtrem vocamus, eã Galli *Truttã Salmonatã*, Rondeletius *Salmonẽ lacuſtrem* vocat, cumq; Truttis vulgarib. grandior ſit, Salmonẽ minor, *Sarionem* ab Auſonio dici Bellonius & Rondeletius opinantur. An ſit *Anchorago* Caſſiodori, quod Gefnerus opinari videtur, ſuperius diximus. Ex Truttarum genere eſſe. Salmoniq; ſimilẽ cũ ex corporis forma, partiumq; externarum & internarum ſimilitudine, tum ex nomenclatura Gallica notũ eſt. *Differt à Salmonẽ* magnitudine & maculis. Minor n. & maculas in lateribus purpureas,

multo quã Salmo copioſiores habet Truttę, itẽ q̃ in fluviis rapidis & limpidis inveniuntur, nõ ſunt adeo maculoſæ, magnitudineq; ſucco, carnis colore & ſubſtantia multo inferiores. Umbra vero nullis ut dictũ eſt litturis ſuggillatur. *Gefnerus hunc piſcẽ diligenter intuitus, his verbis deſcribebat: Squamulis* tegitur minimis, bene dentatus eſt, & *lingua* ẽt utrimq; dentibus munitur. Caput colore nigro, cæreuleoq; mixto, dorſum partim glauco, partim ſubnigro, partim cæreuleo, partim ſubviridi. In lateribus puncta nigra. Pinnæ in medio dorſo multis nigris maculis variatur, reliquæ alben. Habet & ultimã illã dorſi mollẽ *pinnulam*, ut reliquæ Truttæ: Brachias quaternas. *Appendices* nõ toto circuitu inteſtini, ſed ab una tantũ parte magnas, oblongas, bipartitas, utrimq; circiter 18. habet, & alias ſex ſeparatim ex oppoſito, ventriculũ ſeu majus inteſtinum verſus. Hæc ille. Ad duum triumve cubitorum *magnitudinẽ* accreſcit, in Lario lacu ad 50. quinimo, Jovio authore, ad 100. etiam libras. Initio æſtatis caro eius rubere incipit, duratq; is color uſq; ad Auguſtum, vel ſaltem ad Divi Jacobi diẽ, quo tẽpore partu jam abſoluto, colorẽ rubicundum amittit. Gefnerus loco differre invicẽ iſtiusmodi lacuſtres teſtatur; alias n. in vado ipſius aquæ degere, præſertim argilloſo, haſq; magis pingueſcere, & palato ſapidiores eſſe, alias circa ſummas aquas, ubi muſcas appetunt, minus pingues & vilioris pretii: illas apud ſuos *Grundſorinẽ* has *Schwabſorinen* appellari. Duo itẽ genera capi in motanis lacubus quos Atheſis facit, quorum unum ab aureo colore *Goldſorinen* alterum à nigredine *Schwabſorinen* appelletur.

De loco & natura huius piſcis ita Aldrovandus. Lacuſtris piſcis eſt, ſed qui ex lacubus fluviis quandoq; ſubit certo tẽpore, inſtante nempe partu. E Lemano in Rhodanum *aſcendere* ajunt vere, inquit Gefnerus, ut & circa Sedunum capi: at in Tigurino & Acronio lacubus neq; eodem tempore migrare putat. Acronii lacus incola *paritura* ad Rheni influentis oſtiũ aſcendit, ubi cum pepererit, rurfus deſcendit.

dit. Conferri ajunt hunc piscem junipero, nam sicut hæc tertio demum anno fructum perficit, ita etiam eius foetus ad tertium usq; annum creescens, perficitur: *parere* plerumq; Julio & Augusto, alias citius tardiusve, prout cœlum magis minusve calidum fuerit. Jam vero magno licet sit corpore, suâ tamen naturâ agilis quoque est, aliarum Truttarum more. Tradit Jovius sese audivisse majores istas Truttas lacus ripis lascivo excursu extremos arenæ margines aliquândo justipassus longitudine p̄sulcasse. Laudantur vehementer *in cibis*, *Carnē* habet solidâ, rubicundam, & saporis optimi: aliquando tamen præ nimia pinguedine nauseâ movent, & mortuæ paucissimis horis, q̄ pinguis illa teneritudo quam s̄pissimè cōputrescant, gratiâ saporis amittunt. Lariarum multo succo corpora replent, & genitalē humorē copiosè suggerunt. Præferuntur, si Jovio credimus, Soranæ aliis, in Acronii lacus parte inferiore captæ, illis quæ in superiore parte capiuntur: item quæ circa fundum pascantur, iis quæ circa summam aquam. Ab Helvetiis Februario commendantur, ab aliis simpliciter æstate, dum pulpæ earum rubent. Spinæ dorsi & Caudæ assæ, vel principum mensis inferuntur.

CAPUT III.

De Carpione.

TAB. XXIX.

2.3. Aldrov. de Piscib. l. 5. c. 50.

Qui sit apud Veteres Carpio, ignoratur, Moderni quidam in solo Benaco lacu reperiri, & à carpendo auro dici ajunt. Alii ablatâ priori syllabâ, *Pione* vocatum fuisse, ac tandem *Carpione* q̄ cum quidam piscem edisset, careq; supputanti solvisset, carē se *Pione* edissere diceret, perhibent Fracastorius à carponauta, à Saturo Benacum trajecturo, q̄ aurum ipsi extorqui vellent, in carpionem mutaro derivat. Lacustri potissimum Truttæ cōgener statui potest. Nam & corporis figurâ, partium numero & carnis substantiâ ei similis est: punctisque similiter nigris notatur, ac denique pinnulam dorsi posteriorem mollem, ut illa habet. Evidentibus tamē ab eâ

interstinguitur notis. Prominentiori enim rostro, majoribus oculis, candidiore & turgidiore ventre, ac nigricantiore dorso est: *magnitudo* Truttæ lacustri duorum triumve plerumque cubitorum, cum Carpio pedem excedere nunquam visus sit. *Dentes* habet non in maxillis solum, sed etiam in palato & lingua, *squamis* tegitur tenuibus. Ventrem habet candidum atq; argentum, dorsum subnigrum. Quia ab Aldrovando exprimitur, lateribus est ferè rubicundis, intensius verò rubet lineâ corpus dividens. Ventre pinnisque candicat, *Tergus* ad cæruleum inclinat. Solius Benati lacus alumnum esse omnes ajunt: negatque Petrus Bembus alibi capi, huncque piscem capere atque cognoscere Friderico Imperatori volupitati fuisse. Atqui Salvianus revera reperiri nascique asserit in parvo & limpidulo lacu, haud procul ab Alvito Campaniæ oppido ex-oriente, (vulgo illago della posta appellato) ex quo Fibrenus fluvius exoritur: esse tamen Benacinis minores, & vix libram unam implere: Profundiora aqua loca amat. Pisciculis *vescitur* & quibusdam lacus recrementis. Bellonius Phrygani edacem esse tradit. Auro *vesci* paulo ante negavimus. Carne est duriuscula, siccaq; minime glutinosa, rubescente, Truttis & Salmonibus simili. Plus æquo servatos contabescunt & deteriores fieri ajunt, id q̄ & multis aliis piscibus accidit, maxime iis qui delicatiore & friabili sunt carne: quamobrem Benaci accolæ, in sartagine frixum, foliis involutum, aceto in quo aromata pri⁹ ebullierint, irrigatum, per p̄ximas urbes circumferre, quem condiendi modum vulgus ab hoc pisce acarpionare, alii amarinare nuncupant. Platina spinam in capite gerere scribit perniciosam, eamq; inter edendum cavendâ: cujus tamē apud alios nulla mentio est.

CAPUT IV.

De Lavareto Allobrogum,

& Bežola.

TAB. XXX.

4.

Aldrov. de Piscib. l. 5. c. 51.

Lavaretus à munditie & candore, quod nunquam sordidus sit, no-

men fortituse est. Bellonius ex Truttarum genere esse ait, at Rondeletius, Salmonum, Truttarumque generi adjungendum suaderet, inquit, pinnula illa dorsi posterior adiposa Salmonum & Truttarum generi propria nisi multa alia reclamarent, ut oris constitutio Thrissis quam Salmonibus similior. Os sine dentibus, caput compressum, corpus *maculis* carens, caro mollis & cãdida. Quamobrem Lavaretum inter Salmones (Truttaeque) & Alofas, ambigere iudicat. Bellonius exactissime delineavit his verbis: Piscis Lugduni satis cognitus, Umbrę similis, nisi *simus* esset, *dentibusque* omnino careret: *Bisulam* (Bezola) tamen vulgarem magis refert: sed Lavaretus nunquam pedem excedit, neque crassior est eo quod pollex & index capere possunt. Capite est oblongo, *squamis* tenuibus, albis, atque ut in Trutta parvis exiguan in tergore gerit pinnam, duas ad ventris latera utrimq; circa branchias, ac totidẽ sub vẽtre ei oppositas, quę tergoris fastigium occupat: aliã quoq; parvam in eo interstitio, quod est inter caudam & anum, quę omnes nigricantes apparent. *Linea* à supercilio subrubra per latera ad caudam protensa insignis est: *cauda* bifurca, pinnisque ad extrema nigris, fimbriatis ac laciniatis. Ventre laxo & prægrandi, ut in Trutta. Hoc item à Cæteris piscibus differt, quod *nare* est recurta, atque (ut in Harengiis ac Logiis) ossiculis quibusdam prominentibus insigni, labiis nullum *dentium* rudimentum ostendentibus, appendice glabra ac carnosa *cauda* insidenti, in Umbrę modum. Neq; tamẽ *dentibus* caret: ossicula ad eius fauces atque œsophagi ingressum utrimque conspiciuntur, senis hinc inde denticulis, ut in Theiolo, cõminuta. *Branchiæ* illi sunt utrinque quaternæ ac simplicissimæ, quarum extrema, quę capiti inhæret, reliquis sane minor est, nullis lateribus maculis est insignitus, totumq; huius piscis corpus, dempto terгоре argentum est. Verũ tamen si ad eius internas partes advertas, *costas* quinque & triginta ut-

trinque connumerabis, cernẽsq; cor illi esse pallidum ac trigonum, pericardio inclusum: *hepar* album, unius tantum lobi, ut in Exocæto & Delphino, in cuius latere dextro fellis vesicula adfuta est. *Lien* à sinistris apophysibus & stomacho incumbit. *Intestina* nullas habent revolutiones. Nã gula usque ad ventriculi fundum deducitur, qui per piscis longitudinem delatus, ac sursum quidem reflexus, duodenum parit à dentibus suffultũ, in cuius gibbo innumeræ apophyses spectantur: ex quibus vena oritur, per quam sanguis defertur ad hepar. Apyloro sequitur aliud intestinum, quod nullis anfractibus circumductum, rectã ad anum tendit. *Vulvam* utrimque bicornem habet, tenuibus *ovis* conspicuam. Cætera in congenere piscibus describentur. Lacum Allobrogum, ut Burgetii & Equibetii proprium Rondeleti facit. Bellonius ex Lemano quoq; adferri scribit. Caro ei candida, mollis, suavis, minimẽ glutinosa, boni succi, mediocriter nutriens. Bellonius in tantis in Gallia delitiis haberi scribit, ut regionum œconomorum chartæ frequenter inscriptum habent.

BEZOLÆ nomen huic pisci lacus Lemani accolæ dedere, Bisulam Bellonius dixit. Latine *Cephalum* vel *Mugilem Lacustrem*, vel potius *Leuciscum* *Albulam*ve lacustrem appellare licebit. Bellonius semel tantum huius piscis meminit, Lavaretum Bisulam magis quam Umbram referre inquit. Sed Rondeletius exactius; ut Lavaretum, inquit, Lacus Burgetius, & Equibetius ferunt, ita Lemanus Bezola vulgo dictam, non admodum dissimilem, nisi quod colore minus est candido ad cæreuleum inclinante: rostro acutiore, capite minore, ventre latiore & prominentiore. Nullum piscem reperias, cum quo melius comparari possit, q̃ cum Harengo, quam in marinis depinximus. Carne est molliore quam Lavaretus, & ab eo saporis suavitate & succi bonitate multum separatur, nec in pretio habetur. Proprius est Lemani lacus.



TAB.
XXV.
5.
Aldrov. de
Piscib. l. 5.
c. 52.

j Umbla maior.

Große Röteln.


2 Umbla min.

Röteln pöslung.



Trutta Lacustris, Trutta Salmonata.

Grund fohrin See fohrin.





6 Albula Lacustris.

Gang fisch.

Lauarctus Albula

Adel. fisch.




Alb. minima.

hegling.

Albula Canula

Lacustris Bröda.

Blau fisch.





Albula Parua.

Albelen weiß gang fisch.

Carpio Benaci.

See. fohrin.





Schillus

Schiell. Nagmul.

15

Alburnus Albus Sabianus

Weis. fisch.





SQualus.

Ein Art hering.

10

Clauatus caprinus.

Piga. Dorridrachman



Farra albula lacustris specios.

Farra. Alius. generis.

11



12

Agonus.

Welsche Agunen.

Chalcis altera Roadetj.

Ein Heringart. in süßen Seen.



CAPUT V.

De Albulâ parva, & minima Gesneri.

TAB.
XXX.
7.8.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 53.

Albulam parvam non sui generis piscem esse, sed Albulam sive Bezolam cæruleam secundo tertiove suæ ætatis anno ita vocari, quidam opinantur, quibus piscatores nostri, inquit Gesnerus, contradicunt quod cæruleos observarint secundo etiam ac tertio anno forma coloreque à genere Albularum (de quibus hic loquimur) differre. Cognatus est hic piscis cæteris lacustribus albis. Nam & species & sapor fere omnium non dissimilis est. Albulâ magis quam Bezolâ albicat: cauda tamen & reliquæ pinnæ, præter eas quæ juxta branchias sunt, nigricant in extremitatibus. *Dorso* color glaucus: alicubi tamen purpurei quiddam & cærulei mixtum videtur. Caput ex glauco cæruleum. Inter caput & dorsum color viridis, ceu gemma relucet. Branchiæ ei quaternæ. Hyeme aliquando memini me videre hunc piscem *squamis* per latera exasperatum, eminentibus per singulas squamas veluti tuberculis. Aiebant hoc indicium esse recentium & vivarum. *Capiuntur* Albulæ in summa parte Tigurini lacus, juxta locum quem *Buchberg* vocant, diebus ferè quatuordecim post diem divi Martini, & ad oppidum Rappersfullam circa ipsum divi Martini diem. A *partu* in lacum nostrum descendunt (sed non tam procul ut cæteræ Albulæ) usque ad Ver: deinde rursum ascendunt tota ætate, usque ad divi Martini diem. Capiuntur etiam in Gryphio agri Tigurini, multo majores quam in nostro, & in Hallvillensi Bernensis agri. Augusti & Septembri mensibus præcipue laudantur, quod suaviores eo tempore solidioresque sint. Postea enim pariunt, & mollior earum caro fit, & succus in fœturam consumitur.

De ALBULA MINIMA sic Gesnerus: Albulam minimam hunc piscem voco, inquit idem Gesnerus, quæ nostri Hagelevel Haling, quasi Haleculam appellant. Friburgi Helvetiorum (ut audio) *Pfaren*/ Lucrenæ *Nachtsfisch*/ quod noctu fere irretiat ut quidam putant. Sed mihi piscator Lucernensis affirmat, *Nachtsfisch* vocari Albulam cæruleam anno primo, cum circa diem divi Johannis ætate jam ad digiti longitudinem excrevit. Totâ specie accedit ad illam quam proxime albulam parvam nominavi, sed plerumque minor est, & in capite minus viridis. Si piscem erectum inspicias per dorsum aliquid coloris purpurei in lateribus apparebit. Branchiæ ei quaternæ sunt, pinnulæ alben. Ore aperto superioris mandibulæ extremitas deorsum tendit. Os habet longiusculum, *dentes* nullos. *Julio coeunt*. Nocturnum *capiuntur* retibus ad passus quadraginta aut quinquaginta demissis. Cum cælum serenum est, altius descendunt cum nubilum, ascendunt. Densissimis gregibus præ cæteris Albulis capiuntur, non passim in lacu nostro, sed maxime à pago Vædesuilla, usque ad Insulam & versus alteram ripam à loco Surenbach usque ad arborem longam. Diebus quatuordecim fere à natali Domini capi incipiunt & immixtæ eis Albulæ cæruleæ aliquot, & mox expirant. Cum captæ mox expirent, ut recentes habeantur matutino tempore potius ad prandium coeuntur, & assi in craticula quam calidissimi à gulonibus devorantur, quicam ob causam non universos, sed paulatim alios assari jubent, ut statim assumtis prioribus, fervidi posteriores mensis afferantur. Embamma additur ex aceto, sapâ, pipere, sale & potri aut cepæ foliis concisis. Placet item recens in jure albo frigidò, apio copiose insperso, maxime per mensem Decembrem. Sale idem conditus infumatusque commendatur.

CAPUT VI.

De Albo Salviani &
Farra.

TAB.
XXX.
9. 10.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 55.

Albus Salviani, *Capto lacustris* Gernerii est. Quamvis Squalo Alburno nove appellato pisci per similis sit, ab eo tamen evidentibus quibusdam notis faciliè internosci potest. Primum enim etsi uterque latitudinis ratione oblongus appareat, eadem nihilominus utriusque existente latitudine, Albus paulo longior Alburno conspicitur. Deinde rostro acutius, oculis maioribus ac dorso magis repando Albus est. Nam cum Alburnus fenestratque modice, Albi repente ac plurimum à capite extuberat *dorsum*. Pinnarum autem tum in lateribus, tum in dorso ac in imo ventre existentium, situ ac numero ei cum Alburno conveniente, earundem colore ab invicem discrepant: subnigras enim Albus: subrufas verò Alburnus eas habet. Postremò amplioribus *squamis* albus tegitur. Ventreque atque lateribus, æquè atque Alburnus candidus atque argenteus est: capite vero ac dorso magis quam ille subviridis. Magnitudine non differunt. Uti enim Alburnus, sic & Albus pedalis, frequens: bipedalis verò aliquando tantum reperitur. Lacustris piscis est, non tamen in lacubus omnibus aut eorū quam plurimis, ut Tinca, Lucius, Squalus ac Barbus, sed eorum nonnullis solum reperitur. In Trasymeno enim lacu, ubi etiam Albo vulgo vocato, frequens satis in fine veris *capitur*. In fluminibus eum reperiri huc usque non observavimus: estque advertendum, ne quispiam eum in fluminibus etiam reperiri contendens, Squalum pro Albo nobis ostendat, in mari nec nascitur, neque ex lacubus fluminibusve ad id descendit. Duram *carnem* habet Albus, & propterea ægre coquitur. Insuper adeo est, ut piscium omnium jure vilissimus censeatur.

Nec enim ulla condiendi ratione rapidus effici potest. Torrefactus tamen paulò minus ingratus est palato, solumque in aliorum piscium penuriâ eo vesci solemus.

FARRA, Fora & Pala quoque dicitur. Lavaretos vel Thrissas refert, ut scribit Rondeletius, magnitudine cubitali, ore parvo, sine dentibus ut in Thrissis, colore cinereo, corpore depresso & lato, *squamis*, pinnarum situ & numero Lavaretis similis, linea à branchiis ad caudam recta, & candida ducta est. Pinnulam dorsī mollem pinguemque habet, caudam latissimam. *Carnes* est candida & suavi, quæ Lavaretorum Truttarumque carni non cedit.

Æstate & autumno *capitur*, hyeme in altis gurgitibus latet. Sale conditur & servatur in hyemem. Sic ille. Cæterum monendus est Lector in Rondeletii codicibus diversum piscem, quem in Lemano Vangeronem vocant, huic capti haud recte per librariorum incuriam præfigi.

CAPUT VII.

De Pigo, & Schilo.

Pisci, quem descripturi sumus, Verbanus Larii que lacus accolæ *Pici*, *Pigi* & *Picui*, quod clavis suis seu aculeis pungat, nomen impostere. Rondeletius *Cyprianum clavatum*, Albertus *Vergiliadem*, quod Vergiliarum ortu apparent, dixit. Cypriano, describente Rondeletio ita est, similis, ut demptis aculeis Cyprianum esse affirmes. Est enim eodem corporis habitu, pinnae totidem eodem in loco sitas, os, oculos, eodem modo carnosum, interna omnia similia habet. Vita item, moribus, sapore, succo Cypriano similis, nisi quod paulo melior est. *Salvianus diligenter sic descripsit*. Pigus piscis est capite rotundo: rostro obtuso, nec admodum extento, ore mediocri & edentulo.

Bran-

Branchias habet utrinque quaternas, & juxta eas, pinnas binas, utrinque vnâ: aliasque in imo ventre, caudæ magis quàm capiti vicinas. In dorso ferè medio una haud magna, nullis aculeis armata reperitur. Imo vètri, ppè caudâ alia una etiâ minor hæret. *Cauda* ipsa in falcatam pinnâ definit. Totius *figura* ni paulo lógiore esset, ovata censeripotest. *Squamis* magnis tegitur, ex quarum medio albi & pyramidati *aculei*, in fine veris & ineunte ætate, enascuntur. Quibus cum primis 40. æstivis diebus horreat, ætate procedente imminuuntur primû, demûque prorsus delitescunt. Quapropter primis illis æstivis diebus demptis, reliquo anni tempore prædictis pyramidatis aculeis omninò caret: unde cû Plinius scribat: Duo lacus Italię in radicibus Alpium Larius & Verbanus appellâtur, in quibus pisces omnibus annis vergiliarum ortu existunt squamis conspicui crebris atque præacutis clavorum caligarium effigie, nec amplius quàm circa eum mensem visuntur. Dubio pcul Pigum piscem, etsi innotatum eum relinquit, describit, cû is (ut infra monstrabimus) Larii & Verbanus lacus alumnus sit, & (uti diximus) in prima ætate (quo quidem tempore vergiliæ exoriuntur) eius squamæ parte media, clavorum caligariû instar, præacutæ fiant. Habent enim caligares clavi, qui à caligis militaribus, quibus suffigebantur, dicti sunt, pyramidata capita. Eiusmodi aculeos, sicuti Majo & Junio tantum mensibus, in dorsoque solum & lateribus; & nò in vètre, Pigo enasci asseverant omnes, sic nò fœminas, sed mares tantum in horrescere, testantur nonnulli: Venter ex albo languide rubet: tergus ex cæruleo nigricat. Quod ad interanea attinet, nil habet præ cæteris piscibus peculiare atque animadversione digum. Cum maximè excreverit, quinas aut fenas libras nò excedit. Solius Larii atque Verbanus lacus accola est. Nemo enim in alio lacu fluminisve eum reperiri hucusque (qd sciam) animadvertit. Et licet frequentiores in prima ætate, cum clavis illis caligaribus insigniti appa-

rent, in iis lacubus capi solèant, reliquis etiam omnibus ferè anni temporibus, in eisdem, etsi non æque crebro, capiuntur. Majo Mense circa lacus littora *parit*. Sapore & succo Cypriano est similis, paulo tamen melior. Salvianus ei carnem tribuit teneram atque sapidissimam, ideoque cum optimis quibuscunque dulcis aquæ piscibus conferri posse & maxime in æstatis principio captum: hoc enim tempore nulli piscium esse secundum, & quovis denique modo conditum, probe semper sapere.

SCHILUM, qui & *Nagemulus*, ita describit Gasserus. *Magmaul* piscis est in Ambronis lacu Bavarix, qui raro capitur, quoniam raro altius natando evchitur. Longissimus ulnam æquat. Formâ non dissimilis est Lucio, nisi quod in aqua subviridis, extra aquam verò dilutior apparet: oculis albicantibus, ore retro juxta maxillas minus lato. Squamarum magnitudine, ordine & asperitate Percam refert. Pinnæ dorso erectæ, *aculeis* tres fere digitis rigent. Præter dorso spinam paucas alias & parvas habet. Parit Martio. In cibo quidem optimus est Majo & Junio. Elixatus, assatus & frustatim concisus etiam frigi solet. Pinguis est admodum, & carnem etiam coctus albißimam servat.

Alarrov. l.c. cap. 59.

CAPUT VIII.

De Saracho.












Piscem quem Albanenses *Sarachû*, TAB. Ichthyopolæ *Sarachinû* vocant. Bel-XXX. lonius *Agonum*, Jovius & Salvianus *Aldrov. de Aconem*, Fracastorius & Jovius *Aquo-Piscib. l. 5.* *nem* vocant, ab ossiculis sine dubio il-*l. 58.* lis acutis, quæ asperam spinosamque in eius ventre lineam constituunt, & veluti acus quidâ sunt. Rondeletius *Chalcidem*, quem Gaza *Aericam* vocat, dici opinatur, alicubi fortè *Sardanelle* dicitur. De ipsorum Generibus ita Bellonius. Tres sunt apud Insulres *Bellon. de Aquatilib. l. 2.* lacus in quibus piscem vulgari *Mediolanenßum* idiomate, *Agonum* nominatum capiunt, varium quidem eum.

Larius

Larius enim lacus, qui hodie Comensis cognominatur, Agonos educat exiguos ac magis populares, Sardis similes, dempto quod ventre sunt latiore: neque alio quam Mediolanum transferuntur, aut saltem raro Mantuam prætergrediuntur. Eos dolis muriâ conditos adservant, quam etiâ mediocriter sicci sine muriâ cõperiantur. Verbanus lacus, quẽ lacum majorẽ cognominant, multo majores Agonos quã Larius educat. Indigenæ urbiũ, quæ ad eius litus sitæ sunt, Aronan, Palencza, Cornobio, Locaria & Eugudræ vocatos pisciculos magno proventu capiunt, mediâ magnitudine inter Larios & eos ex lacu Lugaræ, quos Indiginæ urbium nominant *Campignon* & *Buiffon*. Benacus autẽ Lacus magnitudine insignes Agonos profert. Sed nec Urbani aut Benaci Agoni muriâ condiri solent, ut minores. Hæcille; & mox rursus de Saracho. Duo, inquit, tresve lacus sunt in Epiro, in quib. Sarachi capiuntur, quos ubi sale condierint, exicaverint, & fumo infecerint, Venetias, Anconã & aliò navigiis transvehunt. Quorum eos maximẽ in pretio habere solent, quos de la Boiane huius nominis flumine ac lacu cognominant. Horum verò duo comperiuntur *genera*, alterum minus, alterum autẽ Clupeæ ferẽ magnitudinis. Minores Sarachi quadrante longiores non sunt, maiores pedalem implent longitudinem. Ambo eadem linea sub ventre præditi sunt, quã Clupea insignita est. Cæterum Agoni omnes (inquit idẽ Bellonius) *squamas* habent levi contactu decedentes, tenues, latas & transparentes: corpora argenteo colore nitentia, sed parum nigricant in tergo. *Desquamati* super argentum terfissimum refulgent. Oris rictum habent grandiusculũ sine *dentibus*: pinna in tergo simplicem, parvam, duas in lateribus sub branchiis, quarum omnium exterius tegumentum spinneum in medio crenatum est. Oculos valde grandes proferunt, caudam in penicilli modum discissam. Utrinque nonnunquam lituris duabus, rotundis, ac nigris, interdum pluribus figillatur in tergo. *Lineam* sub ventre

habent ferratam, ad anũ desinentẽ. quam si digito in adversum cõfrices, cultri modo acutam percipias. *Branchias* habent utrinque quatuor, internâ parte veluti fimbriatas, quod etiâ Harengis, Celerinis & id genus piscibus accidit. *Cor* ut semen Cicerulæ trigonum inter anteriores pinnas sub branchiis occultatum. *Hepar* subrubrum sinistro stomachi lateri & œsophago incubans, ipsumq; pylorum amplectens. *Stomachi* figura in conum turbinatur, à cuius superiore parte pylorus exit, multis apophysis cœcisq; circumdatur. *Lien* dextræ Stomachi parti, inhæret ruber, à pyloro intestinũ non reflectitur, sed recta ad anum tendit. Triginta sub ventre *ossicula* acuta, asperâ in hoc pisce lineam constituentia, connumerare potes. Hæc omnia itaque Bellonius, quibus addi potest, Hosce pisces ita pinguescere referente Rondeletio, ut cum in craticula assantur, pinguitudo veluti oleũ distillet, adeo ut ab hac pinguedine, sint qui *Liparim* appellent. *Carnivori* sunt, & pulices aquaticos venantur. De *generatione* prodit Salvianus, Acones fœminas ovis gravidas, maribus semine refertis consequentibus, ad saxosa litora Majo mense adnatæ, ibique illas parere sua ova, hos suo semine fœcundare, moxque pusillos inde pcreari pisciculos, q; intra paucos dies ad digiti augeantur magitudinẽ, tuncq; vulgo *Antesitos* vocari. Aqua exempti mox *emoriuntur*. Gregatim *vivunt*, & temerẽ in retia incidunt. Adeo sunt *timidi*, ut vel à tremula umbra terreantur. A Luciis, Cyprinis & Truttis adeo sibi metuunt, ut aliquot aliquando millia, insequentem inimicum longo per lacũ tractu pavidi fugiant, jucundo intuentibus spectaculo. Alosis sapore persimiles, vere graciles, autumnis optimos Jovi⁹ facit. Salviano Julio, Augusto, Septembri & Octobri mensibus probantur. Crassiusculũ tamẽ succũ gignunt, difficulter concoquuntur, & mediocriter nutriunt. Cum salendi causa enterantur, *oleum* ex interaneis ad lucernarum usum colligitur.

HISTO-





HISTORIAE NATURALIS

De Piscibus

LIBER IV.

De Piscibus Exoticis.

TITULUS I.

De Piscibus Squamosis.

CAPUT I.

De *Tajasca*, *Paru*, *Pira-Acangata*, & *Acaranna*.



Oterant quidem & isti, quos hoc libro trademus pisces, ad sua genera in præteritis referri: verum cum tardè nimis ipsorum descriptiones & icones in manus nostras pervenerint, coacti sumus eos peculiari libello includere.

TAB. *Tajasca* itaque prout Brasiliensis vocatur: piscis est octo aut novem digitos longus; corpore obterete & pyramidalis, extenuatur enim versus caudam. Caput est illi grossiusculum & compressum: Oculi eminentes & nigri, circello aureo: os edentulum. Sex habent pinnae; nimirum sub qualibet branchia unam oblongam, sub his in medio inferius unam breviorē: unam in medio dorso, aliam longiorem versus postremam dorso partē, & è regione huius unam in infimo corpore: septima est cauda, oblonga & in exitu rotundata. Tegitur squamulis parvis, coloris hyalini pallidi, maculis variis fuscis vermiculatis variegatus per totum, exceptis pinnis postbranchialibus & infimo ventre, quæ ex pallido subflavescent.

Cauda est undata fusco. Latet in arena absconditus; ideoque capitur pedibus, eos ponendo super arenam ubi later.

Coctus atque assatus bene sapit & convenit cum Hollandorum. Post est enim carne albissima & friabili.

PARU, Piscis est latus & subrotundus, verum haud crassus, novem aut decem digitos longus ab ore ad pinnam caudæ quæ duos & semis digitos longa & toridem lata. latitudo piscis septem digitorum. Pinnae obtinet sex: duas magnas ac latas duos circiter digitos; unam in dorso, alteram in ventre, quæ utrobique ad caudam extenduntur; habetque quævis pinna in fine prominentiam instar funiculi, ea videlicet, quæ in dorso quinque digitos, quæ in ventre tres digitos longam. Post branchias in quolibet latere etiam pinna est duos digitos longa, unum lata; & duas in inferiori ventre sub his, duos digitos longas, angustissimas. Capite est parvo, ore elato, angusto, minutissimis dentibus albi coloris; oculis conspicuis, flavo circulo circumdatis. Totum corpus vestitur squamis mediocribus, quarum dimidiis numerus niger est, dimidiis autem flavescit, ita ut lunulas flavas in nigricante corpore gestare videtur. Circa branchias flavedo est, & in initio pinnarum, post aures macula flava in qualibet.

Piscis est edulis.

PIRA ACANGATA, id est, piscis duro capite: Perca mediæ magnitudine, septem aut octo pedes longus, ore haud amplo, oculis nigris, circello nigricante aureo & ruffo colore mixto. Pinnae habet sex & septimam pro cauda: duas postbranchiales, duas in infimo ventre junctas, unam versus posteriora in ventre, & unam per totius dorso longitudinem usque ad caudam extensam & erectam, firmis spinis suffultam quam in vaginam recondere potest. Pinna caudæ furcata. Tegitur squamulis argenteis, aureo & igneo colore transplendente, præsertim in dorso: in ventre in argenteo thalassinus color translucet.

Z

Pinna

Pinna dorsi argentea transplendens & maculis fuscis insignita. Pinnae laterales albæ, quæ in ventre cærulefcentes. Caudæ quoque pinna in extremitate cærulefcit. Est edulis.

ACARAVNA, Piscis magnitudine exæquat Paru, sed non est ita latus, & squamulas habet nigricantis coloris. Cauda est bifida, pinna tres digitos longa, duos lata. Pene utramq; branchiam etiam pinnam habet, inferius in antica parte duas angustas. Per totum dorsum & per ventrem etiam pennam utrobique extensam, acutam, continuam, in postica parte corporis circiter unum digitum latam. Os parvum, angustum, denticulis minutissimis. Oculi haud magni. In utroque latere prope caudam acutissimum habet aculeum; quos in latera potest recondere & evaginare & alios pisces lædere: quilibet aculeus ferè digitum longus osse piscino constans.

Piscis est edulis.

CAPUT II.

De Guaperua, Piranema, & Acarapucu.

TAB.
XXXII.

3.

Marcgrav.
Hist. Brasil.
lib. 4. c. 2.

GVAPERUA Brasiliensibus. Piscis est corpore lato & compresso, quatuor digitos longo, tres lato, ubi latissimus. Ore parvulo, denticulis minimis. Pinnae habet sex: post quamlibet branchiam unam, parallelogrammi figura: in infimo ventre duas oblongas: in dorso & inferiore ventre extremo longam ac latam, quæ in acumen desinunt, subulæ figura. Cauda quadrata seu potius parallelogramma, unum digitum longa, duas tertias digiti lata. Tegitur squamulis coloris nigri, splendentis instar bombycini, quarum oræ (non omnium sed quarundam) fimbrias flavas habent instar semilunularum. Pinnae sunt nigræ. Circa os linea crassa purpurei est coloris, & illi perpendiculariter altera


supposita Corpus tres lineæ latæ ambiunt, quarum duæ per latus & posticas pinnae extenduntur. Caudam etiam talis secat lineæ & ejusdè coloris; una pro fimbria ipsi est oculorum pupillâ nigra, circulo aureo.

PRANEMA, Piscis mediocri Capionis seu Percæ magnitudines novem, decem aut undecim digitos longus; latus, ubi maxime, tres digitos aut paulo amplius, Os habet amplum, subrotundum, edentulum quidem, sed acutissimis prominentiis asperum: oculos magnos instar solidi Hollandici, pupilla crystallina, circulo aureo splendente, qui superius ad dimidiam partem coloris est miniati. Branchias habet admodum amplas. Pone has in quolibet latere pinnae digitum quidem longæ sed haud latæ, & subter has in ventre duæ sibi propinquæ duos digitos longæ & sesquidigitum latæ, triangulares, spinis suffultæ. A ventris medietate ad caudæ exortum usque pinna protenditur tres & semis digitum longa, unum lata, itidem spinis intertexta, quam abscondere fere potest in rima ad hoc comparata: per universum dorsum ab occipitis sine ad exortum caudæ pinna extenditur quinque digitos longa, paulum plus digitum lata, tenui membrana constans, duabus & viginti spinis intertexta, quam erigere atque deprimere & fere abscondere potest in rima. Cauda quæ à corpore protenditur sesquidigitum est longa, unum lata, pinnam habet tres & semis digitos latam, & plusquā sesquidigitum longā. Calor totius piscis est argenteus laccatus laccæ florentina. Squamulas habet minutulas quasi triangulares: in ventre plus albicat, seu argenteo minus laccæ intermixtum cernitur.



Capitur in mari & boni est saporis, edulis.

ACARAPUCU, fluviatilis piscis, in sesquipedalem longitudinem excrefcit, ubi latissimus quatuor aut quinque digitorum, Os acuminatum circiter

Taiasica.




Paru.




Pudiano Vermelho.


Cuaperua.




Pudiano Verde.




Iaguaraca.




Iunucapaba Itaiara.




Carauna.




Guaticupa Iuba.




Tamoata.



Pirapiscanga.



Acara Pinima.



citer duos digitos longum, haud amplum, labia abscondere & contrahere potest ut solum hiatus appareat, nullos habet dentes. *Oculi* magni, pupilla nigra splendente, circulo ex albo & fusco mixto. *Pinnas* habet septem: unam per dorsi longitudinem ad caudam fere extensam, non latam, quam erigere & spinis sustentare, atque recondere potest: postbranchiales duas, totidem in infimo ventre, unam post anum: Septimam pro cauda, furcatam quatuor aut quinque digitos longam. Totus splendor squamis argenteis minoribus: in dorso tamen aliquid aurei admixtum: & in quolibet latere sex oblongæ maculæ cæruleæ rufescentes, non ita conspicuæ. Pinna dorsi & cauda diluræ cinerei sunt coloris, ut & laterales: duæ in infimo ventre flavescent paulū, ut & ea quæ prope anum. Edulis est.

CAPUT III.

De Pudiano vermelho, Pudiano verde, & Iurrucapeba.

& semis digitos longam: & septimam pro cauda, quæ est quadrata, digitū longa & lata. Tegitur piscis squamis subtilibus, ita arctè cōplicitis, ut ad tactū glaber esse videatur. *Color* totius corporis flavus cum aureo mixtus. Summitas autem capitis & totum dorsum ad media utrimque latera, & fere usque ad finem dorsalis pinnæ purpurei est coloris egregii cum lacca mixti: extrema ora pinnæ majoris in ventre versus caudam etiam purpurascit & pinnæ illi junctæ totaliter: reliquæ pinnæ flavæ cum aureo colore mixtæ, ut & totum reliquum corpus. Pars ultima pinnæ majoris in dorso etiam flava ut & cauda. Piscis est edulis.

Pudiano Verde Lusitanis. Piscis oblongus, nimirum decem digitos ab oris extremo ad caudæ initium; corpus tres digitos latum, circa caudam autem sesqui. *Os* acuminatum, haud amplum, antè in superiori mandibula habens duos dentes acutos, longos; & seriem denticulorum minorum: inferius in anteriore parte quatuor, longos, acutos, & seriem minorum candidorum. *Oculos* habet parvos, pupilla nigricante, circello primum aureo, dein exterius albescente. *Pinnas* obtinet septē, nimirū unā per dorsi longitudinem extensam, sex & semis digitos longam, dimidium latam, quam spinis erigere & sustinere potest: post utramque branchiarum unam, duos digitos longam, paulo plus uno latam: sub ventre duas parvas junctas: à medio autem ventre inferiori una tendit pene ad caudæ exortum, quatuor digitos longa, unum fere lata: Septima pinna est cauda, quæ est quadrata aut parallelogrammi figura, sesquidigitum longa, duos lata,

Totus piscis vestitur squamis latis quæ ita compositæ sunt, ut meri cubi sibi appositi videantur; lutei seu aurei coloris ac per totum ambitum linea seu fimbria elegantissima azuri seu cærulei coloris. *Caput* superius aureum est cum magna macula coloris ex viridi thalassini, circumdata azureo & azureis flavis subviridibus & albican-

TAB. XXXII. **P**UDIANO *Vermelho* vulgo, sed rectius *Bodiano*: Brasiliensibus *Aipimixira*, & *Tetimixira*, Piscis mediocris Perceæ magnitudine. Latitudo corporis, ubi maxima, duorum digitorum prope caudam unius aut paulo plus. Corporis fere æqualis latitudo est. *Caput* parvum, *os* acutum, superius in anteriori parte tres denticuli acuti, minimi, inferius item, & versus interiora in utraque mandibula alii minimi denticuli. *Oculos* habet paululum eminentes, pupilla nigra, exteriori albo, hinc flavo circulo. *Pinnas* habet septem: nimirum duas plus digito longas, haud latas, post branchias in utroque latere unam: sub his duas junctas in ventre: aliam in ventre versus caudam duos digitos longam, secundum longitudinem adnatam: unam item talem in dorso, tres

tibus striis variegatum. *Pinna* duæ laterales seu postbranchiales & duæ in ventre albicant, in laterali ambitu cærulea lineola præditæ. *Pinna* dorsalis aurei est coloris & striis undulatis cæruleis secundum longitudinē notata, quæ in ventre major ex ruffo ad brunum vergit colorem, striis itidem cæruleis secundum longitudinem. *Cauda* rufescit striata thalassino ac cæruleo secundum longitudinem, in extremitate aurem paululum virefcit.

Piscis insignis coloris & edulis. Capitur in mari.

Iuruucupeba, aut etiam *Itaiara*. Piscis longus septem aut octo digitos, duos aut tres latus, ubi latissimus: ore satis patulo, & ex triangulari rotundo lingua angusta, brevi, denticulis minutissimis: oculis rotundis, pupilla crystallina & circulo rubro. Post branchias in utroque latere habet pinnam sesquidigitum longam, quadratam & exterius circinatam: subter has, duas in inferiori vente junctas; paulo post occipitium incipit pinna anteriori medietate spinis suffulta, posteriori mollis, quæ tendit secundum longitudinem dorso ad caudam usque, & semper fit latior, prope caudam digitum lata. In inferiore corpore versus caudam etiam pinnam habet haud amplam. *Cauda* constat pinna sesquidigitum longa, plus uno lata & quadrata.

Squamatus piscis, sed squamis ita complicatis ut lævis esse videatur. Piscis universi color egregiè ruber, in ventre autem ex rubro & albo maculatus; in lateribus autem constanter maculas habet puniceas, nigras, varias; majores & minores. *Pinnae* omnes sunt rubræ & nigro maculatæ.

Pinguis est piscis & boni saporis, optimus tamen assatus. Capitur in mari inter scopulos. Parieti recens appensus noctu toto corpore clare lu-
cet.

CAPUT IV.

De Iaguaraca, Caranna, Cururuca, & Guatucupa Iuba.

JAGUARACA. Piscis est mediocris TAB. XXXII. Perce magnitudine, ore acuto, e-
dentulus. Oculos habet magnos, pu-
pilla crystallina nigra, magna & am-
pla, circulo coloris argentei, & supe-
rius maculam sanguineam habente. 7.8.9.
Marcgrav.
Hist. Brasil.
lib. 4. c. 3.

Pinnas habet in lateribus & infimo ventre similes præcedenti pisci: per dorsum verò secundum longitudinem extenditur pinna digitum lata, usque ad unum digitum ab initio caudæ, constans tenui membranula undecim spinis acutissimis suffulta, quam potest elevare & substernere prolibitu: atque non solum componere, sed & abscondere in rima cui pinna insidet.

Hanc sequitur alia contigua unum digitum lata, pertingens ad caudæ exortum, duos digitos longa, triangularis & superius desinens in acumen. *Cauda* autem pars reliquo corpori subtena rotunda est, sesquidigitum longa, continens pinnam furcatam, cuius pars inferior duos digitos longa, superior paulo longior. Ad branchias in utroque latere, in quolibet duos habet aculeos, in quorum medio alii sunt minimi: his branchiis & aculeis ferit & vulnerat: ferit etiam cum spina dorsali & cum iis quæ sunt in infimo ventre, ad quarum singularum latus aculeus est satis longus, & quidem in pinna prope caudam in infimo ventre spina est unum digitum longa.

Totus piscis tectus est squamulis eleganter dispositis; & quælibet squamula in ambitu minutissime est serrata. Color totius corporis est argenteus, in ventre plane albicat. *Caput* superius incarnati est coloris, & hispida testa munitum. *Pinnae* omnes coloris sunt dilute incarnati: ea autem quæ in dorso spinis suffulta, prope spinas auro est umbrata.

Caro pinguis & boni saporis, præfertim si piscis affletur. Capitur in mari inter scopulos.

Carauna. Magnitudinem & figuram habet ut *Iurucapeba*, differt tamen capite & colore corporis. *Pinnas* quoque eodem modo positas habet ut ille. *Os* autem obtinet lunatum; dentesque habet acutissimos, sed minutos: *Branchias* amplas, quæ aculeis in postica parte sunt munitæ. *Oculi* versus summitatem capitis in lateribus positi non longe ab invicem haud magni, pupilla ovali nigra, quam ambit circulus ruber. Squamulis in vniuersum vestitur lunatis, coloris miniatiper totum, & ubique punctula nigra, magnitudine seminis papaveris insparsa, habet, præterquam in ventre.

Capitur in mari inter scopulos: estque edulis, molli admodum carne atque boni saporis.

Cururuca, species *Corvina*; Piscis fluviatilis, sesquipodem longus, corpore oblongo; ore satis amplo, oculis mediocribus, nigris. *Pinnas* habet septem: unam per dorsum longitudinem ad caudam ferè protensam, quæ divisa est & prior pars latior, tres digitos ferme; & totidè longa, triangularis, spinis suffulta, posterior longior, sed exilior. Cauda fere quadrata. Squamas habet mediocres magnitudinis argenteas cum auro & subfusco paulo mixtas, præfertim in dorso & lateribus. *Pinnæ* in dorso & lateribus ac cauda, cineræ; in medio ventre flavescunt, & fuscescunt. Edulis est.

Idem. Lib.
4. cap. 4.

Guatacuba Iuba, in duorum pedum longitudinem excrevit, dorso paulum incurvato. *Os* habet triangulare, acuminatum, dentes parvos acutissimos. *Oculos* magnitudine stuferi Hollandici, pupilla magna, nigra, splendente circulo rubro. *Pinnas* habet molles sine spinis in lateribus; nimirum unam in quolibet latere, post branchias, angustam, duos & semis digitos longam: duas tales junctas & ventre subter illas unica spina munitas: & unam prope anum digitum longam ac latam, unica quoque spina armatam. Ante medium dorsum versus occiput, inci-

pit pinna desinens ad caudæ initium, quinque digitos longa, unum fere lata, quæ duabus & viginti spinis erigitur: cauda duos pene digitos longa, unum lata, pinnam habet plus uno digito longam & quatuor latam paululumque exterius versus interiora arcuatam. Vestitur squamis paulo majoribus, coloris argentei & striis flavis & ex argenteo rufescentibus secundum longitudinem extensis à capite ad caudam usque. In utroque latere etiam à capite ad caudam eminens linea tendit. *Caput* ex argenteo, rufo, flavo mixtum. *Pinnæ* albæ sive argenteæ, caudæ pinna ruffa: venter albus.

Capitur in mari inter scopulos. Boni est saporis, & lingua & caro circa mandibulas longè optimi ut in Carpione.

CAPUT. V.

De Pira Iurumenbeca, Tamoa, Acara, & Pira Pixanga.

PIRA JURUMENBECA vulgo Boca TAB. XXXII.
molle, quia molli ore & aquis extractis statim moritur: vivit in mari II. 12.
in cæno: oblongus piscis haud latus: Idem lib. 4.
novem aut decem interdum pedes 4.
longus, duos & semis latus, ubi latissimus. *Os* habet elevatum; quod ampliare & rotundare potest: oculos magnos, pupilla crystallina, circulo ex argenteo & brunno mixto. *Septem* habet pinnas, duas angustas postbranchiales, duos digitos longas: duas in infimo ventre junctas, duos fere digitos longas, unum latas: unam post anum firma spina suffultam: sextam per dorsum extensam & bisectam; anterior eius pars sesquidigito longa, unum lata, triangularis, quam erigere & in rimam recondere potest, mollis & translucens, altera pars usque ad caudam fere porrecta, tres digitos longa, semidigitum lata, itidem mollis. Septima est cauda, duos fere digitos longa, sesquidigitum lata, figura pentagoni cuius basis inserta in corpus.

2 3 Squa-

Squamas habet toto corpore argenteas, splendentes, mediocris magnitudinis : in dorso viridis & aureus color transplendet. Pinne argenteæ & in medietate exteriori aureæ. In quolibet latere linea tendit paulum elata, etiam argentei coloris ut reliquum corpus.

Edulis est & boni saporis.

Idem lib. 4. 6. 5. **TAMOATA**, Lusitanis foldido (quia armatus) piscis fluviatilis seu aquæ dulcis, edulis. Longitudo corporis ab occipitio ad initium caudæ trium & semis digitorum; longitudo capitis unius digiti; latitudo paulo major. Crassities corporis; ubi maxima, nimirum post occipitiū, trium, circa caudam duorum. *Caput* latum ranæ ferme modo; os haud amplum; ad cuius quodlibet latus filum habet unū digitum longum instar barbæ, os edentulū. *Oculi* minimi crystallini, magnitudine seminis papaveris, circello aurato cincti. *Pinnas* obtinet octo; ad quamlibet branchiam unā, digitum longam, firmam instar cornu in uno latere, directe à latere protensam: duas in infimo ventre, non ita firmas ac eiusdem magnitudinis: unā in medio dorso, alteram in eodem dorso prope caudam, minimā: unā parvam in infimo ventre prope caudam & octavam pro cauda, digitum longam & latam. Totum caput superius tegitur testa dura instar clypei: & universum corpus vestitum est lorica ex oblongis squamosis corporibus composita: suntque hæc corpora per ambitum minutissime serrata & quadruplici ordine tota lorica disposita: id est, coeunt partes seu squamæ loricæ in utriusque lateris medio, in dorso & in infimo ventre. Color totius piscis obscure ferreus, præsertim in capite. Carne bona est.

Piscis hic aqua carens in fluvio ubi est, tempore sicco, per terram abiret aquam quærat.

Idem lib. 4. 6. 6. **Acara Pinima**. Piscis est latus, dorso incurvato, sex aut septē digitos longus, quatuor latus, ubi latissimus, parvi Carpionis figura aut verius Percæ misnicæ. Os habet haud amplum, denticulos minutissimos: oculos satis ma-

gnos pupilla nigricante transplendente, circulo rubro, fusco & albo: *Pinnas* septem; unam per totum dorsum extensam & continuam versus anteriorem unum digito latam, versus posteriora latiore: huius pinnæ medietas anterior spinis suffulta est & illam in rimam potest recondere: post branchias in utroque latere unā duos digitos longam, haud latam, in medio ventre duas junctas semidigitū ferme longas firma spina sustentatas: inter anum & caudā inferius itidem unam firma spina munitam: Septima pro cauda est furcata, plusquā sesquidigitum longa, totidem lata.

Torus vestitur squamulis argenteis ex auro splendentibus: in quolibet latere septē magnas habet strias secundum longitudinem ad caudam usque extensas, coloris fusci splendentis (in quibusdam aurei seu lutei) à summo item capite per utrumque oculum ad extremitates oris, in quolibet latere capitis lata stria nigra descendit, ad cuius orā aliquid cerulei admixtum est. Ultra harum striarum exortum in dorso, nimirum ubi pinna dorsi initium sumit, itidem per quodlibet latus descendit nigra stria usque ad exortum pinnæ lateris seu oram branchiarum. Omnes pinnæ & cauda coloris sunt lutei seu aurei splendentis. Capitur in mari inter scopulos: & est edulis atque boni saporis.

Pira Pixanga, Belgis *Gatvisch*/ quia in initio antri inter scopulos degit in mari. Longus est novem digitos, ab initio oris ad exortum caudæ. *Cauda* duos digitos longa. Os sesquidigitum amplū, minutis sed acutissimis denticulis præditum. *Caput* haud magnum: oculi magni, prominentes, pupilla coloris instar Turcoidis optimi, circulo nigro, cū aureo & sanguineo mixto. Branchiæ in triangularem figuram desinunt, ampla & acuta spinula præditæ. *Pinnas* habet septem: unam per totius dorsi longitudinem extensam, unum ferme digitum latā, & in postica parte latiore, cuius prior medietas undecim firmis spinis sustinetur, posterior est mollis.

Post

Post branchias in utroque latere unam, duos digitos longam & totidem latam, subrotundam & carnosam: duas junctas in medio pene infimo ventre, unica spina singulas firmatas: unam mediocrem post anum spina munitam. Septima est pro cauda, duos fere digitos longa & totidem lata, non secta sed extremo ambitu subrotunda. Tegitur squamulis parvulis per totum corpus, ad tactum glaber nisi à cauda versus caput digitis fricetur. Totum corpus, caput, pinnae, cauda ex albo flavescunt: & per totum variegantur maculis sanguinei coloris diluti, rotundis, magnitudine seminis canabis: quaedam etiam in ventre majores. Pinnae eodem modo maculae in ambitu suo obscurius rufescunt. Figuram fere Auraræ habet. Edulis est ac boni saporis.

Captus per trihorium extra aquam potest vivere: bihorium postquam mortuus esset, aperiebam illum & cor adhuc movebatur exemptum: cor situm erat statim post fauces, & aspera arteria in id inferebatur, eratque digitum remotum à reliquis visceribus per mediastinum; minimum utique & vix granum tritici æquans etiam quando spiritu inflatur.

CAPUT VI.

*De Vubarana, Capeuna, &
Acarapitamba.*

TAB.
XXXIII.
r. 2. 3.
Idem H. B.
lib. 4. c. 7.

VUBARANA. Piscis figura corporis Trutæ nostrati similis, ubique ferme æqualis crassitie, paulum tamen in dorso exaltatus, versus caudam autem angustior. Corpore oblongo, quadratè cylindræo: pedalis longitudinis, semipedem crassus. Caput acuminatum seu coactum, haud magnum: oculi stufæri magnitudine, pupilla nigra, circulo primum aureo, exterius argenteo: Os edentulum & lapis illi pro lingua. In medio dorso unicam habet pinnam duos pene digi-

tos longam, unum antèrius latam, trapezii figura, non tamen duris spinis firmatam. Post branchias in quolibet latere versus inferiora parvam pinnam oblongam & angustam obtinet & duas tales laterales ad infimum ventrem è regione dorsalis: prope anum unam parvam. Cauda constat pinna furcata instar harengi plus duobus digitis longa. Squamulae habet ordine linearis secundum longitudinem corporis positas, ita affabre ut ad tactum quæqua versus glaber videatur. Supernè si aspiciatur olivacei est coloris, ateminus aut laterali ter si intuearis plane argenteus ac splendens videtur, & dorsum carulescit ex argenteo: venter plane albus: branchiæ ita glabræ sunt ut laminæ argenteæ videantur.

Affatus boni est saporis, nec opus est desquamare: coctus non ita commodus ob multitudinem spinarum per carnem dispersarum.

CAPEUNA. Piscis corpore oblongo non lato qui in septem digitorum longitudinem excrescit. Os illi obtusè acuminatum; habetque in superiore atque inferiore mandibula unam seriem minimorum denticulorum: tota cavitas oris cum lingua sanguinei coloris insignis: Oculi illi parvi, stufæri magnitudine, crystallini, circulo partim argenteo colore variegato. Pinnae obtinet septem; in quolibet latere post branchiam unam oblongam, tenuem quasi triangularem: duas triangulares in infimo ventre; unam post anum firma spina munitam: unam per dorso longitudinem excurrentem, cuius anterior medietas spinis munita, quem recondere potest; posterior mollis & sine spinis: cauda bicornis, molli pinna, Tegitur squamulis parvis argenteis, in quibus aliquid aurei transplendet. In quolibet latere habet duas lineas crassas aurei coloris, unam à summitate oris per oculos & medium latus tendentem ad caudam, alteram magis superius per dorso latum pergentem. In summitate capitis livescit. Pinnae omnes sunt cineræ: Venter albus ut & eius pinnae.

Co-

Coctus boni est saporis. Capitur in mari inter scopulos.

Idem. Lib. 4. cap. 8. ACARA PITAMBA, Piscis oblongo corpore ut nullus seu barbus, in duorum pedum aut etiam maiorem longitudinem excrescit: Os habet minutum & dentes: Oculos amplos, pupilla crystallina, circulo miniato: Pinnae septem; unam à summitate dorsi tendentem ad exortum caudæ ferè, spinis suffultam, digitum latam aut paulo amplius: postquam libet branchias unam tenuem & longam; subtus in ventre duas junctas, & prope anum unum: cauda constat pinna quinque digitos longa, quæ in duo obliqua cornua desinit. Squamis totus vestitur modo Carpiois, eleganter ex purpureo cæruleis. In utroque latere in medio ab oculis ad caudam tendit linea sesquidigitum lata; aurei coloris, per totum autem dorsum & latera usque ad hanc lineam puncta aurea majuscula habet: sub linea in lateribus subtiles lineas aureas seu flavas, secundum longitudinem. Venter albicat. Pinnae laterales & ventris ex albo flavescunt. Dorsalis pinna & tota cauda aurei sunt coloris.

Optimè sapit assatus, & melius quam coctus. Pinnae ejus lucent noctu. Capitur in mari.

Hic piscis à crustaceo quodam animalculo vexatur, sesquidigitum longus, digitum crasso, figuræ oblongæ, ut cauda Gammari & eodem modo formato & crustato: constat autem septem juncturis, & habet quatuordecim brevia crura, unguiculis acutis prædita, in quolibet latere septem: antè corpusculum paululum ampliatur. Corpus molle est sub crusta instar cochleæ lente cute obductum: nec oculi nec os apparent. Hoc animalculum omni pisci se ingerit & unguiculis suis arcte faucibus inhæret, nec unquâ piscis se ab illo liberare potest. Postero die

adhuc vivebat capto pisce & pridie mortuo; in totum albi est coloris.

33

CAPUT. VIII.

De laguacaguare, Curimata, Tareira, d. Alto, & Tareira de Rio.

LAGUACAGVARE, Lusitanis *Iaque-Tab. XXXIII. 4.5.6.7. Idem lib. 4. c. 8.* ta, id est, interula, à colore, quæ nigritæ ejusdem coloris amiciuntur. Piscis instar Percæ nostræ latus & obrotundus, ad summum octo digitos, quinque aut sex latus; Os habet parvum, cum minutulis dentibus ordine digestis: Oculos mediocres crystallinos, circulo fusco: Pinnae, porro, septem, unam à medio dorsi ad exortum caudæ protensam, spinis suffultam, anteriore quidem parte semidigitum latam, posteriori latiorè & trianguli figuram desinentem. Duas postbranchiales, duas in inferiori ventre; unam post anum latiusculam: caudam denique duos digitos longam, parallelogrammi figuræ, quæ in duo cornua desinit. Squamis vestitur, instar percæ, majusculis; quæ è cinereo cærulescunt. A dorso autem per latera latæ lineæ descendunt ad ventrem nigrae, in quolibet latere quinque. Superius caput quoque nigrescit; venter verò albescit atque erubescit. Pinnae omnes è cinereo cærulescunt & quodammodo nigricant versus extremitates. Tota denique cauda nigra est. Edulis est piscis.

Haud malè convenit cum Mormyro Gesneri, nisi quod Icon in eo differat; quod in Mormyro Gesneri plures lineæ nigrae vel pullæ à dorso ad ventrem per latera descendant.

CURIMATA. Piscis Carpiois figuræ, colore, carne valde similis: sesquipedem longus, quatuor & semis digitos latus: capite Carpiois, ore rotundo & edetulo: corpore oblongiori, & squamis majusculis. Pinnae habet septem præter caudam; nimirum duas postbranchiales, duas in medio ventre inferiori, unam post anum, & unam plane parvulam parallelogrammâ huic oppositam in dorso; unam denique in medio dorso, magis longam quam latam. Totus piscis coloris est argentei ut Carpio; & ejusdem saporis. Non capitur nisi in dulcibus aquis.

T A -

Vubarana.

1

Capcuna.

2

Acarapitamba.

3

Iaguacaguare.

4



5

Curimata.

Tarcira. de Rio

Sêu fluvialilis.

6

Tarcira.

7

8

Piratiapia.

Guamaiaçu Guara

9

Ceixupira.


10

Guaracapema.

11

Mitupira & Pinbebe.

12



Idem H. B. lib. 4. c. 9. TAREIRA d'ALTO, id est marinus, piscis tereti corpore, decem digitos longus (reperiuntur & maiores) quinque; crassus, ubi crassissimus, nam versus posteriora sensum minuitur. *Caput* habet colubrinum, supra oculos in duo tubera elatum: oculos pupilla nigra, circulo flavescente; os acuminatum satis amplum, interius flavum denticulis acutissimis munitum, quales & lingua habet. *Pinnas* obtinet octo, nimirum in quolibet latere post branchias unam, uno plus digito longam, trientem latam, directe à latere protensam: post has interstitio pene sesquidigiti in infimo ventre duas junctas figura trapezii, duos digitos longas & totidem fere latas in extremitate: versus caudam in infimo ventre unam duos digitos longam in corpore extensam, sed plane angustam, supra hanc in dorso parvula est instar cuspidis culcelli: in medio dorso una pene quadrata, duos digitos lata, plus uno longa: Octava est cauda vix sesquidigiti longa & furcata. *Pinna* a. instar foliorum papaveris sunt tenues, & mollibus spinis sustentantur. *Squamulis* vestitur peltatis, ita affabre compositis ut ad tactum glaber videatur. Venter totus albicat: latera & dorsum secundum longitudinem lineas habent alternatim flavas & virides. *Ore* squamularum circum circa brunneae sunt, & videntur quasi rhombi ordine positi essent brunis lineis circumscripti, & ac si per unum ordinem tenderet linea, flava, per latera viridis. *Pinna* in dorso secundum longitudinem strias habet brunas reliquae flavas. *Cauda* itidem striata brunno. *Caput* superius maximam partem brunnum. Piscis assandus, nam coctus non ita bonus est. Sapore autem multo antecellit Tareira do Rio, qui multas habet spinas.

TAREIRA do Rio, i.e. fluviatilis, oblongo corpore, dorso recto, ventre paululum protuberante: inferior illius mandibula longior superiori: dentes habet acutissimos & inter eos duos longiores in medio inferioris mandibulae & quatuor tales in superiore: mordet vehementer: *Oculi* satis magni, prominuli, pulchri, pupilla atra,

cetera nigri. *Caput* Lucii capiti parum simile. Longus est piscis quindecim aut sedecim digitos. *Pinnas* habet sex: nimirum duas oblongas post quamlibet branchiam unam, duas junctas oblongas in infimo ventre, unam post anum parallelogrammi figura; unam in medio dorso magnam, rectam, parallelogrammam, plus tribus digitis longam, duobus latam. *Cauda* parallelogramma pinna constat, duos & semis digitis longa, sesquidigiti lata, in extremitate circinata. Totus tegitur squamis satis magnis, fuscis in dorso & lateribus; verum in lateribus fuscum argenteo est variegatum, ut ita per fuscum argenteum videatur. *Caput* tegitur dura testa fusca. Venter totus albicat. *Pinnae* omnes fuscae, sed nigro undulatae transversum ut Nisi cauda: itidem & cauda. *Capitur* in fluviis. *Edulis* est, sed multas habet spinas.

CAPUT VIII.

De Piratiapia, Ceixupira, &

Piquitinga.

PIRATIPIA piscis est oblongo corpore & satis crasso, interdum tantam magnitudinem acquirit ut quinquaginta libras aequet: *Oris* pars inferior longior superiori. *Denticulos* habet acutos, inordinate positos & tota oris cavitas cum lingua est rubra. *Oculi* prominētes, pupilla crystallina ovali & circulo rubro. Ante utrumque oculum habet foramen. *Branchiae* desinunt in triangular. figuram, & sunt amplae. A summitate dorsi ad caudam usque extenditur pinna, quae ad medietatem anteriorem spinis surrigitur, reliqua medietas est mollis. In inferiori corpore prope anum etiam pinnam mollem habet obrotundam: in quolibet latere post branchias unam, & duas in infimo ventre junctas, oblongas. *Cauda* fere quadrata est, at in extremitate paulo latior quam in exortu. *Squamis* vestitur parvis. *Dorsum* & infimus venter cinnabarii sunt coloris, latera ex gryseo fuscescunt.

In totum praeterea est maculatus, & in dorso quidem maculas habet maiores

res nummo misnico, ex gryseo fufcas, in lateribus vero & infimo ventre minores eiusdem coloris. *Pinnæ* omnes cinnabarii coloris, in extremis oris lineam albissimam habentes, adque eam fimbriam latam nigerrimam. Postbranchiales *pinnæ* totaliter cinnabariæ sunt sine fimbria nigra aut alba. Dorsalis *pinnæ* medietas anterior tota rubra, reliqua fimbriata albo & nigro ut reliquæ. Optimi saporis carnem habet si coquatur.

CEIXVPIRA, acquirit interdum longitudinem novem ac decem pedum, atq; crassitiem corporis humani corpore oblongo & capite atq; figura corporis Tuberoni haud absimilis. Quem describo tantum duos pedes erat longus cum semisse. Erat illi *caput* compressum & latum, septem digitos longum & fere quinquelatum: *Os* haud in amplum pro mole corporis, parabolicæ figuræ, edentulum, prominentis tamen acutissimis confertim repletum: lingua lata: oculi albi haud magni, paulo maiores duplo stufero Hollandico, pupilla crystallina. *Branchias* habet satis amplas: *Pinnas* septem, nimirum post quilibet branchiam unam, directe à latere protensam triangularem, semipedem longam, duos & semis digitos latam, ubi latissima. Interstitio ferè sex & semis digitorum ab occipitio in medio dorso incipit pinna quatuordecim digitos longa, in initio triangularis, & quatuor digitos alta, hinc sensim minuitur & ad caudam ferme pertingit, ibiq; triangulo desinit. Huic opposita est eiusdem figuræ una in infimo ventre, undecim digitos longa, desinens cum superiore, sed non cum illa incipiens. Infra duas postbranchiales in infimo ventre duas habet junctas, quamlibet tres & semis digitos longam & sesquidigitum latam. Septima pinna est cauda, incipiens duorum digitorum interstitio à fine dorsalis & ventris, bicornis, superius cornu fere octo digitos longum, inferius paulo brevius, nimirum septem digitorum. *Pinnæ* omnes anterieus spinas habent, sed molles. In interstitio inter occiput & dorsalem pinnam, octo osseos triangulares aculeos pro-

minentes obtinet, quos recondere in carne & erigere potest, ac pro armis usurpare. Ante quemlibet oculum, intervallo unius digiti foraminulum habet duplex. *Caput* osseum & glabrum. Totum corpus exiguis squamulis vectitur, ita ut totus piscis glaber videatur. Colore totus est niger, excepto tamen ventre, qui albissimus instar cretæ; in lateribus (inter album & nigrum) paululum canescit nigredo, cætera, ut dictum, nigerrima. *Pinnæ* omnes nigrae, exceptis duobus infra postbranchiales in infimo ventre quæ albæ sunt, oris nigricantibus. In utroque latere piscis linea quædam profundior reliquis squamulis tedit ad caudam usque eiusdem cum corpore coloris.

Piscis gravis ac pinguis est, ac pro optimo habetur inter omnes in Brasilia, præsertim quando adhuc medio; crise est magnitudinis. Capit. in Mari.

PIQVIRINGA est duos, aut paulo Idem l. 4. plus digitos longus, figuræ pene ut *Parabucæ* à quo non multum differt ut dicam. *Os* habet parvulum, sed quæ ample aperire & rotundare potest: *Oculos* satis magnos, nigros, circulo argenteo: branchias amplas: pinnas sex & septimam pro cauda: nimirum duas postbranchiales, triangulares, inferius positas: duas junctas in medio infimo ventre: unam triangularem in medio dorso, unam post anum: cauda constat pinna furcata. Color capitis argenteus splendens superius olivaceo imbutus. Tegitur squamulis albis, in dorso tamen olivaceus color translucet. *Pinnæ* omnes albæ. Differt à *Piabucu*, quod ille paulo maior evadat, & linea illius lata non splendeat, cum reliquum corpus splendeat, quod in hoc contrario se habet. *Piabucu* etiam pinnam habet in dorso prope caudam, qua hic caret. Cæterum caro similis, edulis.

CAPUT IX.

De Camuri, Guaracapema & Muivipera.

CAMVRI Lusitanis *Robalo*, piscis est TAB. duos pedes longus. Lupo nostro XXXIII figura corporis similis atque etiam ore, Idem lib. 4. cras. c. 10. & 11.

crassus plus unopede, ubi crassissimus: *caput* sesquipedem pene longū: *os* semilunare, in medio paulum acuminatum, sex digitos longum, sed quod magis dilatare atque rotundare potest, ita ut circumferentia eius fiat tredecim digitorum: *oculos* habet dupli stufieri magnitudine, pupilla crystallina, circulo aureo: *Pinnas* octo; nimirum duas in dorso, priorem tres digitos longam & paulo plus latam, firmis spinis sustentatam, quam in rimam recondere potest: alteram huic magnitudine parem, sed spinis destitutam, ne habentem quo condatur: duas postbranchiales, paulo plus tribus digitis longas, duas in infimo ventre quatuor digitos longas, duos & semis latas, unam talem post anum; octavā pro cauda, quæ est furcata, quinque digitos longa, sex lata. *Squamas* habet ut Carpio, coloris argentei, splendentes, in dorso autem & lateribus aureus admiscetur. Venter plane albicat: *Pinnæ* sunt aurei coloris, quibus aliquid fusci admixtū est, in quolibet latere superius à fine branchiarum usque ad medium exortus caudæ, ductam habet lineam crassam, nigram.

GVARACAPEMA mas est Doradæ. Piscis compresso corpore & latus, licet non ita crassus. *Caput* definit in figuram quadratam, estque in fronte ita in aciem eductum, ut facilius fluctus maris natando secare posset. In sex aut septem pedum longitudinem excrescit: latitudo sive altitudo, ubi maxima, nimirum versus anteriora & pone caput, sesquipedalis. *Os* habet haud ita amplum, pro magnitudine corporis, mandibulas compressissimas, denticulos acutos. Paulo supra os & quidē versus eius interiora oculi positi inferiori loco, ne nimirum in aquis imperiose ageret, qui alius lineus. *Oculi* autē sunt magni, rotundi, pupilla crystallina, ceterum argentei coloris. Branchias habet amplas: *Pinnas* septem, nimirum unam insignem à summitate capitis per totū dorsum extensam usque ad caudæ exortum, latam in medio septem aut octo digitos, quæ sensum minuitur, constans

membrana ad tactum coriacea, & spinis mollibus interius sustentata: hanc natās in æquore erectam tenet. A medietate infimi ventris ad caudæ initium itidem pinna producitur, sed vix unum digitum lata, in exitu triangularata: post utramque branchiam pinnam habet oblongā octo vel novem digitos: sub his in infimo ventre duas propinquas paulo longiores. *Cauda* circiter sesquipedem longa in duō cornua ampla distenditur. Squamulis minimis vestitur totus, quæque ad tactum vix sentiuntur; ita ut glaber videatur. Color in capite, dorso, lateribus ex viridi & argenteo mixtus, uti & in pinis, in ventre vero albicat. Per totum autem corpus (nimirum latera, dorsum, caput) maculis variegatus cæruleis, variæ magnitudinis, milii, grani hordeacei, erui. Carnem habet siccam, boni saporis.

Velocitate natandi superat porcos marinos, & eodem modo saliendo progreditur. Vescitur pisce longo vulgo *Petumbo* appellato.

MIIVIPIRA & *PIRABEBE* Brasiliensibus, *Peixe volador* Lusitanis. Piscis est volans, vel hirundo piscis: variæ est magnitudinis: maior erat *Halece*, quem hic describo, & formæ rarioris. Figurā corporis habet (instar *Zadæ* Pomeranorum) teretem & posteriora versus acutiorem. Totius longitudo ab ore ad finē caudæ tredecim digitorum; crassities, ubi maxima, nimirum circa exortum alarum, septē fere digitorum, ad exortum a. caudæ duorum. *Caput* crassum habet, superius compressum & latum, nimirum superius fere duos digitos & quasi in tubera supra oculos elatum, os non ita magnum, edētulum, at ossa eius paulum ferrata instar limæ. *Oculi* magni, rotundi, stufero Hollandico equales, pupilla nigra, circulo flavo, & exterius altero fusco. *Pinnas* habet sex cū cauda; duas in dorso, unam parvulā in medio, paulum tamen versus anteriora, alterā post hanc duos digitos longam, sesquidigitum latam, tenuē, at octo spinis sustulā; duas robustas in infimo ventre, subter illa, duos & semis digitos longas, firma spina cō-

stantes sed angustas, & unam parvam in inferiore corpore ex opposito maioris in dorso; septima est cauda, duos digitos longa, totidemq; lata & furcata. Præterea habet duas alas magnas, in quolibet latere unam, habentes ex ortu suum sesquidigitum fere post oculos, post branchias paulum; estq; alarum longitudo septem digitorum, latitudo in exortu plus uno, in extremitate sex digitorum: constant alæ tenui membrana instar chartæ puræ (Postpapier) ex albo seu cinereo subfusci coloris: habent a. aliquot pliacas & sustentantur spinis tenuibus per longitudinem extensis. Ad utramq; alam in initio eiusdem parva quasi ala exit, duos & semis digitos longa, sed planè angusta & sua spina munita. Totum caput cum initio dorsi (ab ore nimirum ad quinq; digitos numerando) vestitur testa ossea, dura, quæ versus suum finem dupliciter divisa in duos aculeos definit quasi spinas. *Branchiæ* a. ad duos digitos extenduntur in aculeos usq; sub alis. Totum a. corpus vestitur squamulis elegantibus, ordine dispositis, quæ in ventre triangulares, in lateribus & dorso verius ellipticæ figuræ. In ventrea. ita dispositæ sunt ut piscis ad tactum glaber videatur: at in lateribus & dorso quælibet in sui medio habet tuberculum, ita ut ordine naturæ dispositæ in recta linea, repræsentent lineas rectas, elatas, tuberculatas. In toto ventre albicat, in lateribus & dorso subfuscus, & splendens ut Harengus. Spine quæ alas sustinent, & per eas extenduntur etiam albicant. Alæ ipsæ ex cinereo fuscescentis sunt coloris, maculis, nigricantibus variegatæ. Volat hic piscis super aquas instar Hirundinis per spatium quantum sclopeto pertingi potest: nimirum usq; dum siccescat alæ, tunc n. iterum aquæ se immittit alas humectandi gratia & denuo volat. Natura a. huic pisci alas dedit, ut se salvare posset, dum hostis eius Dorada magna caterva ipsum persequitur. Sæpissime mille eorum simul volantes vidi in Oceano Tropicis interiecto: interdum etiam volando incidunt in naves, ut nobis etiā factum memini. Caro boni est saporis cocta. Actum &

de Hirundinibus superius, sed quia huius Icon ab illis diversa, addere & hanc placuit.

CAPVT X.

De Guaibi Coara, Guaperua & Piraya.

GV A I B I COARA Brasiliensibus, TAB. *Buraco de Velha* Lusitanis; Piscis est XXXIV. corpore latiusculo: dorso elevato & *Marogr. H. Brasil. l. 4. c. 12.* a capite arcuato, duodecim aut quatuordecim digitos longus, quatuor latus, ubi latissimus. Caput & os acuminatum, satis amplum, habens in utraque maxilla seriem minimorum denticulorum, linguam conspicuam; quæ una cum cavitate inferiori oris, sanguinei est coloris: Oculi stuferti magnitudine crystallinos, circulo coloris ex aureo & fusco mixti. *Pinnas* obtinet septem, nimirum post brachias in quolibet latere unam, quasi triangularem, mollem: in infimo ventre duas junctas: unam post anum duplici spina munitam: per dorsum a. una extenditur, cuius medietatem anteriorem undecim spine erigunt, quam recondere potest in cute, posterior medietas mollis & sine spinis. *Cauda* constat pinna bicorni, & parallelogrammi figura à corpore extenditur. *Squamæ* habet mediocres, instar Percæ, argenteas, quæ per oras sunt melini coloris, & aspectu referunt meros cubos: in occipitio & dorso summo squamæ ex argenteo carulescunt, & per oras idem sunt melini coloris. Totum a. caput superius & ad latera est aurei coloris, striis caruleis secundum longitudinem variegatum. Pinnæ omnes melini sunt coloris, exceptis duabus in infimo ventre, quæ magis albescunt: *platus* a. utrumq; versus dorsum secundum longitudinem tendit linea melini coloris ad caudam usq; Piscis boni saporis coctus: capitur in mari inter scopulos.

GV A P E R V A Brasiliensibus, *Peixe Porco* Lusitanis, Græcis *νάρθη* (G). Ab ore ad initium caudæ quindecim digitos longus, in medio ubi latissimus, octo latus: corpore paulum compresso ac lato: dorso arcuato, ventre adhuc magis curvo: capite porcino: dentibus caninis, albis, longis; octo in qua-

qualibet mandibula, duo medii tam inferius quam superius longiores sunt reliquis: dentes inferioris mandibulae aliis quasi brevioribus sustentantur. *Os* subrotundum, angustum: quatuor fere digitorum interstitio ab ore superius sunt oculi, sesquidigitum à se invicem distantes, maiores grosso misnico (& ante eos quasi vestigium foraminis) pupilla crystallina, circulo aureo maculato cæruleo. Branchiarum loco rimam habet duos digitos longam, plus uno latam. In dorso tres penè digitos post oculos, duo habet cornua, unum pennam olivineam crassum, tres digitos longum, quod versus posteriora paulum inclinatur, alterum parvum per membranam alteri adnexum, utrumque in rimam recondere potest demissum. Trium & semis digitorum intervallo post hæc pinna est, in initio fermè triangularis, hinc magis magisque angustatur ad caudam fere, quinque digitos longa, initio paulo plus duobus lata: & è regione in infimo ventre talem, initio duos & semis digitos latam, magis magisque arctatam versus caudam. *Cauda* quadrata figura à corpore extenditur, & pinnam habet quatuor digitos latam, duos longam, quæ in duo cornua dilatatur, ut totius longitudo sit quatuor digitorum. In medio inferioris corporis parvam habet pinnam & ante eam cornu sesquidigitum longum. *Pinna* omnes sustentantur spinis & sunt cærulei coloris; venter albicat. Squamis vestitur elegantibus, in superficie sua punctulis thalassinis cum cæruleo indico umbratis, in dorso magis cæruleis. Ab oris summitate in utrumque latus ad pinnas postbranchiales, semilunari figura, duæ lineæ crassæ cæuleæ, unius digiti intervallo, ducuntur. Comeditur assatus, coctus non valet.

Dedimus huius & in superioribus descriptionem, sed quæ cum isto non convenit.

PIRAYA & PIRANHA Brasiliensibus: Piscis pedalis longitudinis, lato corpore circiter sex digitos,

ubilatissimus: dorso incurvato, capite obtuso ut Dorada. *Oris* hiatus parabolicus, quod exactè claudere potest, habet labia parva quibus dentes tegit, obtinet enim tam superius quam inferius ordinem dentium triangulorum, alborum, acutissimi morum, quatuordecim in qualibet mandibula (minores habent duodecim) quibus uno morfu partem carnis ex quacunque parte hominis potest abripere quasi novacula esset abscissa: Si quis ingrediatur aquam vel saltem immittat pedem vel manum, statim ab illo lædi potest, ita sitiens est sanguinis & cupiens carnis humanæ, quare caute ab illo cavendum. *Oculi* habet rotundos, parvos, crystallinos pupilla nigra, & inter illos duo foraminula seu spiracula: branchias amplas, exteriores duras & ossæas: sex pinnas & septimam pro caudâ; duas nimirum postbranchiales paulum e-latas à ventre infimo, duos digitos longas, unum latas: in medio infimo ventre duas junctas parvulas, vix unum digitum longas & angustas: è regione harum in medio dorso incipit pinna, & ad duorum & semis digitorum longitudinem extenditur versus posteriora, paulo plus uno digito lata: duorum autem digitorum interstitio à parvulis in infimo ventre incipit pinna firma spina antè munita, cætera mollis & maximam partem squamulis tecta & paulo plus duobus & semis digitis longa, extenditurque ad exortum caudæ, unum digitum lata: exortus caudæ sesquidigitum longus, ipsa bicornis, & quodlibet cornu in exitu arcuatur. *Squamulis* tegitur: tota summitas capitis dorsum & latera usque eo si linea ducatur à postbranchiali pinna ad medium pinnae squamosæ, coloris est cinerei diluti cum paucis cæruleo mixti, ac squamula quælibet fimbriam habet ignei & cærulei coloris transplendentis, reliquum laterum seu inferior pars & venter coloris sunt flavi obscuri, ut & capitis inferior pars, ac pinnae postbranchiales & omnes infimi ventris.

Pinna dorsalis & cauda coloris est è cinereo cæruleo.

Edulis est, & carnem habet albissimam, paululum siccam & boni saporis. Sæpius comedi. Hæc species maximè gaudet cænoso fluvij fundo.

Pyraya alia specus hic reperitur magnitudine & figura plane similis priori, excepto quod parvulam adhuc pinnam habeat squamatam inter dorsalem & caudam, & quod colore differat: nimirum summitas capitis, totum dorsum & laterum superior pars eo usque si linea ducatur à pinna postbranchiali ad medium pinnae squamosæ, coloris sunt aurei cum cinereo mixti, & cæruleo transplendente.

Capitis inferior pars, reliquum laterum & infimus venter insigni colore croceo fulgent, cui aureus persplendet. Eiusdem coloris croceo aurei sunt pinnae postbranchiales & infimi ventris. Dorsales duæ & cauda cinerei diluti cum paucis cæruleo mixti, ut & dorsum.

Hæc species magis gaudet arenoso fluvij fundo. Edulis est ut prior.

Reperitur & alia *Pyraya* species alba, figuræ ut antecedentes, solum caput non ita obtusum, sed os paululum prominet figura conica: color ventris & laterum argenteus: dorsum & caput argentei coloris cum paucis cæruleo transplendente: pinnae omnes argentei coloris cum gryseo mixti.

Dentes habet parvulos triangulares ordine dispositos, nec ita mordet ut cæteri. Paulò minor quoque est reliquis speciebus, cæterum non minus edulis, quam illæ.

CAPUT XI.

De Amore Guacu & Guacari.

AMORE GUACU Brasiliensibus; in semipedis longitudinem excrescit; corpore oblongo, capite crassiusculo, branchiis amplis, minutissimis in ore denticulis: *Oculi* il-



li parvi nigri circello aureo. *Pinnas* habet septem: nimirum duas postbranchiales oblongas, quasi triangularis; duas sub his junctas; duas in dorso, anteriorem minorem posteriorem; & è regione posterioris unam in infimo ventre. *Cauda* oblongiuscula, parallelogramma, in extremitate circinata. Tegitur squamis pro sua magnitudine majusculis. Piscis in totum ferrei coloris, in ventre tamen paululum è ferreo albicat. Est edulis.

GUACARI, piscis subrotundo seu pyramidalis corpore, pedalis vel paulo majoris longitudinis; octo digitorum crassities, ubi maxima est. *Caput* inferius planum, lateribus elliptico describitur, superius subrotundum.



Os parvum rotundum habet subter in plano capitis: loco dentium in utroque latere processus habet quasi setis equinis factos: inferius labium explicatum, lunatum, membrana constans, quæ in lateribus oris in suis extremitatibus in cirrhum desinit, triennem digiti longum, qui cirrhi pro barba serviunt. *Oculi* parvi, rotundi, nummi mifnici magnitudine, cinerei fusco maculati, superne positi & inter quemlibet foramen, distans dimidium digitum ab oculo versus interiora. *Branchiæ* angustæ inferius versus & ante quamlibet proxime corpusculum parallelogrammum, semper ferme digitum longum, quod extendere & recondere potest, ita ut reconditum vix videatur. Continet illud corpusculum in extremitate denticulos acutos setaneos, quibus alios pisces pungit. Et post branchias in quolibet latere inferius ad planum, triangularem quasi pinnam, quatuor digitos longam pene, plus uno latam, oblongam, spina ossea in extremitate laterali sustentatâ & aliis minoribus secundum longitudinem discurrentibus: spatio autem sesquidigiti versus posteriora directè post has iâ descriptas, iterum duas inferius pinnas habet quadratas, in quolibet latere unam, duos & semis digitos longas, duos latas, eodem modo

TAB.
XXXIV.
4. 5.
Idem l. 4.
c. 13.

Piraia et Piranha.




Amore Guacu




Guaperua.


Guacari.



Piraunbu.




Acaraia.




Guariguaru.




Acara.




Cugupu. Guacu.




Piaba.



Maturaque.



Carapo.



modo spinis hispidis osseis sustentatas. Post anum in infimo ventre angusta est pinna, parallelogramma, duos digitos longa. In medio dorso pinna est, quatuor digitos longa, duos longa, spinis hispidis ordine dispositis sustentata, ac antè spinam dura crassiore suffulta, post hanc prope ortum caudæ superius parva quædam est pinna, membranosa, quæ antè corniculata spinam fulcitur. Cauda constat pinna tres digitos longa inferius, duos superius, bicornis, spinis firmis suffulta. Totum caput testæ vestitur dura ad tactum hispida: totum corpus squamis triangularibus, versus anteriora maioribus, ordine positis.

Sunt autem squamæ omnes ad tactum asperæ, quasi exculptæ, quælibet in sui medio extuberantiam habens: scilicet totum corpus lorica tum est, & quælibet pars loricae habet quatuor angulos, & in quolibet existit tuberculum, ita ut in quolibet latere sit quadruplex ordo tuberculorum. Color totius piscis croceus dilutus, in ventre saturior; ac per totum maculatur maculis rotundis, magnitudine seminis sinapi, fuscis. Maculae hæc in lateribus & pinnis paulo sunt maiores, in capite minores, ac in summitate capitis maculae ruunt quasi rivuli. Posterior medietas ventris nullas habet maculas. Pinnae omnes ut corpus coloratae & maculatae, excepta pinnula prope caudam, quæ constat membranula nigra, corniculata autem illius spinam crocea est & maculata ut reliquæ.

Diu vivit extra aquam, ad quinque horas. Editur defracta lorica, sed paucam habet carnem: intestina longissima, æqualis omnia crassitie, instar crassioris fili quo vela consuunt. Habebat unus piscis quindecim digitos longus, intestina viginti octo pedes longa, quæ dimensus sum.

Reperitur & hic *Guacari*, magnitudine & figura plane similis priori, qui in flumine S. Francisci capitur solo colore differens & bonitate carnis: est enim totus umbræ coloris obscuri, & per totum maculis adspersus

obrotundis, nigris, seminis sinapi magnitudine. Caro huius boni est saporis.

CAPUT XII.

*De Piraumbu, Acaraja &**Acara.*

PIRAUMBU Brasiliensibus; *Chay-quarona* Lusitan. Piscis Carpionis magnitudine & figura, decem digitos longus ab ore ad initium caudæ, paulo plus quatuor digitos latus, ubi latissimus: versus caudam angustior & æqualis latitudinis, duorum nimirum digitorum. Os habet instar Carpionis, oculos magnos prominentes, pupilla crystallina, circulo aureo cum albo mixto. Pinnas obtinet octo, nimirum unam in medio dorso, paulo plus tribus digitis longam & unam latam, quam in rimam recondere potest, & erectam novem firmis spinis sustentare: huic contigua est alia tres fere digitos longa, minus uno lata nullis innixa spinis: post utramque branchiam unam habet tres digitos longam, unam latam in exortu: in infimo ventre duas junctas, duos digitos longas, vix unum latas, firma spinam munitas; post anum unam, digitum latam, dimidium longam, itidem firma spinam sustentatam: octava est pro cauda, tres digitos longa, totidem lata & furcata. Squamas habet maiores, instar Carpionis, argentei splendentis coloris, pauxillo aureo mixti: quælibet autem squama mediam partem usque ab insertionem suam coloris est *feulie* mortis: sub capite & ventris prioris parte magis argenteus est. Omne pinnae dilute cinerei sunt coloris. In ore superius & inferius lapidem habet, denticulis minimis præditum, vix sensibilibus.

Edulis est ac boni saporis.

ACARAIA vulgo corrupte *Garranha*: Piscis qui trium pedum longitudinem adipiscitur, figura Carpionis. Dentes in inferiori mandibula habet acutos, instar acicularum: in superiori duos longos paulo crassiores, quibus interjacent minutissimi vix sen-

TAB.

XXXIV.

6. 7. 8.

Marcgr.

H. Bras. l.

4. 6. 14.

vix sensibiles. *Oculi* ipsi magni sunt, pupilla crystallina, circulo sanguineo primum, hinc argenteo. *Pinnam* longam habet per dorsi longitudinē expansam, cuius mediam partem versus anteriora spinis surrigere, & in rimam recondere potest: reliquas quinque pinnas communes habet cum aliis piscibus: septimā pro cauda, quæ lata & penè bicornis est. *Squamis* vestitur argenteis, mediocris magnitudinis, quæ sanguineo colore umbratæ sunt, ita ut maximā partem sanguineus videatur, argenteo colore transplendente; in ventre totus est albus, ut & sub faucibus. *Pinnæ* omnes sanguinei coloris, exceptis iis quæ sunt in infimo ventre, quæ albæ sunt, in extremitatibus tamen sanguineæ.

Edulis est piscis. Sale etiam conditur & servatur.

A C A R A piscis palmum longus, dorso curvo, & alto corpore ut *Perca*. *Os* habet angustum, & dentium loco limam. *Oculos* habet magnos, nigros, circulo aureo. *Pinnas* obtinet sex, nimirum sub qualibet branchia unam longam, triangulum acutum referentem: à summitate autem dorsi pinna extenditur, firmis spinis sustentata & in triangulum acutum prope caudæ exortum desinens. *Cauda* oblonga est, parallelogramma, in extremitate recta. Vestitur squamis satis magnis, argentei coloris, sed in capite, dorso, & lateribus ita umbra mixtis, ut fuscus videatur. Venter albicat. *Pinnæ* omnes & cauda fusci sunt coloris ex umbra. In medio quolibet latere magnam habet maculam nigram, ut & prope exortum caudæ.

Edulis est piscis, & capitur in dulcibus aquis.

CAPUT XIII.

De Guarū-Guarū, Cucupu-Guacu, & Maturaque.

TAB.
XXXIV.
9. 10. 11.

GUARU-GUARU pisciculus est minutus, nunquam maior sesqui

digito, exili corpore, oblongo, instar minimi *Eldris*. Capitulum habet compressum: ocellos nigerrimos, circulo aureo: pinnulas quinque, nimirum duas postbranchiales, & duas subtrus ferè in infimo ventre, & unam in posteriore medietate dorsi. *Cauda* constat pinna parallelogramma, in extremitate circinata. Vestitur squamulis, & totum caput superius, & dorsi anterior medietas sunt fusci coloris, posterior & latera aurei, squamulis umbratis umbra: caput inferius & venter albi splendentis ut mater perlarum, pinnulæ flavæ. Prope caudam utrimque maculam habet nigram.

Edulis est & capitur in lacubus & stagnis.

CUCUPU-GUACU Brasiliensibus, Lusitanis *Meros*, Belgis Iacob *Evergen*: ingens fit piscis: habui, inquit Marcegravius, quorum corpus cum capite quinque pedes erat longum & cum cauda sex. Corporis ambitus quatuor pedum, octo digitorum, altitudo unius & semis. *Caput* & *Os* magnum habet, quod apertum in rotundum dilatat, edentulum: oculos mediocres, pupilla crystallina nigricante, circulo flavo: *Branchias* in ambitu rotundas, medio autem in triangulū desinentes: *Pinnas* quinque, nimirum unam à summitate dorsi incipientem & non ita longe à cauda desinentem, ad anteriorem partem seu medietatem plane angustam & acutis spinis munitam; posterior autem medietas lata est, & semilunata in ambitu, spinisque haud firmis erigitur: prope anum unam eiusdem figuræ, cum medietate posteriore dorsalis, sed dimidio minorem: Post brachias prope infimum ventrem duas longas & latas, tenuioribus spinis intertextas. *Cauda* magnam pinnam habet quadratam, in extremitate latiorē, quam in exortu. *Squamas* habet parvas. Totum caput, dorsum a latera cinerei sunt coloris, cum umbra mixti, & versus dorsum paulo saturatioris. Venter albicat. *Pinnæ* omnes cum cauda dilute brunneæ. Per totum caput, dorsum, latera & pinnas post-

Idem l. 4.
c. 14.

postbranchiales maculæ parvæ nigrae, seu puncta frequentissima dispersa. Venter verò & reliquæ pinnae cū cauda his punctis carent. Bonam habet carnem. Capitur in mari.

MATURAQUE piscis est corpore oblongo, & fermè parallelogrammo, figura scilicet *Tamoate*, Quinque aut sex digitos longus, sesquidigitum latus ubi latissimus. *Caput* habet latiusculum, dura testa tectum. Oris pars inferior paulò longior superiori: & in inferiori sex denticulos acutissimos habet, in superiori aliquot minimos: Branchias satis amplas: oculos rotundos, nigros, circello aureolo, exterius fusco: Pinnas sex, nimirum duas postbranchiales oblōgas, haud latas: duas tales in medio infimi ventris, & unam post anum trapeziji figura, & similem in medio dorso. Cauda constat pinna quadrata, unum ferè digitum longa, in extremitate circinata. Tegitur magnis squamis ordine positis. Totum caput superius, dorsum & latera nigra sunt, venter ex albo obscurè canescit. Pinnæ omnes nigrae.

Capitur solum in lacubus & paludibus, non in fluviis. Boni saporis est.

CAPUT XIV.

De Carapo, Piaba, Piabucu,
& Nhaquunda.

TAB. XXXIV. 12. 13. Marcgrav. 1. 4. c. 15.

CARAPo prima species, corpore oblongo figura cultri, dorsum nimirum crassum & obtusum, venter acutus ut culter: posterius autem corpus definit in acumen: unum pedem circiter longus, duos digitos latus, ubi latissimus. *Caput* acuminatū, sed compressum, inferius labiū paulò longius superiori, os angustum, inferius ordinem denticulorum minutorum, superius nullos habet. *Oculi* minimi, nigri, vix grani papaveris magnitudine. Branchiæ angustæ, & post quamlibet parvula pinna oblonga. Unius ferè digiti intervallo à capite in infimo corpore incipit pinna te-

nuis, angusta, & per totum ventrem æqualiter porrigitur ad finem corporis: nam caudam nullam habet, nec ullam aliam pinnam in toto corpore. Squamas habet mediocres. Totus piscis est coloris ex fusco & paucò rubro mixti, ac in dorso & capite magis nigrescit. A branchiis in quolibet latere linea tendit ad finem corporis usque, quasi cultri acie tracta, & sub hac linea maculæ nigrae per corpus dispersæ, seminis sinapi magnitudine.

Capitur in lacubus & est edulis.

In flumine S. Francisci capiuntur Carapo huic priori speciei similes, excepto quod longiores sint, & in extremitate acuminati instar subulæ, ad trium digitorum longitudinem squamulas parvas habent.

CARAPo secunda species, priori figura, colore & lineis lateralibus similis, excepto quod dimidiæ tantum sit latitudinis, nec ullas maculas habeat. Capitur in lacubus. Caro spinosa, sed boni saporis.

PIABA magnitudine *Phoxini*, pisciculus duos aut tres digitos longus (interdum quatuor aut quinque; quando maximus) ocellos habet nigros, circello aureo. Squamulis vestitus. In medio dorso pinnula erecta triangularis: post quamlibet branchiam unam habet oblongam; duas in medio infimo ventre & post has unam, quæ ad caudæ exortum protenditur: cauda est furcata. *Caput* ad latera auro & argento splendet: totum dorsum argenteo viridi & multo Indico: medium laterum secundum longitudinem argenteo & Indico mixtū: *Venter* aureo & argenteo & paucò Indico. Post quamlibet branchiam maculam habet rotundam, satis magnam Indici coloris, & statim post hanc eiusdem coloris maculam lunæ corniculatæ figura, eiusdem coloris oblongam in quolibet latere ad caudæ exortum. *Pinna* omnes & cauda aurei coloris, quæ in infimo ventre rubra. Capitur in omnibus fluviis currentibus Brasiliæ, ac summa vi contra aquæ cursum nititur.

Brasiliiani involvunt foliis arborū,

Bb

& ci-

& cineribus condunt, de super ignem imponentes; sic præparatos comedunt. Saporis sunt haud contemnendi.

PIABUCU pisciculus sex digitos longus, sesquidigitum latus, ubi latissimus, ventre paululum extuberante, oculis elegantibus, pupilla crystallina, circulo argenteo, cui superius parum rubri admixtum. *Septem* habet pinnas, octavam pro cauda furcatam: nimirum postbranchiales duas in infimo ventre, unam in medio dorso, circa anum unam longam extensam versus caudam; & è regione huius in dorso parvulam. Tegitur squamulis argenteis splendentibus. Per medium laterum secundum longitudinem tendit linea alba lata, non splendens. Dorsum autem ad hanc lineam olivacei est coloris, cui viridis hyacinthinus persplendet. Pinnae albæ.

Capiuntur facillimè aciculis, vel corbe, aut olla immissa in aquam, cui parum farinae de mandioca, aut mica panis intrita. Cocti comeduntur & frixi. Si quis vel leviter vulnerato uno aut altero membro, vel ulcusculum tenens aquam ingredietur, statim hic piscis vulnus petit mordendo, ita sitiens est sanguinis humani.

NHAQUUNDA: Mas & foemina reperiuntur. Mas corpore est oblongo, ferè ubique æquali, septem, octo, aut decem digitos longus, duos altus, ubi altissimus: *Caput* & os ferè *Lucij* habet, superius labium extendere, & oris hiatus rotundare potest: Dentiū loco habet limas, linguam tenuem, branchias amplas, oculos conspicuos, pupilla nigra, circulo fusco: septem pinnas, post quamlibet branchiam unam, duos ferè digitos longam; sub his in infimo ventre duas junctas, & post anum unam penè quadratā. Ab initio ferè dorso una propenditur penè ad caudæ exortum, tres digitos longa, unū ferme lata, æqualis, mollibus spinis suffulta, quæ in fine paulo latior, & in triangulum desinit. *Cauda* testa dura tegitur nigra. Totum corpus squamis mediocris magnitudinis vestitur, ac totum dorsum & late-

ra obscuri grysei sunt coloris cum argenteo transplendente. Venter albus. In utroque latere unum ordinem habet macularum, rotundarum, nigrarū, pisi magnitudine, & inter has dispersa punctula multa cærulea. Pinnae omnes aureæ, ut & cauda: & pinna dorso insuper variegatur per totum punctulis cæruleis. In utroque latere per ordinem macularum nigra tendit linea, incipiens à fine superiore branchiarum, & ad regionem finis pinnae dorsalis desinens, & semidigitiferè interstitio sub huius fine, alia linea incipit, ac in medio exortus caudæ desinit. Lineae hæ elatae sunt ac aureæ.

Capitur in fluviis, ac boni est saporis.

Fœmina mari per omnia similis, excepto quod punctulis cæruleis in lateribus & pinna dorsali destituitur, & quod venter circa anum rubescit. Comeditur ut mas.

CAPUT XV.

De Amore Pixuma, Amore Tinga, Guara Tereba, Piracoaba & Cocororo.


AMORE PIXUMA Brasiliensibus, TAB. vulgo corrupte Amorea piscis XXXV. magnitudine Tamoata, capite lato, ore amplo, & edentulo, corpore oblongo, ita ut fere Tamoatam referat. Coloris est obscure ferrei; in ventre, qui extuberat, albi. Tegitur cute molli: pinnas habet septem & octavam pro cauda in ambitu circinatam. Carne est sicca & bona, ut Tamoata. 3. 4. 5. 6. Marcgravia H. Bras. 4. 6. 17.

AMORE TINGA Brasiliensibus, piscis est eiusdem plane figuræ cum Amore Guacu, sed tantum minor: habetque squamas in totum albicantis, seu pallidi coloris, & in totum maculatur maculis fuscis, ut Tajafrica. Cauda tamen illius est fusco undata. Edulis est ut præcedentes.


Guara Tereba. Piscis magnitudine septem aut octo digitorum: capite obtruso, oculis crystallinis, circulo au-

reo: os


Piabucu.




Nhaquunda.




Guara Tereba.




Amore pixuma.




Piracoaba.




Corcero.




Guatucupa.




Vribaco.



Guarcrua.



Camaripuguacu.



reo: os denticulos habet minimos: Branchias amplas: dorsum incurvatum; unde & *Corcovado* minor potest appellari. *Pinnas* obtinet septē: post quamlibet branchiam, unam longā: sub his duas junctas in infimo ventre: in medio autem ventre duas spinulas acutas, quæ membranula coniunguntur; & post has triangularem, quæ deinceps angustata ad exortum caudæ extēditur: in summitate dorsi triangularem mediocrem, & post illam aliam similem majorem, quæ angustata ad exordium caudæ porrigitur. *Cauda* in duo cornua extenditur. A branchiis linea tendit ad medium piscis, quæ dein obliquè deorsum vergit, & directè usque ad caudam porrigitur: hæc posterior lineæ medietas hamulis posterius versis armatur, & utroque latere triangularibus vestitur squamulis, quæ minimæ sunt, ut ad tactum glaber videatur. Coloris est in dorso & lateribus usque ad medietatem longitudinis ex hyalino cærulescentis: reliquum laterum & venter albicat, sed aureus color transplendet. *Pinnæ* ventris albæ, reliquæ cum cauda aurei sunt coloris.

Edulis est piscis.

Piracoaba piscis pedalem longitudinem adipiscitur, corpore oblongo, ut *Zandæ* Pomeranorum. Os habet acuminatum, amplum, edentulum; mandibulam superiorem longiorem inferiore, & superior pars oris prominet in rotundum conum è cartilagine constantem: *Oculi* illi satis ampli, pupilla crystallina, circulo aureo. *Pinnas* habet octo: nimirum duas in dorso triangulares erectas, interstitio sesquidigiti: post quamlibet branchiam unam longam, angustam; duas his breviores in infimo ventre junctas, & prope anum unam triangulatam; octava est cauda furcata. Sub qualibet pinna postbranchiali barbā habet sex pilis crassiusculis constantem, tres digitos ferè longis, estque eius exortus prope exortum pinnarū, vergens retrorsum. Totus vestitur squamis mediocris magnitudinis argentei coloris, & in dorso ac summi-

tate capitis paulum cānescit. *Pinnæ* quoque omnes cani, seu cinerei sunt coloris: postbranchiales tamen nigredine dilutæ sunt. Barba alba. Capitur arenosis locis in mari. Boni est saporis.

COROCORO piscis dorso incurvato, capite & ore obtuso: pedalis longitudinis. Denticulos habet parvos, haud acutos: branchias satis amplas, quarum anterior pars in spinam definit acutā: sex pinnas: nimirum in quolibet latere post branchias unā tres digitos longam, subtus in infimo corpore duas triangulares fere, sed in extremitate circinatas & antè firmas & acuta spina suffultas, post anum una crassa, dura & acuta spina nixam, cui parvula spina antistat. A summitate dorsi pinna incipit, quæ arcuatim ad medium dorsum tendit, firmis ac acutis spinis sustentata, hinc definit & contigua illi est mollis, quæ & arcuata fere est, & pene ad exortū caudæ protenditur. *Cauda* duos digitos longa, quatuor lata. *Squamis* majusculis vestitur totus argentei coloris, sed in toto dorso, & eius summitate diluta umbra mixtis & per latera transversim (non tamen ad ventrem usque) in quolibet octo striæ, digitum latum crassæ, ex diluta umbra descendunt: venter totus albus, ut & illius pinnæ. Pinna dorsalis, postbranchiales & cauda ex argenteo & diluta umbra mixtæ. Pinnam autem anteriorem dorsalem in rimam potest recondere. Capitur in mari, & est edulis.

CAPUT XVI.

De *Guatucusa*, *Vribaco*

& *Guarerva*.

GUATUCUSA Brasiliensibus, *Ba-TAB.*
labolla Congensibus, *Corvina* Lusitanis. Piscis corpore oblongo, dorso paulum, ventre minimum curvo: longitudinem duorum pedum non raro adipiscitur. Os habet acuminatū, cuius inferior pars paulo longior superiore, quodque ample potest diducere; dentes minimos, linguam conspicuam, branchias amplas; oculos stuferti magnitudine, pupilla nigra, circulo
 Bb 2 argen-

argenteo. Pinnas obtinet septē; post quamlibet branchiam unam oblongam; duas sub his in infimo ventre paululum versus posticam partē, unam post anum triangularem, unam triangularem ac latam in summitate dorsi, duriusculis spinis suffultam, & huic fere contiguam alterā in posteriore parte dorsi oblongam, quæ æqualis fere latitudinis, atq; ad exortū penē caudæ protenditur. *Cauda* constat pinna fere quadrata & lata. Parvulis rotūdis squamis totus vestitur, coloris per totum argentei splendētis, cui tamen in dorso aureus transplendet, & ad tactum videtur lævis. Pinnæ & Cauda ut & venter albicāt. A summitate autem branchiarū per medium latus ad caudæ exortum tendit linea argentei coloris. Capitur in mari, ac optimi est saporis.

URIBAC O piscis dorso incurvato, ventre protuberante, quindecim aut sedecim digitos longus, quinque, aut sex altus, ubi altissimus. *Caput & os* obtusum, conum referens triangularē: dētes parvuli, acuti, lingua lata: brachiæ amplæ in triangulum desinētes: Oculi dupli stuferi magnitudine: pupilla crySTALLINA, circulo argenteo, cui aliquid cinnabrij mixtum est. *Pinnas* habet sex, nimirum post quamlibet branchiā, unam longam triangulum acutum referentem, sed exterius paulum circinatam: sub his in infimo ventre duas triangulares, anterior firma spina munita: post anum unam oblongam, in exteriori ambitu circinatam, molliusculis spinis per medium suffultam, anterior autē dura & acuta spina: à summitate autem dorsi ad exortum fere caudæ pinna latiuscula, latitudinis fere ubique æqualis, & acutis spinis sustentata. *Cauda* itidem lata in duo veluti cornua distenditur. *Vestitur* squamis magnis, in totum argentei coloris, sed cui parum cinnabrij translucet. Pinnæ laterales, & infimi ventris albæ seu argenteæ, dorsalis & cauda plus cinnabrij, quā argentei habent. A summitate deniq; branchiarū ad caudā usq; (paulum arcuatim) tendit linea rubra, & supra eam in posteriore parte corporis, in utroq; latere, maculā ha-

bet nigram magnitudine grossi mīnici. Capitur in mari. Edulem habet carnem & bonam.

Guarervia, piscis corpore lato, compressoq; quatuor digitos longo, tres lato, ubi latissimus, ore patulo, denticulis minutis. *Pinnas* habet sex, nimirum postbranchiales duas, parallelogrāmi figura; duas oblongas & latas in superiori dorso, & infimo ventre posteriori, quæ in acumen desinūt, figura subulæ. *Cauda* quadrata, seu potius parallelogrāma, unum digitum longa, & duas tertias partes digiti lata. Squamulis tegitur nigri coloris splendentis instar bombycini, quarū orē (quarundā tātum, non omnium) fimbrias habent flavas instar semilunularum. Pinnæ omnes nigræ. Circa os linea crassa est ferrei coloris, & alia illi perpendiculariter superposita. Corpus tres lineæ latæ ambiunt, quarum duæ per latas & posticas pinnas extenduntur; (caudam etiam talis linea secat, & eiusdem coloris) una pro fimbria ipsi est. Oculorum pupilla nigra, circulus aureus.

CAPUT XVII.

De Camaripuguacu, Piratipua, Curema, Parati, & Aramaca.

Camaripuguacu piscis dorso recto, ventre paululum extuberante; XXXV: pinguis ad tactum & revera. *Caput* habet antè acuminatum, os amplū, edentulum, quod in rotundum deducere potest, nimirum superiore mandibula, inferiori immota permanente, ita ut duos pugnos humanos iuxta se, vel etiam humanum caput possit admittere. *Linguam* habet conicā, crassam, superior autem mandibula brevior est inferiori, ita ut clausum os superius habeat: *Oculos* latiores Imperiali, rotundos, crySTALLINOS, & argenteos, brachias amplissimas. Longitudinem adipiscitur undecim aut duodecim pedum, crassitiem viri. *Pinnas* obtinet septem; duas haud procul diffitas à branchijs, in lateribus proximè ventrem anteriorem, longas, triangulares; cuilibet autem harum parvula subest, quæ tamen

TAB.
XXXV:
10.
Marggr.
H. Bras.
4. c. 18.

Natando vix videri potest : in medio inferiore ventre itidem duas coniunctas, triangulares, latiores prioribus, sed breviores : has versus posticā partem corporis inferioris sequitur alia solitaria pinna, triangularis, lata, squamata, quæ appendice continua, angusta, protenditur ad caudæ ferè exortum : in dorfi altera medietate versus posteriora, pinna est elata triangularis, lata, quæ appendicē habet versus posticam partem vergentem, elevatam, triplo longiorem, instar funis crassioris. Septima pinna est pro cauda, quæ secta est, & in amplam extenditur furcā. Squamis vestitur magnis, obrotundis seu peltatis, maioribus Imperiali, in dorso tamen minoribus materia squamarum alba, pellucida instar matris perlarum ; sunt autem arctè sibi impositæ squamæ, ita ut quadruplices aut quintuplices jaceant, ac de qualibet autē aliam pròminet pars figura lunæ bisectæ, quæ argenteo obducta est (revera repræsentat argētum) & rivulos hinc inde discurrentes monstrat argenteos in argenteo campis ita totus piscis argēto obductus videtur, præterquam in dorso, ubi cæruleus est, argēto tamen translucente. Pinnae omnes argenteæ, præter dorsalem, quæ eundem colorem habet cum dorso. Carnem habet lentam, quæ diu coqui debet, multæ in carne spinæ, sed satis crassæ, ut faciliè inter edēdum extrahi possint. Magis aspectu quam esu piscis delector.

Comedi sæpius eius carnem, sed lenta est, & tantū famelico conveniens. Os superius ossa habet duritie æqualia ossibus alicuius animalis.

Piratia Pua ingentē adipiscitur magnitudinem, ut *Capuripima*. Inferior mandibula paulo longior superiori : dentes acuti in tota mandibula inferiori, in superiori solum in medio, qui longiores, quemadmodum & mediū in inferiori : Os ampliare amplissimè potest in rotundum foramen. Oculos obtinet non ita longos pro corporis mole, pupilla crystallina. Branchias amplas, duras seu armatas. Corpore a. est oblongo, dorso paulū incurvato versus caput, & ventre mediocriter amplo. Pinnas habet septem : Vnam à

summitate dorfi (incipientem versus capitis ferè exortum) ad caudæ usque initium protensam ; quoad medietatem anteriorem spinis suffultā, quoad posteriorem mollem sine spinis, in medio a. sui angustiore, antèius latiore, postèius adhuc magis latam & quasi circinatam in extremitate. In quolibet latere post branchias, unam latam, & in extremitate circinatam, cætera quasi quadratam : sub his in infimo ventre duæ propinquæ sunt oblōgæ, haud latæ, firmis spinis nixæ : prope anum unam habet satis amplā, itidem circinata fimbria postèius, uti ea quæ in dorso. Corpus postèius quadratè extenditur, & continet septimam pinnā pro cauda, quæ ampla est, & figuræ penè quadratæ. Squamulis vestitur parvulis, ita ut ad tactum glaber videatur, etiā si antrosum mulceatur. Coloris est per totū corpus ex obscuro aureo epatici, qui tamen obscurior in dorso & summo capite huic a. colori per totum retis in modum cinerei coloris lituræ obtenduntur. Pinnae omnes eiusdem cum corpore coloris, laterales a. præterea fimbrias habent aureas, reliquæ epaticas. Carne satis probata est, si junior sit, nimirū sex, septē aut octo pondos & assatus magis quam coctus, nam pinguis est : adultior verò ducentorū aut plurium pōdo carnem habet probiulis ; nec delicatiorē carne *Camarupim* asu, nimirum lentā, tenacem, ac difficilis coctionis. Capitur in mari.

Curema species *Tainha* grādis & crassa. Piscis marinus, in duorum pedum longitudinē excrefcens, corpore oblongo, ferè cylindraceo, more Trutæ fluviatilis, crasso & præpingui. Caput in conum obtusum desinit, superius compressum & latum, durum, squamis duris tectum. Os pro mole corporis parvum, parabolicū, labio superiori conspicuo, mobili, inferius a. os triangulare, obtusum discubit, & paulo brevius est superiori, edentulū. Oculi magni, rotundi, antèius positi, nigri, circulo argēteo. Duo narium foramina supra os. Branchiæ semilunares, haud amplæ. Pinnas habet septem (octavā pro cauda, quæ in duo cornua desinit) nimirū duas postbranchiales, triangu-

latas duas, magis versus posteriora in infimo ventre, junctas: in summo dorso parvam, tribus suffultam duriusculis spinis: post anum unam bicornem, & illi oppositum in dorso eiusdem ferè magnitudinis. Tegitur squamis magnis clypeatis, planis: color totius pìcis in summitate capitis, dorso & medietate laterũ obscurè cinereus, cui hyalius transplendet: reliquum laterum, venter & caput inferius argentei splendentis coloris, uti & pinnæ ventris, reliquæ pinnæ cum cauda eiusdẽ cum dorso coloris. Præpinguis est & coctus vel affatus sine oleo vel butyro comedi potest. Salit⁹ & in sole fìccatus asservatur magna copia. Salitus quoque & in muria servatur. Optima illius pars venter.

Parati Lusitanis Tainha, piscis est in longitudinẽ pedis excrescens, figura corporis ut *Curema*, cui per omnia similis est excepta magnitudine, & q̃ circulum aureũ habeat circa oculos. Carne est fìcciori, & quæ inter coquendum pinguedinem flavam de se fundit. Magna copia saliti in sole exficcantur & recõduntur. Capiuntur retibus, ut & *Curema*, tranfiliunt a retia eleganti spectaculo, quando illud trahitur: quando malacia est magno numero ex aquis exfiliunt.

Aramaca Lusitanis Lingoada & vulgo *Cubricuncha*, soleæ est species cõpresso corpore, & figurã habens soleæ q̃ Belgæ vocant *Longe*. Os denticulis acutis p̃ditum: caret lingua: Oculos habet duos in uno latere (ubi lapidei est coloris) in altero nullum, pìsi magnitudine, unum p̃pe latus posterioris oris, alterum superius & magis versus posteriora vergentem, pupilla lunata, c̃rystallina, hyalinocolorè transplendente. Branchiæ satis amplæ, in quolibet a. latere post brâchias est pinna una, duos digitos lōga, angusta, superius in pilum tenuẽ definens; ad brâchiarum finẽ in infimo corpore sunt duæ parvæ pinnæ junctæ. Per totum a. corpus tam superius, q̃ inferius secundum longitudinem habet piñam usq; ad caudã extensam, tenuem, vix semidigitum latam; cauda fẽ quadrata cõstat pinna tenui. Vestit squamulis parvulis, & in toto sinistro late-

re, ubi oculos habet, lapidei est coloris, in latere dextro albi, vivit in mari inter arenas. Edulis est & boni saporis.



TITVLVS II.

De Piscibus Exoticis Lævibus.

CAPVT I.

De Piscibus in totum lævibus.

ARTICVLVS I.

De Guamaiacu, Ape & Petimbuaba.

Pisces Exotici læves sunt in duplici differentia: Vel e-
nim sunt in totum læves, vel cum aliqua lævitate spinosi. Ex istis sunt quos hic describemus.

GVAMAIA CV APE Piscis triangularis, duplex est, unus cornutus, alter sine cornibus. Cornutus ab ore ad initium caudæ septem digitos est longus, (interdum & longior) à ventre ad dorsum summitatem tres digitos latus seu altus: venter vix duos digitos latitudine complet: cauda unum digitum lata, definens in pinnam duos digitos longam & totidem latam. Os ipsi parvulum, & pìsi tantum capax: habens in superiori mandibula duodecim denticulos angustos, acutos, in inferiori quinque. *Caput* ab ore ad cornua usque in gibbum assurgit, convexitate sesquidigiti; dorsum autem ad eundem modum in gibbum arcuatur: & unicam tantum habet pinnam in postica parte versus caudam, & quidem exilem. Oculos habet satis amplos, diametro trientis, superne in capite in fronte positos prope cornua, ab ore circiter sesquidigiti intervallo: & ante singulos oculos foraminulum unũ. *Pinnas* in universum obtinet quinq; unã in extremo dorso, ut jam dixi, & in quolibet latere unã, lōgẽ infra oculos versus posticam

corpore.

TAB.
XXXVI.
1.2.

TAB.
XXXVI.
3.4.
Marcgr. H.
Brasil. 1.4.
C.I.

Corporis partem paulum vergentes; unum digitum longus: & prope utraq; rimā, unam plus semidigito longam, branchiarum loco: unā denique pinnā inferius in ventris extremitate, prope exortum caudæ, unum pene digitum longam, dimidium latā: quinta facit caudā. *Cornua* duo directè ante se protensa in fronte gerit prope oculos, magnitudine calcario galligallinacii, duo itidem æqualis magnitudinis in infimo ventre versus quartam pinnam. Caret squamis, sed tegitur densa cute, in ventre quidē alba, reliquo a corpore fusca, atque in ventre & lateribus usq; ad altitudinem oculorum figuris trigonis, tetragonis, pentagonis, sexagonisque mirè distincta & notata. Vbiq; a. (excepto infimo ventre) eadem cutis variis maculis nigricantibus est insignita. De altera specie superius egimus.

Idem H. B. lib. 4. c. 4. *Petimbua* piscis tres aut quatuor pedes longus: corpore instar Anguillæ. Os edentulum acuminatum, superiori mandibula breviori quam sit inferior: estque lōgitudō oris sesquidigiti, amplitudo, ubi maxima, vix unius. *Caput* novem digitos longum est ab oculis ad oris extremum, crassities eius post oculos quīnque digitorum, hinc paulatim minuitur, ita ut prope os sit trium tantū digitorum. In summa a. longitudo capitis à fine branchiarum ad oris extremum est unius pedis & unius digiti. *Oculos* habet satis magnos, magnitudine nucis avellanæ & pene figura, pupilla splendida cærulescente, quā tunica ambit argentea, in parte anteriori & posteriori macula miniata notata. Post branchias in utroque latere, pinna directè prenditur à latere sesquidigitum lata & longa rufescentis coloris: hinc sex & semis digitorum intervallo versus posticam corporis partem, duæ pinnæ parvæ rufescunt in quolibet latere una, sed magis versus ventrem.

Posthas pedis intervallo sequitur pinna rufescens duos digitos longa, sesquidigitum lata: sub hac autem eiusdem magnitudinis & coloris una in infimo ventre: demum à fine harū intervallo fere quīnque digitorum,

sunt adhuc duæ pinnæ rufescentes paulo minores superioribus, una sursum, altera deorsum elata, & inter has ortum sumit cauda instar murenæ tenuis, teres, sex digitos longa. Corporis a. longitudo à fine branchiarum ad caudæ initium est duorum pedum & trium digitorū. Cute est instar Anguillæ glabra, coloris in toto corpore & lateribus ab ore ad caudam, hepatici, in dorso triplici, in lateribus unica serie macularum cærulearum magnitudine nummi Misnici ferè: hæc maculæ à medio corporis in lateribus ad caudā usq; in lineas coeunt: inter omnes a. maculas cæruleas ordine intercedunt maculæ virescentes. In inferiori corpore tam sub capite quā ventre albescit, & videtur aliqua rubedo inspersa. Corpus a. universum non exactè teres est, sed compressum & latiusculū, ventris n. latitudo prope secundum par pinnarum, ubi latissimus, duorum digitorū, crassities ibidem totius corporis sex digitorum. Hinc paulatim attenuatur, donec prope exortum caudæ sit sesquidigitum paulo plus aut minus crassum. Edulis est piscis. Potest *Acus* piscis vocari. Iconum quas supra dedimus, nulla cum hac convenit, nisi fortè *Acus* minor Bellonii.

ARTICVLVS II.

*De Nhambdia & Guape-
rua.*


NHAMBEDIA Brasiliensibus, *Bagre* TAB. *do Rio Lusitanis*, piscis corpore XXXVI. oblongo, obeso, ventre molli, versus 5. 6. posteriora angustiori. *Capite* cōpresso, & ore parabolice figuræ, & denticulis minimis prædito. Est autem corpus duodecim aut quatuordecim digitos longum, duos & semis altum, ubi altissimum. *Oculi* parvuli, paululum protuberantes, rotundi, pupilla nigra, circulo ex auro & umbra mixto. Branchiæ satis, amplæ, & barba sex filis constans, duobus supra & quatuor infra os: Eorum quæ supra os versus latus stant

stant quodlibet crassitiem habet fili, quo literæ obsignantur, quinque digitos longum, & post cuiusque exortum fovea est oblonga, in quâ barbæ initium incumbit, vertēdo illam postica parte, ut semper facit: quatuor inferiorum quodlibet exterius duos & semis digitos longum, interius semidigitum; suntq; inferiora fila barbæ non ita crassæ ut superiora. *Pinnas* habet septem, & octava est, p cauda: nimirum post quamlibet branchiam unam oblongam, firmissima & acuta spina munitam (quemadmodū & in exortu ipsius post branchiam os durum est, triangulare) ad medietatem corporis ante anum duas junctas oblongas, in extremitate circinatas: versus caudam in inferiore ventre unam ferè quadratam & in extremitate circinatham: in summitate dorsi magnam quadratam multis spinis suffultam & post illam unam longam angustam, cute carnosâ constantem, qua & corpus est tectū. *Cauda* bifecta est, & quælibet pars in exitu circinata. *Cute* tegitur non squamis.


Caput dura testa tectum, osque superius totum umbræ coloris: dorsum & latera cinerei cum pauxillo cæruleo mixti: Venter albus: pinna dorsalis prior prope exortum eiusdem coloris, cætera in totum nigri, spinis cinereis: posterior eiusdem coloris cum dorso & lateribus: pinnae postbranchiales totæ nigrae: barba nigra, uti & pinnae ventris & cauda, licet in exortu paululum ruffæ. A summitate branchiarum per quodlibet latus tendit in medio linea rubra usque ad caudæ initiū. Capititur in fluviis, & est optimi saporis, vulgoque comeditur.

Guaperna piscis cuius longitudo ab initio oris ad exortum caudæ paulo plus duorum digitorum (reperiuntur tamen & duplo maiores) corporis medii crassities, ubi maxima, trium: laterum quodlibet unum digitum altum. Caret omnino brachiis: os habet satis amplum & elatum, proiectum instar canis, minutissimis denticulis; loco linguæ lapidē habet instar Carpionis: ocellos vix grani milii magnitudine, colore egregie turcoidis. Intra ocellos in medio superioris labii,


seu in fronte corniculū gerit sursum erectum, & paulū retrorsum versum, & ante illud corniculum etiam filum tenue, & dimidium ferè digiti longū versus anteriora directè, ppensum paululum tamen elevatū, cui appendiculum adhæret ut in Liliis: filiū hoc retrò recōdere potest: nam post corniculū fovea est in vertice, hinc parva eminentia & iterum vallis, tunc ad uni⁹ digiti longitudinē pinna in dorso porrigitur quadrantem lata. *Cauda* pinnulā habet plus semidigitum longam: à cauda interstitio aliquo versus anteriora circa ani regionem iterum pinnula est semidigitum longa & duæ parvulae in inferiori corpore sub pectore. In medio a. ferè corpore, magis tamen versus anteriora, in quolibet latere brachium obtinet, desinens in pinnā duas trientes digiti longam, & penè ita latam, pinna a. brachiorum octo constat spinis, quæ per pinnæ longitudinem disparguntur, & antèius prominent instar octo unguiculorum acutorum. Brachiū quodlibet unica constat junctura ac versus anteriora deflectit, ut ita naturæ piscis commodius serviat. Caret in totum squamis, sed tegitur cute in ventre molli, reliquo corpore ad tactum aspera & scabra, ut in Tiburonibus. *Color* cutis est obscurè rubricans, cui fuscus admixtus, & per totum corpus maculas habet nigras, figura undarum. Pinnæ & brachia etiā eiusdem sunt coloris cū fusco mixti. Sed pinna in dorso in quolibet latere quatuor habet maculas nigras maiores: cauda verò & omnes pinnæ minores eleganter variegatæ sunt. Ventriculū habet duos digitos longum, cum orificio tres digitos longum, & duos circiter amplo, q; in ipsas fauces inseritur: Vnde ventriculum inflare instar utriculi potest. Caro eius non comeditur. Ad orbem classis pertinet. Vescitur squillis: natans egregie explicat pinnas & inflat se, ut instar orbis, seu pilei appareat rotundus. Habui alium totum colore differentem, duos & semis digitos longum qui totus erat coracini coloris splendentis, & se inflabat. *Cutis* horum piscium faciliè detrahi potest, & tomento impleta servari.



Aramaca.




Guamaiaçu apc.



Petimbuba.




Guaperua.




Nhamdia




Curatá Prima.



Pirague.



Piscis innominatus.



Harder.

ARTICVLVS. III.

De Curvata Pinima, Puraq,
& Pisce innominato.

TAB. XXXVI. 7.8.9. Marcgrav. Hist. Bras. lib. 4. c. 5. & 6.

CVRVATA PINIMA, Lusitanis *Bo-into*. Piscis est *Cordovadi* magnitudine, vel etiam maior, corpore oblongo, satistamen lato & crasso, amplis branchiis, oculis grandibus argenteis. Caret *squamis*, & regitur solummodo cute præterquam in medio laterum: nam cuiuslibet lateris mediū à branchiis usq; ad caudam permeat lata linea aurei coloris; hinc à branchiis incipiēs alia parallelus superius ducitur ad duas partes totius longitudinis; hinc hæc parallela secat oblique auream, & pergit parallelus usq; ad caudam: linea hæc parallela aureæ antè, & usque dum auream secat, duplici squamularum serie minimarum insignitur, & tota est glabra, postica parte, ubi secat auream, & infra itidem duplici serie squamarum notata, sed maiorum, & linea ipsa nō est glabra, ut antè, sed aculeata quasi denticulus piscium. Color piscis in dorso & lateribus subvirescens, in ventre albus & splendens. *Pinnas* habet septē, nimirum postquamlibet branchiam unam oblongam: duas sub his versus posteriora junctas in infimo corpore: unā in medio ventre, & huic oppositam unam in summo dorso, & adhuc in dorso unā magis versus anteriora. Ab ultima dorsali & ventris pinna continua, haud lata, acuta utrobique; ab ita exordium caudæ: quæ furcata est. Capitur frequentius in mari, & boni est saporis.

PURAQVE, Lusitanis *Piexe viola*, ob figuram quam cum *Cithara* communem habent qualudunt Lusitani. Piscis est latus, non crassus, cartilagineus. Longitudo eius ab initio capitis ad finem caudæ unius pedis, & novem digitorum. Ab initio seu acumine capitis ad octo digitorum intervallum versus posteriora, cordis latitudinem habet, uti pingi solet, latitudo eius, ubi maxima septem digitorum, excurritque ibi in latere in pin-

nas instar *Raijæ*, estque penè transparens cum luci obvertitur. Caret branchiis. *Caput* in coniformam definit. Ab acumine capitis tres digitos & semis retrò numerādo, occurrunt oculi unum digitum ab invicem distantes, rotundi, prominētes, medio-cris avellanæ magnitudine, pupilla nigra, circulo aureo. Ad utrumque oculum versus posteriora habet fistulam, minimi digiti apicem capientē, per quam aquā evomere potest. Sub oculis, in inferiori tamen corporis parte, os habet, distans tantum ab initio capitis quantum oculi, sesquidigitum amplum, edentulum, & duo ipiracula sesquidigitum post os versus posteriora: In quolibet latere quinque incisuras habet, ut *Raijæ* & *Tiburones*.

Post anteriorem illam cordiformem corporis partem reliquū corpus teres, aliquantulum tamen compressum, & ibi latū tres digitos, & in quolibet latere habet pinnā mollem, tres digitos longam, & sesquidigitum latam: hinc angustius fit corpus usq; ad caudæ pinnam, ubi digitum est crassum. *Caudæ* pinna fermè duos digitos longa, paulo plus uno lata, superius longior, q̃ inferius, ut in *Tiburones*. Inter duas a. illas pinnas secundas laterales versus caudam in dorso, distantia duorum digitorum ab invicem adhuc duas pinnas erectas habet, ad tactum instar membranæ crassioris, triangulares, duos digitos longas, sesquidigitum latas. Tegitur cute molli, nullis squamis, ac in toto inferiori corpore in medietate anteriori est albus, in posteriori incarnati coloris cum albo mixti. In dorso, aut superiori corpore glutinis est colore, fuscis maculis variegato, inspersaque egregia varietate puncta ex albo cæruleiscentia. *Pinnæ* quoque glutinis habent colorem, ac in lateribus aliquid rufescentis mixtum. Acumen capitis cartilaginis colorem obtinet, qua etiam constat. Per totius dorfi longitudinem ad tactum spina dorfi, quasi tuberculis minimis eminet. *Caput* illius recens lucet noctu. Caro eius non comeditur. Sed si comeda-

tur, afferunt piscatores, per tres horas semifatuos reddi homines, dein sponte adferedire. Vnius attactus, crepitum articulorum manus, & brachii causat, qui tamen statim definit: & si in medio tangatur, artuum tremorem efficit.

Capitur mensibus pluviosis, quando tempestuosum est in Bibribi fluvio, longè ex terra adveniens, cum Raijs & Pastinacis.

PISCIS INNOMINATUS in septē digitorum longitudinem excrevit; figura similis illi, quem vulgo *Harder* appellamus; pinnis tamen aliter firmatis: duæ enim quæ in infimo ventre anteriore sub branchiis sunt, magnæ & latæ, duæ post branchias in lateribus parvæ, in dorso duæ mediores, & in inferiori ventre posteriori parva. *Cauda* constat pinna furcata. *Os* parvum, *oculi* magni. *Cutem* habet glabram, sine squamis: in dorso nigricantem, ac in utroque latere quatuor nigricantes maculæ magnæ à dorso protenduntur, in ambitu suo violacei coloris: Inter maculas autem versus dorsum prominet thalassinus color: reliquum corpus argenteum. *Pinnae* nigricantes cum violaceo mixtæ, & duæ illæ magnæ sub ventre quinque argenteis maculis singulæ insignitæ. Insignis coloris piscis, quando natans videtur. Victitat venenis illis Bæsaenen.

ARTICVLVS IV.

De Mucu, Abacatuia, & Acaramucu.








TAB. XXXVII. **M**VCV Brasiliensibus, piscis tereti corpore, ut *Enneoptalmus*, vulgo *Lampreta*, Germanis *Neunauge*/ nec crassiori: circiter duos pedes sit longus, magis aut minus: Capitulum habet acuminatum, conicum; ocellos parvos nigros: os item parvulum: guttur inflare aliquo modo potest. Caret pinnis: per latera lineas obliquas nigras habet, angulos obliquos per medium laterum invicem facientes.

Edulis est & capitur in lacubus &

paludibus. Iconem eius Nobilissimū de Laët in Americæ descriptione, sub nomine *Vbirre* dedit verum descriptio *Mucu* cum iconem non satis convenit, ideo non est mirum, quod diversum à *Mucu* esse sentiat.

Abacatuia, Lusitanis *Peixe gallo*. *Faber* & *Gallus marinus*. Passeris magnitudinem habet, altus & latus instar illius, subrotundus, neque illo crassior: *Osilli* est haud amplum, edentulum; *Oculi* nigri, circulo argenteo. *Pinnas* habet quinque, unā in dorso, unā in ventre, utramque descendentem, & continuam ad caudam usque: itidem post branchias utrimque; unam: *Cauda* constat pinna furcata. Præterea habet duo quasi fila in longum extensa ab inferiore corpore, & unicū tale in dorso ante pinnam dorsalem. Caret squamis, sed tegitur cute levissima, splendente, coloris argentei; totusque est illius coloris, exceptis filis illis, quæ nigra sunt. Carnem habet boni saporis. In descriptione Americæ sub nomine *Avvab kattoe*, sive *Iavvke* datur. Icon superius data, non in totum convenit, ideo repetimus.

Acaramucu Piscis corpore est cōpres- Idem Hist. l. 4. c. 12.
so, nec crasso, verum oblongo, decem enim digitos longus est, quatuor latus, ubi latissimus. *Osilli* parvulum, angustum, rotundum, apicem minimi digiti admittens, ut piscis triangularis, Superius & inferius in anteriori parte oris utrimque; dentes triangulari acuti. *Oculi* stufieri magnitudine, crystallini, pupilla nigra. Distāt oculi ab ore, duos digitos & semis, plane in alto positi, tres quartas partes digiti à dorso sub utroque oculo, in quolibet latere, branchiarum loco fissurā habet oblique factam, unum digitū longam, trapezii figura. In dorso summitate directè supra oculos, instar fili maioris, seu crassioris cordæ violæ, corniculum habet oblique erectum versus posteriora, quatuor digitos longū & teres. In postica corporis parte inferius & superius utrimque; pinnam habet tenuem, tres digitos & semis longam, tres quadrantes digiti latā, quæ desinunt circa caudam, quæ parallelogrammi figura exoritur à corpore, habet





habetque pinnā sesquidigitum longam, paulo plus duobus latam. Caret squamis, sed tegitur cute glabra, parum tantum hispida, ut Xiphia, coloris albicantis, cui cryseus est admixtus, & in dorso paulum fuscus; pinnæ quoque grysei coloris. Non est edulis: in ventriculo algæ seu musci marini multum inveniēbam. Parieti appensus noctu clarissimè lucebat in tenebris.

ARTICVLVS V.

De *Punaru*, *Timucu*, &
Guebucu.

TAB. XXXVII. *PVNARV* pisciculus est quatuor digitos longus, corpore oblongo, capite crassiusculo, & antierius obtuso. Os habet parvum, in maxilla inferiore duos solummodo denticulos, longos, acutos instar acicularum: oculos superius & in fronte positos, pupilla nigra, circello aureo: & supra hos duo rubra fila brevia, prominula; branchias amplas: utpote quæ una ei est è duabus conflata. Pinnas postbranchiales duas oblongas, & sub his duas plane angustas. Paulo post occiput incipit pinna, quæ ad caudam usque producitur, spinulis prominulis suffulta. In medio infimo ventre incipit similis, ferme ad caudam usque pertingens. *Cauda* a. longiuscula, & parallelogramma. Tegitur cute fusca, & pinnæ sunt eiusdem coloris.

Reperitur hic & alia *PVNARV* species, figura corporis priori similis, sed mandibulas habens rostratas, quasi è minimis denticulis compositas. A summitate capitis pinna latiuscula extenditur usque ad exortum caudæ, quæ mollibus textitur spinis non prominulis. Postbranchiales habet ferè ut prior, ut & in ventre & cauda. Color ut prioris, sed variegatus est in lateribus lineis curvis obscurè purpureis. Vtraque species inter scopulos vivit, & intrat etiam testaceorum domicilia.

tem H. B. *TIMVCV* Lusitanis *Peixe agulha*, lib. 1. c. 14. Piscis duos est pedes longus, corpore tereti instar Anguillæ. *Rostrum* habet osseum, tres vel quatuor digitos lon-

gum, acuminatum, utrobique dentibus minimis refertum: inferior rostri pars paulò longior superiori, & id quod prominet molle, non osseum; caret lingua. *Oculos* habet rotundos, crystallinos, circulo argenteo: sex pinnas, nimirum duas oblongas postbranchiales, duas junctas in infimo ventre ante anum parvas, post anum unam, quæ ferè ad exortum caudæ porrigitur, & similem huic oppositam in dorso. *Cauda* pinna quasi bisecta constat. Caret squamis, sed tegitur cute. Summitas capitis & rostri ac dorsum cum medietate laterum olivacei est coloris: inferior medietas cum ventre argentei. Per utrumque autem latus secundum longitudinem linea tendit virescens, distinguens olivaceum ab argenteo. Pinnarum color respondet parti cui appositæ sunt.

Edulis est. Capitur in mari, & fluviis salis. Boni est saporis, præsertim frigus butyro: Caro eius non est spinosa.

GVEBVCV Lusitanis *Bicuda*, piscis Idem lib. 1. rostratus; oblongo & fermè tereti est c. 15. corpore, ut *Dorada*: capite porcino, rostrato, cauda in duo cornua diducta ut *Albacara*, *rostrum* acutum, osseum, durum: partis superioris longitudo sedecim digitorum, inferioris decem. Crassities totius prope insertionem septem digitorum: utramque autem rostri partem movere potest. Branchias habet amplas: Os inferius orbicularis figuræ, in medio sui hyperbolico foramine; lingua oblonga, alba, dentibus omnino caret. *Oculos* habet solidi magnitudine, pupilla crystallina, circulo argenteo. A rostri insertionem caput in altum assurgit, ut in *Dorada* mare: Est autem caput ab oculis ad occiput longum septem digitos, novem altum. Corporis longitudo ab occipite ad caudæ exortum quatuor pedum, & altitudo lateris post occiput unius pedis; in medio autem corporis decem digitorum, & prope caudam duorum. *Cauda* in duo cornua extēditur & ampliatur, quodlibet octodecim digitos longum, ad cuius exortum in quolibet latere duæ

auriculæ membranaceæ. *Pinnas* habet sex: proxime post quilibet branchiam unam, directè à latere protensam, dura membrana constantem ut in *Tiberone*, figura trianguli acuti, undecim digitos longam, & in exortu, ubi latissima, duos tantum latam: è regione harum in infimo ventre duo bacilliformia corpora juncta habet, ex osse nigro constantia, dura, plane ut os *Sepiæ*, quodlibet novendecim digitos longum, utrumque junctum, in rima longa, profunda recondere potest, quæ à natura secundum longitudinem ventris facta est ad caudam usque. Interstitio duorum pedum à fine huius fissuræ seu anio, in infimo corpore pinnam habet triangulatam sex digitos longam, latere anteriori firma spina munitam, etiam hanc in rimam quandam recondere & rursus surrigere potest: Octo digitorum interstitio ab hac pinna, parvam habet versus caudam, in acutum triangulum versus posticam partem desinentem, & è regione huius similem & æqualem in superiore corpore, has duorum digitorum intervallo sequitur cauda, quam supra descripsi. Maxima a. omnium est pinna dorsalis, incipiens à summitate occipitis, quæ pretenditur per dorsum in trium pedum longitudinē, constans membrana pergamini æmula, costis intertexta, hanc quoque totā demittere potest ac in profunda rima cōdere: lata est sesquipedē, ubi latissima, & versus posteriora paulū angustatur. *Cutecras*sa, subaspera vestitur, tota subfusca: spinulis oblongis, trientē digitis longis, ut ita solida sit & aspera, cum squamis careat. Venter & caput inferius albicant, latera cinerei & argentei coloris: dorsum ex cinereo argenteo obscure fuscū, ut & caput superius & rostrū; reliqua rostrū cinere fuscit flavo. *Pinnæ* omnes cū cauda ex cinereo argenteo fuscescunt, ut & dorsalis, quæ præterea maculis orbicularibus, numi misnici magnitudine est variegata, illa post anum paulū undulata maculis fuscis: Carnem copiosam habet, non spinosam, pingue, non glutinosam, ideo ad comedendum aptiorem, quam caro *Marforum*. In ventriculo interiore


multos integros pisces pedales inveniebat author.

ARTICVLVS VI.

De Bagre aliquot Speciebus.

BAGRE piscis sex ponit author Species. ^{TAB. XXXVIII.} *Prima* est oblongo corpore, initio dorsi paulum elevato, capite ^{1. 2. 3. 4. 5.} acuminato seu conico, q. dura testa ^{Marcgrav. H. Bras. l. 4. c. 16.} est tectum ad initiū elevationis dorsi, pedalis longitudinis: Barbā habet sex cirrhis constantem, quorum quatuor inferiores sesquidigitū longi, duo superiores longitudinem totius piscis æquant. *Pinnas* obtinet septem, octavā pro cauda: nimirum duas postbranchiales loco inferiori positas, & ante quamlibet fortem aculeum, dentatū osseum, unā in summitate dorsi elevatā, & ante illam item aculeum fortem, equalis cum pinna longitudinis: duas junctas in medio ferè infimi ventris, magis tamen versus posteriora, unam membranaceā sine spinis versus caudam, & huic oppositā medio-crem mollibus spinis suffultam. *Cauda* constat pinna furcata, caret squamis, sed tegitur cute per totum argentei coloris splendentis. *Pinnæ* omnes argentei sunt coloris, ut & barba & caput. Per medium utriusque lateris tendit linea argentea ad caudā usque, constituta ex 77. protuberantiis. *Oculi* nigri satis amplios parvulum, edentulum, labiis elevatis. Piscis est edulis, si quis ab eo læsus fuerit, difficulter sanatur, & magnos patitur dolores.

Secunda corpore oblongo, capite compresso & plano, ore inferius parabolicę figurę, obtuso, edentulo. *Caput* octo digitos longū, testa dura punctulata tectum. *Oculi* parvi, rotundi, crystallini, quatuor ferè digitos ab invicem distantes. Barbam habet sex cirrhis constantem, quorum exteriores longiores, quatuor digitorum, reliqui breviores: septem illi pinnæ, octava pro cauda: una nimirum in summitate dorsi, firma spina anteri⁹ munita, erecta, tres digitos longa, totidē lata: duæ postbranchiales, itidem firma spina munitæ, quatuor digitos longæ, duos latæ, Interstitiū sex & semis digitorum post branchiales



chiales in infimo ventre (qui paulum extuberat) duæ junctæ, tres digitos longæ, duos latæ, in ambitu circinatæ: septem digitorum intervallo à dorsali, alia in extremo dorso, carnosæ, sesquidigitum longa, unum lata, in extremitate mollibus spinis munita; & sub hac in infimo ventre alia paulo major cauda sequitur trium digitorum intervallo, in duo cornua diducta, crassa seu molli membrana constans duos & semis digitos longa, in quolibet cornu duos lata. Totum caput superius, & ad latera, dorsum totum & latera ad protuberantiam ventris usq; candidi cum diluto flavo & aureo mixti est coloris, in testa capitis etiã aliquid viridis transplendet: *Pinna* omnes & cauda gryseæ sunt: Venter & laterum inferior pars & caput inferius (quod planum est) albi coloris. Caret squamis, sed vestitur cute. Bona satis est carne, melior quam Camarupi, cuius magnitudinem ferè æquat.

Tertia figura & magnitudine ut præcedens, sed barbam habet quatuor tantum cirrhis constātem, duobus nimirum longis octo digitos, & latiusculis instar ligulæ, duobus brevibus: ad pinnam dorsalem similis ligula novem digitos longa, & postbranchiales pinnae eodem modo: cætera similis præcedenti.

Quarta Belgis vulgo *Clipbagre* decem digitorum longitudinem habet; corpore oblongo: Capite lato & cōpresso: ore parabolico, edētulo. Barba constat sex cirrhis, quorum quatuor inferiores unum digitum, superiores duos longi. Oculos habet parvulos, cæruleoscentes, quatuor digitorum interstitio ab ore in summitate dorsi tegitur testa dura ossea, & postbranchias in quolibet latere pyramidalis testa angusta tegit latera. Pinnas habet septem, & octavā pro cauda: nimirum unam in summitate dorsi, elevatam, mollem, sesquidigitum altam, plus uno latam, antèrius spina ossea crassa dupliciter ferrata, duos & semis digitos lata sustentatā. In medio ventre infimo duas parvas: in fine penè dorsi, carnosam, parvu-

lam, angustam, & è regione huius inferius aliam parvulis spinis suffultam; cauda diffusa in duo cornua sesquidigitum longa. Tegitur cute: ac in capite, initio dorsi & lateribus, ubi testaceus est, umbræ est coloris, per reliquum totum dorsum & latera umbræ dilutioris, & fuscis maculis mediocris magnitudinis variegatur: in ventre albicat. A testæ latiore fine ad caudam usque in quolibet latere, per lineam rectam tendit ordo denticulorum acutorum, posterius versus, qui clypeo duro ferrato in medio insunt, nam anguli obtusi figura positi sunt usque ad caudam hoc modo 7.

Edulis est, sed pauca carne, quæ non magni fit.

Quinta præcedenti similis, & maculis nummi misnici magnitudine variegatus: Verum caret denticulis illis in lateribus: lineam solummodo habet: & duos cirrhos, & sex longiores quam altèr. Hæc species habet carnem bonam & pinguisimam.

Sexta magnitudine & figura similis illi, quem secundo loco descripsimus: sed barbam habet tantum quatuor cirrhis constantem, duobus nimirum longis octo digitos & latiusculis instar li. ulæ, duobus admodum brevibus. Ad pinnam dorsalem similis ligula est novem digitos longa; & ad postbranchiales eodem modo; cætera per omnia similis illi, quem diximus, nam & ventrem ita protuberantem habet.

ARTICVLVS VII.

De Ajereba, labebirete, Niqui, & Guatacupu.

AIEREBA Brasiliensibus *Raja* species, piscis planus, circinatus, unum pedem & novem digitos longus, & totidem latus (reperiuntur & duplo maiores.) Quatuor digitorum interstitio ab anteriori circumferentia in superiori superficie duo foramina habet satis ampla, tres digitos ab invicem distantia, prope cau-

dæ exortum orbicularis incisura est in quolibet latere: *caudateres*, quatuor pedes longa, & circiter in medio sui, duas osseas spinas crassas retro dentatas habet, quibus pungit, quando ad spiracula apprehenditur, caudam incurvatam supra corpus levando. *Os* inferius habet, haud amplum, edentulem, incisuræ quasi parabolicæ. *Cute* tegitur in superiori corpore ferrei coloris, & in medio dorso insignitur tuberculis nigris, parvis: inferius corpus totum album. Caro nihili æstimatur in cibis.

Iabebirete Raja species, ejusdem magnitudinis cum *Ajereba*, figura autē obtusi vomeris ad latera extuberantis: sectiones prope caudam ut in illa, & præterea duo corpora cylindracea digiti crassitie protuberantia. Cauda longa. Color piscis superius è cinereo fuscus, inferius albus, carne probata est & bona.

Reperitur hic & alia *Raja* species præcedenti similis; excepto quod processibus illis cylindraceis prope caudam destituitur. Color totius corporis superius umbræ, punctulatus per totum maculis nigris, feminis sinapi magnitudine: *Cauda* aculeis caret. Carnem habet bonam.

Reperiuntur hic & *Raja*, quarum caudæ tres & semis pedes longæ, crassæ in initio tres digitos, & in fine plane acuminatæ, plenæ tuberculis nigricantis in totum coloris, flexiles ut seutica.

Nique Belgis Pieterman: Piscis est capite crasso, ore ranæ amplo, edentulo, crassa lingua, inferiore mādibula paulo longiori quam superior. Anterior corporis medietas est paulo latior, posterior angusta & teres: estque ut plurimum sex aut septem digitos longus, latus antierius quidem sesquidigitum aut paulo latior: Ocelli ipsi parvi quidem, sed exserti, cylindracei more cancrorum terrestrium, pupilla nigra, circulo è cinereo fusco. Branchias habet amplas, & post quamlibet pinnam unam, digitum longam & latam, in ambitu circinatam: in ventre sub his paulo inferius duas junctas: à medio

dorso pinna ad caudam pene continuatur, semidigitum lata, at in fine paulo angustior, cui respondet similis in infimo ventre: *Cauda* plus digitum longa, minus lata, parallelogrami figura, in extremitate circinata. Ante exortum pinnae dorsalis duos habet aculeos fortes, & supra postbranchialem utramque unum acutum. Tegitur cute, cujus color ex nigro & umbra, gryseoque mixtus, nimirum in toto dorso, capite & lateribus, pinnisque omnibus; Venter albicat, & in lateribus etiam plus albi, quam nigri aut grysei est. Per totum dorsum, caput & latera, puncta nigra, magnitudine seminis papaveris, dispersa.

In arena absconditus jacet prope littus Maris, ac incedentes vulnerat.

Eduis est, si jecur & fel bene separetur, aliis lethalis.


Guarapucu Lusitanis *Cavala*, Belgis *Roningsfisch* est corpore oblongo, ferè æqualis ubique crassitie, excepto versus posteriora, ubi magis magisque attenuatur. Ut plurimum in septem pedum longitudinem excrescit, & crassitiem corporis humani. *Caput* & *os* habet acuminatum, dentes acutos, rotundos, ordine positos, oculos magnos crystallinos, circulo argenteo: *Pinnas* octo, videlicet post quamlibet branchiam unam triagulare, directè à latere protensam: unam tenuè angustam ferè in initio dorfi, post hæc unam in eodem dorso triagularem erectam, sub hac in infimo ventre triagularem; duas mediocres triagulares in infimo vêtre subter postbranchiales. *Cauda* constat magna pinna in duo cornua amplè extensa. A pinnis autem triagularibus, tam in dorso, quam in infimo ventre, parvulae ordine pinnulae oblongae sunt dispositae usque ad caudam. Vestitur cute argentei coloris, cui in ventre paulum cærulei, in dorso multum miscetur, ut color resplendeat. In quolibet latere linea subtilissimis squamulis contorta describitur ad caudam usque. Boni est saporis. Est quidem *Scomber*, sed quia Icon quam supra dedimus, non cōvenit, ideo & hæc adijcere placuit.

CAP.


TAB.
XXXVII.
8.
I. C. 17.

Guarapocu.


Tab. XXXIX.




Guacucua.



Guamaiaçu Atinga.




Piraaca.




Cucuri.

5




Narinari.




Tihurenis.

7



Iperogiba & Piragiba.

8



CAPUT II.

De Piscibus non omnino
levisibus.

ARTICULUS UNICUS.

De Guacucuja, Guamajacu
guara, & Guamajacu
Attinga.

TAB.
XXXIX.
2.3.
Marcgrav.
H. Bras. l.
4.6.1.

GUACUCUIA, *Monoceros* piscis: *Vespertilio* Aquaticus posset appellari. Corporis figura antea est instar vomeris: Corpus octo digitos longum, quinque latum in medio, ubi latissimum: medietas autem corporis posterior rotunda est, & versus caudæ pinnam fastigiatur in conum: medietas autē anterior vomeris seu lati cordis figuram obtinet. Piscis autem non crassus, sed latus; caput vix prominet seorsim à corpore, estque illi inter oculos supra os cornu impositum, durum, duos pene digitos longum, conicum. Oculos habet nummi misnici magnitudine, pupilla crystallina lenticulari, reliqua pars variegata maculis; & lineis flavis albisque. Oris hiatus castaneam potest capere, ipsum edentulum est. Supra os carnea prominentia est instar tonsillæ humanæ ferè. In utroque latere in medio piscis, brachium eminet, quatuor digitos longum, una junctura constans, inferior medietas brachij duos digitos longa est, unum lata in infimo ventre inter brachia duas habet pinnas sesquidigitum longas, quæ quasi pedes sunt. Cauda consistat pinna duos digitos longa, sesquidigitum lata, ac fere quadrata. In inferiore corpore, sesquidigiti interstitio à cauda etiam pinnulam habet parvam, & talem etiam in dorso, trium digitorum intervallo à cauda, Cute tegitur, non squamis, quæ superius fusca est, multis tuberculis duris, per dorsum insignita versus anticam partem, & utrumque latus. In utroque autem latere undecim nigras habet maculas lentis magnitu-

dine & figura, binas ac binas juxta se positas. Prope insertionem utriusque brachij etiam multas ejusmodi maculas nigras habet, & ibidem in quolibet latere foramen parvum in corpus.

In summa, in lateribus, circa oculos, in extremis branchiis, mirè variegatur punctulis albis, nigris, lineisque itidem albis & nigris, ut vix exprimi possit à pictore. In toto autem inferiori corpore egregij miniati est coloris, atque ibi cutis æqualis, verum ad tactum paulum hispida.

Guamajacu Guara, Lusitanis *Peixe porco* & *Diabe*: Orbis est species. Longitudo ejus ab initio oris ad pinnæ exortum in cauda quatuordecim digitorum: pinnæ caudæ longitudo plus duorum digitorum: Rotundo est corpore, & crassities ejus duorum & viginti digitorum. Caret squamis, tegitur cute, per totum corpus ex fusco ochræ coloris pallidi, in ventre albi. Totum corpus aculeis munitum est, qui in lateribus longiores, in reliquis partibus breviores (longiores autem sunt duorum digitorum) teretes, in extremitate valdè acuti, & singuli tribus insertionibus, quasi triquetris cuti infixi. Inter aculeos cutis ubique maculis nigris scatet, excepto ventre. Oculos habet magnos eminentes: Os parvum obrotundum, edentulum: pinnae tantum quatuor, duas in lateribus duos & semis digitos longas: unam in dorso versus caudam ejusdem magnitudinis, & minorem sub ano.

Potest orbis muricatus Gesneri dici.

Habui inquit author, alium minorem vivum Mense Febr. anni 1639, item alios duos mense Septembri vivos. Cutis eorum erat fusco virescens, in ventre nigricans: aculei ut prioris, & planè similis figura corporis: prope quamlibet pinnam, maculâ habebant nigram, ut & utrimque ad latera prope os. Pinnarum color erat flavus: oculorum pupilla nigricans, circulo luteo. Supra utrumque oculorum cornu exile, satis longum, molle, cutacea substantia constans, quod

quod præ se fert natans, quando autem extra aquam est, flavescit. Inflare se potest & iterum confidere. Sonum edit *Blech/ Blech*. Si velis ut se inflat, trahere pinnam quæ in dorso est.

Idem l. d.
c. 14.

Guamaia *Attinga* Brasiliensibus, Marcgravio *Orbis muricatus* Ranæ rictu, septem digitorum longitudinem habebat, & corpus oblongum: os Ranæ simile, & loco dentium tam superius, quam inferius; os durum; oculos magnos, rotundos, protuberantes, pupilla crystallina circulo flavo: Branchiarum loco foramen in utroque latere digitum admittens, & pone hoc pinnam trapezii figura, unum digitum longam, duos latam: In extremitate dorfi versus caudam etiâ pinnam oblongam, haud amplam, & e regione huius similem in infimi ventris extremitate. Cauda constat pinna sesquidigitum longa, unum lata. Totum corpus tegitur cute spinosa, quæ in capite in duram testam abit. Spinæ illæ constant duris ossibus & acutis: in infimo tamen ventre caret spinis, sed mollis est instar Ranæ. Totum corpus & caput superius ex gryseo & fusco est maculatum: magis tamen suffecit, inferius totum ex albo flavescit, ut & spinæ totius corporis. Pinnae omnes flavescent. Post utraque pinnam postbranchialem maculam habet nigerrimam stufæri magnitudine, & supra hanc utrobique, paulum tamen magis versus anteriorem aliam minorem nigerrimam. Ad utrumque latus exortus pinnae dorsalis etiam similem habet, parvulas item sub oculis & ore. Vtris modo se inflare potest. Edulis est, & capitur in fluviis dulcibus.

CAPUT III.


*De Narinari, Tiburone,
& Iperuquiba,*

TAB.
XXXIX.

NARINARI. Sunt aliquot illius species, hæc quam hic describimus, appellatur *Narinari pinima*:


Lusitanis *Raja*, Belgis *Puissteert* vel *Deicle*. Pastinaca marina. Corpus habet magnum, latum, fermè triangulare: constas ad utraque latera latissima pinna triangulari, carnosa: & prope caudam habet duas pinnas, palmi magnitudine, subrotundas æqualis longitudinis: caput magnitudinem habet mediocris porci, crassum, compressum, in medio quasi fossam habens. Os triangulo subrotundum, compressum paulò & in promuscidem definens: nam oris hiatus quinque distat digitos ab extremitate promuscidis versus ventrem: amplitudo oris duorum & semis digitorum; edentulum, sed loco dentium os habet lingue figura inferius in ore, quatuor digitos longum, sesquidigitum latum, ad fauces usque pertingens, & simile os superius, transversum positum, duos digitos longum & totidè latum. Inferius os constat è septendecim ossibus, albis, duris literæ U figurâ habentibus, quæ arctè per membranas coniunguntur, hisce alia septendecim subiacent, singula singulis, spongiosa ad aspectum, nec ita dura, superius os constat quatuordecim ossibus literæ J figura, quæ eodem modo per membranas sibi invicem agglutinantur, iisque etiam alia quatuordecim ossa superiacent: duo autem illa ossa per membranas annectuntur aliis ossibus capitis. *Crani*j cavitas sex circiter digitos longa est, vix duos lata, in qua cerebrum later. Promuscis tantum constat cartilagine. *Oculos* habet parvos, nummi misnici magnitudine: post oculos in quo libet latere spiraculum amplum, pomi vulgaris capax; intra hæc branchiarum folia recondita jacet: ad latera inferius a fine capitis in quolibet quinque oblongas incisuras. *Color* totius superius ferreus, maculis albis per totum inspersus, magnitudine nummi misnici, inferius totum album. *Cutis* tota glabra lævisque. *Corporis* longitudo ab occipite ad exortum caudæ sesquipedalis, latitudo inter extremitates pinnarum triangularium, trium pedum, & decem digitorum.

Pinna-




Pracamo Brasil.

Pirametara.




Petim Luaba.


Tabac pype.




Sallema seu Salema.




Camaripiuguacu.



Leo marinus.



Frater Hugo.






Galerita.

See monch.

Synagris.

ii





Pinnarum prope caudam longitududo septem digitorū, latitudo quatuor. *Capitis* longitududo decem, latitudo septem digitorum, crassities sesquipedis. *Caudæ* longitududo quatuor pedum & trium digitorum: crassities sesquipedis. *Caudæ* longitududo quatuor pedum & trium digitorum: crassities in exortu quinq; digitorum, quæ sensim gracilescit. Paulo post exortum caudæ superius parvam pinnam curtam habet, paulo plus digito longā, & mox post eam duos hamulos sibi invicem super erectos, piscatoriis hamulis similes & incurvatos, longitudine trium digitorum. Caro boni est saporis, sufficiens quadraginta hominibus saturandis.

Tiburoni species minor. Belgis een Crupshape, à figura. Convenit eum majore, excepto capite, quod triangulare habet seu prout cor vulgo pingitur. *Oculi* parvi ad latera ipsius capitis. *Os* parvum, triangulare longe infra positum, triplici ordine dentium minorum, unde ita nocere non potest, os quippe habens angustum. Caro melius sapit, quàm majoris.

Iperuquiba, & *Piraquiba*. Lusitanis *Piexe pogador* & *Piexe piolho*, nostratibus *Dupger*, quia Tiburoni adhæret fugens. Octodecim digitos longus, ferè teres, quatuor digitos crassus, ubi crassissimus, in postica parte attenuatur. *Os* habet triangulare, cuius pars superior brevior inferiori, etiā linguam. *Caput* superius ad dorsum usq; duos digitos longū, circiter planum & figuratum, ut palatum alicuius piscis strijs transversis, hac parte Tiburoni firmiter adheret in ventre, & capto illo simul capitur. *Oculi* parvi, flavi, pupilla nigra, semicirculo flavo. *Dentes* nulli, sed eorum loco multæ minutissimæ prominentiæ. Post branchias utrobique pinna obinet triangulatam, duos & semis digitos longam, subter in ventre duas junctas: à medietate corporis tam superius, quam inferius, etiam pinna extenditur angusta usque ad caudā, quæ pinna constat sesquidigitum longā. *Cute* tegitur per totum corpus cinerei coloris.



TITULUS III.

De aliquot aliis, & inter hos
monstrosis piscibus.

CAPUT I.

De pisce ἀνθρωπομορφῶ & Remoranti.



Piscem ἀνθρωπομορφῶν, ita describit Kircherus. Capitur certis anni temporibus in mari Orientali India ad insulas Vissajas, quas insulas Picorum vocant, sub Hispanorum dominio, piscis quidā ἀνθρωπομορφῶ, id est, humana prorsus figura, quam ideò Peche muger vocant, ab indigenis Duyon. Caput habet rotundum, nulla colli intercapedine trunco compactum. Extremæ aurium fibræ, quæ & auriculæ nominantur, ex cartilaginea carne eleganter vestita, quarū interior pars amplissimis formata anfractibus, veram hominis refert aurem; Oculos suis ornatos palpebris, situque & colore non piscis sed hominis iudicares; naso non nihil aberrat: malam inter utramque non usquequaque eminet, sed levi tramite bipartitur; sub eo verò labra magnitudine specieque nostris simillima. Dentium non quales insunt piscium generi serratiliū, sed plenorum & candidissimorum continua series. *Pectus* alba cute contextum, hinc atque hinc paulò latius quàm pro corpore in mammas extuberans; neque eas ut fœminis pendiculas, sed qualis virginibus globosas, plenas lactis candidissimi. Brachia non longa sed lata ad natandum apta, nullis tamen ipsa Cubitis, ulnis, manibus, articulisve distincta. In ministris soboli propagandæ membris, in utroque sexu nulla ab humanis distinctio: posthæc in piscem cauda desinit. Hactenus ingeniosissimus Kircherus. Ossa huius piscis insignem vim sanguinem si-

TAB.
XXXX. 1.
Kircher.
Artis Mo-
gnet. l. 3.
par. l. 6.
P. 675.

Nieremb.
H.N.II.
6.4.

stendi & attrahendi habent: visa, ita sanguinem currētem stringere, quasi vena ligaretur. Efficaciora tamen foeminarum, & ex his quæ maculis ad nigrorem accedentibus distinguuntur. Alius quidā dicit, carnem carni hominis applicatam, ita omnes spiritus ad se attrahere, ut hominem veluti stupidum reddat. De *Remoranti pisce* apud Hugonem Lincho-
ranum habemus. Historia talis est. Navis quædam Lusitanica per Mo-
rambiquem in Indiam decurrebat. Vento hæc adeo secundo & optato utebatur, ut vela omnia plenissima navem proferre felicissime viderentur. Diebus ergo quatuordecim integris cursum versus Lineam æquinoctialem nautæ tenentes, & quotidie altitudinem metientes, tandem observarunt, gradus ad metam propositam, non minui aut pauciores fieri, verum quotidie multiplicari, seque ab æquinoctiali Linea quam longissime dispelli & arceri. Quæ res non saltem præter omnes naturæ causas esse videbatur, ad admirationem univerforum, verum etiam qui in navibus erant, certis se præstigiis & incantamentis agitari, liquidissime rebantur, cum scirent, illius loci mare huius appulsus neutiquam causam esse, & vela secundis ventis interim nihilominus ex voto turgida procedere. Sese ergo anxie invicem contuentes, partem terrore, partim anxia vi & admiratione diu exercebatur; dum tandem, nescio quo casu, nautarum quidam, attentis & sollicitis in undam oculis despectans, latam & ingentem quandam caudam proræ intortam innexamque contritus est, qua piscis quidam navem firmiter prehenderat, reliquumque corpus per navis longitudinem exporrexerat, adeo ut caput ipsius post puppim prominere. Hoc ille sit navis omnem molem ita violenter torquebat, ut illam contra violentissimum quoque resantis venti impetum vi & robore suo immenso retroageret, secumque tot diebus rapide proferret. Iam itaq; hoc pacto causa repulsus præcognita, adactis sudibus

furcisque & organis, conferentibus cæteris, ad arcendum eum tamdiu studiosissime laboratum est, donec tandem, cauda plicatili avulsa, navem ille destitueret, cum iam diebus quatuordecim integris illi agglutinat adhæsisset, & violento renissu eandem, omni impetu ventoq; contrario spreto, natando secum abrupisset. In æternum itaque memoriæ signum historiæ hanc Pro Rex in atrio suo depingi accuravit: quâ effigiem his meis oculis persæpe egomet cum magna admiratione usurpavi, & circumstantiis supradictis subnotatis diligentissime perlegi.

CAPUT II.

De pisce Goensi.

IDÉ Hugo narrat, ex flumine quodam Goæ, cujus ostium hyberno tempore pro loci more obstructum erat, pisces quosdam monstruosos piscem extraxisse, cuius similem nec in India nec in aliis locis uspiam videre contingit: qui ob novitatem Archiepiscopo, ejus jussu à pictore ad vivum exprimebatur cujus Icon seu effigies Regi Hispaniarum postmodum transmissa est. Animal illud mediocris magnitudinis erat, canem domesticum vulgarem altitudine haud excedens, cujus rostrum porcino simile protuberabat. Oculi ei parvi erant; nullæ aures, quarum loco duo saltem foramina hiabant. Pedes elephantinis (respective tamen) per omnia similes erant. Cauda ad dorsum fissa, sensim in acumem desinebat. Per atrij pavimentum cursitans, suum porcorumve grunniebat ritu. A capite ad caudam universum corpus squamis, pollicis articulum prioris equantibus, constitutum erat tam solidis ac firmis, ut nec ferrum, nec æs plus resisterent. Grandibus & frequentibus, non secus ac incus quædam, à nobis plagis contusus, nihil aliud quam convolvebatur, & echini more caput caudamq; intro condebatur, ut globi exquisitam rotunditatem præ-

Nieremb.
H.N.I. II.
6.5.

præstaret: nemine interim juncturam proportionem satis observante. Conglobatus, nulla, vel vi, vel machina divelli aut expediri poterat; relictus tamen, sponte se iterum pandebat aut explicabat, & qua via patebat errabat.

CAPUT III.

De pisce ludicro, *Pusta*, &
Michipillin.

Illuvies menstrua, & ludicus gestus, unde nomen meruit, commendant *Axototl*, h. est, lusum aquarum. Genus quoddam est piscium lacustrium molli cute intectum, ac lacerarum more quadrupes, dodrantis longitudine pollicemq; crassum, etsi interdum cubitum excedat. Vulvam habet muliebri simillimam, ac veter eius maculis fuscis distinguitur, corpore medio ad caudam usque, nempe prolixam & quæ juxta finem tenuissima sit, paulatim ac sensim gracilescit. Pro lingua est cartilago brevis ac lata. Quaternis natat pedibus, in totidem digitos, per similes ranarum, fissis. Caput depressum est, & reliqui corporis proportionem magnum. Hic rictus, aterque color. Huic menstrua singulis quibusque mensibus fluere observatum sæpe sæpius est, haud aliter ac mulieribus; tum venere abunde excitare, haud secus ac scinci facere solent, quos terrestres crocodilos quidam vocant, ad quorum genus fortasse pertinet. Salubre ac gratum præbent alimentum, nec dissimile anguillarum carni. Multis modis parari solent, frixi nempe, assi, elixique. Verum ab Hispanis magna ex parte ex aceto mulso, addito pipere, caryophyllis, atque siliquaestro Indico: à Mexicanis vero siliquaestro solo, seu intacto, seu integro, familiarissimo illis ac prægrato condimento. *Pusta* capiuntur in fluminibus Panu-

star paulo protuberantiorè, quibus simul cum miltomame permixtis & admotis, subvenitur passis erisypelata, brevitate & facilitate mirabili. *Michipillin* seu ova piscium, dicitur genus quoddam lacustre, album, quod ex omni piscium in lacu degentium Mexicano conflatur multitudine, unde factum est illi nomen. Statis anni temporibus eadem capitur palude, haud aliter quam thynni, trichiæ, scombri, similesque pisces, alij gregatim vagantes in Oceano. Agmen pisciculorum esse creditur, haud lendibus majorum. Medio id procedit alveo, in neutrum litus inclinans, tã numerosũ à multitudine, ut quinque cubitorum intervallum aut amplius occupet. Non prætermittunt occasionem piscatores, sed diligenti observatione & cura vagantes pisciculos captant excipiuntve retibus, atque ita non mediocris solet sæpenumero fieri captura. Coquuntur iidem alienis fictilibusve vasis, ferculisque ubi opus est, adiiciunt, addito siliquaestro chillive: quo apparatu neque modico neque ingrato cibo constant, sed quo non modo Indi, verum advenæ quoque Hispani sæpenumero vesci gaudeant.

CAPUT IV.

De *Ambiza* & pisce
mulari,

Adnectam quod Philippus Pigafeta scribit de quodã pisce *Zairi*, qui membra duo habet manus humanas referentia, & caudam clypei & forma & magnitudine. Vocatur hic ab incolis *Ambize angulo*, id est, *porcus aquatilis*, propter pinguedinem qua porcum refert. Caro, quæ ab incolis fumo induratur, & ad lautitias reservatur, & gustu & odore est grato. Aquam dulcem non relinquit. Pabulum ejus est gramen, & omnis generis herbæ in littore enatæ. Ore bovem refert. Tantæ interdum &

Dd 2 magni-

Nieremb.
H.N.l.II.
c.41.Nieremb.
H.N.l.II.
c.13.Nieremb.
H.N.l.II.
c.14.

magnitudinis, ut quingentas libras pondere elever. Capitur à piscatoribus non ut pisces, sed fere ut bos. Observato enim loco diligenter, ubi pasci solet, scaphis suis expectant, & advenientem contis aut remis occidunt: occisum ad aulam regiam deferunt; aliter enim capitali proposita pœna (ut & alios pisces, qui hinc Regij dicuntur, nempe trutas, & cacongo pisces singularem, salmonem figura referentem, sed colore diversum, caro enim ea est alba; & tam pinguem, ut prunis superimpositus eas extinguat) vendi non potest. Unde diligenter ne impunitas audaciores reddat, observantur piscatores ab Aulicis, & deprehensi absque ulla remissione plectuntur. De *piscemulari* sic scribit Nierembergius.

Nieremb.
H.N.l.II.
c.62.

Sub Philippo II. visa in Oceano bellua duabus velificans alis, navis specie. Fregit unam bombardæictus. Irrupit per fretum Herculeum bellua furens, & horribilibus frendens mugitibus atque illapsa per mediterraneas Hispaniæ oras, Valentiam appulit, ubi demum exanimata, centum & quinquaginta dodrantes prolixa, molis circuitus centum, vacuitas cerebri septem homines capiebat.

Eques in os consistere posset. Maxillæ servantur in Escoriali usque ad decem & septem pedes porrectæ, viginti armatæ dentibus duorum dodrantum, minimi unius. Genitalia immodica. Appellatum idcirco monstrum piscis mularis. Aliqui eruditi lamiam fuisse putarunt ob fauces & ingluviem. Duo cadavera in stomacho reperta. Creditum quoque aliquibus huius generis belluam devorasse Ionam Prophetam. Quis certo sciet?

CAPUT V.

De Piscis tauriformis & *Amiloti*.

Piscis tauriformis est Francisco Her-
mando pisculus vix duos palmos
longus, sed pinna munitus caudæ
instar, sed pæne prolixa digitos: cor-
rio intestus duro, fusco, sed circa
ventrem candenti, & ubique penta-
gonis sex angulisve distinctos figuris.
Os est minimum, sed longiusculis
munitum dentibus: Oculi magni,
pinnæ circa aures binæ satis parvæ,
quemadmodum & aliæ duæ, quarum
altera circa extrema ventris est,
altera verò juxta postremum dor-
sum; mirum est, in hoc pisciculo du-
as prominere juxta frontem spinas
acuminatas, infractæ duritiei, instar
corniculorum, ac totidem alias ea-
dem magnitudine & forma circa
ventris postrema. Vide an ad Boopa
vel Acanthiam referri possit. *Amiloti*
vero est piscis teres, lacustris, squa-
mosus, candescens, maculis aspersus
pullis, sesquidodrantem longitudi-
ne, & pollicem crassitudine ex-
cedit. Binas pinnas habet in dorso, to-
tidem in ventre, utrimque unam, ac
infra ventrem alteram. Caput est
oblongum, rostrum acuminatum:
sed inferna maxilla prominentior.
Oculi sunt nigri, iris aurea. Aureum
caput, venter luteus, adeoque reli-
quum pæne corpus. Victum eius sic
commendat Franciscus Hermadus.
Optimum & concoctu facile præbet
alimentum; nam & ovis capitur ma-
gna ex parte onustus, adeoque gra-
tum, ut cum gravem quamdam eva-
sissem ægritudinem, mihi que nutri-
menta omnia, à sanis hominibus &
sagacioris palati vehementer expe-
rita, sorderent displicerentque vehe-
mentius, hoc uno cibi genere suavissi-
me usus sim, & ad vires instaurandas
non mediocriter adjutus. Sed ma-
gnitudo ipsa adeo gratiam commen-
dat, ut quo in majorem amplitudinē
adoleverit, eo majori habeatur in
precio, experatur avidius, ra-
rius invenitur venalis,
inventusque ematur
carius.

Nieremb.
H.N.l.II.
c.24.
Nieremb.
H.N.l.II.
c.26.

HISTORIÆ NATVRALIS

De Piscibus,

LIBER V.
DE CETIS.

C A P U T I.

De Cetis in genere.



Etorum nomine sæpè tam apud Græcos † quàm Latinos ingentis molis pisces intelliguntur; hic pro illis duntaxat sumimus, qui pulmones, arteriam, collum & alia membra cum terrenis quadrupedibus communia habent, quibus omne propriè dictorum piscium genus constituitur. Specialius aliquando, seu pro Pistrice, seu pro Balæna sumi, apud Ciceronis Aratum, & Oppianum videbis. Integuntur corio, qui Macedonibus, dum è Mesambria Tocam navigarent, visus, corio squammoso, tam crasso ut cubitum æquaret, ostreisque patellis, & algis oppletus, pro monstroso habendus est. Lora ex eo fiunt, quibus maxima pondera per cochleas sublevantur, simili duritie & nervos esse, & chordas exiis ad bellica instrumenta confici, prodidit Ælianus. *Pulmones* habent, quod plus caloris, quia ingentis molis animalia, ut possint moveri, requirunt. Branchiis † ideò carent, sed *fistulas* (ora vocat Plinius, nares Ovidius, Cardanus oscula) accipere. Ductus hæc ab ima palati ad extimam parte duplex, septo distinctus, & nostrarum narium foraminibus ad palatum deductis, proportionem quodammodo respondens. Vnicum in extima parte lateræ C. figura foramen apparet, quod

carne pingui, tanquam operculo, tegitur. Respirationis gratia datas, vel exinde colligas, quod obturatis, citius moriantur, quod in Delphino Rondeletius observavit. Os ipsos subter habere, Aristoteles & Plinius reliquere, ut dum resupinantur, pisces quos captant, evadendi tempus habeant, in promptu habere, observavit Rondeletius. Resupinatos tamen cibum capere, tum ob dictam causam, tum propter longam & multum infra descendentem oris scissuram. Carent quidam *Dentibus* instructi quidam, ferratis, planis, exertis, aliquando hominis similibus. Eboris instar candidos, ad opera firmos, anteriores latos, ne hæreret cibum, posteriores acutos, ut promptius divideretur, apud Cardanum legimus. *Mammæ* fœminæ habent; detractos aliquando ex una in Aquitanico litore duo lactis cados, Rondeletius prodidit. Audire certum, & nulla manifesti instrumenti vestigia, ut putat Aristoteles, Rondeletius tamen in Delphini cranio, meatum qui ad cerebrum usque excurrit invenit. Vehementer *pinguescunt*, quod piscium carne alantur, & moveantur tardissimè, quod tardo motu digerî posset, densitate corii præpeditur. *Internas partes* verbis Rondeletii describam. Subperitoneo, inquit, partes quæ ad nutritionem & generationem conformatæ sunt, ad quadrupedum terrestrium magis quam ad piscium partes accedunt. Nam *Epiploon* habent, sed minus pingue, quo ventriculus & intestina incallescunt, & foveantur. *Ventriculum*, magnum, cum ad justam magnitudinem accreverint: recens natis exiguum est, & geminus videtur. Eius fundo *pancreas* hæret, desinit in *intestina*, quæ in multos gyros convolvuntur, eadem ferè ubiq; crassitudine, præterquam in extremis, quæ mediis paulò sunt latiora. *Mesenterium*, vertebris annectitur, glandulas nigras, venas, arteriasque intertextas habens. *Renes* venæ magnæ trunco, arteriæque magnæ per emulgentes annectuntur, sunt inter epa & testes siti. *Urina* per

Aristot. H.
A. l. 9. c. 2.
& 4. de
partib. c. 13

Cardan.
variet. c. 37.

Arist. H. A.
l. 4. c. 8.

† Galen. 3.
de Alim.
facult. c.
21. & 37.

Ælian. H.
A. l. 17. c. 6.

† Plin. H.
N. l. 9. c. 7.

ureteras in vesicam percolatur : quæ terrestrium animalium vesicis similis, sita est inferiore ventris parte. In iis qui utero adhuc gestantur, in urachum definit, per quem urinam deponit in allantoidem tunicam ad diem usque partus. Editi in lucem, per pudendum urinam veluti terrestria emittunt, & per musculum sphincterem retinent. *Vracho* arteriæ umbilicales adhærent, arteriæ magnæ inferioribus ramis insertæ. Utrinque sunt *testes* oblongi, quibus præparantia vasa præposita sunt, infiniti scilicet venarum arteriarumq; è magna vena ortarum ramuli, qui post varios & multiplices anfractus, in epidymis inferuntur. Cum enim magna sanguinis copia, multo femini generando necessaria sit, quæ longo vasorum ductu, ob spatii brevitatem transmutari & elaborari non potest, solerter admodum natura gyros illos vasorum constituit, ut illis, id quod longitudini deest, pensaretur, & quibus singuli meatus capreoli intorti dependent, & glandulosa corpora radici pudendi adnata desinunt; ex quibus meatu urinario, nervo cavo *genitale* constat humano simile, cuius extremum foris propendet, in glandem tenuem linguis avium similem desinens, quæ præputio non omnino integitur : intus replicatum latet, ad veneris usum exoritur. Venas suas, nervos, arterias, idem pudendum habet. Ossi innititur, quod ossi pubis proportionem respondet. *Thorax* costis veris ac mendosis, sternis, vertebis, musculis constat : cuius capacitatem *pulmones* magni complent, densiore substantia quam in terrestribus : crassitudine & colore hepar quadrupedum referunt, tum, ne aqua in rariorem substantiam penetrans, ejici non posset; tum ne in magnis expirationibus, quibus in aquis ferè semper coguntur, tenuior substantia ferè disrumperetur. Hi in duas partes divulsi sunt, parte inferiore adeò gracilescunt, ut membranam esse affirmes. Undique *Cor* complectuntur pericardio conclusum, in medio thora-

ce locatum, nulla in re porcorum cordi ab simile : duos sinus, totidem auriculas, denique omnia similia habet. Ad hæc, asperam arteriam, Oesophagum, musculos & quæcunque in terrestribus corporibus sunt, clavicula exempta, reperire est. *Caput*, cum vertebis articulatur. *Cerebri* dispositio diversa. Nam in antèrius & posterius divisum est, nõ in dextrum & sinistrum, ut in homine. *Nervorum* coniugationes ex eo nascuntur, plexus *χρυσειδης*, in eo rete mirabile, meningis duæ pro integumento. *Vulva* in fœminis cervicem palmum unum longam habet : ea deinde in ramos duos distribuitur, veluti in quadrupedibus terrenis videre est, testes ad uteri cornua positi, pudendum inter umbilicum & podicem. De *Magnitudine* in singulis speciebus dicitur. *Locus* si spectes, in solo nec tamen omni mari (Pontus Euxinus nullos habet) reperiuntur. Semperque ferè in alto versantur. Circa solstitia maximè visuntur, quod tunc illic ruant turbines, tunc imbres, tunc delectæ montium jugis procellæ ab imo vertant maria, pulsataque ex profundo, belluas cum fluctibus volvant. Alias in fundo maris ferè degunt, molis suæ pondere. *Cibus* ipsis pisces, harengi in primis, quos quandoque tam avidè persequuntur, ut in littora vadosa impingant. *Generant* intra se, & catulos enituntur. Hi teneri sequuntur matrem, quod à nautis visum. *Motu*, ob corporis molem, & ventris ingluviem tardo feruntur. *Visus & auditus* ipsis hebetior. Hinc curiosæ omnium naturæ beneficio, pisciculis, si credere fas est, tanquam ducè utuntur. Odore picis adeò delectantur, ut sese navi affricent. Strepitu terreri Arrianis in rebus Alexandri M. prodidit. *Usus* in cibis, apud Ichthyophagos, prodente antiquitate invenere.

Præparationem vide apud Aldrovandum.

CAPVT II.

De Cetis in specie.

ARTICVLVS I.

De Balena.

ET hæc de Cetis in genere sufficiant, in specie jam de iisdem agentur. Numerantur autem inter eos, *Balena*, *Balena vulgi*, *Physeter*, *Pristis*, *Orca*, *Delphinus*, *Phocæna*, *Scolopendra*, *vitulus marinus*, & *Manavi Indorum*.

BALÆNA, Græcis φαλæνα, vel φάλαινα, id est emittere, quod maris aquas per fistulas emittat, vel à φάλον quo vocabulo Græci meatum in galeis militaribus, cui plumas inferebant, indigitant, vel à Chaldæo בל, quod & devorare dicitur. Ingentis est magnitudo. Vifa in Indico mari, quaternum iugerum, seu nongentorum sexaginta pedum longitudine. Centum & quinquaginta cubitos obtinebat, quem Nearchus eiectum vidit. Describitur à Bellonio, Rondeletio, & Aldrovando. De suo scribit Bellonius, adipem eius velut oleum non concrefcere: pinnas habere utrinque unam & tertiam in dorso, qua totum corpus dirigit. Caudam lunatam, Corium nigrum, cui pinguedo pedis altitudine subfit, laridum quadragesimale appellant. Lingua eidem aliquot librar. pondo. Ante oculos prætenturæ, seu tenues quædam asfulæ, quatuor ulnas longæ, ac sesquipedem latæ, longissimis villis præditæ, quibus iter prætentat. Ossa tam magna, ut postes ex iis fieri soleant. *Rondeletius* suæ parvam linguam, & quæ quatuor duntaxat vel quinque vasa salsamentaria adscribit. Alibi, penem se unius vidisse, qui à procero homine humeris deportatus terram contingeret, scribit. In eius quam *Gesnerus* describit ventriculo tria dolia crudo-

rum pisciculorum, inter quos salmo unius ulnæ longitudine, inventa sunt. Pelle nigro undique tegebatur, nisi quod maculæ duæ candidæ, utrinque supra medium oculi inciperent, & retro tenderent. Tota maxilla inferior erat candida, & pars quædam sub ventre. Plura apud *Gesnerum* vide. *Aldrovandi* prior colore erat subcæruleo, tota maculis nigrificantibus conspersa, ventre candido. Altera, quam *Bufalinam* vocat tota nigricabat. Capta erat An. M. D. LXXVII. in Scaldi decem ab Antverpia miliaribus monstrosa, quam *Pareus* descripsit. Longitudo eius erat pedum octo & quinquaginta, altitudo sexdecim. Cauda quatuordecim pedes lata, ab oculo ad extremum rostrum intervallum sexdecim pedum, Maxilla inferior senum in singulis lateribus pedum erat, viginti quinque dentibus armata, qui totidem foraminibus in superiore dentibus omnino carente excavatis, recondi poterant. Tot dentium longissimus sex pollices non excedebat. *Locus* ipse procul à terra ubicunque degit. Plurimas *Schonfeld*, autem circa Islandiam, Gronlandiâ, in *Ichtyol.* & vicina Septentrioni loca, à Biscainis, Anglis Hollandis, circa æstivum in primis solstitium, quo tempore sinus recessusque maris pacatiores quærunt, capiuntur. In Ta-probanæ mari Thunnis insidiari, apud *Ælianum* legimus: in Gaditano Oceano non ante brumam conspici: statis temporibus in quodâ sinu placido & capaci, mirè gaudentes ibi parere, condi, *Plinius* prodidit. *Victus* ipsis pisces, visus qui quadraginta asellos devoraverat, eosque adhuc recentes, quos oculatus testis dissectos & sale conditos ad solem siccavit. Sunt qui comedere masticando negent: pisces deglutire integros, eosque minutos, quod interna gutturis membrana nil magnū ingredi sinat, dicunt. Quidam carne vesci negant, quod in captæ visceribus præter mucum & spumam nihil reperiatur. Pisciculum *Lodel* venatoribus dictum, si copiosè voravit inobviatur quasi, & in furorem

TAB.
XLI.
TAB.
XLII.

Vossius de
Idol. l. 4.
c. 32.
Plin. H.N.
l. 9. c. 3.

Ælian. H.
A. l. 16. c. 18

Plin. H.N.
l. 9. c. 6.

Schonfeld.
in Ichtyol.

rem acta, ne hominibus nec æqualibus suis parcat. De *Coitu partique* (verba sunt Schonfeldii) venatores referunt, Balænas contracta societate & consuetudine in amorem mutuum, quem coniunctione, saltatione, aliisque affectuum coniugalium significationibus inter se testantur coire; hinc unà natæ semper, amicitiamque cæptam conservare, donec accensa ad libidinem fœmina, erecto ad perpendicularum & in caudam corpore, marem eodem positu obviam, pinnis suis, tanquam brachiis duobus amplectatur, mutuoque complexu per horæ dimidiam, vel integram utræque hæreant: Inde coniugium & conversationem ad mortem usque colere. Fœmellæ fœtum autumnino inter Octobrem & Ianuarium pariunt, unicum, tauro non minorem, imò maiorem pro matris quantitate, qui sub maternarum pinnarum præfidiis & tutela tutas, non

Philosrat.
l. 2. de vita
Apollonii.

Aristot. H.
A. l. 4. c. 10.
Oppian.

Halient. l.

l. v. 404.

Ælian. H.

A. l. 9. c. 50.

Galen. l. 3.
Alim.
Schonfeld.
in Ichtyol.

deserit parentes, nisi ablactatus. Philosrat. faucibus ab eis filios abscōdi, si quando maiorem belluam fugere contigerit, prodidit, quod & apud obscurum de natura ferarum auctorem invenies. Terræ defectu aquæ affinis, aquâ ore recepta & ejaculata succurrere, fide eiusdem dicitur. *Dormire* edita per summa, fistula Aristoteles auctor est: stertentes audiri, Plinius: in siccum exire ut à Solis radiis calefiant, Oppianus & Ælianus. *Inimicitiam*, cum Delphino, Thunnis & Orca gerit. A gladio pisce ut septem diximus vehementer timeretur. Ziglerus castoreo aqua diluto & in mare effuso ad eò terri, ut totus grex dissipetur prodidit. De *venatione & captura* vide Schonfeldium. *Vsus* adipis, in lucernis, ad inungenda coria, curruum rotas, & alia. Cardanus viscera quia pinguis, & sapore & violæ quasi odore commendari scribit. Galenus eis mucosum sorem tribuit. Vingt balænarum genera apud Hartenium inveniuntur, ex quibus *Primum* quot Ninting vocatur hominem fugit, & comestibile est. *Decimum*, quod Fiscraake, haleces versus terram fu-

gat. *Vndecimum*, quod triginta ulnarum, ultra septuaginta dentes habet, & eos tam magnos, ut inde tabulæ ac manubria cultellorum fiant. *Duodecimum*, non habet pinnas in dorso. *Decimum quintum*, quod Rodkemling vocatur, subvertit naves, & XL. est ulnarum. *Decimum sextum*, quod Nahwal, antè in superiore mandibula, dentem longitudinis septem ulnarum, ad eò exactè tortum in circuitu, ut humano ingenio melius fieri non posset, habet. *Decimum septimum*, quod Skelling, octuaginta ulnarum, diversos superciliorum supra oculos habet ordines. *Decimum octavum*, quod Nordhwal, nonaginta ulnarum, non vivit nisi de pluvia & rore cœlesti, quod fabulosum credo. *Vicesimum*, quod Haffnegriffia, magis insula esse videtur quam piscis. Fides sit penes auctorem.

ARTICVLVS II.


De Balæna vulgi, & Phsetere.

Bellua hæc ut plurimum triginta sex cubitos longa est, octo alta, ut Rondeletius describit. *Oris* scissura ad duodeviginti pedes porrigitur. *Dentes* in eonulli, sed horum loco in utraque maxilla, corneæ sunt laminæ nigræ, sensim in pilos fuillis similes desinentes, quæ in anteriore & posteriore sive interiore oris parte breviores sunt, in media longiores. Ab interioribus *Lingua* intus continetur & coercetur: inde abducta vel abscissa ita diffunditur, ut in eundem locum iterum recipi non possit. *Oculi*, quatuor ulnarum spacio à se distant, toris parvi apparent, intus capitis humani magnitudinem superat. *Pinnas* duas maximas in lateribus habet, quibus natat, & catulos in metu occultat, in dorso nullam habet. *Cauda*, situ caudis Delphinarum similis est, figura non multum absimilis, quam cum movet, ita mare agitat, ut naviculas submergat. *Rostro* est

Aldrov. de
Cetiv. 7.


Balæna .

Walfisch




Balæna .

Walfisch .




Balæna .

Monstrosa .




Balæna


Ein ander art Walfisch .



Phocæna


Meer Schwein . Braunfisch .





Aculeatus marinus Maior

Tab. XLVII



Lupus


marinus Schönfeldij

2




Lycostomus Palticus

3




Scorpis Marinus alter

4




Idem Sypnus

5



Spirinchus


6



Siluri uera affinis

7





ARTICULUS III.

De Puste & Orca.

est brevi. *Fistula* caret. *Corio*, duro, nigro, integitur, sine pilis, cui lepadæ, & ostrea hærentia aliquando repériuntur. *Internæ partes*, veluti in Delphino. In ventriculo mucus, spuma, aqua, algæ foetida, ambra inveniuntur, ut exinde Carnivorâ nō esse colligas. Vitulos vivos parit. Carnis nullus in *Cibis* vsus, sola lingua commendatur, sale condita. Viginti tria sæpè vasa eâ implentur. *Μοσχον* Aristotelis esse, vel exinde colligitur; quod pro dentibus setas; quibus intus os hirsutum est, habeat. Plinius musculum manuum benè dixit, sed pro duâ Balænâ malè posuit.

PHYSETER, qui & *Phyfalus*, *φυσήτης*, id est à flando dicitur, quod copiosorem aquarum eluviam præ cæteris efflare scribatur. Gesnerus eadem vel saltem affinem cum *Pusti*, qui *πυρην*, & *πυρην* dicitur, facit, quem vide. Diversum esse à *Phyfalō* maris rubri, ex descriptione videre est. Magnitudinē hic adulti *Gobionis*, sine ore; cum branchias tamen habeat, perniciem ei qui gustaverit creat. Intumescit enim; tandemque ventris profluvio vita finitur. De Descriptione inter auctores non convenit. Plinius ingentisq; columnæ modo se attollere scribit. Solinus super antennis navium velis quondam diluvium eructare addit, quod Strabo communē cetis in mari extero circa

Turdetaniā facit. Turnerus portentosæ magnitudinis cetum facit, & singulos se eorum tantum aquæ è fistulis, quas in capitibus habent ejaculantes vidisse, ut singulis singulas naves aquarū copiâ in profundum submergerent, adjicit. Bellonius hoc solo à Balænis differre, quod nullas prætenturas habeat, neque tam vastâ corporis mole, figuraque sit magis terribilis. Rondeletio est ore maximo, dentibus acutis, ferratis, linguâ carnosa & magnâ, fistula longè quam reliquis crassiore, pinguedine multa.



PUSTES à secādo, quod perniciosissimè natet, dictus est. Perperâ à Bello-
nio capite vasto, rotundo; & cacabi figuram exprimente describitur, quomodo namque aquam velociter secaret? Rondeletio est rostro, valde longo, osseo, utrinq; aculeato. Aculei validi sunt, & Delphinorum dentibus similes. Aloysius Cadamustus ferram aquaticam vocat, eaque in assamenta secari ligna scribit. Clovius ipsius formæ rationē inter Galeos seu caniculās reponi debere affirmat: eumque ita ex pictura describit. Erat hic piscis, inquit, corporis formâ & colore Galeorum generibus, aut Caniculæ Aristotelis valde similis: nullis tamen maculis ut illa, conspersam cutim habens, perinde tamen rudem, & instar *Zygænæ* cutis asperam, fusci in dorso coloris, in ventre candicantis, & sex pinnas habet; in lateribus, medio videlicet pænè corpore binas, &c. Caput in longum & angustum, planum & firmum rostrum porrigebatur, utrinque cum iis dentibus, sive ossibus firmisque & rectis spinis, ex adverso sitis ferræ instar munitum, viginti vel etiam pluribus, &c. Binos oculos in prona capitis parte habebat, binas nares in supina, & infra illa oris scissurâ, ut *Zygænæ* ferè transversam. Reperitur plerumq; in Oceano occiduo.

ORCA Latinis à vasis olearii aut vinarii similitudine dicitur. Quodnam apud Græcos habeat nomen, vix cōpertum, nisi vocabulo *Orygis* apud Strabonem, quē in mari extero circa *Turdetaniā* ponit, veniat. Bellonius ocrynū Oppiani esse credit, sed perperam. Thunni enim hic genus maximum. Delphino est corpore toto vigesies crassior, potissimum circa ventrem: Toto tergore atra, ventre ex albo roseo, ad latera ferè cærulea. *Rostrum* habet simum, sursum reparandum; cuius labri inferioris tanta est crassitudo, ut à superiore se jungatur

E e dum

TAB.
XLIII.
Aldrov. de
Cetis c. 5.

Bellon. de
Aquatilib.
l. 1.

Aloysius
l. 6. Na-
vigat.

Clovius
Exot. l. 6.
c. 19.

Aldrov. c. 6.

Strabo
Geogr. l. 3.

Aristot. H.
A. l. 3.
c. 12.

Plin. H. N.
l. 11. c. 37.

Ælian. H.
A. l. 3. c. 18.

Plin. H. N.
l. 9. c. 4.

Strabo
Geogr. l. 15.

dum piscis pronus est, quadraginta triculenti in eo dentes, quorum anteriores obtusi & graciles, posteriores acuti & crassi sunt. *Oculi* eidem sunt parvi, pinnæ pro corporis magnitudine pusillæ. *Cutis* glabra & politissima. *Cauda* lunata, & ulnam distenta excedens. *Pudendum* mari in medio ventre abstrusum, duor. pedū longitudinem excedens; in foemina ano vicinum est, ad quod utrinque duorum digitorum intervallo, quædam foramina visuntur, in quibus mammarū papillæ delitescunt. Sæpe octingentas, aliquādo & mille libras excedunt. *Lienem* unico orbiculari globo in placentæ formam effectum habet. Plurimum aquæ per fistulas ejaculari, Plinius auctor est. *Orca*, inquit, *in portu Ostiensi visa est oppugnata à Claudio Principe. Venerat tunc exadificante eo portum, invitata naufragiis tergorum à Gallia advectorum, satiansque se per complures dies, alveum in vado sulcaverat, accumulata fluctibus in tantum, ut circumagi nullo modo posset, & dum saginam persequitur, in litus fluctibus propulsa, eminente dorso, multum super aquas, carinæ vice inversa. Pratendi jussit Cæsar plagas multiplices inter ora portus, profectusque ipse cum prætorianis cohortibus, populo Romano spectaculum præbuit, lanceas congerente milite, è navigiis assultantibus, quorum unum mergi vidimus restatu belluæ oppositum unda.* De earum & Balæna pugna ita quoque Plinius. Balæna & in nostra maria penetrant. In Gaditano Oceano non ante brumam eas conspici tradunt. Condi autem æstatis temporibus in quodam sinu placido & capaci mirè gaudentes ibi parere. Hoc scire orcas, infestam his belluam, & cujus imago nulla repræsentatione exprimi possit alia, quam carnis immensæ dentibus truculentæ. Irrumpunt ex ò in secreta, & vitulos earum & foetas vel etiamnum gravidas lancinant morfu, incussæque ceu Liburnicatum rostris fodiunt. Illæ ad flexum immobiles, ad repugandum inertes, & pondere suo oneratæ, tunc quidem & utero graves, pariendive pænis inva-

lidæ, solum auxilium novere in altum profugere, seseque opponere, & caurium angustis trucidare, in vada urgere, saxis allidere. Spectantur illa prælia ceu mari ipso sibi irato, nullis in sinu ventis, fluctibus verò ad anhelitus, idusque, quantos nulli turbines volunt.

Hucusque Plinius.

ARTICULVS IV.

De Delphino.

Piscis quem Latini Delphinum vocant, is Græcis δελφίς & δελφιν & si XLIV. minutus δελφινέος, plerisque Euro- Aldrov. de pæ nationibus, Porcus marinus dicitur. Ex Cetis esse, quod branchiis careat, pulmonemque & arteriam habeat, Aristoteles reliquit. Repando dorso incurvum esse plerisque proditum, unde incurvè cervicum pecus Pacuvius vocavit, seu quod talis oculis nostris, dum ab undis exsiliens in mare præceps fertur, propter celeritatem motus appareat; seu quod, quia branchiis destituitur, revera corpus, cum se vibrat, incurvet, ut promptior in gurgitem pronus feratur.


Rostrum ei est simum, unde Simo- Plin. H. N. nis nomine gaudere Plinius scribit. *Linguam* mobilem, brevem, latam, carnosam, exertam in ambitu ferratam, suillæ non absimilem. *Dentes* parvos, acutos, pectinatim coeuntes. *Oculos* magnos, sed cute adeo tectos, ut pupilla solum appareat, non longe ab oris scissura, quin in eadem prope modum linea sitos. De *Fistula* situ non convenit inter auctores. In dorso esse scribunt Aristoteles & Plinius, ante cerebrum Rondeletius, cuius verior sententia, inter oculos Bello- Aristot. nius. In dorso esse creditum veteribus, quod magis ad posteriorem partem quam in balæna spectet. *Pinnis* duabus validis natat, quæ veluti hominis brachia cum omoplati articulis junguntur. Earū muscoli quatuor robusti dorsi pectoriq; annectuntur. Hæ in vêtre sunt, ita sitæ, ut nō solum nata-

Utilis Piscis ferream ad instar Præcis habens.




Delphinus prior.

Delphin



Delphinus alter.

Delphin.



Antiq.
Metal.



Antiq

Metal.




Delphinus
Delphin

famina.
Weiblein.



Delphinus alius.


Ein ander art Delphin.



Caput Delphini.


Delphins Kopf.

Tab. XLIV.




Gladus pifis Serice

Der Kopf des Schwerdtfisch



Scolopendra cetacea.





Phoca sine

Vitulus marinus.

Vitulus.

Seehundt.



Seehund.

Rosmarus.


Wallrofs.



Rosmarus.


Vetus.










Ein Alt Meer Ros.










Rosmarus luyencus.

Ein Jung Meer Ros.





Albula nobilis.



natatum, sed & motum, quo sursum se effert respirandi causa, adinvenit. In dorso quæ est, aculeatam Plinius, & Pausanias faciunt, propter duritiam sine dubio. Nam rigidam satis esse Rondeletius testatur, duæ quæ in cauda, ex ejusdem lateribus, altera dextram, altera sinistram partem versus, ita ut cauda, quæ lunata, aquam latitudine sua verberet. *Sextum* si attendas, pudendi in *femina* orificiū, ano vicinum est ad terrestria animalia accedens, binas eadem, si Plinium sequimur in ima alvo papillas tantum gerunt, nec evidentes, & paulò in obliquum porrectas. Aristoteles mammas propè genitale continere ait, papillas quadrupedum more conspicuas habere negat, sed velut alveolos quosdam humoris duos esse scribit, utroque de latere singularem, è quibus lac fluit, quod ore catulorum parentem sectantium excipitur. *Vulva* cervicem palmum unum longam habet, quæ deinde in ramos duos veluti in quadrupedibus terrenis videre est, distribuitur. Testes ad uteri cornua, pudendum inter umbilicum & podicē gerit. *Mari* foramen quoddam in medio ventre apparet, è quo pudendū quadrupedibus simile exit, quod in congressu erigitur, & extra eminens profertur. Ideò fortè Aristoteles genitale foris esse dixit, testes intus, qui secundum Plinium prolongi, ad alvum necti. *Felle* omninò caret. *Locum* si spectes, nullum ferè sine Delphinis mare; adèd ut & in Ponto, quem nulla piscibus inimica belluā ingreditur, reperiantur, & in Adriatico quamvis raro capiantur, sed & aquas dulces subit, & Nilum ipsum, ibique piscibus aliquandiu pascitur. Illos tamen non esse, quos Solinus ferratas cristas habere. Crocodicolos studiū ad natandum elicere, demersosque astu fraudulento tenera ventrium subternatantes secare & interimere, scribit, facilè mihi persuaderi pator, quod Marcellinus non Delphinos, sed Delphinis similes vocat. Accepit à Græcis qui circa Propontidem salitant Bellonius, eosdem instar alio-

rum piscium migrare, è mari mediterraneo videlicet Septentrionem versus, Hellepontum & Propontidem emetiri, Euxinum ingressos certo tempore immorari, tum denuo locaprius relicta repetere. *Cibus* Delphino pisces, in quos crudèlitter gressatur, habetque Cephros aves comites, quæ ab eo occisorum sanguine pascuntur, ut Oppianus scribit. *Vita* satis lōga, ad tricenos sæpe annos producit, fortè quod felle careat. *Coi-* tus humano similis, illeque paulò quam piscium qui attritu ventrium coeunt, diuturnior. Aristoteles tam cæteror. more congregi scribit. Gestat utero * decem mensibus, & singulos uno partu, interdum & binos edit. Parere æstate, nec ullo alio in vulgatis Plinii codicibus legimus. Rondeletius foetum verè aliquando extraxit, alterā fœminā Octobri dissectuit, inque eius utero tum demum formari cœptū foetum invenit. Chorion amnio & allantoïdo tunicis, is in utero involvitur, sanguine per venas umbilicales nutritur, & spiritum per easdem arterias recipit. Proles celeriter adolescit, quippe quæ annis decem ad summam magnitudinē perveniat, ut tradit Aristoteles. Pro voce ipsis gemitus est humano similis, ut Plinius prodidit. Rondeletius stridorem edere scripsit, vocisque non nihil. *Visum* habent acutissimum, ita ut piscem etiam sub lapide vel in caverna aliqua latitantem videant. Omnium terrestrium tum aquatilium velocissimos Aristoteles dixit, ocyores volucre, ocyores telo. Nam cum fame concitati fugientem in vada ima piscem, diutius spaciū continuere, ut arcu emissi ad respirandum, emicant; tantaque vi exiliunt, ut plærumque vela navium transvolent saltu. Pernicieis sæpe causa ista velocitas. Nam aliquando, dum Mugiles persequuntur, nec incitatum cursum inhibere possunt, terræ impacti, præda fiunt; quod & tum fit, cum vel asylo infestantur, ut Rondeletius observavit, vel nimio piscatorum strepitu gravantur. Plinius telluere tactas mori ait, repugnante experientia. Nam &

Aristot.
H.A. l. 6.* Aristot.
H.A. l. 6.
c. 13.Aristot.
H.A. l. 9.c. 48.
Plin. H. N.l.
Ælian. H.
A. l. 12, c. 12.Plin. H. N.
l. 9, c. 8.

Plin. H. N.

Solinus
Polyhist.

Aristoteles extra aquam mutantem & anhelantem cæteror. spirantium more reliquit, & Gesnerus Arimini captum tres dies in terra vixisse scripsit, & Rondeletius vivos à Monspelienfibus. Lugdunum usque deportari affirmat. Gregatim ex ætatum ratione dispositi natant. Parvuli præcedunt, adultiores sequuntur. Hoc singulari in prolem amore fit, quo etiam motus tenellos in fauces recipere, ut Solinus dicit, vel saltem eos in faucibus aliquando gestare, quod Oppiano & Gesnero visum, solet. De ipsorum somno ita Plutarchus. *Delphinus dormiens de summo per altum demittitur, tantisper dum in vadum impingat, solumque sentiat: Hic excusso somno ronchoque edito ad summum rursus meat, rursusque demittitur, ac pronus fertur, imo quodam mirabiliter composito quietem captans. Ingenium singulare respicit, quod parentes senio confectos alant, sui que corporis nisu natatum eorundem promoveant, totam nationem tanto amore prosequantur, ut sæpe aliquem ex se captum ad portum usque comitentur, mortuum verò quasi ad sepeliendum efferant; quod Hesiodi à latronibus. interfecti in mare projectum cadaver, * ad Rhium & Molycriam deportasse legantur, quod navib. in qua aliquis ex delphinicidis, coorta tempestate, quasi in ultionem perniciem struant, quod à Græcis, Italis, Venetis in primis nautis creditur; quod Serapidem & Dyonisium, iussu Ptolomæi Soteris revelentibus, & supra Maleam abreptis, ducem se ad stationem præbuerint; quod Simonis nomine miro modo gaudeat, ut post Plinius, Gillius cum ad Antipolin provinciam Narbonensis urbem navigaret expertus scribit; quod captus miserationem gemitu moveat, ut auritus testis Gillius prodidit, quod denique cantu & Musicâ, unde illa de Arione in mare injecto & à Delphino liberato, seu fabula, seu Historia, oblectetur. Tempestates lasciviendo præfagire * nautæ, Bellonio refragante affirmant, & à nobis cum ex Anglia Scotiam aliquando peteremus observatum est; seu quod aëris mutationibus*

Plutarch.
l. i. ur. animalia.

* Aristot.
H. A. l. 9.
c. 47.

* Plutarch.
in Sympos.

Plutarch.
Lutra animalia.

* Plin. H.
N. l. 8. c. 35.

non aliter ac ægri afficiantur; seu quod procellâ exsurgente, confurgentes ab imo maris exhalationes, calorem in Delphinis excitent, quem ut temporent, crebrius erumpunt. Piscatoribus Euboicis in piscatione subsidio esse, authoribus proditum est: Verum rectissime Bellonius, non suo pte ingenio sed fortitudo id facere, observavit. Si enim in Celerinorum aut Sardiniarum græges inciderint, capitibus absumptis, truncos capientibus relinquunt. Pisces verò irruentis Delphini impetu consternati, postquam in aërem exiliissent, tam densò interdum in mare agmine relabuntur, ut pluviam repræsentent. Quæ de Delphinorum in pueros amoribus dicuntur, apud Gellium & Ælianum invenies. *Inimicitias cum Balæna, ut apud Philen legimus, Pompilo, & Amiis gerit. Expisciculis, Pediculum parasitum habet, de quo ita Aristoteles. Maris quod à Cyrena in Ægyptum panditur, piscis Pediculus nomine circa Delphinum est, qui omnium pinguis simus sit pabuli copiâ, quæ Delphini operâ suppeditatur. Usus ejus quibusdam gentibus in Cibis, & quidē tantus, ut in mensas Principum veniat. Maximè tamen hepar & lingua commendantur. Illud tenerum, sed mali succi. Hæc, tenerior pinguior & hepatri præferenda. Cardanus viscera non solum sapore sed & odore quasi violæ commendari scribit. De Usu in Medicina pauca occurrunt. Kiranides ventrem siccū & tritū spleneticis prodesse, jecur assum & in cibo sumptum, tertianam & quartanam integre sanare scribit. Plinius febrium circuitus tolli ait, si ante accessiones degustatum fuerit. Dentium cum melle Cinis infantium gingivis dentitionibusque confert. Alligatus, pavores repentinos tollit.*

Gell. Noct. Atticar.
l. 7. c. 8.

Ælian. H. A. l. 6. c. 15.
l. 8. c. 13.

Aristot. H. A. l. 5. c. 31.

Plin. H. N. l. 32. c. 10.

ARTICULUS V.

De Phocæna & Scolopendra

Cetacea.

PHOCÆNA Delphini species est. Rōdeletius quidem diversum à Turfione facit; sed Gaza, motus sine dubio

TAB.
XLI.

Plin. H. N.
l. 9. c. 9.

bio Plinii verbis, qui Tursiones Delphinorum similitudinem habere scripsit, Phocænâ Tursionē vertit, & pro iisdem, Scaliger, Bellonius, Gesnerus, Jovius & alii agnoscunt. Differt tamen & ab eo qui Athenæo *θυσσάδων* dicitur, & à *Platanista*, quem Plinius in Gange Indiæ rostro & cauda Delphini, magnitudine verò quinque cubitorum, facit. *Descriptionem* si attendas, ita de iis Plinius. *Delphinorum similitudinem habent, qui vocantur Tursiones. Distant & tristitia quidem aspectus: abest enim illa lascivia; maxime tamen rostris. Canicularum maleficientia assimilati.*

Cardan. in
varius.

Nobis ex Bellonio & Cardano, ista placet. Phocæna Delphini est magnitudine, brevior tamen crassioreque corpore. Captus aliquando in Neustria, qui mille libras pendebat, adeo pinguis ut teres videretur. Caput habet obtusum, *Rostrum* tam finum ut cum capite ferè rotundetur; *Meatus auditorios* admodum obscuros si reperire volueris, ab oculi majore cantho, sex digitor. intervallo caudam versus accuratè disquirere, illucque grandem culmum inferere oportebit. *Pinnæ* eidem solidæ ac nigræ. Tergoris color ex cæruleo in obscurum liveus, *Cauda* lunata. Cardanus eum qui Diepæ in Neustria captus erat, *fistulam* in medio per quam aquam effunderet, digiti magnitudine habuisse scribit: *dentes* quoq; obtusos, & hominis molarib. similes. Minxisse, ore aperto respirasse & suspirasse; *Lachrymatu* fuisse, p. fluentib. ex oculis guttulis; diuque supervixisse, quamvis sanguis è vulnere, nō secus ac vinum è siphunculo flueret, addit. Nullius non maris est incola. Bellonius sæpius in Oceano Gallico quam Delphinos capi scribit. Rondeletius etiam in Ponto

Arist. H. A.
l. 8. c. 13.

vivere, & in loco illo, Aristotelis, *ἔξω γὰρ φαλλίνιας καὶ δελφίνος ἑδὲν ἐστὶν ἐν τῷ Πόντῳ, &c. φαλλίνης* pro *φαλλίνης* ex eodem Aristotele, qui antea Phocænam in Ponto nasci scripserat, legendum esse putat. Hocalii de vitulis marinis accipiunt. *Parit* magna ex parte binos vel singulos ut Aristoteles prædicit. Bellonius in for. Parisiis, diebus Veneris in primis adferri reliq. Del-

phino tamen est deterior, quia pinguior.

SCOLOPENDRÆ CETACEÆ, *Ælian H. A. l. 13. c. 13.* Ælianus solus meminit. Exerunt aliquando totum è mari caput. Narium pilos magna excelsitate apparere, caudam perinde atque locustę latam conspici, reliquum corpus aliquando in superficie æquoris spectari, & cum triremi justæ magnitudinis conferri posse: Per multis pedibus, utrinque ordine sitis, tanquam ex scalmis appensis natate. Addunt inquit harum rerum periti ac fide digni, ipsos etiam fluctus ea natante leviter subsonare. Pro hac Cetacea Scolopendra, hanc quam exprimi curavimus Aldrovandus exhibet. Tota ad colorem cæruleum vergebat; ad latera tamen & in ventre non nihil rufescebat.

ARTICVLVS VI.

De Phoca, seu Vitulo marino.

ET si Phoca animal sit amphibium, TAB. XLI. quia tamen humore potissimum victitat, nec diu extra aquas vivere potest, inter aquatilia referre placuit. Græci *φώκην* dicunt, seu ex *βώκη* beatu quem edit, unde Servius apud Virgilium, *Phocas, marinos boves* interpretatus est, seu aliunde ducto vocabulo. Plinius & Gaza vitulos marinos; ille, quandoque Vitulos simpliciter dixit. Festo *Bocas*, ut Gesnerus cōiicit, vocatur. Varinus *εινάλιον κήπος*, Oppianus *θηρεῖ εἰνάλιον* dixit. Differt *Corporis figura* ab omnibus tum piscibus, tum Cetis, adeo ut quadrupedem vocaverit Aristotel. Habet quippe, ut oculus testis Rondel. scribit, veluti *brachia* sine cubito, sine ulna, brevissima: Quod sequitur, Carpo nostro respondens, ex multis ossibus constat: Metacarpium verò, ex quinque ossibus quæ pelle tantum teguntur: inde tanquam manus indivisa, præterquā in extremo, in quo quatuor linearum, distinctiones, tantum spectantur; ungues autem quinque distincti. Quia pinnarum vicem agunt, idè Homerus *φώκας νέποδες* cognominavit. *Corio* tegitur duro, solido, pilis nigricantibus

bus & cinereis, quædam maculas parvas albicantes in ventre habent. Plinius *Cartilagine*s non ossa habere scribit, sed Aristoteles carne abundare mollemque esse, & cartilaginibus ossibus constare, author est. *Caput* est breve, & pro corporis magnitudine parvum. *Collum* longius, quod pro arbitrio extendit & contrahit. Inferior *maxilla* Lupinæ similis est, superior quæ in lupo latior, hacque & naribus vitulis terrestribus affinis est. Oris scissura mediocris. *Superciliorum* locum & superius labrum pili duri aliàs nigri, aliàs albi tegunt. *Dentes* sunt serrati & lupinorum similes. *Oculi* splendent & subinde in mille colores ut hyænæ transeunt. *Lingua* est scissa, id est bifurca. Plinius duplicem facit, Rondeletius latam esse addit. *Auribus* caret, quod vitam in humore traducat, partes verò aurium meatibus additæ, ut motus aeris à longè delatus servaretur: sed loco eorum meatus angustissimos & exiguos habet, qui in viventibus sunt evidentes, in mortuis difficillimè inveniuntur. Lato est *petiolo*. Omoplatas enim habet quaternis musculis conexas, superiore vel posteriore in parte quam canes terrestriaque alia animantia, quæ in lateribus eas habent. *Felis* in hepate habere negat Aristoteles, omnino habere, Bellonius. *Plinius* tribuit, sed partem non exprimit. *Renes* ei sunt firmissimi & solidissimi, cum reliquorum omnium magis minusve cavi. *Genitale*, maribus oblongum, fœminis ad terrestria accedens. Aristoteles simile Raræ esse ait. *Locus* Phocæ aqua & terra. Nec penitus illa carere potest, nec in ipsa agere secus, nisi per intervalla quædam respiret.

Vescuntur piscium carnibus, & in vivaria immisæ, furibundi in eos faciunt; apud Troglodytas extra sinum Arabicum piscium capturæ non minus ac homines intenti. In retia delapsi, dilacerant eadem, & piscibus una capitis effugiendi ansam præbent. Leporum & aliorum retro mingentium ritu *mingunt* & *coeunt*, nempe aversi, inque medio coitu cohærent. *Pariunt* in terra pecudum more, nun-

quam geminis plures, ut scribit Plinius. Secundinas emittere scripsit Aristoteles. Prolem circa duodecimum à partu diem in mare deducunt, quod Calpurnius inter impossibilia recensuit. Maxima ex parte per littora vagantur, & vicinos agros, vineta & pomaria deperdunt. Si quando colliculum ascenderint, indeque secedere coguntur, pedibus ac capite in ventrem contractis, ac toto corpore in globum constricto, maximo impetu in mare devolvuntur. Non procul tamen à littore recedunt, quod ipsis difficilis pedum in terra usus sit. Difficulus *interfciuntur*, nisi capite eliso, quod corpus totum carnosum sit. Extra aquam ad solem in arena littoris vel super saxa *dormiunt*, ut liberius respirent. Nullum animal graviora somno premi, author est Plinius. Nos aliquoties, *Plin.* cum Andreapoli in Scotia studiis *Juvenal.* peram daremus, tam prope ad sterrentes accessimus, ut lapidibus infestari potuerint. Postquam se in aquas coniecissent, elato ex undis capite nos intuebantur. Inter dormiendum tam altè stertunt, ut mugitum edere videantur, quod Aristoteles quoque & Plinius meminere. In causa pituitosus humor, qui in aspera arteria, inspirando & expirando exagitur. Sed & in aquis fortè dormiunt. Nam & ranæ, quarum more, sub aquis diu urinantur, longissimo anni tempore, sub aqua latere possunt, ne quicquam de *pulmone* dicam, qui exiguus, spumofus, nec sanguineus *Ingenium* si spectes. Sæpissimè mitescit, & naturam ferinam deponit, & quod mireris, accipit disciplinam, voceque pariter & visu populum in spectaculis exhibitus salutat, & incondito fremitu, nomine vocata, respondet, sed & in hominem amore fertur, hac in parte nihil à Delphini natura abhorrens. Visus aliquando vitulus marinus, qui ad principis Christiani nomen gaudio perfundi videbatur, obmutescerebat ad Turcæ. Is etiam cuius Rondeletius iconem dedit, in Lerini insulæ Cænobio, nullo metu cum hominibus

per

Aristot.

Plin.

ARTICVLVS VII.

De Manati Indorum.

per multos dies versabatur, adeo ut & gradus ascenderet. Damnis apud Philostratum, Phocam à piscatoribus captum, filium quem in cavea pepererat, ita deplorare mortuum vidit, ut per triduum à cibis abstinerit. Tzetzes verò testatur, cum suis catulis mori, istos cum suis matribus, parentesque senio confectos, in natando iuvare. Summa ipsis cum mari *Sympathia*. Pili enim excoriati si mare turbatum in fluctus surrexit, similiter eriguntur, si desedit, in planum sternuntur. Quod cum non crederetur, factò in Indico mari circa Hispaniolam insulam periculo, non amplius fabulosum haberi Cardanus asserit. Plinius sensum æquorum retinere, semperque æstu maris recedente inhorrescere scripsit: Rondeletius verò mutationes aëris significare, austrinis ventis furrigi, borealibus ita desidere, ut nullos planè affirmes, sæpius observavit. Fulmina & grandines corium prohibere Plutarcho & Palladio proditum. Ideò, & summas velorum partes eo obtegi, & Augustum Cæsarem pellem vituli marini perpetuo circumferre cōsuevisse, & Severū Imperatorē eadē testū voluisse legitur. Grandini verò obviare Palladius credit, si per possessionis terminos circumferatur, & in villæ aut cortis ingressu suspendatur, cum malum videris imminere. Urso metueri Oppiano debemus, congressos aliquando eum iisdem in spectaculis, Lycostæ rustico apud Calphurnium fugere & arietes marinos, & forti anhelitu è cavetnis extrahi, Æliano. Negligitur etiam ab infima plebe in *Cibis*. Caro enim ipsius, mollis est, spangiosa, & pinguis, adeo ut liqueat si diutius manibus contrectetur. In *Medicina*, dextra pinna capiti subdita somnum adfert, quod nullum animal graviore somno prematur. *Pellis* à podagra præservat, si ex ea calceos gestaveris. Adeps in muliebribus morbis vehementer ab Hippocrate laudatur. *Coagulum* quod evolmere dicunt, ne in hominum manus incidat, cum panace, vel succo punici, Comitiales morbos sanat. Cælius Aurelianus tamen id reprehendit.

HUJUS piscis nemo veterum meminuit, nisi fortè Bos sit Aristotelis, quem in Historiis inter Cetacea reponit. Belgæ vaccam marinam vocant. Nec in congruè iste dicitur, cū quòd capite terrestrem bovem referat, tum quòd ejusdem more herbis in terra pascatur. Utri est similis, ideò fœdissimus aspectu. *Caput* habet bovis instar, *Oculos* exiguos, *Pedes* circa caput binos, crassos tanquam alas brachiorum loco, quibus natat. *Aurium* loco duo foramina exigua quibus audit. *Lapides* seu ossa in cerebro bina parvæ pilæ palmarie magnitudine, orbicularia. Circa *caudam* strictior est & quasi præcinctus, quæ etiam ab inde ad extremum tota conspicitur nervosa. Fœminæ duo sunt ubera in pectore, quibus catulos lactat. *Corium*, quo integitur est simile ustulati porci corio, digitum densum, cineraceo colore, rarisque pilis præditum. Adeò magnus est, ut iugo boum opus sit ad unum vehendum. Nonnunquam quatuordecim aut quindecim pedum longitudinem superat, octo verò palmarum crassitudinem. Circa insulam Hispaniolam in mari capitur. Subit tamen & flumina, & secundum ripas eorum herbas depascitur. *Manfuescit* aliquando. Aluit quendam per vigintisex annos in lacu Gvaynabo Cafamatexi Regulus, tam mansuetum, licet jam grandem, ut nomine Matonis in clamatus, è lacu egrederetur, & ad aedes cibi sumendi gratia perreptaret, iterumque in lacum remearet, pueris atque viris, quorum cantu delectari videbatur comitantibus. Idem denos simul pueros tergo exceptos ex una lacus parte in oppositam transvehebat. Cum quidam ex Hispanis hastam in eum vibrasset, etsi non læsus, nunquam tamen imposter emergere voluit, si viros vaste indutos, & barbaros conspexisset. In tumefcente fluvio Hayboaco, & in lacum illum se effundente, in mare

Ee 4 regref.

Philostr.
l. 2. de vita
Apollonii.

Plutarch.

Sueton. in
Augusto.Pallad.
R. R.

Ælian.

Plin.

Plin.
Theoph. H.
l. 9. c. 12.

TAB.

XLIII.

Arist. H. A.
l. 6. c. 11.

Lopez

Hist. Ge-

ner. c. 13.

Clus.

Exor. l. 6.

c. 19.

regressus est. *Vsum* & in *Cibis* & in *Medicina* præstat. Caro enim ejus resiccata, Anglicæ bubulæ similis est, & diutissimè incorrupta manet; cocta Thynni carne est præstantior. Cauda in partes concisa, & soli per quinque dies exposita, tandem in patella cocta, multa pinguedo elicitur, quæ, quia rancorem non contrahit, ad ova in sartagine frigendo

adhibetur. *Ossa* in capite colicæ passioni & doloribus nephriticis valdè adversantur, si primò adusta, contrita & per cribrum transmissa, in vino drachmæ unius vel alterius pondere, assumpta fuerint. Ex Corio cingula etiam & calceorum soles fiunt.



ADDITA-

ADDITAMENTUM

De

CANE ARISTOTELIS.

Nieremb.
H.N. l. II.
c. 20.



Piscis qui hodie Tü-bero dicitur, Canis Carcharias esse vulgò creditur. At quia ille quem Franciscus Hernandus describit, exactè descriptioni, quam attulimus, non respondet; idèò placet & hanc apponere. Ceraceus inquit piscis est, ex genere oblongorum; Oceani incolà, quindecim interdum dodrantes longus, voracissimus, cursu velox, nec omninò stupidus, & bina humana corpora sæpè numero crassus; ore quòd rostro unciarum decem intervallo subjacet; lunato; vallatoque supernè trino dentium præacutorum, ac sese mutuo ferræ modò subintrañtium, ac quaterno infernè binum dodrantum rictu, & brachiis utrimque quinis: rostro ranæ obrotundo, pinnis singulis utrimque juxta branchias, totidem juxta pudenda, juxta caudam unicà alterà omnium maxima imminente dorso statim à branchiis; alteraque juxta caudam modicà, à contrariò alterius parvæ, sed in oppositam partem vergentè caudà magnà, crassà, falcataque, & superna parte triplo aut quadruplo longiore atque latiore, & juxta exortum quibusdam parvis cavitatibus insigni: oculis modicis longo inter sese distantibus intervallo: pupillà magnà, & sub lutea iride, corio verò ceterorum cartilagineo-ium, cum sese tendit, nullis ictibus penetrabili: dorso ac lateribus cæruleis exsaturatis, ac ventrè candenti. Mirum est, bina pendere mari, offeà pudenda, cava, alba, dodrantem longa, & ternis singula, glandis loco,

longiusculis noxia acuminibus, quibus novaculæ modò facillè quidvis obvium abscondit. Maleficum animal est, atrox, ac hominum devorator: adeò vivax, ut in perquam tenues etià divisum apalectos, affixumque veru, ac vitam adhuc videatur mordicus retinere. Mediocrè præstat, & quale alii congeneres pisces, dum parvum est alimentum; sed provectius, durum, ingratum, insalubre, & fluxum alui ciens. Vnicum est illi intestinum; satis amplum; unde tam improba contigit voracitas. Cor parvum subalbidum; laxum, & usque adeò vivax; ut eductum, & in varias partes sectum; diutius conspiciatur moveri, ventriculique distinctū. Stomachus vastus est, hepar candens, in duas partium ténias, quatuor dodrantes longas, ac decè uncias latas. Splen vero jocinoris longitudine, sed duas tantum uncias longus.

Cæterum solent circa tuberones *Nieremb.* pisciculi quidam natàre *Romèri* dicti, *H.N. l. II.* de quibus ita Hernandus. Piscis est ^{c. 19.} spinosus, Oceani Septemtrionalis alumnus, dodrantem plus minus longus, tres uncias crassus, corio rectus molli & pæne teres. Lunatà constat caudà, & rostro resumo atque compresso, oculis magnis, si magnitudini corporis comparentur; pupillà nigrà ac luteà iride. Senis natat pinnis, quarum altera medio pæne dorso in caudam usque procedit, sensim sese attenuans, & à quibusdam præacutis spinulis sumens exordium: altera à pudendo pæne ipso in caudam ferè descendit, utrimque à brachiis singulæ, binæque paulo ante initium ventris.

Color

Color universi ex albo in cæruleum tendit, quamquam dorsum caputque cyaneo exsaturato videantur nitere, universumque corpus senis pavonini coloris transversim in discurrentibus orbibus ambiatur. Extrema corporis caudam contingens quadrata sunt, & quaternis veluti dorsis distincta quarum bina quæ in latera excurrunt, desinunt in acumen. Caudæ initium pavonino exsaturato splendore. Micant mediæ utrimque partes, dilutiores sunt sequentes exsaturatæ, ac demum postremæ candentes.

DE GLAUCO ÆLIANI.

Nieremb.
H.N. l. II.
c. 21.

AD Glaucum Æliani videtur referri debere, & hic quem Clusius exenteratum & resiccatum ita describit. Erat, inquit, corpore longo, trium ferè pedum longitudinem explente coloris (resiccatum enim & exenteratum dumtaxat conspiciebam) ex cineraceo fusci, in quo tamen quidam candor, præsertim in tergore, adhuc elucet: vivum enim & recenter captum argentei pænè coloris fuisse intellegebam. Medii corporis ambitus pedis, hoc est, duodecim unciarum longitudinem æquabat.

Cartilagineus verò erat, & lævigate prædicatus; rostro lato, sed in obtusum deinde acumen desinente. Oculi magni erant, è quorum infima parte enata erat membrana, quæ sursum sese attollens, velut nubes caliginem illis offunderet.

Oris rictus non valde latus, in supina capitis parte maxillas in obtusum angulum delinquentes habebat, ferè ut simiæ: quaternis autem dentibus os præditum erat, binis in superiore maxilla, totidem in inferiore: iisque firmis, quorum singuli quibusdam sulcis erant distincti, ut pluribus dentibus armatum os esse videretur. Corpus à cervice sensim gracilescerebat: spina sive a-

culco in eâ parte, quâ dorsum cervici connectebatur, sito, eoque sex uncias longo, infimâ parte lato & cavo supernâ autem valdè acuto. Pinna surrecta innitebatur quatuor pænè uncias longa. Binas dumtaxat in lateribus branchias valdè apertas observabam, utrumque videlicet unam, cum aliorum galeorum genera denas habeant, in singulis lateribus quinas.

Has sequebantur duæ pinnae ad natandum idoneæ, longiores quam in nullo galeorum genere conspexerim, novem videlicet unciarum longitudinem æquantès. Binas alas habebat ex utraque podicis parte, quatuor uncias longas, illasque bifidas, hominum ne industria sic fissas, an à natura nihil pronunciare possum.

Alia deinde pinna in dorso paulò infra eam, quæ ad aculeum erat, exoriebatur, ad extremam ferè caudam usque inæqualiter porrecta, hoc est, ad eam usque caudæ partem, quæ tenuissima, & septem uncias longa, muris caudam quodammodò æmulabatur. Podici, qui in supina parte, ut in reliquis piscibus, sitis, vicina apparebant bina foramina, in quem usum, ignoro.

Capitis porro cutis siccitate adeò erat contracta, ut nulla circa oculos, nulla ante eos, foramina observare potuerim.

De Pisce Gibbo.

HUic similis est *Acacana*, qui est Nieremb. *Hadrantalis* piscis, insignis prolixitate inferioris labri, & eminentiæ gibbæ, quæ à capitis exordio usque ad os, quod per exiguum est, arcuato descendit flexu.

Dorsum lateraque cyanea sunt, venter ac laterum pars alba, ac præter duas pinnas quæ circa branchias sunt utrimque, unicam angustam & longam, & aliam parvam, duæ aliæ visuntur breves, altera à medio ventre, altera vero à dorso in caudam usque procedens.

Squa-

Squamofus non eft, & tamen bono conftat alimento. Mare illum ad me mifit Australe; etfi quidam referant, in Septentrionali quoque reperiri.

De Oſtracione Gefneri.

Oſtracioni affinis eft *Catan* qui piſcis eft quindecim pedes, cum in perfectam magnitudinem adolevit longus, cortice rectus duriffimo, laminis rhomboidis figuræ, paucisque contexto, teſtaceæ pæne duritiei, nitidis, ac circa ilia elatis, qui vicem lorice præſtare poſſet. Roſtrum eſt prælongum & acutum, ſerrati dentes, & quaterno ordine diſpoſiti, ac pinnæ craſſiſſimæ binæ juxta branchias, ac juxta caudam unica. Vivit in lacubus aut magnis fluminibus provinciæ Panucenſis. Salubri conſtat nutrimento: ſed cum parandus eſt, hic piſcis, ſpoliatur corio. Vivit ex aliorum piſcium canumve raptu, homines quoque interdum aggreditur.

Editur vero aſſus, non coctus aut elixus.

AD LIBRUM V.

De Phoca.

De Lact. Ind. Oc-
vident. l. 2.
c. 6.

Phocarum generis eſt Wallrus ſeu Mors, animal amphibium, quod Vorſtius apud Delaetium ita deſcribit. Belluam hanc marinam vidi, magnitudine vituli, aut canis Britannici majoris. Phocæ non diſſimilem: capite rotundo, oculis bovillis, naribus depreſſis ac patulis, quos modo contrahebat, modo diducebat, aurium loco utrimque foramina; riſtu oris rotundo nec ita vaſto, ſuperiore parte aut labro myſtica geſtabat ſetis cartilagineis, craſſis ac rigidis conſtantiem. Inferior maxilla trigona erat, lingua craſſa brevisque, atque os interius dentibus planis utrimque munitum, pedibus anterioribus

poſterioribusque latis, atque extrema corporis parte Phocam noſtram planè referebat.

Pedes anteriores antrorſum, poſteriores retrorſum ſpectabant cum ingrederetur.

Digiti quinque membrana interſepiente diſtincti, eaque craſſa. Poſterioribus Digitis ungues impoſiti, non prioribus caudâ planè carebat. Poſtica parte repebat magis quam incedebat.

Cute craſſa, coreacea, pilisque brevibus ac tenuibus obſita veſtiebatur, colore cinereo. Grunnitum apri inſtar edebat, ſeu crocitabat voce gravi & valida. Repebat per aream extra aquam, quotidie per ſemihoram aut amplius dolio aqua pleno immittebant, ut ſe ibi oblectaret. Catulus erat, ut ferebant qui attulerant ex nova Zembla, decem hebdomadarum, dentes ſeu cornua exerta, ut adultiores, nondum habens, tubercula tamen in ſuperiori labro præcipiebantur, unde brevi proditura facile apparebat. Ferrum & validum animal calebat ad tactum, valideque per nares ſpirabat.

Pulmentarium ex avena, miliove comedebat lentè & ſuctu magis quam deglutiendo, herumque geſtantiem cibum ac offerentem magno niſu ac grunnitu accedebat, ſequebaturque, nidore eius allectus. Lardum eius guſtantibus haud inſuave viſum eſt.

Conſpiciebantur ibidem duo majorum capita, dentibus duobus exertis Elephantorum inſtar, longis ac craſſis & albicantibus munita, quideorſum verſus pectus ſpectabant. Eorum coria cccc. aut Io. pondo pendiffe ferebant Angli qui attulerant.

Hiſce dentibus rupes ascendere, ſeque ſuſtinere aiebant. Et prodeunt in continentem ſeu terram ut ſolimum ibi capiant gregatim.


Pabu-

Pabulum aiebant illis esse folia oblonga ac magna ; herbæ cuiusdam è fundo maris nascentis. Nec piscibus vivere ; aut carnivorum esse. Vidi ibidem penem ejusdem animalis osseum ; rotundum, cubitum & amplius longum , crassum

ponderosum ac solidum, in fine prope glandem longe crassiore ac rotundiore. Hujus pulvere ad calculum pellendum Mascovitzæ utuntur



Finis Historiæ de Piscibus.



HISTORIÆ NATURALIS
De
EXANGVIBUS
AQVATICIS

LIBRI IV.

Cum figuris aeneis.

JOANNES JONSTONUS
Med. D. concinnavit.



FRANCOFVRTI

ad

MOENVM,

Impendio

MATTHÆI MERIANI.

M DC L.



HISTORIÆ NATURALIS

De

EXANGVIBUS

AQVATICIS

LIBER I.

De Mollibus, seu Molluscis.

TITVLVS I.

De Molluscis in genere.



UATUOR Exanguium genera Aristoteles constituit, *Mollia*, nempe seu *Mollusca*, quæ carne molli foris obducta, solidum interiorius modo sanguinei generis continent. *Crustata*, quæ crustis collisitis teguntur. *Testacea*, quæ testis duris fragilibus muniuntur, & *Insecta*, quæ Græci *ἐντομα* dixere, *Zoophyta*, hisce adnumerari meliori jure possunt, quàm ut inter plantas, numerentur.

Mollusca præmittimus, tum quod nobiliora sint, & partium numero ac robore longè præcellant; tum quòd idem Aristoteles & Plinius fecerint. Nec malè Aquatica Piscibus subiungentur, cum & Plinio, ea, pisces nuncupare placuerit. *Mollusca* seu *μαλάκια* dicuntur, quòd neque asperam, neque testaceam cutem, neque squammam habeant, Athenæus *πυδάδι*, seu *Loligini* similia dixit. Dicitur & *μαλακόδεσμα* *Gaza* & *Rondeletio* visum: deceptos, &

Cartilaginea Aristoteli talia dici Sal-
vianus ostendit.

*Aristot. de
Gener. l. i.*

Naturam inter carnem & nervum
mediam obtinent: fissilis hæc, in an-
fractum, ut ad vires commodior ef-
se possit: loco ossium, quod piscium
spinis proportionetur omnia, Poly-
pum si excipias. *Exteriores partes*
tres præcipuè habet *Caput*, *pedes* si-
ve *brachia*, quos Aristoteles quan-
doque *πλεκτανας*, *Gaza* crura, bar-
bas, cirros vocat, & *τὸ κύττω ἀδίολεστον*
id est, *alveum indiscretum*. *Caput* omnibus
inter pedes & ventrem, seu ut A-
ristoteles, *ἐν μέσῳ τῶν πόδων τῶν καλῶν
μαλῶν πλεκτανῶν*. In capite *Os* est &
bini *dentes*, qui potius, cum immo-
biles sint, neque ad retinendam
prædam firmè innitantur, *ὀύγχοι* seu
rostrum dicendi sunt. Est enim hæc
pars, (os & dentes) ad unco carni-
vorarum rostro per quam similis, ex
duabus partibus composita, superio-
re & inferiore commissura pyxidata,
ut loquitur *Rondeletius*, ita ut infe-
rior superiori inferatur. Loco *linguæ*
carnosum quiddam in ore gerunt,
quo esculentorum voluptatem dis-
cernunt. In capite *oculos* binos
grandiusculos, quibus exigua quæ-
dam cartilago, discrimen cere-
brum

*c. 10.
Descriptio.
Aristot. de
part. l. 2.
c. 8.*

*Plin. H. N.
l. 9. c. 28.*

*Aristot. de
part. l. 4.
c. 5.*

brum parvulum continens, præstat. *Pedes* habent parti priori, circum caput, infra oculos circa os & dentes vinctos, quod pars eius posterior ad priorem adducta sit, extremaque coeant ac confundantur, hinc fit ut excrementa meatu ori vicino infra emittant. Otoni hic sed singulis eorum generibus diversi. *Acetabula* sunt quibusdam, circumstantaque, implicamentis illis quibus digitos antiqui medici indere solebant, similia fibris implexa, quibus carunculas cæteraque cedentia trahunt. Aliis breves & inutiles, binæque promuscides prælongæ, quibus veluti anchoris innituntur, seque contra æstus marinos navigii

Arist. H. A. l. 4. c. 1. l. 8. c. 2. Plin. H. N. l. 9. c. 12. modo stabiliunt. *Fistulam*, supra caput, & brachia ante alveum, gerunt, cavam, quam modò in dextram modò in sinistram partem transferunt, & hac, mare transmittunt. Aristotele hæc modo, αὐλὸς modò μικτὴ. Gesnerus φυσήτης legit, Gaza & Plinius narem transfulere. *Pinnulam* quoque habent circumdantem alveum, ut natare, & se in natando dirigere possent.

Alveus à capite amplioris capacitatis propendet, cuius caro non in directum, sed in orbem fissilis & cute integitur. Cutem tamen Salvianus denegat, & Plinius, nulla, Polypos vestiri scribit. *Capillamenta* in toto eorum latere conspiciuntur, quorum is, qui branchiarum in aliis piscibus, usus. Scholiastes Nicandri δελγίας, Aristoteles τριχώδη vocat. *Interiora* si spectes. *Osgula* excepit angusta, quam sequitur ingluvies, πτόλοε, ampliuscula, neque avibus absimilis, cui jungitur *venter*, tanquam ἡνυστρον facie buccinorum claviculæ.

Intestinum ab eo tenue, partem versus repens superiorum ad os fertur, quod laxius est quam gula. De *Cerebro*, vel quod ipsi proportionem respondet, superius diximus, *vesica* carent.

Mutis adhuc superest, quam Aristoteles, principatum sentienti obtinere dicit, ac si hæc cordi esset ἀνάλογον. Humida ea & corpu-

lenta pars per quam gula in ventrem pertendit, adnata magis tergo. *Atter* humor, quem quidam τὸν ὄλον, alii ut Athenæus & Dioscorides τὸ μέλαν vocant, pro sanguine ipsis inest, si Plinio credimus: probabile, ut Rondeletio placuit. Non solet, scilicet, natura, id quod pro sanguine servat, in quolibet metu effundere: nec ullus meatus venæ proportionem responderet, quo alendi corporis causa in universum corpus distribuatur. Secretus is ab alimento in vesica, seu tunica membranæ; Aristoteles μικτὴ, Gaza Papaver appellavit; exitum finemque habente, qua alvi excrementa emittunt, parte quæ fistula vocatur, quæ in supinis posita est.

In falsis aquis degunt: sed in potu lentioribus non inveniuntur, idcirco frustra in Ponto quæras. *Locus.* *Arist. H. A. l. 9. c. 28.*

Vescuntur carnibus. Nec *sexus* ipsis denegatus. Aristoteles enim vulvas bifidas, ac testes geminos iuxta genitale in omnibus reperiri ait. *Cibus.* *Arist. H. A. l. 4. c. 1. de Gener. l. 1. c. 1. & 3. Sexus.*

Differunt *scæminæ* à maribus, quod mas prona sui corporis nigriora supinis, partesque omnes asperiores habeat quam scæmina, & lineis intervenientibus varias, caudamque acutiores. In mare quoque meatus quidam subditus gulæ, à Cerebro in ima alvei pertendit, idque ipsum ad quod fertur, speciem mammæ imitatur: in scæmina duplex illud idem, supraque positum habetur.

Generationem quod spectat, Ter. *Generatio.* *Generatio* copulari, & diu in venere, quia frigida, morari, compertum. Ore coire, & renixu atque complexu mutuo brachiorum jungi, prodidit alibi Aristoteles.

Semen per meatum emittunt, idque parte corporis supinâ, quam *putamen* distat, & mare illabitur, faciunt. Continent scæminæ primò ova indiscreta, mox discreta in plura: sed quia imperfecta excluduntur, augeſcunt mote vermium, postquam vim vitalem ab asperso maris semine accipere. Sic glutino uvæ instar coheret, & quam primum

Plin. H. N. l. 9. c. 29.

Locus. *Arist. H. A. l. 9. c. 28.*

Cibus. *Arist. H. A. l. 4. c. 1. de Gener. l. 1. c. 1. & 3. Sexus.*

Generatio. *Generatio* copulari, & diu in venere, quia frigida, morari, compertum.

Arist. de Generatione l. 1. c. 15 & l. 3. c. 8.





Polyopus.

Pölkuttel.

Tab. I.


Sepia.

Black fisch. black kuttel.




Loligo

*maior. großer
schmäler
black fisch.*




Sepia supina.

Meerspin.




Loligo minor.



Oua separum.

Lopus

marinus. Seehas.



Sepiola.

Kuttelfisch. Klein blackfisch.



21

bit, minulque huius quàm Sepiã, & quidẽ ad mutim habere, quod brachia habeat coloremque mutet, ubi amissum est, accrescere, & nunquã eius copia deficit, Aristoteles addidit.

Aristot. H.
A.l.9.c.37.

Athen.
Dipn. l. 73

Aristot. H.
A. l. 4. c. 1.

*Arist. de
part. l. 4,
c. 9.*

6.96

6.96

6.96

A quibusdam brachia, ab aliis, Crura, Cirri, à Plinio barbæ, vocâtur. Acetabula Aristoteles ἀλεκτάρια, alij κα-
τυληδόνας, Antiphilus Bizantius ἑλίκας,
Antipater Thetralus πλοχμύς, Ovidi-
us flagella, dixere, περιθίμα à Hefychio
& Varino dici, nonnulli credere,
alii id capiti tribuunt. *Dorsum*, Plini-
us partem lævem appellat, à qua ace-
tabulorum ordo inchoatur. *Cervicē*,
habet imbecillam, cum premitur.
Pinnulam ipsi angustam, à medio or-
tam, quod parvum habeat alveum,
quem pedibus suis dirigere possit, A-
ristoteles tribuit. Plinius ob eandem
causam, habere negat. Tam esse ex-
iguam, ut minimè aut vix conspici
possit, experientia didicimus. *Fistula*
ipsi in dorso, cava, qua mare trans-
mittit: eamque modo in dextram
partem, modò in sinistram transfert.

Arist. H. A.
l. 4. c. 9.

Rostrum Psittaci, si Scaligero & Bel-
lonio, fides. *Cutis* nulla, quamvis Bel-
lonius pedes cute contegi reliquerit.
Caro alba, cavernosa, meatuumque
plena, quod apud Galenum & Plu-
tarchum legimus.

Scalig. Ex-
erc. 218.
Bellon. Ob-
serv. l. 1, c.
4.
Galen. de
sympt. caus.

3.
Locus.
lut. qu.
atur. 19.
Arhen.
7.
trabo
Geogr. l. 3.
ppian.

spectans imbris ferè sit obnoxii.
Arist. H. A. l. 8. c. 2. Victus.
Ælian. H. A. l. 6. 32.
 quandoque exfugunt, & succum exhauriunt; fœlamenta, & pisces. Hæc omnia tanta aviditate devorant, ut ne à proprio quidem genere abstineant, & si *Æliano* fides est, qui minores retibus inclusi capiuntur, majorum esca fiunt. Humanas verò carnes inprimis appetit. Et refert *Trebius Niger* apud *Plinium*, ad conficiendum hominem, in aqua, nullum hoc atrocius esse animal, luctari còplexu atque sorbere, & numerofo fuctu detrahare, ac in naufragos urinantes impetum facere. Depasce & arborum fructus, in siccum æstivo tempore egressos, certum. Ex plantis autem olea maximè delectari eiusque truncum flagellis sæpissimè amplecti, præter *Athenæum*, *Oppianus* prodidit. Ficus ad mare natis affigi, & fructum mādere, ex *Clearcho* habemus. An brachia sua tempore penuriæ, sub brumam comedant, quæ rursus renascantur, dubium quidem est, à maximis tamen authoribus, *Alcæo*, *Diphilo*, *Hesiodo*, *Oppiano*, & *Æliano*, affirmatur, hinc *κολοβόπους* dici *Iohanni Grammatico* ajunt. At *Aristoteles*, *Plutarchus* id falsum censent, & ille, aliquos sua brachia à congris habere, addit. Distingui *Sexu*, nullum dubium, & *Marem* à *fœmina* differre, quod ille capite esse productiore, & brachio suo gerit, quod genitalis speciem referat, in quo duo amplissima acetabula habentur. Nervo id quasi constare, porrectum ad medium usque brachium confirmant, torumque nari fœminæ annecti. *Athenæus*, acutius & solum albicans esse, parte sui extrema bifurcatum, dorsoque annexum tradit. *Plinius* forte *caudam* vocat.

De *Coitu* ipsorum hoc scimus, cum *Arist. H. A. l. 5. c. 12.*
 latent, (conduntur autem binis mēsis) idque hyeme coire, & ova parere. Os ori, acetabula acetabulis

componunt. Cum eo, quod vocant *Arist. H. A. l. 5. c. 6.*
 caput, in terram reclinato, unus invitetur, brachiaque pandat, alter, passis item flagellis, adaptat sese ita, ut acetabula continentur. Edunt ova & quidem verno tempore, fistula. De *Ovis* ita *Aristoteles*. Deponūt *Arist. H. A. l. 5. c. 18.*
 aut in cavernis aut in testis, aliove cavo loco simile quiddam labruscæ cirrulis, & candidæ populi fructui. Edita ova dependent ab ambientibus specuum parietibus, tanta copia, ut exempta, vas implerint longè maius, quam caput ipsius, in quo ipsa continebantur. His quinquagesimo demum die disruptis, pusilli polypi generantur: & magno agmine serpunt, phalangior. more. Ac quanquam nō omnibus membrorum singulorum natura conspicua est: tota tamen apparet forma. Multi autem propterea quod invalidi sint, pereunt. Adeo verò aliquando exigui reperti sunt, ut nihil haberent discretum; cætera discreti moverentur. Quod ita brevissimè *Plinius*. *Polypi vere pariunt ova* *Plin. H. A. l. 9. c. 51.*
tortili simulata pampino, tanta fecunditate, ut multitudinem ovorum cuncti recipiant cavo capitis, quo pregnantés tulerè. Excludunt quinquagesimo die, è quibus multa propter numerum intercidunt. *Polypus* fœmina modò incubat ovis, modò cavernam cæcellato brachiorum implexu claudit. Artificiosè hæc extructa, & circumjecta concharum tenuiorum & scabrarum congeries velut lorica dura erigitur. De *Ætate* *Arist. H. A. l. 9. c. 59.*
 hæc apud *Aristotelem* legimus. *Pau. l. 9. c. 59.*
cissima genera Polyporum biennium vivunt. Natura enim facile contabescit. Argumento est. Pressus enim, aliquid semper emittit, ac tandem evanescit. Patiuntur hoc fœmina, post partum magis, ac stupida fiunt, neque fluctibus agitata sentiunt. Facile quoque ab urinantibus manu capiuntur. Mucosa quoque evadunt, neque ad venandum consistere queunt, quod autem bimatum non expleant, inde capiunt argumentum. Nam postquam polypuli orti sunt, tum in æstate, tum sub Autumno, haud facile invenias polypum grandem. At ante id tempus maximisunt. Vbi igitur ova ediderint, sic consensescere atque debilitari utrumque affirmant, ut etiam à pisci-

pisciculis exedantur, per facile quoque abstrahi à cubilibus. Ante id tempus, nihil

Ælian. H. tale. Ælianus hoc Veneri adscribit, cui & Oppianus assentitur. Vivit tamen etiam in centum dissectus partes.

Motus.

Natant & pinnis & pedibus, & quidem obliqui. Pedes in eam porrigunt partem, quæ capitis nomine appellata est, ita, ut cum natant, in adversum prospiciant, & caput ex adverso habeant. Sub aquis, ita in solido ingrediuntur, ut humoris beneficio suspensi fluctuent. In sicco (in ficcum exeunt asperum, lævitatem odere) cum cambulatio cum pulsu & tractu fiat, alterum solum est in Polypi motu. Acetabulis enim iactis procul, ut, cuique applicuere id apprehensum tenent: tum brachiorum contractione corpus admovet, ita subvehunt sese in eam partem cui adhæserunt.

Ingenium.

Ingenium & sagacitatem si spectes, ἀνόντων quidem Athenæus, brutum Plinius vocat, quod ad homines adnatet, nec persequentem fugiat: est nihilominus callidus & solers. Nam primò, omnia in domum comportat, dein putamina erosa carne egerit, ad natantesq; ad ea pisciculos venatur. Idem Conchas artificiosè discuneat, & earundem carnibus vescitur. Non

Arist. H. A.

l. 9. c. 37.

sunt, inquit Plinius, prætereunda & L. Lucullo Proconf. Beticæ comperta de Polypis, quæ Trebius Niger è Comitibus eius prodidit, avidissimos esse Concharum; illas ad tactum comprimi, præcidentes brachia eorum, utroque escam ex prædante capere. Carent Concha visu, omnique sensu alio, quam cibi & periculi. Insidiantur ergo Polypi apertis, impositoque lapillo extra Corpus, ne palpitatu ejiciatur, ita securi grassantur, extrahuntque carnes: ille se contrahunt sed frustra, discuneat. Tanta solertia, animalium hebetissimis quoque est. Colorem eum mutare, sic pisciculis imponere, vulgare; in eo non convenit, quod Theognis, Phocylides, Ion, petrar. duntaxat mentiri colorem scribunt. Plinius verò & Antigonus ad similitudinem, ille loci, hic rerum, quibus appropinquat, quod & de arena Scaliger innuisse videtur, eandem fuscipere, prodant.

Athen.

Dipnos. l. 2.

Plin. H. N.

l. 9. c. 37.

Causas huius rei diversi diversas assignant. Plutarchus id astu facere & quod corpus porosum & transparens habeat, ait. Alij, ut Theophrastus scribit, metui id assignant, ut cū hominis genæ, pro varia cordis concitatione, hoc vel illo colore tinguntur. Bellonius, ob mollem pellem, quæ facile deglubi potest, id fieri credit. Cuius colorem, nunc album (hunc assumere non posse, apud quosdam invenies) mox rufum, postea lividū, mox variis coloribus distinctum videas. Huc pertinet & illud quod a

Plin. H. N. pud Plinium extat. Polypum hamos l. c. appetere, brachiisque complecti, nō

morfu, nec prius dimittere, quam escam circumroserit, aut harundinē levatum extra aquam: Monstro verò propiora sunt, quæ Trebius Niger, apud eundē prodidit. Carteja, inquit, in Cetariis prodire assuetus, exire in lacus eorum è mari apertos, atque ibi salsamenta

popolari, convertit in se custodum, indignationem, assiduitate furii immodici. Sepes errant obiecta, sed has transcendebat per arborem, nec deprehendi potuit, nisi canum sagacitate: Hircum deuntem circumvasere noctu: Concitiq; custodes expavere novitatem. Primum omnium magnitudo inaudita erat, deinde color muria obliti, odore divi. Quis ibi Polypum expectasset, aut ita cognosceret? cum

monstro dimicare sibi videbantur. Namque & afflatu terribili canes agebat, nūc extremis crinibus flagellatos, nunc robustioribus brachiis clavarum modò incussos, ægreque multistridentibus confici potuit. Ostendere Lucullo caput eius dolij magnitudine, amphorarum quindecim capax, atque (ut ipse Trebij verbis utar) barbas, quas vix utroq; brachio amplecti esset, clavarū modo torosas, longas pedū XXX. acetabulis sive caliculis urnalibus, pelvium modo: dentes magnitudini respondentēs. Reliquiæ asservatæ, miraculo pepédere pondo DCC. Quæ de alio, mercatorū res salsamentaq; Puteolis depopulante, dicuntur, apud Ælium vide.

Quantum ad usum appositos olim mensis, nullum dubium. In convivio nu-

Ælian. H.

A. l. 13. c. 8.

Athen.

Dipnos. l. 4.

Vfus.

Athen.
Dipnos. l. 9

Plin. H. N.
l. 32. c. 10.

† Plutar. l.
An aqua i-
gne melior.

Hippocr. l.
de inter.
affect. de
Natura
muliebri
c. 6.

Antipa-
thia.
† Plin. H.
N. l. 9. c. 62
Ælian. H.
A. l. 10. c.
38.
† Plin. l. 6.

vio nuptiali Sphicratis, qui Cotys Regis Thracum filiam ducebat, erant centum. Mnesimachus in Hippotropho apud Athenæum, eosdem apparat. Apud Græcos, quoque cum Ἀμφιδρόμια celebrarentur, ab amicis mittebantur. Duræ tamen sunt carnis, & ad concoquendum difficilis. Ideo ligno contunduntur, vel ad lapidem atteruntur, ut fibrosæ carnis durities frangatur. Caput suavissimi saporis esse perhibetur. Caro, si concoquatur, copiosum alimentum, sed succo crudo scatens, suggerit. Plinius muriam ex sese emittere, scribit, & ideò non debere in coquendo addi, & arundine secari: ferro enim infici, vitiumque trahere, natura desinente. Elixī magis probantur quam assī. Philoxenus Dythiramborum Poeta, quod totum excepto capite devorasset, in egritudinem incidit, & mortuus est. Idem Diogeni Cynico accidit, quod crudum † deglutivisset. Invenere & in Medicina locum. Polypotuso & apposito sisti sanguinem, scripsit Plinius. Myrseus in clibano cū lignis oleæ eundem urit, donec in cinerem vertit, pulveris unciam, cum dimidia Chalcanti miscet, & naribus ad tollendum Polypum insufflat. Secundum Hippocratem, tosti puerperii purgamenta purgant, bene ad concipiendum dantur, menses in vino albo suffocati, movent. Uteros molliunt, & in dislocatione eorundem bene præscribuntur. Ad Venerem stimulare, præter Diphilum, Æginetam, Dioclem, Alexis & Xenarchus apud Athenæum testantur. Iovius verò, sale inveteratos Venetias ex Dalmatia & Illyrico deportari, & à senibus acetabula & extremitates cirrorum, ad sobolem procreandam expeti, scribit. Causam Mnesitheus in flatuositatem, Iovius in falsedinem Aldrovandus, in feminis copiam, quam suppeditant, coniiciunt.

Inimicitias cum Locusta, Cammaro, Congro, & Muræna exercet. Locusta cum in tantum pavet, † ut si juxta viderit, omnino moriatur, quod & Ælianus prodidit. A Congris † laceratur. Muræna eidem den-

tium firmitate brachia † abscindit. † Ælianus. Cum apud Epidaurum easdem secaret Bellonius, ventriculos cirris Polyporum refertos comperit. Immobiles manere si quis rutam coniiciat, Ælianus author est.

Quantum ad Differentias & Genera, variant circa ea authores. Apud Athenæum ex Aristotele & Speusippo, Heledonem, Polypodinem, Bolbotynen, & Osmylem, species Polyporum invenies. Apud eundem Nautili & Treplichrotis fit mentio. Arist. H. A. stotelis hæc sunt verba, ex Scaligeti l. 4. c. 7. interpretatione, Polyporum multa sunt genera. Vnum genus est frequentissime dit. summa aqua natans, quod & maximum est. Horum littoris accolæ longe sunt maiores quam qui in alto degunt. Aliud genus parvorum, ij vario sunt calore, neque estantur. Item alia duo. Nam Eleadona tum peculiari crurum longitudine: tum, quia molluscorum sola singularibus tantum acetabulis prædita est. Cum bina alij habeant. Et quam alij vocant Bolitænam, alij Olentiam. Postremo alij duo in conchis. Vnus, à quibusdā & Nautilus & Nauticus, appellatur, ab alijs autem ovum Polypi. Ejus testa pectunculo similis est, cava: neque ei connexa natura. Is prope terram pascitur sæpe numero: quare à fluctibus ejicitur in aridam, ubi elapsus de Concha, aut capitur, aut in humo perit. Hoc genus & pusillum est, & simile Bolitanis. Alter in testa tanquam limax, is ex ea nunquam exit: sed interdum brachia exerit. Tantum Aristoteles: Quinque itaque Polyporum genera sunt, quorū duo in conchis hærent, tria, sine conchis conspiciuntur, inter quæ levem & exiguam moderni differentiam esse putant. Eledone ὅσο τῆ ἐλεῖν, quod comprehendat, vel ὅσο τῆ ἐαυτῷ ἰδεῖν, quod se seipsam rodat, dicitur, ὀζῶνα, ὀζολῶ, ὀσμούλῶ, à gravi capitis odore nomen habet: Osmylus adeo benè olet, ut Gyllius, nihil moscosius se sensisse, etiam tum cum mortuus esset, scribat. Pollux tamen inter cirros & caput fistulam gerere, è qua tetrum emitat odorem, prodidit.

Bolitæna, quo & Βολιτίνη, Scaligerolentia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & πολυποδίνη, nomine ab Os-

ab Osmulo duntaxat differre, scribit. Epicharmus apud Athenæum, mare olere ait. Non alit eam Euripus: in Laconia frequens est. Illa Menulas Sepiolasque venatur. Ad venerem plus cæteris valet. Efficatur à quibusdam, ut vestibis frangantiam in aquis conciliet.

CAPUT II,

De Sepia.

TAB. I. **S**epia, quæ Thebanis *Opistholia*, Arabibus *Sarathan* & *Sarthan* audit, Græcis ita dicitur, non quod sepibus interclusa facilius capiatur, ut Mido- ro placet, nec quod profuso atramento se sepiat, ne capiatur: sed quod atramento, veluti putrida quadam sanie, quam Græci *σηπεδόννα* vocant, abundet.

Defcrip-
tio. *Descriptionem* quod attinet, multas cum Polypis, plurimas cum Lolligine, communes habet, partes quasdam etiam proprias. Cum Polypo convenit, quod pinnas exiguas habeat. Angustam esse, & per totum alveum circumductam apud Aristotelem legimus, ventrem tum figuratum tactu similem. Cum Lolliginibus, sortita est alveum corporis magnum, qui tamen Sepiæ latior, Loligini longior: crura † breviora; pedes supra dentes senos exiguos, eorumque novissimos duos infra, omnium maximos, promuscides binas longas acetabulo parte extrema bino asperiufculas, quibus veluti anchoris innituntur, seque tempestate urgente modo navigij stabiliunt, venantur, & prædam ori è longinquo admovent, pedes Plinius vocat. Vulvam quoque articulatam habent, ut bifida cernatur, cum Polypi rotundum conglobatumque uterum habeant. Proprium Sepiæ est præter fistulam inter caput & alveum prominentem, atramenti copia, & vel idè quàm cæteris maior, quod vitam littoralem traducat, & nihil aliud quo sibi auxilietur habeat, cum Po-

lypis & brachia, & mutatio coloris interserviat. Continet hoc non ea quæ *μύτιν* vocant, quam Plutarchus vesiculam collo dependentem facit, sed infra ad alveum, qua intestinum petere incipit superiora, foramenque suum eadem obvolutum habet. Vocatur hoc Galeno *θόλῃ ὑπόσαγμα* & *σέν-τερον*, Nicaandro *χολή*, Aliano, *ἀποσαγμα*. *sat.* Aristoteles noctu præfulgere ut quorundam piscium capita, addit. Habet & *ὤσιον*, in dorso, robustum & latum, inter spinam & os, mediam præ se ferens naturam, fungosam intra se complectens & friabilem corpulentiam. Athenæus, & Dioscorides *ὄρεγκον*, Columella testum vel testam vocavit. Exemtum id è Sepiæ dorso, candidum est superiori parte, durum ac læve: inferiore autem fungosa quadam medulla repletum, quæ & leviter aspera, & ligni modo frequentibus venis distincta visitur. Germani *Fischbein* vocant. Sæpè binum cubitorum magnitudine capiuntur.

In Ponto nullas reperiri Sepias, Plinius author est. In septentrionali Oceano degere, cum sint frigida & exangues, mirum. Major earundem in Gallia quam Italia copia, maior in Adriatico quam Tyrreno mari. Archestratus, eas quæ prope Abderas & Maroniam capiuntur, laudat. Littoralem tantum vitam vivere, apud Aristotelem, cavernas maris incolere, apud Oppianum habemus. *Vicitat* pisciculis, sæpe & mugile, quem longis promuscibus venatur. Aliquando & majores pisciculos vincit.

Generatio sic perficitur. Coeunt corpora inter se amplexæ, adaptantur, & tesque mutuo ex adverso narem (*μύτινα*) & brachia, quod ore coire & lingua Plinius falso dixit. Vere utrum scæmina gerit, continet partum diebus quindecim: Ova statim candida specie grandinis: magnitudine myrtillorum grandiusculorum. Editis superinfundit de suo atramento. Itaque & nigra fiunt: & quasi glutino hærescunt inter se ad racemuli figuram. Mas quoque genituram suam effun-

Plin. H. N.
l. 9. c. 30.

Defcrip-
tio.

Arist. de
Part.
Animal. l.
4. c. 8.

† Arist. H.
A. l. 4. c. 1.

Arist. de
Part.
Anim. l. 4.
c. 9.

Plin. H. N.
l. 9. c. 28.
Arist. de
gen. c. 8.

Locus.

Aldrov. l. x.
c. 4.

Arist. de
part. l. 4.
c. 5.

Vicitus.
Arist. H. A.
l. 9. c. 37. &
l. 8. c. 2.

Genera-
tio.
Plin. H. N.
l. 9. c. 31.

Arist. H. A.
l. 15. c. 17.
Scal. edit.

effundit, qua illa & nigriora & duriora fiunt, atque augescunt uvæ ad acini magnitudinem: Ex candida fit Sepiola, exitque die quinto decimo cute obrupta, exitque in caput & ventre annexo, ut aves. Quanquam nexus ille umbilici nondum satis constat. Crescente itaque Sepia, decrescit albumen, ut in avium ovis vitellus, ac tandem deficit: Oculi Sepiolarum ut in cæteris quoque animalibus grandissimi. Perfecta iam Sepia cum est egressura, se membrana secare occipit. Sepiola perterrita & stercus edit, & rubescit. Parit verò juxta terram inter arundines & sicubi enata alga, aut aliud quidpiam è mari ejectum, ut materia samentorum aut lapides. Bimatum non complere Aristoteles prodidit.

Arist. l. c.

Plin. H. N.

l. 9. c. 51.

Arist. l. c.

Sexus.

Arist. H. A.

l. 4. c. 1. l. 5.

c. 12.

Sexus dignoscuntur facillè. Mares prona sui parte nigriores sunt, partes omnes asperiores habent, & lineis intervenientibus varias, caudâ etiam acutiorem. Fœmina intestina continet duo veluti mammas, quæ alvo dissecta facillime conspiciuntur.

Ingeniû.

Plin. H. N.

l. 9. 29.

Arist. H. A.

l. 9. c. 37.

Ad *Ingenium* pertinet, quod percussæ tridente fœminæ auxiliatur mas: at fœmina icto mare fugit: quod soli suo utitur atramento, non solum cum metuit, sed & abscondendi causa: quod ambo ubi sensere se apprehendi, effuso eodem, quod pro sanguine his est, infuscata aqua abscondantur: quod à collo acetabulum instar funiculi, quo hamus dependet, dimittit, & pisciculis mordendum exhibet, eodemque retracto prædâ ad se adducit: quod denique tempestate urgente, propriis scopulis devincta flagellis hæret, & nativos dura connectit caute rudentes.

Plin. l. c.

Ælian. H.

A. l. l. c. 34.

Philes in

Iambis.

Oppian.

Halieut.

l. 2.

Vfus.

Habent ut olim ita & nunc in *Cibis* locum. Nam & cum Amphidromia celebrabantur, mœnas cum Sepiis mollire, & plurimos cirros diligenter stringere solebant, & in Ipsicratis nuptiis, assarum fit mentio. Optimæ putantur gravidæ, mensibus in primis Ianuario, Februario, & Martio. Elixantur magna ex parte, assis-

que præferuntur. Majores sale conservantur in Illyride, indeque Venetias deferuntur, ut & Genua Mediolanum. Ad Venerè ciendam quidâ cum nucibus adhibent. Ova in siccû ejecta, nonnulli in sartagine coquunt. Sethi difficulter concoqui, parumque in se continere succi, scripsit. Est & in *Medicina* earum *Vfus*. Ad dentium dolorem, cum ovorum putaminibus & oleo miscet Galenus. Hippocrates in morbis mulierum sæpissimè præscribit. Celsus & Dioscorides atramentum alvum emollire prodit. Ova urinâ movent teste Plinio. Marcellus ad tincturas & maculas corporis abolendas ex iisdem remediû facit: Dentifriciis aptissimum est os Sepiæ; quod & thoracis vitis cum aqua potum prodesse Gesnerus scribit.

De *Differentiis* nihil occurrit. Rô- Differentia deletius pisciculum hunc, quem ita descripsit, Sepiolam vocavit. Sepiæ, inquit, nascenti similis est, pollicis crassi magnitudinem non superat: octo pediculis constat: duas proboscides habet, nec sepium in dorso, nec gladiolum habet: utrique lateri pinula, veluti ala parva affixa est, rotunda, nec figura, nec situ pinnis Sepiarû & Loliginum similis, &c. Colore est vario, parvulus enim punctis in dorso notatur. Ore, oculis, fistula, partibus internis à Sepia non differt. Carne est molliore.

CAPUT III.

De Loligine majore & minore.

Loligo major τὸ ὄζον Græcis, Gazæ TAB. I. Lolium, Gallis Calamar, à thecæ 4. 5. scriptoriæ similitudine, sive quod in ea reperiuntur, quæ ad scribendum necessaria sunt, dicitur. Minorem τὸ ὄζον vocavere. Quænam cum Polylo & Sepia communia habeant, capite de Sepia explicatum est: hoc solum addimus, Loliginum promusci-des, Ligulas vocari Apulejo; id vero quod durum ac solidum intus per corpus-

Nomen.

Apul. Apol.

corporis prona continetur, $\xi\iota\phi\theta$, seu gladiolum dici. Differunt à Sepia, quod alveum, quem Aristoteles $\kappa\omicron\iota\lambda\iota\delta\iota\varsigma$ Athenæus $\zeta\omega\mu\alpha\tau\iota\omicron\nu$ vocat, longiorem habeat: & bina quidem conceptacula gerat, quæ ventris ferunt speciem, sed alterum minus ingluviè imitetur & tactu discrepet, quoniam & Corpus totum carne molliore constat. Quin & præter atramentum, quod prope mutim habet, gerit & succum purpurascens, $\omega\chi\epsilon\delta\omicron\nu$ Athenæus vocat, Oppianus $\iota\pi\epsilon\rho\upsilon\theta\epsilon\omicron\nu$, Gladiolus autem, quem Athenæus $\omicron\varsigma\epsilon\gamma\kappa\omicron\nu$ dixit, cartilagineus est, pellucidus, & ab uno parte cultrum, ab altera calamus referens.

nihil ab ista differt, vide apud eundem.

Reperiuntur in profundo † mari, etiam propè † Eubæam, quin & in Ponto, in quo nulla Sepia. In nostr. mari, inquit Plinius, quin & cubitorum capiuntur. *Vitæ* piscibus: nec à Cancris Paguris & Astacis abstinent; diligenterque, quicquid in stomachum dimiserint, rostro, quod robustissimum habent atterunt.

De *Coitu* idem in Loliginibus occurrat, quod in Sepiis di. imus. Pariunt in alto, & conferta ova edunt. Apparêt hæc gemina, quod vulva earum ita articulata sit, ut bifida cernatur. Neque his bimatu † longior vitæ. Mas à fœmina differt, quod intrus meatus duos habeat, quibus mas caret, sicuti in Sepiis e. edit, Non tantum suis pinaculis natant, † sed etiam iisdem extra aquam se effeientes volitant: & sæpè tanta multitudine, ut, quod ex Trebio Nigro Plinius prodidit, navigia quoq; demergant. Dum volitant tempestatem prænunciant, quod caro ipsarum nuda & glabra, frigoris quoq; sit impatiens, ut Plutarchus prodidit.

Vsus Loliginum ut olim in Cibis *Vsus*, fuit, sic nunc est. In cœna lauta appositos Pherecrates apud Athenæum testatur: Scholiastes Aristophanis, & Suidas inter viles reponunt. Præferuntur gravidæ, & quas Ambracia dedit, Romæ mensibus frigidis laudantur. Et assarum, & in sartagine coctarum, Athenæus meminit. Antiphanes sacra delectatur. Deterius jus sine atramento confici opinantur. Quomodo sapidiore reddantur, vide Aldrovandum. In *Medicina*, stomachicis convenire in cibo apud Galenum legimus. Tormentosis assaras prodesse Marcellus Empiricus prodidit.

Locus.
† Arist. de
part. l. 4.

6. 4.
† Athen. l.
7. Dipn.

† Plin. H.
N. l. 9. c. 15.
Idem l. 9. c.

30
† Vitæ.
Genera-
tio.

Plin. l. 9. c.
5.

Arist. de ge-
ner l. 3. c. 8
† Plin. H.
N. l. 9. c. 3.

† Plin. H.
N. l. 9. c. 29

Plut. qu.
natur. 18.

Galen. de
Comp. sec.
gen. l. 1.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

Plut. qu.
natur. 18.

CAPUT IV.

De Lepore marino.

T. A. I. 6.
Nomen.

LEPUS marinus, Græcis λαγώς & λαγώσῃ θαλάσσιῃ, à colore leporis terrestris, quem ἐμπέριον vocant, nomen sortitus est. Monspelientes ebrum vocant, quod vivus colore ex rubro nigricante sit, quali plerumque ebrii conspiciuntur. Mortuus ex fusco albicat.

Descriptio.

Ælian. H. A. l. 2. c. 45
Apulej. in Apologet.

Variè à veteribus describitur, quem modò offæ informi, ut Plinius, modò cochleæ testa exemptæ ut Ælianus; modò Lolligini parvè, carneam si respicias, ut Dioscorides, assimilarunt. Apulejus cætera exossem, duodecim tamen numero ossa ad similitudinem talorum suillorū connexa & catenata gerere, reliquit.

Differentia.

Rondelerius tria genera descripsit. *Primum genus* maximè lethale est, cochleæ nudæ admodū simile, maxime posteriore corporis parte. Os habet in dorso veluti Sepia, volutæ instar contortum, qua parte caudam spectat; in lateribus Sepiarum modo pinnas habet alveum ambientes replicatas: mox cornicula duo carnosæ, qualia sunt in cochleis, altera tantum capitis parte Zygenæ caput imitatur: altera parte foramen est, per quod carnosam quandam substantiam exerit, quam etiam pro arbitrio retrahit. In harum duarū partium medio rima est pro ore, atramento & reliquis partibus internis lolliginem refert. Idque in hoc genere est mirabile, quod cum in omnibus animantibus partes sinistræ dextris similes sint, in hoc sint valdè dissimiles, idèò ossa informis merito dicitur. Odore est Pisculento retroque. *Alterum genus* superiore est maius, partibusque & aliis superiori simile, sed parte priore duas latas appendices carnosas habet, in quarum medio rima est. Paulò infra cornicula duo, qualia in superiore descripta sunt, nisi quod acutiora & breviora sint. In dorso os nullum, neque posterior pars, cochleæ exenteratæ similis est. Huius posterioris partis utroque la-

tere, veluti in Sepia pinnæ sunt magis replicatæ & expansæ. *Tertii generis* prona & supina pars exhibetur. Quod in partis supinæ medio conspicitur, est os: Supraposita ori pars alveus, qualis in Sepiis, ovi figura, sed in ambitu crenatus. Ori subiecta pars membrana est tenuis, carnosæ, magis expansa in rotundum, cuius ora fimbriata est, fimbriæ nigrescunt. Intus cerebri nigri parum est, guttam excipit ventriculus, ex quo oritur intestinum instar capreolorum vitis convolutum. In medio substantia quædam est fungosa, succum fuscum continens, fortassis μύκων cum atramento suo. Toto corpore est splendido: Crystallum vel pituitam concretam con elatamque dixeris. Odore est ingrato & pisculento nauseumque movet. Hoc genus Bellonius pro communi lepore descripsisse videtur. Fulvum inquit leporis terrestris colorem imitatur. Pulmonis marini more per mare divagatur, tamen si pinnis careat. Pellucidū habet corp⁹ ovi anserini magnitudinē non excedēs, q̃ pro lubricine huc & illuc trāsferit. Septē habet appendices innumeris promuscidibus stipatas ex Indico in cyaneum vergentes, quibus sugendo corpori alimentum suggerit: appendicum autem substantia fungosa est. Ex aqua emergens naturam suam emittit, & in seipsum concidit. Linguam demorsus vellicat utari radix, paulò tamen remissius, &c.

Addit Ælianus & *Indicum*, quod Ælian. H. A. l. 16. c. ex omni parte ad terreni leporis similitudinem accedit, præter pilos, qui spinosi & erecti. Tertium illud genus in alto mari degit, ideoque rarissimè capitur. Primum in stagnis marinis lutulentis, & alga limoque vescitur. Frequentes inter cycladas insulas occurrere Bellonius prodidit. Dari in hoc genere marem & sceminam apud Plinium habemus. Cum ad Rondelerium delatus esset qui lingua carnosæ careret & ore in dorso, marem esse iudicavit, primo loco descriptam sceminam, quod in ea Polyporū ovis simile quid reperiretur.

Adhuc

Ufus. *Adhibitus est in Medicina olim. Ga-*
len. l. II. de Sympt. lenus & Plinius inter Psilothra refe-
 runt. Archigenes ad ægyloas la-
 næ tomentum sanguine leporis
 marini tinctum indit. Iubent quidam
 & lepore marino recenti podagram
 fricari, prodente Plinio. *Venenatum*
 esse certissimum est, cum inprimis
 qui in Indico mari. Eo Titus à fratre
 Domitiano sublatus est, & Plinius
 ait. Non sunt minus mira quæ de le-
 pore marino traduntur. Venenum
 est aliis in potu aut cibo datus, aliis
 etiam visu. Hi quidem gravidæ si-
 spexerint foeminam duntaxat ex eo
 genere, statim nausea & redundatio-
 ne vitium fatentur, ac deinde abor-
 tum faciunt. Remedio est mas indu-
 ratus sale, ut in brachialibus habe-
 ant: eadem res in mari & tactu qui-
 dem nocet. Alibi tamen, mortem
 sæpè inferre, & si nihil aliud ventrem
 doloribus acerbissimis torquere scri-
 bit: quod & Ælianus prodidit. Quæ
 de mulieribus dicta sunt, à Rondele-
 tio experto confirmantur, sed reme-
 dii non meminit. Symptomata quæ
 insequi solent, egregiè vetustissimus
 Poëta descripsit

Post bibitum hoc virus viridis sta-
gnantia fellis
Excrementa manent, tenebroso lu-
mina visu,
Caligant, liquida abeunt in corpore
carnes:
Nausea adest, tumet alta cutis, talig,
calescunt:
Subque cavis oculis roseo fucata ru-
bore
Apparet facies, sistensque urina mo-
ratur,
Quæ nunc purpureo, nunc sanguineo
esse colore
Cernitur, & quemcunq; videt con-
temnere piscem
Affolet averfians, ut qualibet aquo-
ris ager.

Hinc patet vix pulmoni propriè
 infestum, cum tot affectus sumpto eo
 oboriantur. Fatendum tamen ple-
 rumque tabem invadere. Alexiphar-
 macorum quæ contra adhibentur
 haud paucus est numerus. Exhibetur
 primò helleborus niger, hinc lac asi-

ninum inprimis: nec non decoctum
 malvæ, & alia de quibus Aldrovan-
 dum vide. Rondeletius mulieri quæ
 nauseam ex odore conceperat, can-
 crorum usum præscripsit.

*Aldrov. de
 Moll. c. ult.*



HISTORIÆ NATVRALIS

De Exanguibus Aqueis.

LIBER II.

De Crustatis.

TITVLVS I.

De Crustatis in genere.



Væ Crustata Plinio, illa *Plin. H. N.*
 Latinis aliis Crustacea, *l. II. c. 31.*
 quod molli crusta operta *Nomen.*
 sint, Græcis *μαλακός, ἄσπετος*
 eandem ob causam dicuntur. Me-
 dium inter Testacea & Mollusca for-
 titi locum videntur. Nam quatenus
 foris crusta, etsi fragili & tenui obte-
 guntur, cum testaceis conveniunt:
 quatenus molle carnosumque intus
 continent, Mollibus comparantur.

Osibus carent, quod ossa juncturis *Descri-*
 indigerent, ut Cardanus scribit, nec *ptio.*
 sub crusta extendi possent. Commu-
 nes ipsis cum cæteris exanguibus
 partes, Caput, Alveus, Gula, venter,
 & intestinum. *Alveus* totius corporis *Aristot. H.*
 indiscretus est: nec caput distinctum, *l. I. c. 3.*
 nec aliud quicquam. Ideò ea Gale-
 nus capite truncare voluit: quod ca-
 ve de Caudatis accipias. *καὶ εἰς* ista
 dicuntur, non tam quòd magnum
 caput habeant; exiguum enim hoc:
 quàm quod maximum inter cætera
 crustata. Et videtur Athenæus apud *Athen. Di-*
 quem ista leguntur *καὶ φάλη* catàchre- *pnos. l. 3.*
 sticè pro thorace & capite sumere.
 In Capite *Os* est quod protinus ven- *Arist. H. A.*
 trem in omnibus, præterquam in Lo- *l. 4. c. 5.*
 custis excipit, mox à ventre intesti-
 num. Exiguus is, si proportionis in
 b 3 corpore

corporum magnitudine ratio habetur: hoc simplex usque ad exitum excrementi deiecitur. *Dentes* in ore habent duos priores, & quia hi ad exactam ciborum contritionem non satis, quoad intima corpi oris penetrare queant, tres in ventriculo, aliternsecus singulos, inferius tertium. Longi qui in ore & tegmine duplici operti, inter quæ talia quædam interiacent qualia locustarum dentibus annecti suo loco dicemus. Intra hos binos dentes carnosum est illud, quod lingua proportionem eiusque effigiem

Arist. H. A. l. 4. c. 2. gerit. Supra os *Oculi* siti sunt, iique duri omnibus, apti intrò, foras, & in obliquum & quidem celeriter moveri, idèd palpebris carent: Cardanus in latus moveri ait nostri comparatione, directè autem oculorum suorum. Melius enim esse ut altero utrinque prospiciant etsi diversis oculis, quàm utroque simul necante nec post. Prominere autem quia à lateribus: quia aliter antè penitus prospicerent: à lateribus autem collocari, quia si supra caput non viderent, ante verò non poterant, quia os infra reponere necessarium fuisset, quia caput habent immobile: neque ante simul os & oculos esse, quoniam oportuisset esse latam faciem, unde in motu etiam tardiores evasisent.

Caput etsi exiguum, appendicibus tamen & cornibus munitur, quæ & ad pugnandum & ad prætendandum iter data sunt. *Pedes* omnibus octoni, omnes in obliquum flexi. *Brachia* forcipibus denticulata sunt bina, quæ Græci *χέλας*, Apuleius furcas, alii nomine Græco servato Chelas nominant. Horum pars superior in primoribus his, ut loquitur Plinius, movetur superiore immobili; hisque pro manibus utuntur, & contra quam pedes flectant. Omnibus magna ex parte grandior & validior dexter quàm lævus *forceps* est. *Caro* colore sanguinis rubra & tactu lento. In alveo humor est pallidus, & minuta quædam oblonga & albida, ruffa etiam alia maculis dispersis. *Papaver* eis parcius. brachior. annexus communis. *Tabellas* quidam Latini vo-

cant quas *πλάνας* Aristoteles, quibus cor crustæ coagmentantur. *Lapides* sub crusta genitos refert Cardanus, de quibus in Cancris agemus.

In stagnis potius marinis & juxta Locum amnium ostia, saxorum foraminibus & limosis locis morari ex Aristotele & Athenæo habemus. Lapillis, alga, limo & stercore victitant: nec à carnibus abhorrent. *Coeunt* more eorum quæ in aversum mingunt, ineunte vere, & cum ficus maturescunt, propè terram, & quidè quod exanguia sint & naturæ frigida, diutissimè. *Fœmina* ovum rubidum, membrana prætenui obvolutum, ventri, lateri, & utrique intestino annexum, & ad carnem usque adhærens parit. Imperfectum illud, quod foris editum, incrementum capiat. Diversitas *Sexuum* ex nonnullis cognoscitur. Maior & crassior mas, tenues genitales meatus habet, & primum pedem simplicem. Nec non duabus particulis candidis, quas in carne pectoris habet, sed à scœnina discretas tum colore tum concretionem similes Sepiarum promiscidi. *Vorticosa* hæ sunt, quemadmodum buccini anfractus, quem Græci *μικράνα*, id est, papaver vocant. Oriuntur ex ab acerabulis, quæ sub extremis sunt pedibus. *Fœminæ* operculum distantius, hirsutius, & opacius: vulvæ membranæ ad intestinum hinc atque inde fissæ, in quibus ovum gignitur; primus pes duplex, & cauda latior.

Longæ *vita* esse scripsit Plinius, *Nulla respirant*, sed aquam per fistulam egerendo refrigerantur. Humorem ore accipiunt, & meatu oris superiori emittunt. Hebes omnibus *visus*, tum quod oculis habeant duarior & promittentes, tum quod à latere positos. Valent *gustui & odoratu*, & ad morem aquatiliu *dormiunt*. Nullum sonum vel vocem emittunt, & obliquo motu incedunt, caudaque tantum natant.

Ad *Naturam & Mores* pertinet, Mores: quod hyberno solum tempore conduntur, vere & autumnopinguescunt, quod autennis potius & cornibus quàm chelis quibus tamen magis valent

Plin. H. N. l. 11. c. 37.

Aristot. de Gener. l. 3. c. 11. & Athen. Dipnosoph. l. 3.

Generatio. Arist. de Gener. l. 1. c. 11 & 14.

Cardan. variet. l. 37.

Arist. H. A. l. 4. c. 2.

Arist. H. A. l. 4. c. ult.

Plin. H. N. l. 9. c. 31. Sexus.

Plin. H. N. l. 9. c. 31.

Plin. H. N. l. 6.


Vita.

Arist. H. A. l. 4. c. 10.

Plin. H. N. l. 8. c. 1.


Arist. H. A. l. 4. c. 2.

Locusta Marina Carnius.
Marstöffel.





Astacus Marinus com.

See Krebs




*Astacus similis
 pediculus marinus.*

Astacus (canmarus) 3.





Leo seu Elephantus.



Astacus parvus Marinus.

*Astacus similis pediculus
 marinus.*



Arist. H. A. l. 5. c. 17. lent inter se depugnant, istis cum aliis, quod denique vere & autumnopost partum operculum exuant.

Vfus. In Cibo laudantur plenilunio, quia *Plin. H. N. l. 9. c. 37.* sydus tepido fulgore mitificat tempore verno & autumnali, & cum utrum gerunt. Grati sunt saporis, sed duræ carnis, ideò coctionis arduæ. In Medicina, ad canis rabidi morsum, tabem, & fervidorum humorum deustionem conferre, Lemnius tradidit.

TITULUS II.

De Crustatis in specie.

CAPVT I.

De Crustatis caudatis.

ARTICVLVS I.

De Locusta.

TAB. II. I.
Nomen. CRUSTATA in Caudata & Rotunda Optimè dividemus. Illa sunt, *Locusta, Asacus & Squilla.* *Locustam* Isidorus, à pedum longitudine dici putat. Græcis est καρχέδων, ἀπὸ τῆς καρχαβαίνων, quòd capite incedat, vel eo sit multum prominente, καρχέδων apud Trallianum, Hesychio & Varino ἀγχιλίδων, à caudæ motu, καρχέδων & καρχέδων. Ab aliquibus γερφαῖοι, ab aculeis, πρὸς τὸ γερφειν καὶ χαρχέδων, id est, ad scribendum & sculpendum idoneis. Aristophanis scholiastes παγέδων τὸς πρὸς ἡμῶν καρχέδων exponit. Hirto asperoque sunt corpore.

Descriptio. Duo eis ante oculos cornua magna, initio aspera & aculeata, deinde rotunditate præpilata, (κέντερον Oppianus & Ælianus, Aristoteles κέντερον, nos antennis vocamus) in exortu crassissima, quæ paulatim magis ac magis ita gracilescunt, ut tandem in tenuissimum cirrum desinant, in omnemque partem pili instar flecti possint. Oculi cornei semper prominentes, & exerti, in obliquum mobiles, aculeis acutissimis firmissimisque utrinque tanquam propugnaculis

mununtur. Oris lateribus additæ appendiculæ tanquam parvi pedes ad tutelam. *Dorsum* asperrimum est & aculeatum, velut è fronte aculeus magnus eminet. In lateribus brachias habet veluti è pilis coagmentatas, pedes utrinque quinquos annumeratis extremis chelis, quas Gaza modò forcipes denticulatos, modò brachia forcipata interpretatus est: flectunt eos in obliquum, ut chelas intorsum. Cauda lævis & sine aculeis ex quinque tabellis contexta, in pinnas quinque desinens, natandi causa, ei tanquam remoinnititur, & in ea totius corporis robur situm est, quod experieris si ea parte Locustam apprehendas. *Dentes* habent primores binos maiusculos & gulam ante ventrem exiguum, in quo nonnulli dentes, & similis muti humor. Cor ex nigro rufescere observavit Bellonius. Mare cum excipiunt ore, transmittunt id ad suas branchias, quarum plures quàm alia crusta intesta obtinent. Præterea meatus pectoris Aristot. H. re dependet usque ad exitum excrementi: is pro vulva fœminis est: genitalis verò semen continet in manibus. Iacet autem in concavo carnis, ita ut interiaceat caro. Nam intestinum ad partem curvam situm est, meatus ille ad cavam; non alio modo quam in quadrupedibus continetur. Neque verò id alia specie est in masculo & fœmella, sed utrisque & tenues & candidi, ac pallidum continent humorem. Et utrisque eadem origo à pectore. Quem Aldrovandus appinxit dorsum habebat inter atrum & cæruleum medium, dentem superiorem triplo maiorem inferiore. Vterque intus tuberculis caret, & utrinque est acutus.

Reperiuntur in mari, circa Sigæon Loc. in primis Athon & Ligustico. In Indico quatuor sunt cubitorum. Hyeme *Plin. H. N. l. 9. c. 3.* verò aprica littora sectantur, æstate in opaca gurgitum recedunt, petrosisque locis vivunt. In Ligustico nigricantes Pierius Valerianus conspexit. *l. 5. c. 17.*

Victus ipsis pisciculis, quos circa cubilia capiunt, & captos ori forcipe suo admovent. Murænas & congros maiores devorare, & cibos ore tere, quod

Bellon. A.
guatil. l. 2.
c. 3.
Genera-
tio.

Arist. H. A.
l. 5. c. 17.

re, quod oris constitutio & gulæ angustia ostendit, observavit Bellonius. Vita omnib. diuturnior. De Generatione ita Aristoteles. In genere crustatorum locusta post coitum impletur, & continet ova circiter menses tres, Maio, Iunio Quintili. Deinde edit ea sub ventre ad plicaturas: ubi crescunt, quomodo solent vermiculi. Id quod commune est & molluscis & piscibus oviparis, ut omnium ova crescant. Locustarum igitur ovum est solutile in arenæ modum, octo in classes partitum: pro numero scilicet cooperculorum, quæ lateri adhærent. Quorum singulis cartilagineum quiddam adfitum est: circum quod hærent cumulata specie rami: unumquodque enim horum cartilagineorum in plura scinditur. Quod deprehendas, si diducas: sin aliter intueare, unum corpus concretum putes. Grandissimum quodque non est ad foramen, sed ad medium: postrema autem minima. Minimis magnitudo quanta fici granulo. Neque continuo ipsi meatui hærent, sed medio. A cauda namque ad pectus, duo, singula utrinque sunt potissimum intervalla. Sic enim etiam cooperacula ipsa disposita sunt, ut à latere tegere non possint. Quare extremitatibus suis imposita cooperculi modo contegunt omnia. Videtur autem parturiens producere ova ipsa ad illa cartilaginea caudæ applicatu. Comprimens enim sese atque statim curvans parit. Cartilaginea hoc tempore augeſcunt ita, ut ovorum ipsorum capacia esse possint. Nam ad cartilaginea pariunt sicut Sepiæ ad malleolos, aut alia quæ fluitant. Is est pariendi modus. Concoquit autem ibidem potissimum vicenis diebus. Tum abjicit cuncta simul consistentia sicut cum eiecit, videntur: inde ex his locustæ oriuntur die ferè quinto decimo: capiunturque sæpè numero minores digito. Ante

Aristot. H.
A. l. 4. c. 2.
Sexus.

Sexus differentia in eo consistit, quod fœminæ primus pes bipartitus sit, mari continuatus uno ungue.

Fœmina quoque pinnulas quæ subtus sunt magnas habet, sed collum versus decreſcentes. Mas omnes æque minores. Maris etiam pedibus postremis quasi calcaria quædam sunt: eaque tum magna, tum acuta, fœminæ eiusmodi pars parva & inoffensa. Rondeletius addit in caudæ supina parte fœminam habere appendices duplicis pinnis similes, ad contegenda & conservanda ova; mari simplices & parvas. Vulvam bifurcatam habere, Aristoteles testis est.

Aristot. de
Gener. l. 3.
c. 8.

De Natatu, pedes anteriores, in eo Motus, qui maiores sunt moveri Bellonius negat, sed pinnulis quas partim sub cauda gerit, partim in extremo eiusdem, tum quaternis reliquis pedibus natare asserit. Cum nullius rei metu afficitur anteverſus progreditur non prætenſis sed obliquatis ad latera cornibus, ne aqua contra natantem ruens reprimat cornua, & ulterius progredi prohibeat. Retrocedens in metu, demittit & laxat eadem, & tanquam remis altius demissis Scapham propellens, multum itineris conficit. Latent mensibus quinis, & more arietum cornibus dimicant. Lædi non posse nisi sub cauda tradit Rondeletius. Antipathia, si attendas, tantum Polypum pavet, ut si juxta viderit omnino moriatur. Murænam eadem aggreditur, & ex victa prandium instituit.

Bellon. A.
guatil. l. 2.

Ælian. H.
A. l. 9. c. 25.

Plin. H. N.
l. 9. c. 30.

Antipathia.

Plin. H. N.
l. 9. c. 30.

Uſus.

Vſum in Cibis si spectes, Collimendon idè Carabi accepit nomen quod hoc cibi genere impensè delectaretur. Eliguntur gravidæ & tempore plenilunii. Præferuntur in Italia ab Octobri usque ad Aprilem: præferuntur & maximæ, quales capiuntur in mari Indico, & circa Africæ quoddam littus loco petroso, ut scribit Syneſius. Plus carnis habent quàm Cancris, ut Diphilo Siphinio apud Arhenæum viſum, difficulter concoquuntur, sed admodum nutriunt salſi humoris sicciq; participes, & si aqua dulci sæpius coquantur, ventrem cohibent. Condituras vide apud Aldrovandum. Vſum in Medicina quod spectat, Hippocrates puerperæ ut melius

Hippoc. l.
de morb.
mulier.

melius purgetur præscribit. Simeon Sethi testas combustas ac cum mera-
co vino potas renes calculosos ex-
purgare scribit.

ARTICVLVS II.

De Astaco.

PUNCTUM I.

De Astaco marino commu-
ni.

T A B. II.
2.
Nomen.

Astacus ex sententia Rondeletii, quasi ἀστῆς, id est, non destil-
lans sed abundè fluens dicitur, quòd
tubercula plurima, tum alba tum
purpura guttarum, siue lachryma-
rum specie forcipibus inspersa ha-
beant.

Descri-
ptio.

Aristot.
H. A. l. 4.
c. 2.

Est vel Marinus vel Fluvialis. Ad
eum Leo seu Elefantus Plinii, &
istæ quem hic descripturi sumus per-
tinet. Est autem Astacus colore toto
nitido, sed nigritia insperso. Pedes in-
feriores grandes, ad octo usque ha-
bet: ab his grandes sp̄s duos multò
maiores & mucrone latiore, quàm lo-
custa, sed specie diversâ. Dextri
namque summum latum oblongum
tenue est: sinistri crassum & teres: u-
triusq; verò bipartitum ac quasi man-
dibula cum dentibus infra supraque.
Quamquam dextro dentes serrati
sunt omnes, alterius primores serra-
ti: at interiores tanquam molares.
Inferiorum ordo quaternis æquali-
bus, superiorum ternis inæqualibus
expletur. Movent partem superio-
rem utrique, & ad inferiorem pre-
munt: ac valgi quidem sunt situ
inferiore, tanquam à natura de-
stinati ad protendendū & premendū.
Supra hosce duo alii hispidi paulò in-
fra os. Mox haud longè infra, bran-
chiæ circum os multæ & hispidæ,
quas assiduè motat. Hi pedes qui ori
præstò sunt, extantibus quibusdam
tenuibus barbulis asperantur. Dentes
duos habet ut locusta: supra hosce
cornicula breviora ac tenuiora quam
locusta. Tum alia quatuor eadem

specie, sed breviora & tenuiora, su-
per his oculos pusillos breves. Pro-
minet pars cui subsunt oculi, acuta &
aspera quasi frons, major quàm locu-
stis. Omnino facies acutior, pectus
autem latius: totumque corpus car-
nosius ac mollius quàm locustæ. O-
cto pedum quatuor bifidi, quatuor nò:
quod collum appellatur, quinque in
partes divisum est extrinsecus. Tum
est sexta pars lata quinque producta
plagulis. Hactenus Aristoteles. Gef-
nerus Chelam faciē hominis ridiculā
repræsentantem exhibet. Nam Che-
læ pars minor maximum & aquili-
num nasum refert: & quæ in utrius-
que partis confinio apparent verru-
cæ, oculos, si supercilia addantur. Su-
periolem partē quatenus seu corni-
cula quatuor supra nasum & frontē e-
minent, cæruleo aliove colore si pi-
ctor inducat, ad repræsentationē pilei
auriti & ad latera descendētis, ita
tamen ut aures lateant: retrò & cir-
catempora pili prominent nigri.
Facies partim albo inducatur pig-
mento, partim roseo fucō niteat. Lin-
guæ instar partis chelæ majoris tube-
ro rubicundo colore insigniantur.
Quòd si cristam quoq; è pennis præ-
fertim gallinacæ, capi aut pavonis
nutantē, foramini summo indideris,
planè Gorgoneam & terribilem ha-
bebis faciem.

Nunquam nò in Oceano frequen-
tes: in Euxinio tamen nulli. In saxis
habitare Oppianus prodidit: Aristot. Oppian.
teles in terrenis. Circa Thasum & Halient.
Hellepontum nascuntur. Coeunt eo-
dem modo quæ cætera crustata. Arist. H. A. l. 5 c. 17.
Mas fœminaque nulla nota insigni
inter se differunt. Nam utriusvis u-
Genetram libet forcipem maiorem depre-
hendes; quamquam utramque æqua-
lem unquam neutri. Ore mare ex-
cipit, cum locustæ ad branchias trans-
mittant. Sine humore longius à mari
deferri nequit: & tam est locipatris
amantissimus, ut non longè deporta-
tus, eodem adrepat. Polypum exti-
mescit. Ælian. H. A. l. 6. c. 22.

Quantum ad *Usum in Cibis*, optimi *Usum* in
illi apud veteres qui in Methymna *Cibis*.
c capie-

capiebantur. Omnes difficulter co-
quuntur, & tardè descendunt: ritè
confecti & præparati non imbecilli-
ter alunt. Mnesitheus assos elixis præ-
tulit.

PUNCTUM II.

*De Leone seu Elephanto &
Astaco parvo Ronde-
letij.*

TAB. II. **C**RUSTATUM quòd hic descripturi
sumus, nomē Leonis vel à magni-
tudine, ut Aldrovando videtur, vel à
colore flavo, quo vivus conspicitur, ut
Rondeletio placet, sortitum est: Bel-
lonius cum Elephanto Plinii idem
facit, quòd eadem sit Leonis apud
Ælium & Elephantum apud Plin-
ium descriptio.

Corporis speciem Astaco affinis est,
sed brachia longiora habet, forcipes
tenuis & latiusculos, quorum scis-
sura major, quàm in ullo alio Crusta-
torum genere. *Pedes* tres qui proximè
brachia sequuntur, longiores sunt,
aculeati, in calcaria terminati: ulti-
mus exiguus brevis & tenuis, neque
aculeis, neque pilis munitus. Præter-
ea ab Astaco dorso aculeis differt,
quibus cum locusta convenit. Utrin-
que *cornua* duo longissima tenuissi-
maque habet, item alia in fronte
brevia, inter quæ unum in fronte e-
minet acutum, neutrà parte ferra-
tum: hæc sunt oculorum propugna-
cula, qui cornei sunt & prominent.
Corpus totum undulatum est, instar
panni ex hircorum camelorumque
pilis contexti. *Cauda* perinde ac in A-
stacis in pinnas quinque definit, sed
lineis magis distincta. Scaliger unum
vidit, cujus brachium puerilis bra-
chii magnitudinem æquabat, quan-
tum & ille quem Aldrovandus Brun-
dusio sibi missum describit, habebat.

Plinius Elephantum suum nigrum ef-
se vult, id est, violacei exsaturati co-
loris. Nam *κυανός* Græcè denigro, ut
de Æthiope, & cæruleo, ut de mari
dicitur. *Forcipes* adeò valent, ut ob-

servatum sit, Massiliæ vulpem per to-
tam noctem, ab uno detendam
fuisse.

Apponuntur lautis in Italia con-
viviis, Ælianus, adipem squalidæ &
infuscatæ faciei nitorem afferre, re-
liquit.

ASTACVS parvus marinus Ronde-
letij semper est parvus. *Corpus* ei vivo
rubescit, alioqui lineis cæruleis trans-
versis variatum. *Capite* & thorace
est rotundiore quàm fluviatilis, in la-
teribus inciso. E capite eminet *Cornu*
latiusculum, magnum si totum cor-
pus spectes, utrinque ferratum, inter
oculos situm, quas recondit & ex-
erit. Cornua quatuor oculis præfixa
sunt, dum & breviora cornu ferrato
viciniora, alia duo multò longiora,
flexibilia, articulata. Chelam utrin-
que unicam habet denticulatā, qua-
ternis articulis connexam. Utrinque
pedes sine forcibus. *Collum* tabel-
lis constat, & in pinnulas definit.
Sub cauda appendices sunt ovis re-
ponendis destinatæ.

PUNCTUM III.


*De Cammaro seu Astaco flu-
viatili & aliis.*

Astaci fluviatiles Galeno *καμμαελ-
des*, Athenæo *καμμαροι*, modernis
Græcis Caranides & Caranidia di-
cuntur.


Circa eor. *Descriptionem* non est
quòd multum laboremus, hoc tamen
poni potest. Ventriculorum mutim un-
dique ambire, quam quidam stercus
esse credunt, Bellonius hepar, sed
falsò, quòd hoc solis sanguineis da-
tum sit: Eundem tam miro artificio
fabrefactum, ut etiam in ejus fundo
alterum os comperias suis maxillis &
dentibus refertum. Utrinque et-
iam spiraculum seu foramen sub cor-
tice ad latera oris videas, per quod a-
quam ore acceptam referunt. Bran-
chias habere ex Aristotele Gaza &
Rondeletius prodidere. Philosophus
enim *βραγχίαι*, hoc est, partis
branchiis similes dixit.

Gesne-


Camurus. See Krebs.




Astacus Minor. Kleiner Krebs.



Astacus Maior. grosser Krebs.



Astacus Supinus.





Gefnerus cirros potius esse judicat, ad motum progressionis natationisque à natura datam, vel ne aqua *Helmont.* introrsum penetret. De *Lapidibus* memorabilia prodidit Helmontus, quæ sequuntur. Per plurimas inquit atque uniformes cancerorum discretionibus ista comperi. Inprimis stomachum cancri esse in capite propè verticem. Mares enim quotannis ægrotare incipiunt, à mensis Junii medio: fœmellæ dein in Julio ante testarum exuvium. Sunt enim per dies novem & amplius velut semiexanimæ ac immoti. Quæ tempestate stomacho illorum exterius obducitur membrana nova, inter quam & stomachum veterem, est liquor quidam lacteus, qui sensim exterius in globum stomachi convexum, quâ parte attingit, obduciturque stomachum veterem, contrahitur utroque latere in concavum, statimque lapidescit. Interim nec tunc nec multò post cancer esitat quicquam. Ideoque (penè incredibile) vetus sive interior stomachus, sensim in mucilaginem alimentariam absumitur; exteriorque ac novus alter stomachus, in vicem absumpti, succedit. Siquidem isti lacti, ad stomachi veteris convexum subnato, obtenditur statim pellicula, per modum lacti tepenti solitum: crescitque lac istud, inter utramque præfatam membranam, utriusque scilicet stomachi. Quæ cuncta ducentis fortè cancris dissectis, dietim observavi, jucunda admiratione. Tandem residua pars lactis, cancro cedit in alimentum. Nil autem cancer edit, aut in eius stomacho reperitur, quantisper isti lapides sunt in stomacho eius, vivitque circiter xxvii. dies tam ex veteri suo stomacho, sensim absumto, quam ex usu resolutorum postea lapidum. Hucusque Helmont. Albertus plenilunio crescere putat.

Locus. Reperiuntur passim in fluminibus, lacubus, & rivis. In Pannonia tam frequentes ut Julius Alexandrinus sæpe supra triginta currus Astacis onustos, in foro Gammario Viennæ numeravit. In Hispania non haberi affirmant quidam.

Vitiant cadaveribus, & carnibus, *Vitius.* & quidem his adeò delectantur, ut in Danubio de navibus suspensis, magna multitudo adhæreat. Ranas quoque appetere, Albertus testatur, & nos experientiâ comprobatum habemus. Per tredecim dies vivum absque cibo conservavit Gefnerus *Sexus* notis distinguuntur. Mares in ea parte quâ corpus ad caudam continuatur subtrus, quatuor longas prominentes virgulas habent, quibus fœminæ destituuntur. Cauda etiâ illius, rotundio, planior & spissior; tenuis, vacua, & lata huius, majorque tabellarum in eadem distantia.

De *Generatione* hoc sciendum, *Ma-* *Genera-* rem in coitu primò supra dorsum fœminæ ascendere, mox se istam supinâ vertere: per solam meatuū applicationē coire: membro n. q. alterius corpus ingreditur destituuntur: Ova per anum, per quem & excrementa reddunt, parere: & sæpe minimos Astacos caudæ matris adhuc adhærentes conspici. Albertus ova fœminæ primò in corpore valde compressa esse, dein paulatim exire & virgulis curtis sub cauda donec complectantur adhærescere, scripsit. Hyeme mensibus quinque *latent*, si cōmunem opinionē sequaris. Aliqui enim tū etiam apparere ac ad litora prodire; æstate ad optatas aquas gregatim concedere dicunt. Novilunio emaciantur, plenilunio pinguescunt.

De mirâ quædam inter Cancros *Antipathia.* & parvos *antipathia*, sic Helmontus. In Marchia Brandeburgica locupletissima est cancerorum piscatio. Vectores autem coguntur noctu excubias agere, ne ferrè porcus aliquis vel leviter subter currum transcurrat. Nam id si contigerit, manè quotquot cancri, in curru fuerint inveniuntur mortui. Tam exitialis est porcus cancro.

Dividuntur in *Minores* & *Majores*. Illi, *Differen-* quòd sub saxi degant, saxatiles dicuntur, parte supinâ albicant, pronâ nigricant, elixi non undiquaque rubescunt. *Majores*, rotundiori sunt magisque crenato in Pado cor-

pore, quàm in squama, cuius dexter pes sinistro tenuior est.

Vfus.

Locum in *Cibis* habere, omnes norunt, quamvis etiam difficilioris concoctionis esse certum sit: quia & longiore in ventriculo morâ, mandatis frigidis & humidis in caput vaporibus, soporem inducunt. Martio & Aprili mensibus à quibusdam cōmendantur, lunâ inprimis accrescente. Venæ quæ in eis interdum reperiuntur, improbantur. Varias præparationes apud Aldrovandum vide. *Medicis*, contra canis rabidi morsum, phthisin, febrem hecticam, urinæ retentionem, calculum, inflammationem linguæ & gutturis, & Cancrum in mammis inserviunt. Contra anginam sic à quibusdam præparatur. Astacos circiter decem vivos contere: & stillatitios liquores intybi rosarum & papaveris erratice affunde, inde expressus succus vinum rubellum refert. Eo linguam ablueri & diligenter ac penitus gargarizare oportet, deinde et haustui eius mediocrè bibere, Linguâ abstergam & purgatam larido insulso percinge, post horam & dimidiam, quicquid viscidæ pituitæ infederit, rursus absterge, & succo Astacorum præscripto denuò lava. Reliqua in Aldrovando vide. Præparatio contra mammarum cancerum apud Hartmannum optima. *Lapides* quod spectat, rarissimum ex iis diureticum, febrifugum, & vulnerarium parari posse existimat. Helmontius, si in formam pristini lactis resolverentur. Usurpantur quoque contra calculum, cum nucleis persicorum & mespilorum: Contra sanguinis grumos, cum carbonibus è tilia aceto restinctis, &c. Huc pertinet *Astacus Caraboides*, & *Gammarus terrestris*. Ille colore est omni parte corporis cinereo, antennis quatuor, duabus longioribus, reliquis brevioribus, pedibus & chelis hirsutis. Pedes duos priores chelis proximi tabellas in extremitate circum undique ferratas habent, ad natatum faciliorem fortè utiles. Quantum ad hunc, Crustacei quoddam genus in terra latitat, maximè in India Occidentali, Cuaras-

fas vocant, tam prope Gammarorum formam, ut cum effossum è terra conspexisset Julius Cæsar Scaliger, ac roganti quid esset, in sepulchris inveniri alii dicebant, à Gammaris abstinerit diu.

ARTICVLVS III.

De Squilla in genere.

CRUSTATA, quæ Latinis Squillæ, ^{TAB. IV.} Græci *κραιδάς*, *κραιδάς*, & *κραιδάς* ^{3.4.5.} vocant, seu *κραιδάς* ^{6. & c.} capite, quod Squillis majusculum est; seu *κραιδάς* ^{Nomen.} initiali abjecto. Heraclides ^{Aldrov. de} Colybdænas apud Athenæum vo- ^{Crustat.} cat, quo nomine Epicharmus, ut Nicander vult pudendum marinum intelligit. ^{c.8.}

Descriptionem si attendamus, ^{Descri-} *Caudam* habent, sed forcipe carent, fortè ^{ptio.} quod pluribus pedibus, in quos redundantia illa absumitur, instructi, si ^{Arist. de} Aristotelem & Rondeletium sequi- ^{c.8.} mur: At Bellonius pedes forcipatos habere scribit, quas etiam Ælianus, & quidem maximas Indicis in Gange fluvio attribuit. *Corpore* sunt vere nigrescente, sed postea albedinem recipiunt. *Cornua* etiam habent ^{Aristot.} Op- ^{H.A.I.8.} piano teste acuta, & in summo capite ^{c.ult.} posita: Ælianus aculeum acutissimum triremis rostro similem, & secturas, ferræ modo habere scribit. *Oculi* sub eodem munimento præduri eminent. *Intestinum* quoque rectè in caudam veluti Locustis & Astacis finit, qua excrementa emittunt & ova pariunt.

Vivunt in marinis palustribus & ^{Locus.} faxosis locis. Ab illis ^{Æliani,} Æliano, ab ^{Oppian.} his petreæ Oppiano dicuntur. Indi- ^{Halicut.} cum mare majores alit, quæ in profundo hærent, ut minores littoribus gaudent. In diffractis faxis in mari rubro reperiri, prodidit Theophrastus, quod de vivis an de figuris fumen- dum sit, dubitatur. Habentur & in Oceano Germanico, & Gallico, mari Tyrrheno & Adriatico. Circa Jasum magnas celebrat Archestratus.

Vivunt ostreorum carnibus: Æ- ^{Victus.} lianus quasdam alga vivere prodidit. ^{Ælian H.} De ^{A.I.1.6.30.}

Aldrov. de
Crustat.
c.6.
Hartman.
in praxi
Chymia-
trica.

Astacus flu

1

Edel Krebs

Tab. III.

Astacus fluviatilis.

2

Squilla lata.

3

Squilla lata Rondel.

4

Carangon seu *Carangon* Rondel.

6

Squilla gibba Garner.

5

8

Squilla *Vrfa* minor.

Squilla parva.

7

Squilla *mantis*.

9

hoger Krebs.

Squilla.

10

Leo Rondel.

11

Leu.


Squilla lata Bären Krebs

12

Squilla gibba.

alia.

13



Arist. H. A. l. 4. c. 2. Sexus. De *Sexu* ita Aristoteles. Distinguitur à fœmina mas duabus particulis candidis, quas ipse peculiares habet in carne pectoris, sed ab ipsa discretas tum color, tum concretionem, similes sepiarum promuscidi. Vorticose hæ sunt, quemadmodum buccini anfractus, quem Græci *μήκων*, id est, papaver vocant: Oriuntur ex ab acetabulis, quæ sub extremis sunt pedibus. Est etiam in pectore caro rubra, sanguinis colore, quæ tamen attrēctata dilabatur, neque similis carni sit. Ab ea meatu qui in pectore buccini refert speciem, alia est sinuatio funiculi crassitudine, sub qua duo, quædam sunt appensa intestino arenacea genitali semini destinata. Atque hæc mas habet. At fœmina ova ibi, colore rubra, quæ annexa ventri, atque utrinque latus intestini, ad carnosas usque partes, membranâ tenui continentur.

Generatio. Coeunt more quadrupedum retrò mingentium, scilicet, ut fœmina caudam supinam exponat, mas suas superimponat & applicet; & coeunt in eunte vere juxta terram, & cum ficus maturescunt.

Antipathia. Inimicitias cum Laborace exercent, & à Phycide ac Lupo comeduntur. Quo semodo ulciscantur, apud Ælianum habemus. Cum se, inquit, interceptas sentiunt, fastidium quod eminet à capite, quodque simile est acutissimi triremis rostro, atque in summa parte secturas habet, modo ferrulæ uncinatæ, hoc, inquam, animosæ illæ bestiolæ cum incurvarint, summa lævitate saliant, & tanquam saltatorium versant orbem. Lupus ore hians squillam lassam comprehendit, hæc in gutturis laxitate saltat, ut gula intumescat.

Vfus. Vfus earum & in *Cibis* est & in *Medicina*. In *Cibis* preciosum piscem Juvenalis nominat. Apicius tantigrandi sculas faciebat, ut earum gratia in Africam navigaret, cumque priusquam navi exiliret Minturaensis minores animadverteret, gubernatorem, nulla excensione factâ, eadem via Italiam reperere juberet. Hodie elixantur & cum aceto comeduntur:

friguntur etiam in Cartagine cum oleo farinâ adpersâ. Olim ficus folis affatæ involvebantur. Difficulus coquantur, stomacho nocent, & Veneris desiderium excitant. Hoc & sibi contigisse Cardanus testatur. Hæcicis eximie prodesse nullum dubium. Ajunt tritas & particulæ impositas, cuspidem vel sagittam, si quæ infixæ, singulari atrahendi vi educere. Quidam escæ ad mugiles capiendos admiscunt. Iisdem & lupus piscis infcatur.

ARTICULUS IV.

De Squilla in specie.

PUNCTUM I.

De Squilla lata sive Urfa.

Quam Squillam latam Rondeletius vocavit, hanc nos *Vrsam* & *IV*. quidè Aristotelis cū Bellonio & Scalig. 3. 4. 8. 12. ligero dicimus. Ubi enim porrecta ja-Nomen. cet, urfi corium extensum repræsentat. A Squilliseam separavit Aristoteles, quod sub Squillarum nomine non notet. Neapolitani Messanenenses in Sicilia Messacaram, quasi sit *ἡ περὶ τὴν νῆα*, vocant.

Rondeletius eam ita descripsit. Lo- Descri- custarum est magnitudine, sed latior, ptio. multo & magis depresso corpore & hirto, in fronte ossa duo, utrinque unicum, in ambitu ferratum, in quibusdam acutius, in aliis latius. Hic pinnæ duæ alligantur. Inter hæc duo enascuntur cornua, initio articulata, circa media bifida, ut ex duabus quatuor fiant, non valde longa. Brachia duo habet cum aculeis, veluti clavis eminentibus, pedibus majora, non bifida, quæ in os flectuntur, quibus ori cibum tanquam pedibus admovent. Pedes utrinque quaterni sunt. Oculi parū prominent. Frons quadrata, & latior quàm in ullo Crustatorum genere. Tumores multi p dorsum sparsi sunt, ex quibus extant tubercula, quorum summa pars adeò rubet, ut carbunculus in annulorum pala inclusas dicas.

In Cœnosis vivere argumento est, quòd luto obsita è mari extrahatur. *Scalig. Ex. 245.* Rarò in Gallia capitur; Romæ & Neapoli frequenter; in Africa frequentissimè. Circa Minturnas Campaniæ oppidum majores sunt Smyrnæis. Idem eis parienti tempus natura statuit q; Locustis. Per hyemem & vere prius q̃ ova excludunt laudantur, Ethæc de Vrfa, quæ Major dicitur, accipienda sunt. Est alia quam *Minorem* & *Calatam* vocant. Scaliger *Cangren* Aristotelis credit, Rondeletius *Cicadam marinam*, quòd cum Cicadis terrestribus magnam similitudinem habeat. Quinque tabellis constat, & dorso egregio naturæ artificio variè cælatis & sculptis. Tota rubet. Dodrantalem magnitudinem vix superat.

PUNCTUM II.

De Carangone & Squilla gibba.

TAB. IV. 6. QUas Aristoteles *καργώνας* aut *καράγγας*, Hesychius *καργώνας* vocat, ex Gaza sunt Crangines.

Descriptio. Est verò hæc Squilla. si Descriptionem attendas, palmi majoris longitudine. Contegitur crusta tenui, lævi, candida, nonnunquam ex albo parum rubescente, quæ cocta, tota rubescit, cornu instar pellucida. E dorso enascitur cornu in fronte serratum, sursum recurvum, cuius denticulata asperitates in superiore & inferiore sunt parte non in lateribus. Oculi sunt cornei, in quibus subjecta pars cava cochlearis modo. Cornua sunt quatuor, ex quibus duo benè longa, tenuia & flexibilia. Pedes habet quinos; quin calcar terminantur terni sunt.

Posterior pars pro reliqui corporis crassitie & magnitudine longa, septem tabellis constans, in quatuor pinnas desinit: è quarum medio extat aculeus latior quàm in Squilla gibba. Quam Gesnerus vidit, partim rubebat, partim dilutius

albicabat, ad latera flavescebat.

Sunt omnium crustatorum sapor diffusi. Carne tenera dulci, bonique & multalimenti constant. Caudæ in primis crusta spoliata, cum pipere, sale & aceto, mensibus Februario, Martio, Aprili, Majo, laudantur.

SOVILLA GIBBA *κυφίς*, propter gibbum quem habere videtur dum se curvat dicitur. Alii *καμπύλας* & *κυρτός* vocant. Græci moderni *Carangas* & *Caranidia* nuncupat. Crangonibus sunt tenuiores maximè in cauda extrema. Senos ante frontem gerunt valdè tenues cirros. Caudam contractam, in cuius extremo pinnae sunt quinæ: quarum quæ medio loco posita est, serratam duram, atque in acutum fastigiatam formam habet. In Santonum littora maxima earum copia. Ova pariunt & generant Locustarum more. Ceterum menses circiter quatuor gerunt. Cornu frontis elatum in palatum Lupi piscis infigunt, eumque interimunt. Ubi tanguntur saltant, actangentem sæpè expavescunt, corpusque in aqua gibbosum arcuato motu promovent crucarum modo. Vendebantur olim in sportulis ex junci rimine contextis, friguntur cum oleo in sarta, ine: aut elixantur in aqua & comeduntur cum aceto.

TAB. IV. 5. 13.

Descriptio.

Aristot. H. A. 1. 5. 6. 17.

Anexandr. in Pindarr.

PUNCTUM III.

De Squilla parva, & Squilla Manti Rondeletij.

SQUILLA parva nomine proprio caret. TAB. IV. 7. *Σκυλαρον* Aristotelis, non est, ut perperam Gaza convertit. Chelas enim hoc, Astaci modo habet. Quidam *Αρίστ. H. A. 1. 5. 6. 15.* *εγγλώγας* à colore fortasse, quem vivis Rondeletius obscurum tribuit, dici volunt. Alii *μελικαείδας* apud Athenæum propter suavitatem in cibo. Duplex istarum est genus. Unum *Μα- Differen- tia & de- ba*, q; vivū in aëre saltat, & noctu ut candela lucet, *Cambaretto* Romanis.

Alterum *Minimum*, ut tam exiguum,

guum, ut mille vix libram æquent pondere, Venetiis frequens. Cocis quibusdam Brava, Vasconibus, Civade, id est, avena, pugillatim enim devoratur. *Caput* habet pro Corpusculi magnitudine crassum & latum, sine cornu. *Caudam* tenuem, gibbum parvum. Oris appendicibus & aliis Gibbæ similes, punctis aliquot variatur. Bellonius vivas subfulvaspectari ait, coctas rufescere.

Locus.

Et in mari, & in fluviis nascuntur: etsi Bellonius longè à mari provenire dicat. De Garumna canistris excipi, Scaliger testis est. Tarentinus fluviatiles nominat.

Vlus.

Carne sunt adeò dulci, ut fastidium pariant. Vix ullum aliud Cibi genus, teste Rondeletio, dulcius degustaveris. In aqua hordei lotæ, & in carnis jure coctæ, hæsticis maximè conveniunt. Cum crustis adjecto pipere elixæ, venerem stimulant. Icon quam hic damus, Gesneri squillam parvam exprimit.

TAB.
IV. 9.
Aldrov.
l. 2. c. 16.

SCVILLA MANTIS, nomen à bestiola quadam ex Locustarum genere accepit, nec antiquis est dicta. Occitani eam Preguedicus, id est, precantem Deum appellant, quod semper manus junctas teneat, & corpore sit, jejunantium instar, gracili & macilentio. Divinare eandem vulgus credit, & de itinere quæsitam alterum brachium extendere.

Mathiolus *Hippocampus* appellat, Bellonius *Cicadam marinam*, quam *Speusippe Nymphæ* esse suspicatur, eandem ita descripsit.

Descriptio.

Tenuis est, inquit, huius crusta, cruda ita albicat, ut ferè transpareat. Una cum pisciculis marinis sæpe suo cortice contexta extrahitur, & simul cum carpionatis, bocis, mænis, & trachuris canistris inferitur. Natura incredibili ferè artificio. Cicadæ oblongum corpus decem *tabellis*, assabre articulatis loricavit: quarum prima, quæ caudam extremam conficit, caudam in lateribus expandit. Cauda porro duabus maculis

phœniceis subrubris insignita est, quæ duorum oculorum speciem præ se ferunt, estque aculeata & crenata. Prima tabella à cauda incipiens, versus secundam, tertiam, quartam, quintam, & sextam, pinnulis fimbriatis multiplicibus subtus munita est: quibus, dum in mari natat, aquam percutit, & corpus incitat.

Tres *tallellæ*, quæ sex prædictas subsequuntur, ternis utrinque pedibus communitæ sunt: ad cervicis autem initium, duo brachia majora oriuntur, quibus cibum apprehensum ori suggerit: sed ea cancris, alter quam locustis forcipantur. Sunt enim in longum expositæ, atque in extremo grandioribus crenis suffulta, quibus cum cibum corripit, ex uno brachio, ad aliam brachii articulationem transfert.

Horum autem extrema velut in duritiem osseam abeunt denticulati: conficiendis ob id expetita. Pars quæ capiti contigua est, in exile quiddam terminatur, & contra quam cauda se in latum diffundit. Extra aquam prorsus immobilis & imbecillis est.

Aculeum unum habet utrinque ori præfixum, ut Phalangium & Scolopendra, quo mordicus cibum à pedibus suggestum continet quem postea dentibus conficiat, & in stomachum detrudat.

Dentes illi natura in oris lateribus protulit, unico utrinque offi crenato, V. litteræ formam referente infixos. Cujus anterioris partis officium est, ea incidere quæ mandit: posterioris verò quæ crenas habet, conterere. Nam idem os, duos habet dentium ordines.

Prætenturas duas in fronte breves, ursinis similes, ostendit, trifariam in extremo diffusas: ac rursus duas alias in lateribus prædictis breviores. *Oculos* habet virides, exertos, quos non alveo ut Cancrarium & Locustarium genus condit: sed ante hos pinnulas exporrigit eis similes quas in cauda gerit: ex quo multi decepti caudam *caput* esse crediderant. Strias rectas intergore, atque in capitis tabella ductas

ductas profert. Pisce dissecto, *dentes*, fortib. musculis movere conspicientur. *Cerebrumque* adeò esse exiguum, ut vix hordei grani magnitudinem æquet: Optici tamen ad oculos perducì apparent. Rondeletius toto corpore pellucido esse addit. Eodem modo parit & coit, quo alix squillæ.

Vfus.

Carne est molli, dulci, delicata. Huic affinis est *Tamarugvacii* Brasiliensium, *Camaron de Salgado* Lusitanis dicta. Caput habet triangulare. Barbam cancerinam octuplam. Et in eo tantum à Manti differt, quod in anteriori parte corporis pedes non habeat, nec brachia interius ferrata.

TAB.
LI.

Marcgrav.
Hist. Brasil.
l. 4. c. 20.

CAPUT II.

De Crustatis rotundis.

ARTICULUS I.

De Cancris in genere.

CRUSTATA quæ Latini Cancros vocant, Græcis καρκίνοι, quasi κογχίνοι, quòd κόγχαι, id est, pupillas, & oculos mobiles habeant, dicuntur. Sicuti κάρχαες vocant, Heclychius καρχαείας. Apud Varinum πύξαρις vel πύξαρις Cancer dicitur, quod ostrea lapillo inter testes seu valvas (πύξαρις ἢ πύξια) injecto, venetur. Caudam habent revolutam, sine ἐπιπλάσμα πύχωνδες Aristoteles vocat, quæ extrabellis constat, & corpus posteriore parte integit: Caput indiscretum. Cerebro carent, etsi partem quæ cerebri fungitur munere habeant. In obliquum aspiciunt inclusis crustæ fragili oculis. Pedes qui in obliquum feruntur eis deni cum forcipibus, quorum dexter in omnibus major, & in primoribus superior pars movetur inferiore immobili.

Descriptio.

Arist. H. A.
l. 4. c. 10.
c. 3.

Plin. H. N.
l. 9. c. 13. c. 9.
l. 11. c. 48.

Arist. de
part. 4. c. 8.

Dentes interius bini primores, & inter eos caruncula linguæ effigie. *Stomachus* ori continuo junctus exiguus.

Plin. H. N.
l. 9. c. 31.

Mollibus & petrosis locis gaudent: quin & sub terra inveniuntur. Hye-

me aperica littora sectantur æstate in opacagurgitum recedunt.

Vesuntur conchiliis. Polypum ob nimiam Venerem imbecillum devorant, nec à suo genere abstinere. A- Arist. H. A. quam quam ore excipiunt, parte o- l. 4. c. 2. ris exigua emittunt, hinc apparet circ- & l. de Respirat. caos spuma, quod aqua & aër, qui cum ea hauritur, per attractum & rejectum agitentur.

Galenus dulci & falsâ aquâ vivere scribit. Lacte potatos sine aqua diutissimè, author de natura rerum. Galen. de cib. bon. & mali succi.

Generationem si spectes, Cancrì parte priore copulantur, sua opercula, loculosa illa rugosaque, mutuâ confertione cõponentes. Primum Cancer minor ab averso supervenire solet, tum major, ubi ille supervenerit. Ova edunt in operculo, hinc istud tæminis latius, & hirsutius; ita à maribus discernuntur.

Additamen Plinius, sceminæ primum pedem duplicem, mari simplicem, eundem duas inter ventrem & caudam spinas habere, quibus illa carer.

Plin. H. N.
l. 9. c. 31.

Soli è crustatorum genere non nant, sed incedunt, & quidem transversò latere quod simiis & ursis, propter posteriorum pedum latitudinem competit. Cum enim motus tractatione & pulsione fiat, & sic secundum artum flexiones, quæ Cancris introrsum ad pectus sunt; ideò quasi cum triremes circumaguntur, lateris unus remiges impellunt, altrinfecus inhihent, aut retrò trahunt, ita quam in partem processurus est cancer eius lateris utitur cruribus ad carpendum solū, alterius lateris ad aspellendum.

Motus.

Insidias incredibili sagacitate subodorantur, & confestim se vel luto ob-


Natura, & Ingeniū.

ruunt, vel inter saxa subducunt. Universi ubi aliquando congregantur, os Ponte evincere non valent: quamob-


Plin. H. N.
l. 9. c. 38.

rem regressi circumeunt, apparet que tritum iter. Concurrent inter se ut Arietes adversis cornibus. In capiendis ostreis & conchis, summa calliditate utuntur. Calculos enim & lapillos, patulæ hiantique eorum testæ ingerunt, ita ut occludi nequeat, mox dentato forcipe pisculentâ carnem abra-


Tamaru Guacui.




Cancer marinus, Krab. Tab. V.




Cancer Anonimus Rande.



Cancer Heracleoticus Rond.




Cancer 5 maiz. meer spin.



Hypocarcinus.




Cancer Heracleoticus alter.




Cancer


Glabr.




Cancer Heracleoticus. 3.



Cancer Rande.




Cancer Prabbe.




13

Pagurus fœn.



Pagurus nusc. meer spin.

12



abradentes devorant. Sole signum Cancri transeunt, Cancrorum cum exanimati sunt corpora in sicco trāsfigurari in Scorpiones Plinius author est. Ovidius, brachiis orbos, scorpis, si sub terra occultetur producere, p- didit. Latent mensib. quinis, & veris principio senectutem anguium more exuunt renovatione tergorū, & tum mollis ad modum crusta subnascitur, & vix præ teneritate ambulare possunt.

Ovid. Me-
tam. l. 15.

Plin. H. N.
l. 9. c. 30.

Ufus.

Plin. H. N.
l. 9. c. 32.

Duræ sunt carnis, ideò difficiles, concoctu, sed firmialimenti. Id apud Galenum, Athenæum, & aliis invenies. Nec in Medicina spernuntur. Plinius Sole cancri signum transeunte cōtra serpentum ictus mederi tradit. Sues percussas hoc pabulo sibi mederi Thrasyllus author est. Apri hyofciam devorato Cancros pro remedio quærunt. Cervi à phalangio vel quovis alio admorsu iisdem sibi medentur. Carbunculos & carcinoma in mulierum parte, præsentissimo remedio sanari, tradunt, Cancro fœmina cum flore salis contuso, post plenam lunam, & aquâ illitâ, ut apud Plinium legimus. Ad stranguriam, tres, in aceti cyatho cocti, in mortario contusi & expressi propinantur. Succus cum aqua florum Cyani destillata expressus, gingivis puerorum in dentitione salubriter illinitur. Pulverem Ranzovii ad dissectionem nervi apud Aldrovandum vide. Lapis in capite repertus, & aceto acerrimo immixtus, motum manifestum habere deprehenditur.

ARTICVLVS II.

De Cancris in specie, & quidem de Cancris extra conchas in salsis aquis degentibus.

PUNCTUM I.

De Cancro marino.

TAB.

IV.

TAB. V.

CAncri degunt extra conchas, vel in istis. Illi vel sunt in aquis salsis, vel in dulcibus. Inter illos qui in aquis salsis sunt. *Cancer marinus, Cancer Maja dictus, Pagurus, Cancer eques, Cancer fla-*

vus, undulatus Rondeletii, Cancer varius, Aldrov. de Cancer cordis figura & alii Chelarū lōgitu- Crust. l. 2. dine differētes. Cancro marino generis c. 17. nomen inditum est, nec in eius descri- TAB. ptione Rondeletius, Bellonius, & IV. 1. Gesnerus conveniunt. TAB. V.

Rondeletii acuminatus magis est parte anteriore prope oculos, & duo habet cornicula, quibus horū caret. Descri- Rotundo est ac circinato corpore ptio. Bellonii, anteriore, parte crenis diviso, crustaceo regmine cōvestito. Majores trium aut quatuor digitorū latitudinem non excedunt. *Hepar* habent rubrum, quod Aristoteles mutim neminare videtur. Intestina multiplicibus cirris obfessa, moventur. que horum partes solidiores albis musculis agentibus. Aldrovandus aliam observavit speciem, cujus pes ultimus qui ab utraque parte est, brevioribus & crassioribus constat internodiis, & aliis pedibus est curtior, in fine duabus, aliis articulationibus latior. Plurimi propè insulam Capibalorum, quæ hodie Domeneca dicitur, reperiuntur, & quia in faxis habitant, *παραλίας* Oppian. dixit: Et *mares & fœminæ*. Illis color rubentior, his ex livido in cyaneum tendit. Mares fœminas opprimere videntur antequam inëant. Crura in ventrem inflectunt dum incedunt. Rondeletius fœminæ partem inesse quandam croceam scribit quâ mares carent. Ovorum putat esse materiam. In Bosphoro Thracio, vento violento ingruente, contra fluctus nituntur: Circa promontoria, ubi major vis venti, singuli in sinuoso loco se tenent.

Ælian. H.

A. l. 7.

c. 24.

Ufus.

Maximè, in *Cibis*, fœminæ cum ovisturgent laudantur, ideò majus earundem Bononiæ pretium. In India succo dulci cū luna parturit turgere, plenam eodem destitui, à quibūdam proditum. In *Medicina*, phtisicis carnem prodesse Rondeletius experientia docuit, quod & apud Marcellum invenies. Stranguriam sanant si duarum drachmarum pondere ex lacte materno vel nutritis infantibus porrigantur. Ad quartanam, scabiem, & oculorū lachrymas ab Avicenna; ad Carcinomata à Plinio laudantur. Iidem pilosè mamma tollunt.

d

PUN-

PUNCTUM II.

De Cancro Maja dicto.

TAB. V.

5

TAB.

VI. 2.

Nomen.

Descri-
ptio.

Cancer Majas dictus, nomen à magnitudine sumfit. Nam *μαία* quæ amitam & nutricem significat, aliquando etiam pro grandiore natu sumebatur.

Eo à Paguro differt, quòd hic parte anteriore latus sit, Maja se posteriore in latitudinem diffundat, anteriore coarctetur, & magis orbiculata sit.

Corpus illi tam grave, ut ad incesum sit ineptissima, idque vivæ livet, aut virescit, aut rubore phæniceo aspersum est; quam si supinam contempleris, tria parte anteriore brevissima specula ab ipsius crustæ tegmine continuata cernes, inter quæ prætenturæ duæ delitescunt. *Cruva* quaternis articulis intercepta sunt, alta & exilia. *Pedes* utroque latere quaterni, quinque articulis intercepti, unguibus benè muniuntur. *Tibiæ* multa scabritie exasperantur. *Femina* operculum latiusculum habet, sub quo duo foramina membrana occlusa, in ipsis posteriorum tibiæ radicibus collocata apparent. Quatuor præterea semicirculis utitur in natando, à quorū radicibus octoni pdeunt pinnati ramuli, quibus hærent ova in foetis. *Interanea* si spectes, in capite atque adeò ore ipso duos osseos dentes gerit: in palato, carunculam quâ linguæ vice fungitur: ante dentes bina denticulata ossicula, atque in ejus ore cavitatem statim ante gulâ, in qua quod rubrum continetur, habet multiplices flexus. Vulvam esse Bellonius putat, Ex hac enim ova prodire compertum est. Subsequitur cavitas satis capax, vacua quidem ea, dum jejuna est piscis, ut vel os alterum, vel ventriculumejus esse dicas: cui etiam dentes adsunt numero quaterni, incisorii, & unus molaris, à quibus gula incipit, in cujus summo epiglottidem manifestè videas: ea autem ad apophyses meatibus committitur adeò exilibus, ut vix appareant: & quemadmodū vulva adimplebat majorem

partem recessuū, sic apophyses ubique per cavitates immittuntur, tenuibus tamen ligamentis adstrictæ, & maxime musculis. Nec est aliud intestinum manifestum, quam illud in quo definunt apophyses, excrementi scilicet receptaculum. Est autem id teres, cæteris partibus incumbens, ad caudam usque protensum. Sed & vesicam utrinque unam in ipsa alvo, robustam, magnam & membranofam cernas, cuius exitus est per ea duo foramina, quæ sub operimento latent. *Branchias* habet utrinque sub testa inter lateribus numero senas: quæ certâ membranâ ab ipso tegumento distinguuntur. Aquam enim in ore acceptam permeatus qui ad radices crurum sunt egerit. Hæc omnia ferè Paguro suo Rondeletius adscripsit, quæ vide. Ad Maxam pertinent & aliquot sequentes.

Primus Hippocarcinus à magnitudine, cum addito *hispidus*, quod universum tergus aculeis spinosisque quibusdam operculis oblitum sit, quæ ad latera majora videntur, dicitur. Supra oculos emissitios è tabulis quibusdam ad latera protensos fronte media, duo velut cornicula acuta exeunt. *Os* infimo loco situm, duo veluti brachiola intus tota villosa muniunt. Quinque ab utroque latere pedes, si brachia annumeres, in totidem articulos distincti. Chelæ anteriori parte, brachiū puerile æquant, forcipibus fuscis coloris, è quibus villosa quædam prominentia stamina instar penicilli.


Alter est parte supina Hippocarcino non dissimilis. *Cauda* est ovalis ferè figuræ, & extremo in angustam, appendicem scutiformem quinque angulorum seu pentagonam definit. Insignis in eadem scutellata cavitas apparet. *Os* multis veluti brachiolis villosis, supernè & infernè circumsepitur. In ventre plana cavitas, ovis retinendis aptissima.

In *Tertio* senæ spinæ majusculæ latera utrinque ambiunt: & binæ maximæ frontem muniunt. Duos palmos est longus, chelis, brachiis, & supina corporis parte tuberosus, & hispidus.

Quartus


TAB.
IV. 6.

Pagurus foemina.




Cancer marinus.


Tab. VI.



Pagurus prone.




Pagurus Supine.




Cancer Varius

marinus




Aranej


marini Species prone.




Araneus Supine.



Araneus crustae.




Aranej m. Spec. Supine.




Araneus alius.




Cancer brachychoelos. Pondel.




Cancer minutior.



Cancer minut.



Cancer brachychoelos.



Conger.



Quartus eiusdem est figuræ, sed pluribus spinis ab utroque latere & in dorso horret, pedibus & brachiis hirsutus, & supina parte, variis coloribus sed præsertim rubro maculatus.

TAB. IV. 4.5.6. *Quintus* quem Heracleoticum Rondeletius vocat, aculeos in fronte habet & in lateribus. Pars testæ prona aculeis aspera est, & hirta, coloreque fusco.

Sextus asperitatem in testa tomentosam habet, coloreque est cinereo & fusco.

Locus. Reperiunt in Ægæo, Jonio & Adriatico mari.

Vfus. Mares eliguntur autumnò, hyeme & Aprili mense ad Cibus, in plenilunio: fœmina verò reliquo anni tempore usque ad Septembrem. Asfantur etiam in furno ano & ore clausis, ne quod intus est liquidi effluat.

PUNCTUM III.

Dr Paguro.

TAB. V. 13.14. TAB. VI. 1.3.4. Nomen. Descriptio. **P**aguro, ὡς τὸ ἐρεῖν καὶ φυλάττειν ἐν πύργοις, id est, κερμένω δεξι πύργοις, quod in locis præruptis versetur, nomen inditum est. Simeon Sethi eum Carcini appellatione dignatur. A Palladio Cancer marinus dicitur. Scholiastes Aristophanis Caraburi exponit. Moderni Græci Paguri nomen adhuc retinent, idemque in Dalmatia, teste Massario retinetur. Latior est quam longior, & ex Oceano in pedalem longitudinem abit. Visus in Anglia decem libras pendere. Valida crustâ integitur & in lævi, eaque novem in gyrum crenis imbricis modò incisa est. Color vivorum viridiorum præ nimia rosei exhalatione veluti subnigra tergora apparent. *Cruca* utrinque blæsa quatuor habent, villis hirta, ternis articulationibus geniculata, in quibus ungues acuti oblongiq; sunt, minimè bifidi. *Brachia* bisulca parte anteriore binis articulis intercepta forcipibus crenatis munita, in extremo nigra: quibus quæ constringunt ut edant, etiam dura confringere possunt. *Branchias* utrinque in latere o-

stendunt dispositas, ut reliquum genus Locustarum, sub tergoris crusta senis ordinibus ad tibiæ radices insertas. In ore tot comperies naturæ secreta, tot adstantes appendices, tot pelliculas, ut coactus incredibile artificium necesse est fatearis. *Mutim*, TAB. V. 3.10. quæ hepar est, habet dulcissimam, maximâ ex parte subrubram, cum infinitis propè apophysis flavis grandistomacho adjacentibus. Reliquæ partes internæ musculis albis constant, quibus externæ moventur. Rondeletius sub nomine Cancræ Mæjæ descripti. *Differentias* si species, alius est Mas, alius Fœmina. Scaliger alium orbiculatiorem, fuscior, & majorem facit, alium quadratiorem & minorem, colore dilutiore, & penè pallida viriditate. Poreffos vocant Veneri.

Huc pertinet *Cancer Heracleoticus* Bellonii ab urbibus Heracleis, quarum una Ponto, altera Propontidi adjacet, dictus. *Crusta* firmiore munitur ut Maja, *Tibias* utrinque quaternas habet, *brachia* duo admodum firma, binis articulis geniculata, forcipibus robustis, bisulca, hispida, & benè armata, quorum pars superior elatis crenis vallata est. Nonnulli *Gallum marinum* vocant, quòd brachia eius in crista galli modum tornata videantur. *Dorsum* tuberculis exasperatur & coloris est miniacei.

Huic similis est alter pilorum densitate Ursi corium referens. Differt à priore primum chelis, quæ longiores sunt, & in extremo pars utroque, quæ forcipem facit, & instar dentium sibi invicem dum clauduntur contingunt, colore miniaceo: præterea pedibus brevibus, quorum duo posteriores utrinque brevissimi, antennis & oculis magis à se invicem distantibus. *Invenitur* in mari Tyrreno & Adriatico: sed in Oceano maximus, Vidit Rondeletius unum, cuius latitudo palmum majorem superabat, longitudo ad semicubitum accedebat. Alexander apud Ælium genus *Ælian.H.* quoddam Cancrorum commemorat, *A.l.17.c.1.* quorum testa circumferentia undique pedis mensuram impleveret. Miras eo-

rum magnitudines in sinu quoq; Per-
fico Strabo refert. Suetum ipsis in te-
gumento se exuere. Hoc cū luxari & à
corpore abscedere sentiūt, furiis quasi
agitati huc & illuc ferūtur, & plenio-
rem victū quærunt, ut tumore inflatis
facilius crusta rumpatur. Elapsi simi-
les mortuis in sabulo jacent, sibi resti-
tuti sabulum gustant, & postquam se
abdidere, nō citius ex latebris, egre-
diuntur, quā pristina armatura instru-
cti. Musicæ sunt adeò amantes, ut eā-
dē capiuntur. Captos aliquando fo-
ramina subire, & mortuos in Scorpis

Ælian. H.
A. l. 9.
c. 45.

Nicand. in
Therica.
Vfus.

mutari Nicander prodidit.

Inter lautissimos numerantur ci-
bos, sed difficillimè digeruntur. Cum
coquuntur parum rufescunt & parum
nigrescunt.

PUNCTUM IV.

De Cancro Equite.

Nomen.
Aristot.
H. A. l. 4.
c. 2.
Plin. H. N.
l. 6. c. 3.
Aldrov. l. 2.
c. 20.
Descri-
ptio.

Cancer Eques à velocitate cursus
nomē accepit. Hefychio est δρόμων,
Æliano δρομία Cursor, aliis Græcis
ἵππευς Eques. Major est Castaneâ par-
vâ, colore subalbido, pūctis subrubris
consperso, & ut Pagurus, tornato. So-
li objectus totus pellucidus est, præ-
terquam in ea corporis parte, quæ in-
teranea continet. Oculos grano pha-
seolinō habet maiores, quibus acutis-
simè cernit. Tibiæ sunt villis levibus
obsessæ, utrinq; quinæ: quarū duæ an-
teriores brachia sunt forcipata, quib⁹
cuncta cōplectitur: reliquæ graciles
vnguibus rectis & obliquis variatę. Hu-
ius generis fortè erit, qui Rondeletio
Cancer latipes dicitur, nucis juglandis
magnitudine aliquādo paulò maiore.
Chelas habet denticulatas & articula-
tas, pedes utrinq; quatuor. Postremus
& minimus, q̄ in ossiam latitudinem
desinat, nomen Cancro imposuit. *Te-
sta* est levi, parte superiore albescente,
quodammodo nigricante. Cum ma-
ris purgamentis in littus eiicitur. Huic
similis est quem Bellonius Græcis
μικρόν καρκίνον, Romæ Grancettum vo-
cari scribit. Punctis frequentibus cā-
didis in tergo variatur Ophitæ mo-
do. Singulares digiti quaternis con-
stant articulationib⁹. Amphibii sunt,
& in maximis ardoribus meridiano

tempore è mari egrediuntur, diemq;
sub sole, trāsigunt, circa vespērā mare
reperunt. Tanta velocitate ferri vidit
Bellonius, ut ne unum quidē unquam
cursu consequi potuerit: quin nec la-
certam ex ambrosia sub qua delite-
scebat exilentem, assequi eundē po-
tuisse. Volare potius quàm currere
videbatur.

Dromonem Hefychiū quidam in Locus.
maris æstuariis capi scribunt, sagittæ-
que modo per aquas summum decur-
rere. Facit Ælianus quorundā men- Ælian. H.
A. l. 7.
c. 30.
tionē, quos πεπληίας à volando (Gillius
legit πηληίας) vocat, quod per parvis a-
lis volatum exerceant, quibus currē-
tes non utuntur. Potest ipsis ποδανέμων
titulus, qui ex Cratete Comico ab
Athenæo datur, tribui. Negliguntur
in cibis propter exilitatem.


PUNCTUM V.

De Cancro flavo undulato Rondeletii, Marmorato, Cor- dis figurâ, & aliis Chela- rum longitudine diffe- rentibus.

Cancer flavus undulatus, à colore & TAB.
VI. 6.
lineis, quæ in prona parte sunt si-
nuosæ undarum modo, non aliter Aldrov. l. 2.
c. 21.
quàm Cameloto vulgò nuncupato, c. 21.
nomen fortitus est. Pedes quaternos
habet longos & hirsutos: Chelas duâs
magnas, etiam hirtas: Cornua duo sa-
tis longa: in fronte appendices duas,
in lateribus alias. Capitur circa Anti-
polium & Lerinum insulam.


Cancer Marmoratus sive varius, quod TAB.
VI. 5.
testa sit lævi, ac perpolita, & maculis Aldrov. l. 2.
c. 22.
viridibus cæruleis, albis, nigris, cinc-
reis, Jaspidis instar & marmoris per-
spersus sit. Si mortuus in sole exsicce-
tur, totus fit flavus, maculæ verò in
mortuo statim evanescunt. Forfices
habet aliis breviores & crassiores.
Tubercula veluti gemmæ in eis e-
minent, ut in Astaco. Cornicula duo
è frōte extant. Post oculos, qui satis à
se distant, testa est serrata. In saxorū
cavernulis degunt, & ita pedibus hæ-
rent, ut vix avelli possint. Crusta sunt
cæteris

Cancer Mollucensis pronus.




Cancer Mollucensis supinus.


Cancer parvus.



Coridis figura Cancer.



Cancer parvus. alius.




Cancellus

rudus.


Cancellus

in testa.


Cancellus ruber.




Cancellus aldrou.




Cancellus in Buccino.




Sigillatus siue cancell. in Nerite concha.



Cancellus oblongus.






Canceri Hirsuti Rondel speier.



Cancellus

avena.



cæteris duriore. In faxis Agathensis littoris degunt.

TAB. VII. 4. *Cancer cordis figurâ*, Cornua duo è fronte prominentia habet, brachia quoque duo brevi forfice, & quater-nos pedes. Pelagius est, & panagro ex alto mari cum piscibus in littus pertrahitur. In maiorum Afellorû ventriculis sæpissimè reperitur.

Aldrov. l. 2. c. 23. *Canceri chelarum longitudine differentes*, vel sunt Μακρόχηλοι, vel βραχύχηλοι. Chelis vel tenuib. vel crassis. Μακρόχηλοι chelis tenuibus, sub Aranearum marinarum nomine apud Aldrovandum veniunt, & sub tribus generibus exhibentur.

TAB. VI. 7. 8. 9. 10. 11. *Primum* est fusco & cinereo colore, parte priore quàm caput est, acutum, oculis parum à se invicè distantibus, cornibus duobus acutis.

Alterum corpore est rotundiore, quod sub Aranei crustacei nomine venit.

Tertium magis rotundius, colore cinereo & fusco, chelis quàm priores crassioribus, cui Aranei marini crustacei alterius in Tabula nomen inditum.

Differt ab his *Aranea marina*, cuius Aristoteles in Cancelli descriptione meminit. Formâ enim similis araneis est, nisi quòd partem capiti & pectori subiectum araneo maiorem habeat. Brachia forcipata habere pro corporis exilirate longissima Rondeletius addit. Μακρόχηλοι crassis brachiis, sunt hirsuti & asperi, ut aculeati videantur. *Unus* est prona parte corpore & pedibus albus, unde albicantis nomen. Chelis cæruleis, supina verò ruber. *Alter* priore minor colore nigricante, unde nigricantis appellatio.

TAB. VI. 12. 13. 14. 15. Βραχύχηλων aliquot sunt species. Ex quibus Rondeletii ex rubro nigricat, Chelis valdè brevibus ac tenuibus, pedib⁹ proximis longissimis pro corporis ratione, crassis, acutissimis, lanugine quâdam obducta. Frequens est in Lorino insula.

Reliqui sunt tenues & læves, supina pars aculeos habet. Ex his unus ore est acuto admodum, & oculis à latere utrinque prominentibus, corpore undiq, aspero. *Minutior* dicitur.

Conger brachichelo Aldrovandilagenam crasso ventre refert, caudam si demas. Capite est valdè acuto, corpus parte supinâ aculeis horret, coloreque est cæruleo, pronè albicat, forcipes Chelarum rubent.

ARTICVLVS III.

De Cancris fluviatilibus.

TAB. III. *C*ancer fluviatilis seu fluvialis, καρκίνος ποταμίου. Græcis dicitur. Simeon Sethus & Galenus, Pagurum fluviatilem vocavere. Eo à marino differt, quod sit testâ duriorè & crassiorè; tibiis asperioribus, brachiis rugosioribus, & cum marinus lividum loti corticis colorem referat, fluviatilis ex ruffo nigrescit. Marino, præterea, ungues extremam tibiæ articulationè faciunt: fluviatiles multas crenas in gyrum circa ungues habent.

Frustra eos in Gallia, & Germania quæras. In Græcia, Creta, Sicilia, & Etruria inveniuntur. Bellonius in Atho Macedoniæ monte vidit, & in Ciliçiæ rivulis, qui non longè ab Iffo defluunt. Tanta aliquando eorû ibi copia, ut temporis momento mille capi possint. In Nilo habitare apud Æli- num habemus. *Locus.*

Sunt Sarcophagi, & cum invicem tågunt, pedes sibi arrodunt & vorant. Rondeletius cū ducentos Romæ emisisset, denique in aquam ut sese reficerent coniecisset, ita inter sese confictati sunt, ut plures quinquaginta mutilatos reperiret. Eo tandè eventum est, ut omnibus necatis, unus tantum superstes fuerit. Ibidè ligonibus effossa scrobe vel paropside capiuntur. Juxta Ephesiam metropolim serpentes, qui ex caverna quodâ egressi paludè tranare conantur, forcipibus arreptos interficiunt. Romæ in foro piscario, filo appensi ac trajecti, prostant. *Ælian. H. A. l. 16. c. 38.*

Eduntur omni tempore, sed æstate sunt meliores, & posteaquam durû corticem exuerunt, magnatum mensis apponuntur. Lacte à quibusdam suffocantur. Avicenna in hecticis febribus cū aqua hordei valde probat.

In *Medicina* easdē ferē habent vires quas & alii. Tritos potosque ex aqua recentes seu cinere asservato, contra omnia venena prodesse, privatim cōtra Scorpionū ictus, cum lacte asinino, vel si non sit, caprino, vel quocunque, Plinius author est; quod & apud

Plin. H. N.
l. 32. c. 5.

Dioscoridnm invenies. Ad viperæ morsum bibuntur è vino per se, vel cum staphide agria, sale & polio, ut testatur Ægineta. Cinis ustorū prodest pavore potus periclitantibus ex canis rabiosi moribus Æschrion empiricus vivos in patella æris rubri tam diu urebat, donec facilē in lævorem redigi possent, lunâ decimâ octavâ, post canis syderis exortum, cum sol leonem ingressus esset. Huius pulverem tenuissimum cochlearii unius mensurâ ex aquę cyatho propinabat, cum recentior esset morsus; augebatur quantitas, si inveteraverat. Huic remedio tantam vim inesse scribit Galenus, ut dicat nullos periisse, quibus hoc in tempore datum esset. Id ex proprietate substantiæ fieri idem credidit. Triti in oleo & aqua peruncti, ante accessiones in febribus profunt, teste Plinio. Archigenes apud

Plin. H. N.
l. 32. c. 10.

Galenum ex cancris siccis tritis, pedib⁹ & eminentiis amputatis, drachma unâ, & asari drachmâ alterâ, cum aqua ex eodem flumine ex quō cancri sumtâ, medicamentum aquas educens componit. Hippocrates in vino suffocatos in flexu uteri propinavit.

Hippocr. de
morb. mulier. l. 1.

ARTICULUS IV.

De Cancris in conchis degentibus.

PUNCTUM I.

De Cancris parvis.

TAB.
VII.
35.

PRæter ea quæ hætenus retulimus crustata, sunt & alia, quæ in alienis conchis, ut Mitulis, pinnis, pectinibus, ostreis, ac varii generis turbinatis degunt, ut Cancelli, Cancri parvi, Squili, & Scylari, figurâ non usque adeo à prædictis diversâ.

Cancer parvus, qui pinnis innascitur Descri-

pinνοφύλαξ, quasi ὁ τῆς πίννης φύλαξ, ut Sui-

das, Hefychius, & Varinus tradunt, πιννοτήρης Chrysippo, ut Athenæus citat, ὅπου τῇ τηρεῖν ἢ φυλάσσειν τὴν πίννιν, dicitur. Sunt autem qui in ostreis reperiuntur, parvæ fabæ magnitudine, toto corpore candidi, præterquam, quod pronæ crustæ medium rubeat. In pinnis qui degunt, majores sunt & magis rubri, alioqui chelis, pedibus, toto denique corpore aliis similes. A Cancellis eo differunt, quod parvi cancri viventium pinna-rum & ostreorum hospites sint: Cancelli inanes duntaxat testas & turbinatas subeant, sintque longo corpore Locustis non Cancris simili.

De *Generatione* non conveniunt Genera-

authores. Piscatores cum illis quorum testis inhabitant, quasi ex eodem semine nasci tradunt, teste Aristotele. Apud eundem ista invenies verba. Arist. H. A. l. 5. c. 15.


Pinnæ quæ petris aut saxorum cavernis adhæserint, radices agunt, illic Margaritam generant. Vivunt autem & nutriuntur per partem carnî hærentem. Huius autem conchæ ori adnascitur animalculum chelas habens, & cibum assumens, quod cancro parvo simile est, & vocatur Pinnophylax. Rondeletius cum sæpissimè Cancros parvos in Conchis & Ostreis ovis turgentes viderit, ex Coitu maris & sceminæ & ovis provenire affirmare audeat. Ut ut sit, nō possunt isti in aliis procreari, ut nec vel viscū vel polypodium, nisi super aliis arboribus crescere.

Quæ de eorū prudentia apud Plutarchum, Oppianum, & alios invenies, quod nempe pinnā regat, & de appropinquante præda admoneat, fabulosa sunt. Decem Pinnas aperies antequam unum pinnophylacem invenias. Plutarch. de solertia animal. Oppian. l. 2. Halient.

Aqua tantum & luto eadem patiuntur, ut Mytuli. Latere in eis erede ut vitam servant vitam, Molliore testa præditi, injuriis magis sunt obnoxii. Ideo & spongiarum cavernulis saxorum rimis, & in externis testarum quibus Ostrea testa sunt cavis, sæpissimè Cancros parvos se reperisse, Rondeletius affirmat.


Pun-

Amphibæna marina.




Tab. VIII.


Cancer Heracleoticus hirsus prone,




Cancer prorus.




Cancer Heracleotus hirsutus supine,



Cancer Supine




Crabon




Tortudo


marina.



Tortudo marina.



Stella marina maior.



Stella marina tridocima radis.



Stella marina minor.



PUNCTUM II.

De Cancellis.

TAB.
VII.
Nomen.

Qui Latinis Cancellus, Græcis est *καρκίνιον*, Oppiano *καρκινῆς*. Plinius eum & Cancrum parvum sub Pinnotheris seu Pinophylacis nomine cōfudisse videtur, ut Aldrovandus ostendit. Gallis Eremita, Bernard l'Eremita dicitur. Eremitam, quod alios fugiens in testa quasi in solitudine vivat. Bernardum autem, quod vulgo in Gallia Bernhardus fatuos proverbio dictitent: hunc autem fatuam, quod crusta testis, chelas habens, quæ ad vitam tuendam satis esse possent, alienas domos in quibus latitet, quærat. Exactissimè ab Aristotele describitur.

Aldrov. l. 2.
c. 26.Descrip-
tio.Arist. H. A.
l. 4. c. 4.

Communis ferè est, ait Philosophus Crustatorum & Testatorum socius, quippe qui specie locustis simili spectatur, nascique seorsum per se solitus est. Verum quod testam deinde petit, quam ingressus est, hinc similis testa cōtectis animantibus est: quapropter is in accipiti esse, genusq; sibi vindicare utrumq; videtur. Formâ tamen, (quod simplicius dixerim) similis Araneis est, nisi quod partem capiti, & pectori subditam ampliore quam Aranei habent. *Cornicula* duo ruffa tenuia gerit, quibus *oculi* totidem subiacent, qui nunquam intrò recedant, ut Cancrorum, sed semper eminentes appareant. *Os* sub iis est, quod veluti capillamentis pluribus circumdatur. Iis pedes subijuncti duo, bifurces, quibus cibû ori admovent. Bini item utrique adhærent lateri, & tertius parvus. *Thoracis* pars inferior mollis tota est, disiectoque sine pallidum intus cernitur. Meatus ab ore ad ventrem pergit. Foramen excrementi perspicere nullum potest. Pedes ac thorax duritiem præ se ferunt, sed minus quam Cancri. Nexu nullo testis adhæret. Buccinarum ac Purpurarû modo solutus liberque vagatur. Omnes sinistram pedem crassiores dextro habent. Cum enim in testa circa medium corporis complicati vivant, quantum dextræ parti cōpressæ alimenti ac proinde incremen-

ti decedit, tantum sinistræ liberiori ac laxiori accrescit. Bellonius addit, *Oculos* instar Astaci elatos habere, quos porrigit ac contrahit, maculis albis distinctos. *Dentes* osseos. Ab ore *æso-phagus* tenuis ut filum ad stomachû protenditur. *Intestina* bis tantum revolvuntur: ac qui in eius stomacho viridis humor spectubatur, is in intestinis apparet candidus.

Tres ipsorum *species* Aristoteles facit. *Oblongior est*, qui Turbinem scilicet ingreditur, quàm qui Neritim. Qui in Natice degit, dextrum bifurculatum pedem parvum habet, cum lævum grandiusculum habeat, eoque potissimum ingrediatur. Ad tertiam spectare videtur, de quibus idem ita. Sunt inter Cochleas, quæ inter se bestiolas habent Astacis parvis similes, quæ in fluminibus gignuntur. Sed eâ differentia, ut præmollem intra suam testam carunculam habeant, formâ qualesnâ sint ex dissectionibus contemplare. Noshic ternas Icones damus.

Scaligero Squilla minima, Vasconibus Civada, Pugillatim enim devoratur. Reperiuntur in pisciculis, pedes novissimos latiusculos habent, ut ad nandû utiles sint. In saxosis locis, cœno, & luto versantur. Ex eodem gigni credidit Aristoteles, sed perperam. Ad latera enim adhærent tantumquam racemi aut globuli ova filo annexa. Et observatum est mares à fœminis apertè distingui. Nati conchulas ingrediuntur; ubi excrevere in ampliores transeunt.

Vsum & in Cibis habent. Dorian enim apud Athenæum, inter hepsetos refert. Gesnerus, Coctum odorem colorem & saporem fluviatilis habuisse scribit. Bellonius non esse edulem, sed Julidibus, channis, Percis, & id genus saxatilibus gratissimum ait. Gasterius eorum usu Mullos deteriores, & mali odoris evadere testatur: sed forte hoc de Cancellis, qui in spongiis, & qui *καρκίνιοι* à fœtido colore dicuntur, sumendum est.

Et tantum de Crustaceis.

MS
9

APPE N-



APPENDIX.

*De quibusdam Crustaceis
Brasilienfibus Cancris
inprimis.*

CAPUT I.

*De Guaja Apara, cancro
maximo.*

TAB.
IX.



VAIA APARA, cancer maximus elegantissime variegatus. *Corporis* figura est Lunæ bissectæ similis, in latitudine habens tres digitos, in longitudine duos & semis (quanquam & majores reperiantur) *Testa*, ut dixi, lunata est, in utroque latere posterius exsecta, & in acumina desinens. Anterior pars testæ ultra medietatem coloris est obscure brunni, & variegata maculis ex albo flavescens; posterior pars ex albo flavescit, striis brunnis secundum longitudinem ornata.

Pedes habet octo; singulos quatuor internodiis constantes, subrotundos, ex albo flavescens: brachia duo, quodlibet duos & semis digitos longum, & sesquidigitum latum, quodlibet parva forcipe præditum, quibus non ita arctè comprehendere potest, ut alii cancri. Est autem quodlibet brachium superius armatum & dentatum instar cristæ galli, ita ut quando vivus brachia corpori applicatis ea componit, uti aptissime potest, cristas duas galli sibi invicem appositas esse appareat. Tenacula representat rostrum galli, brachium itaque totum rostrum galli cum sua crista. Brachia autem etiam ex albo flavescunt, & maculis brunnis sunt variegata. In aquis natans per os





aquam exsufflat, quasi ex fonte exsiliet.

GVAIA alia species. *Corpus* rotundum, paulo oblongum, juglandem cum suo viridi cortice æquat, octo habet *pedes* cancrinos: duo *brachia*, quodlibet ferè duos & semis digitos longum, at exilia; in parte extrema corporis tres habet aculeos obtusos, & oculos planè exiles. *Color* totius corporis, brachiorum & pedum est albus; ac tota testa dorso egregiis maculis brunnis ordinatim distincta, in summitate majoribus, at in lateribus, minoribus: *Brachia* parvulis maculis ex ruffo purpureis sunt variegata: pedes albicant in totum, ut & venter.

GVAIA alia species quæ rarius capitur. *Corpus* ellyptica figuræ, latum, tres digitos & totidem longum, aut paulo minus; testa recta est ellyptica, in ambitu multis corniculis prædita, superius autem convallibus: *ocelli* parvuli, ut aliis: in quolibet latere pedes quatuor cum quatuor juncturis, *Crura* subhirsuta, & in extremitate unguem nigrum corniculi figura habentia. Anterius autem crus tres digitos longum, reliqua semper breviora unum altero. Brachiorum cum forcipibus, cujuslibet longitudo trium digitorum, crassities humani digiti, forcipe sesquidigitum longa & satis crassa. Ipsæ extremitates forcipis paulo plus sesquidigitum longæ, rostratæ & exterius versus dentatæ, quasi denticulis humanis, & ita aptè sibi invicem quadrantes complicatæ, quasi quis rostrum dentatum clauderet, in una tenacula forcipis, quæ movetur seorsim, in medio etiam est dens albicans. *Color* totius cancri vivi saturate rubens, ut pruna nostraria majora esse solent, in medio corpore saturatior, reliquis partibus dilutior: extremitas tencularum ruffa cum brunno mixta, ut cerasa nigra tingere solent. Coctus retinet colorem.






CA.




Cicie Panema.




Carara Vna.





Aratu et Aratupinima





Maracoani.



Potiquiquixze.



Parnacare.



CAPVT II.

De Guaia Miri, Carara Vna, Cunuru, & Ciecie Ete.

GUAIA MIRI, cancerculus in salis fluviiis degens, nunquam excedit pruni magnitudinem; *testa* est ellyptica, anteriore parte in multos angulos desinente: *Ocelli* parvi, breves: *brachia* duo, dextrum paulo minus sinistro: *crura* octo, quatuor internodiis constantia, & brevibus pilis hirta: color testæ ferrugineus: brachiorum & crurum obscurè violaceo-purpureus. Pili crurum pallidi, inferius forcipum latus albi-
cat.

CARARA VNA Cancer parvus, cuius corpus quadratum refert, cuius singuli anguli transversim abscissi, cæterum compressum, magnitudine semi digiti. *Oculi* prominuli, haud longi, nigri, in angulis abscissis consistentes. *Brachia* brevia, forcipibus obrotundis crassiusculis: *crura* octo haud crassa, sed compressa. *Testa* cum cruribus epatici coloris, seu instar hepatis tincti: *brachia* itidem: forcipes brunni coloris, qualis succus cerasorum nigrorum: *Crura* minutulis pilis hic inde vestita, eiusdem cum cruribus coloris.

CUNURU, fœmella est *Vca una*, figura & colore conveniens, solum magnitudine corporis & brachiorum differt, minor enim est, quam mas, & brachia habet parva, brachio maris sinistro vix æqualia, sinistrumque paulo grandius dextro; raros quoque habet pilos, cum *Vca una* tota sit hirsuta.

CIECIE ETE Brasiliensibus: *Crangversinho des Manges* Lusitanis: *corpus* ad quadratam figuram accedit, & totum vix superat maioris avellanæ magnitudinem: *Oculi* prominentes longiusculi quos recon-

dere potest. *Crura* octo: brachium sinistrum ipsi maximum, non tamen crassum, forcipis tenacula tenuia & longa, æqualia, sine dentibus: dextrum brachium tenuissimum. *Testa* coloris hepatici: reliquum totum corpus cum cruribus obscurè flavum expallido.

Edulis est; & Brasiliani illo curant morbum, quem vocant *Mia*.

CAPVT III.

De Ciri Apoa, Vca Una, Guanhumu, & Aratu Pinima.

CIRI APOA Brasiliensibus. Cancer marinus, *testa* quasi ellyptica rectus, quæ in medietatis anterioris ora dentata, & in quolibet latere in acutum desinit angulum, mediocris magnitudinis. *Brachia* habet duo mediocria, itidem dentata: sex *crura* & septimi & octavi loco posterius duos remiges planos, quatuor internodiis, circum circa pilosos, quibus utitur natans. *Oculi* longè à se invicem distantes, parvuli, cylindracei, crassiusculi, non tamen longi & ad quemlibet cirrhulus eminet instar pili. Totius testæ color fuscus, seu nigricans, in qua diverso fusco cordis figura, aliæque depictæ. *Brachia* fusca, forcipes ex cærulescente al-
bent. *Crura* ad medietatem internam viridi & albo mixta: medietates exteriores cæruleæ: remigum extrema pars, quæ lata est, cærulea, reliqua viridis & albo mixta. *Corpus* interius etiam cærulescit. Boni sunt saporis. *Ciri* ordinariè in fundo aquæ salæ ambulant, interdum tamen ad littora prodeunt cum decremento maris, sed rarius. Capiuntur maris refluxu.

VCA VNA Cancer in palustribus degens, *corpus* eius ellypticum, superius convexum, juglandis cum suo cortice magnitudinem æquans
e vel

vel etiam superans. *Crura* habet octo, quatuor juncturis: anteriora longiora, posteriora breviora: *Oculos* haud longè distantes, cylindraceos, haud longos, quos erigit & recondit, coloris pallidè flavescientis, pupilla hyalina. *Brachium* dextrum ipsi maximum, interius multis tuberculis acuminatis præditum, ut & forceps: sinistrum parvum. Color *testæ* superius olivaceus, flavo in extremitate intermixto. *Corpus* interius pallidè flavescit. Omnia crura & brachia castanei sunt coloris, forcipes etiam superius, cætera pallidè flavescencia una cum tenaculis. Crura omnia inferius vestita sunt copiosis pilis longiusculis obscurè castanei coloris. Carne sunt bona.

GVANHVI, Cancer terrestris: corpus illi rotundum, sed paulum compressum, magnitudine Auriaci mali.

Pedes habet octo, quinque digitos longos, quatuor internodiis: *crura* longis pilis vestita: os magnum & ad latera oris utrimque latitudine unius digiti hirsutum, ut & corpus: *Brachia* duo, dextrum magnum, sinistrum parvum, magnum longum octo digitos, latum plus duobus: parvum vix quartam partem illius æquat.

Oculi bini, quos instar parvæ pilæ erigit, & iterum in longa cavitate abscondit: circa os quasi duo brachiola quæ recondere potest, & iterum depromere, & usque ad oculos deducere.

Celerrimè currit, & quidem transversim, ita ut oculos ad latus convertat & brachium maius elevatum gestet. Maximo numero in silvis paludosis oberrant. Carnem habet bonam.

ARATV & ARATV PINIMA. Cancer terrestris, quadratæ figuræ, corpore haud magno, *testa* multiplici colore picta, brunno, cæruleo, albo, rubro punctatim variè intermixtis.

Oculi prominentes longè distantes, nigri, in angulis rostri positi.

Crura octo, quatuor internodiis, compressa, ruffa, ac per totum maculis purpureis, nigris ac albis distincta. *Chela* duæ non ita magnæ, æquales, ruffæ, in extremitate ex albo flavescences. In ventre etiam flavescit. Crura raris pilis nigris vestiuntur.

CAPUT IV.

De Maracoani, Potiqui- quiya, & Tamaru Guacu.

MARACOANI, cancer parvus, in locis ambulans, quæ refluxu maris sicca evadunt, alio enim tempore è latibulo suo non prodit: corpore est ferè quadrato, digitum longo & lato, anterius tamen paulò latiori: *Oculi* prope sibi invicem appositi, longi plus semidigito, tenues instar aciculæ crassioris, quos erigere & aptè in rima recondere potest.

Os habet amplum & maius quam cæteri cancri: *crura* octo, quatuor internodiis. *Brachium* dextrum illi maximum, tres digitos longitudine superans, satis crassum, & se totum post illud potest abscondere: forceps autem brachii latior, haud crassus, referens forcipem sartorum, extuberantiis haud acutis loco dentium præditus; superficies brachii etiam parva tubercula habet: *brachium* sinistrum minimum, minus uno è pedibus, forcipula minima instar scorpionis.

Crura raros habent pilos fuscos. Coloris est in testa fulvi, ut & in pedibus & minore forcipe, atque in inferiori corpore: extremitate pedum magis rufescunt. *Brachium* dextrum è fulvo obscurè rufescit. Est edulis.

POTIQUIQVIYA Brasiliensibus. Locusta marina, Belgis *Zeekreeft*. Longitudo corporis à fronte ad extremum

ortum caudæ septem digitorum, caudæ sex: latitudo testæ dorsi septem, ventris duorum & semis: totius corporis ambitus novem digitorum & semis; caudæ ambitus quinque, quæ constat sex tabellis, septem juncturis sibi invicem appositis: & habet cauda ad quodlibet latus inferius quatuor pinnas, sesquidigitum longas, unam latas: extremitates laterales cuiusque tabellæ desinunt in cornu acutum: in quolibet latere quinque habet crura, quinque internodiis distantia; primum par crurum sex digitos longum, alterum novem, tertium pedem, quartum septem digitos, quintum quinque: Quodlibet autem unguem habet incurvum, acutum, pilis multis flavescens hirtum, instar penicilli pictorum: crus anteriùs crassitie digitum æquat, reliqua graciliora.

Testa corporis variè tuberculata, frequentibus eminentiis instar corniculorum rectorum, acutorum, anteriùs scatet.

Oculi prominentes cylindracei, & post eos duo cornua surrecta antrosum inclinata, digitum longa; ante oculos supra os quatuor cirrhi exortum sumunt, primo duo magni pollicis humani crassitie in exortu, ubi quatuor internodiis constat, longi sesquipèdem & undique spinosi, inter hos duo minores, quatuor internodiis, teretes sine spinis, ac ultra medietatem bisecti, decem in totum digitos singuli longi.

TAMARU GVACU, Brasiliensibus: *Cameron de Salgado* Lusitanis. Locustæ marinæ species, novem digitos longa, vel paulo plus. Capitis longitudo duorum digitorum; versus caput magis magisque angustatur.

Corpus autem habet undecim quasi juncturas, quemadmodum cauda in Gamaris: in postica parte corporis ad quodlibet latus duos habet processus subhirsutos.

Totum corpus testum est crassa cancrina, albicante, splendente in-

star cornu polito, ad juncturas autem subnigricat aut purpurascit; pedes in quolibet latere tres, nimirum ad tertiam, quartam & quintam juncturam à collo numerando; exilia, duos circiter digitos longa.

Caput triangulare, olivæ magnitudine sub testa albicante splendida latet, duos digitos longa. Pone caput ad quodlibet latus habet brachium unum, septem digitos longum, quatuor juncturis constans, estque extrema pars brachii ab ultima junctura incurvata instar falcis maioris, & novem dentibus acutissimis prædita: his brachiis ferit, & qui vulnerati sunt, ægrè sanantur.

Oculos habet prominentes, oblongos: barbam cancerinam octuplam: prope oculos duas prominentias retrorsum versas, digitum longas, læves, at in extremitatibus hirsutas: infra caput adhuc octo prominentias, duos digitos longas, quæ in extremo tubercula gerunt. Versus posticam corporis partem inferius multas latas quasi pinnas habet, quæ natationi haud dubio inferviunt, & quasi folia complicata ventri inferius adjacent. Non comeditur.

CAPUT V.

De Paranacare & Guari curu.

PARANACARE: *Gammarus* in concha degens, haud edulis, tres digitos longus: brachia habet duocum forcipibus, crura quatuor longissima, nimirum tres digitos longa, & posthæc quatuor planè breviora; caudam sesquidigitum longam instar aliorum Gammarorum; oculos longos & prominulos: duos cirrhos pro barba.

Corpus tegitur testa obscure castanei coloris; eiusdem coloris est

& cauda, nigris striis secundum longitudinem variegata, corpus inferius & exortus crurum & brachiorum interius cærulescunt, uti & oculi & barba; per totum corpus habet pilos ochræ coloris.

Concha quam inhabitat fermè quatuor digitos longa, turbinata coloris pallidè subflavescentis.

Varia autem magnitudinis reperiuntur, planè parvulæ, magnitudine minoris pruni, turbinatæ & variis tuberculis acuminatis præditæ, pallidæ, rufescentes, nigrae, ad littus prope fluvium Paraiba.

GVARICVRV Brasiliensibus, *Gammarius* vulgo *Camaraon*; quatuor digitos longus: crura habet sex, tribus internodiis constantia, cum unguiculo in extremitate: antè par crurum quasi furas habet, crassius reliquis & vicem brachiorum fungens; paulo plus duobus digitis longum, ultimum paulo plus uno, omnia aculeata seu spinosa.

Cirrhos prope os prodeuntes habet sex; duos longissimos, nimirum tres digitos singulos, versus posteriora reflexos; duos unum digitum, & duos semidigitum: sub ore parva tenacula quatuor crassiuscula, & quatuor tenuiora, quibus cibum tenet. Oculi similes

reliquis. Color totius fuscus. Cocti eduntur.



HISTORIÆ NATURALIS

De Exanguibus Aquaticis.

LIBER III.

De Testaceis.

TITVLVS I.

De Testaceis in genere.



Estacea quæ vulgò dicuntur, ea alii Testata, *Horat. l. 2. sary.* *tius testas, Cicero, belluas* *Nomen.* *nativis testis adhærentes,* *Palladius clausa maris animalia, Albertus testudines, plurimi Conchas, & Conchilia dixere. Græci ὀστρεῖα Arist. H. A. l. 1. c. 6.* *δεξμα, ac si dicas testaceæ cutis animalia, ὄστρεα, quod apud Philosophum invenies, ὄστρεα, ut Athenæus testatur, ὀστρεὴ καὶ ὀστρεὶ ὀδὴ καὶ κογχιδῆ, q. Strabo scribit, σκληρὸν δέμα, λιγύρινα, quod Empedocli tribuitur, ὀστρεὲ ὀρενα, ὄστρεα, ὀστρεὲ δὲ ἰζμὸς ἰχθύας, seu testaceos pisces, quod apud Suidam, ut illud apud Opi- *lianum legimus, λιγύρας Hefychius & Varinus, κυματοφορέιδας idem, appellavere.**

Partes corporis si spectemus, *Omni-* *bus testa intus lævis æqualisque ha-* *betur, Caro item quam Græcè spon-* *dylum, latinè callū dici Hermolaus* *author est, quam Lunæ incremento* *augeri prodidere quidam. Terrenū* *illud quod continet & conservet fo-* *ris est, hoc calorem leviculum, quia* *sanguine carent, tanquam furnulus* *fovet & conservat, & testa dicitur.* *Non mutant eam, tum quòd nō mo-* *veātur, tum quòd non siccentur. Ocu-* *los habere negat Aristoteles, Plinius* *Arist. H. A. l. 1. c. 9.* *moveere etiam, scribit. Dentes ipsis pri-* *mores, & carnosum illud quod propor-* *tionatur ad sentiendū cibum caput o-* *mnib. infra, plantar. modo. Stomachus* *ori cōtinuò jungitur, isq; pportione* *magni-*

Horat. l. 2. sary.

Nomen.

Arist. H. A. l. 1. c. 6.

Descri- ptio.

Plin. Epist. 136.

magnitudinis exiguus. Hunc excipit *venter*, in quo q̄ *papaver* dicimus, (*μίσκον*) situm. Mox intestinum continuum tendit simplex, originem à papavere illo ducens. Excrementū illud quod papaver dicimus, continenturbinata omnia sua clavicula, univalvia fundo, bivalvia qua nodo ligantur. Laborant omnia per frigus, & æstum atque exuperantiam temporis patinequeunt. *Nutriuntur* more plantarum per poros, & quidē humore dulci, si Aristoteli credimus. Ideò eis anni pluvij profunt, Purpuras si excipias. Movenitur omnia parte dextra, non ad vertiginem sive claviculam, sed in adversum.

Victus.

Arist. H. A.

1.8.c. 2.

Arist. H. A.

1.8.c. 20.

Differentia.

Plin. H.

N. l. 9. c. 33.

Differentias quod spectat, mira in ipsis naturæ ludentis varietas. Tot color. differentia, tot figura, planis & concavis, longis, lunatis, in orbem circumactis, dimidiò orbe cæsis, in dorsum elatis, lævibus, rugatis, denticulatis, striatis, vertice muricatis in torto, margine in mucronem emisso, foris effuso, intus replicato, jam distinctione virgulata, crinita, crispa, cuniculatim, pectinatim, imbricatim, undata, cancellatim reticulata, in obliquum, in rectum expansa, prædensata, porrecta, sinuata, brevi modo ligatis, toto latere connexis, ad plausum apertis, ad buccinum incurvis. Rondeletius eas brevissimè complexus est. Alia ab aliis testæ duritia superatur, ut pulmones, Holothuria, Echini, longè minus dura testæ conteguntur, quàm Purpuræ & Buccina. Alii undique circumteguntur, ut nihil interioris corporis regi possit, ut Ostrea, Tollinæ, Pectines. Alia altera tantum parte testam habent, alteri parti testæ loco est scopuli pars cui hæret. Chamæ & Dactyli sive Solenes utrisq; extremis non integuntur, per quæ caput & posteriorem partem exerunt. Eorum quæ undique integuntur: alia turbinata sunt, ut Purpura, Buccinum, alia turbinata non sunt, ut conchæ, quæ à Gallis Porcellanos vocantur. Alia unica cōcha cōstāt, ut Lepades. Alia duabus, & Mytuli. Testar. aliæ læves, ut Unguiū, Mytulorū. Aliæ asperæ, ut

Purpurarum, Buccinorum, Ostreorum, quarum rursus testarum, per magna est in asperitate varietas, quæ in singulis declarabitur, &c. Nō ea brevissimè in Turbinata, Turbines, Bivalvia & Univalvia distinguimus. *Locus* ipsis mare, quod ita amant, ut apud Ægyptios maris symbola conchyliæ haberentur. In mari rubro mira quadam magnitudine augentur. Bibacta iisdem referta est, ut & maris Ægei & Laconici littora. In montibus & remotis procul à mari locis reperiri, nullum dubium. Causas alibi inquiremus. Ad *Temperiem* spectat, quod plurima eorum algore & æstu lateant. Limaces hyeme, Purpuræ & Buccinæ canis exortu trice nos circiter dies conduntur. Æstate tamen potius plures vigent, Piræsem Euripum si exceperis, in quo non minus hyeme probantur, quod tum, piscibus alio migrantibus pabulentur uberius.

De ipsorum *Generatione* accuratissimè Aristoteles in libris generationum egit, eoq; res redit, ut omne genus testatum spontè oriri pronunciet. Apertum, inquit, id hinc est, quod navigiis putrescentibus, sæpe spumosa adnascuntur, & locis multis ubi nihil tale aderat ante, post per inopiam humoris factò cœno, Ostreæ prodire: ut apud Rhodum insulam, cū classis applicuisset, & fictilia proiecta essent, in mare, tēpore post cœno obducto testis. Ostreæ in eis reperiebantur. Nihil autem partis genitalis emitti ab iis, argumentum est, quòd cum Chii quidem ex Pyrrha Lesbi insulæ Ostreas vivas portassent, & in loca quadam maris reciproci æstus, & luto similia dimississent, plures nihilo fuere temporis spacio, quāquam incremento corporis plurimum profecerunt. Quæ autem ova vocantur, nihil ad generationem conferunt, sed indicium sunt nutritionis melioris, quale in sanguineis pingue est: quamobrem sapore per id tempus præstant, ciboque laudantur. Quæ de Conchis Ælianus scribit, in speciali historia adferemus.

Generatio.

Arist. Gen.

A. l. 3. c. 11.

Arist. H. A.

1.5. c. 14.

Scalig.

Sensus.

Sensus eis Plinius adimit, tribuit Aristoteles. Purpuris escas putidas Purpurarii emoli. acceduntq; odore sine dubio illectæ ad ipsas. Ungues ad strepitum se subtrahunt, inferiusque subsidere cernuntur, quoties ferramentum sentiunt admove-ri. Exiguo namque excant, reliquo autem toto corpore perinde ac in cubili occiduntur. Natices qui capiunt non adverso, sed secundo flato adeunt, quoties escam persequuntur, nec voce ulla sed silentio agunt.

Antipathia.

Antipathiam cum tonitru habere creduntur, & adhærescentis tempestatis signa sunt.

Vfus.

Adeò olim in *Cibis* adhibebantur, ut inde conformatum sit adagium, conchyliia viduarum cupedias, & Plinius, luxuriæ matrèni Conchyliorum. præcia margaritis propemodum æquasle, quæritur. Commune omnibus salum quendam in sua carne succum habere, quo alvum ciere nata sunt: quòd si probè assentur, maximè tum falsa evadunt, ut quæ succum jam habeant ab igne veluti succensum, & propè dixerim, absumptum. Mollitiæ tamen & duritiæ operationis variatur eventus. Venerem invitare certum, unde eam Concha Cyprum vectam quidam, aliè concha natam voluerunt. In *Medicina* quoque locum invenisse in specialibus dicemus.




TITULUS II.

De Testaceis in specie, & primò de Turbinatis in genere.



UPERIORE titulo Testaceorum, omne genus, in Turbinata, Turbines, cōchyliia bivalvia seu *μυζα*, & *μυζα* seu univalvia distinximus: Turbinata vel in genere, vel in specie considerantur. In genere dicta Turbinata sunt illa, quæcumque in volutas



& anfractus seu spiras, quales in prælis & torcularibus visuntur, Testas suas quoquo modo reflectunt. Græci *σχομῶδες* vocant, Gesnerus *ελκυσθῆ* quoque dici posse putat, quòd *ελικας* vocent, quas diximus, volutas. At Rōdeterio *σχομῶδες* in genere pro omnibus Turbinatis sumitur, Turbo autem est id quod ex amplo & lato paulatim in mucronem definit, cuius figura est & Turbo lusorius. Proprium illis est testam habere continuam totam & unicam. Si externa *Aristot. H. A. l. 4. c. 4.* spectemus, si interna considerentur, quodammodo similem naturam nata sunt omnia, magnitudine autem distant & aliis affectibus qui excessu comparantur. Quædam enim quæ maiora sunt suas quoque partes conspectiores habent: minora autem minus: sic etiam duriora & molliora, & ejusmodi alia alii. Nam quæ caro summa à testæ ostro exorta est, eam quædam firmiorem quædam solutiorem habent. Ex eius medio caput est & cornicula bina; in majoribus proceriora, in minoribus minima. Eximendi capitis eadem omnium ratio, & per terrefactis contrahendi. Habent quædam os & dentes, minutas, tenues. Quædam etiam muscarum more habent *proboscidem* linguæ speciei. Hæc dura est buccinis & purpuris. Nam quemadmodum Tabani & asilus tergora quadrupedum pertundunt: ita his tanta est duritia, ut escarum testas perforant. Subest ori statim *venter* similis avium ingluviei, qualis est etiam umbilicis. Infra duo candida quædam, firma, specie *mammillari*, qualia in sepiis inveniuntur: sed hæc solidiora. A ventre *gula* duplex longa ac papaver usq; quod in fundo est. Quæ omnia perspicipi possunt, in sinu vorticoso testarum. Quod gulæ jungitur *intestinum* est, à qua, continuo tractu fertur totum simplex usq; ad exitum, incipi eas à vorticoso sinu quo *papaver* continetur, atque inde laxiorum. Est autem papaveris magna pars quasi excrementum in omnibus ostraceis. Inde intestinum reciprocans rursus ascendit ad carnosas partes, atq; circiter caput



Polypus.


Tab. x.

Nautilus.




Testa Nautili.

3



Nautili Structura.

4




Purpura.

5



Purpura


6



alia.


Testa Nautili.

7




Buccina.

8




Cochlea rugosa.

9



Murex aculeatus.

10



Strambus magnus.

11



caput terminatur, qua emittitur excrementum omnibus turbinatis tam terrenis quam marinis. Hucusq; Aristoteles. *Crescere* ut vermes, scilicet anfractibus, qui subinde accrescentes plures efficiuntur in partem priorem, quod caput vocatur, experientia docuit. *Serpunt* parte dextra non ad clavículas, sed in adversum. De *Congressu* in speciebus dicitur.



TITVLVII.

De Turbinatis in specie.

CAPUT I.

De Turbinatis in anfractum tortis.

ARTICULUS I.

De Nautilo.

TAB. X.

Aldrov. l.

3. c. 3.

Arist. H. A.

l. 4. c. 1.



Uum sunt Turbinata apud Aristotelem generum, velenim ελικώ habent, vel sunt Φαιροειδῆ seu in globum circumacta. Ex illis sunt Nautilus, Purpura, Buccinum, & Conchylum.

Differen-
tiæ.

Nautilus, quem Suidas ναυτίλῳ, alii ναυτιχόν & ὄν πολυπόδῳ vocant, vulgo ναύπλος dicitur, & cum Nauplio Athenæi idem esse videtur. A modernis Græcis θαλάμῳ τεκτεπόδι vocari Robertus Constantinus auctor est.

Arist. H. A.

l. 4. c. 2.

Duo ipsius apud Aristotelem habemus genera. Vnum est, cuius testa pectunculo similis est, cava, neque ei connexa natura. Is prope terram pascitur sæpe numero: quare à fluctibus eiicitur in aridam, ubi delapsus de concha, aut capitur aut in humo perit. Hoc genus pusillum est & simile bolitanis: quæ Polypi spe-

cies est. Alterum in testa tanquam limax est. Is ex ea nunquam exit: sed interdum brachia exerit. Illud respicit Plinius cum dicit. Inter præcipua miracula qui vocatur Nautilus, ab aliis, Pompilos (potius poly-podis ovum.) Scipinus (verius pronus) in summa æquorum, pervenit, ita se paulatim subrigens, ut emissa omni per fistulâ aqua, velut exoneratus sentina, facile naviget. Postea prima duo brachia retorquens (potius attollens ex Athenæo) membranâ inter illa miræ tenuitatis extendit. Qua velificante in aura cæteris subremigans brachiis, media cauda, ut gubernaculo se regit. Ita vadit alto, Liburnicar. ludens imagine, & si quid pavoris interveniat, hausta se mergens aqua. Eundem exactissimè Bellonius descripsit. Concha, inquit, tribus fragmentis constare videtur (carina scilicet & lateribus, cum tamen una & simplex sit) quarum latera utrinque ceu carinæ junctæ apparent, ea ut plurimum magnitudine, quam ambæ manus amplecti possent: latitudine autem quantum pollex cum indice comprehendat. Omnes autem non excedunt crassitudinem membranæ pergamenæ, stritq; in oblongum ductis, adoras crenis laciniatæ sunt, in formam rotundam abeuntes: foramam autem per quod Nautilus alitur atque exit de Concha, magnum est. Fragilis hæc lactei coloris, lucida, admodum polita, omnino navis rotundæ effigiem referens. Navigat enim per maris summa, elatus de imo gurgite offertque se testa inversa, ut facilius ascendere posset, & inani scapha enaviget, atque ubi inde emerferit, tum concham invertit. Cæterum Nautili brachiis interjacet membranula, qualis est inter palmipedum digitos, sed hæc magis est tenuis, in telæ araneæ modum, robusta tamen, qua etiam aura inspirante velificat. Cirris quos utrinque multos habet, pro gubernaculis utitur, atque ubi metuit, tum concham protinus marino humore oppletam demergit.

Plin. H. N.
l. 9. c. 29.

Alterum

Alterum Nautilum, Cochleam margaritifera Bellonius vocat, & videtur eam Fauconerius describere, cum in Epistola ad Gesnerum ait, suum Nautilum, testā habere interna parte ita nitentem, ut cum unionibus preciosissimis de coloris amœnitate certare posset, Bellonius enim suæ illius cochleæ concham, in magno apud artifices Gallos, ad vasa ditionibus abacis accommodata conficienda, precio esse, & *Porcellanam* ob id vocari scribit. Fauconerius multa in sui Nautili testæ carina tabulata, eodem amœno colore nitentia, fuisse prodit. Hinc facile colligas eundem cum eo esse, quem à Græcis *πυλάρμιον* τὸν *ποδὶς*, id est, polythalamū dici scripsimus. Plin. cū de Nautilo paulò ante dixisset, mox tanquā

Plin. H. N.
l. 9. c. 30.

de altera eius specie. Navigeram similitudinem, inquit, & aliam in Propontide visum sibi prodidit Mutianus. Concham esse acatii modo carinatam, inflexa puppe, prora rostrata: in hanc condi Nauplium animal Sepiæ simile, ludendi societate sola: duobus hoc fieri generibus. Tranquillo enim, vectorem demissis palmulis ferire ut remis; si verò flatus invitent, eosdem in usu gubernaculi, pandique concharum sinus aure. Huius voluptatem esse, ut ferat, illius, ut regat: simulque eam descendere in duo sensu carentia: nisi fortè tristi (id enim constat) omine navigantium humana calamitas in causa est. Cardanus quoque cuiusdam cochleæ meminit, quam India mittit. Est, inquit, forma triremis cum alta puppi, in qua vasculum aliud, diceres poculum à natura excogitatum. Nam & magnitudo tanta est, quam vidi, ut cotylam capiat.

Res profectò usus elegantissimi & pulcherrimæ formæ.



ARTICVLVS II.

De Purpura.

Purpura Græcis *πορφύρα*, Plinio a Tab. X. 5. 6. c. 6. Nomen. liquando Pelagium, Politiano concha Herculea, quòd tincturæ Hercules author credatur; Serapioni Pulpia, Brasavolo Antale dicitur. Qui cum Conchylio confundunt, à Plin. H. N. l. 9. c. 35. Plinio refutantur. Distinguit enim iste, & expresse apud eum legimus. Conchyliæ & purpuras omnis ora atterit, quibus eadem mater luxuria paria penè etiam margaritis fecit. Nec minus illi, qui Conchylium idè cum Buccino ponunt, quòd Plinius Plin. H. N. l. 9. c. 36. cum duo tantū genera Turbinator. continentium florem illum tingendis vestibus adeò expetitur poluerit, alterum Purpuram, alterū Buccinum esse, necesse videatur. Eodem enim libro hæc verba extant. In Conchyliata veste cætera sine Buccino, præterque jus temperaturæ aqua pro inviso potus humani excremento. Concham ex Turbinatorum genere esse Aristoteles prodidit, & aliquot ipsarum genera agnovit, ut circa finem dicemus.

Descriptionem si spectes, sæpe ovi est Plin. H. N. l. 9. c. 36. magnitudine, aliquando major, nisi Descriptio. elevata & aculeis munita esset, & canalè ad latus qua linguam exerit haberet. Rugata eadem, aspera, cinerea, aliquando flavescentes, aliquando ex viridi cinerea, intus luteo colore. Rostrum est longo tubuli modo excavato: Cornua Limacum more attollit, atque eodem modo serpit, iisdem cornibus iter sibi præterendit. Linguam ex tubulo illo canaliculato in latere procurrentem habet, quæ callosæ huic parti adhærescit, cui caro ipsi testæ adjungitur. Est autem ea *c. aro*, musculus quidem fortis ac candidus, mediæ testæ alligatus, quo Purpura tanquam congenito quodā operculo, carni patulæ opposito, diutissimè extra aquam vivit. Marinam enim aquam haustam asservat, qua pluribus diebus refovetur ac sustentatur. Caput illi cartilagineum ac durum.

durum. Os in ea parte qua scopulis hæret, rotundo foramine pervium, quo lapides arrodit, & in stomachum exugens demittit. *Hepar* quoque habet viscidum, tenaci quodam lentore præditum, ut penè viscum esse appareat. Sed hoc quod de hepate, Brachiis, & corde, Bellonius scripsit, pro fabulosis censet Rondeletius.

Et hæc quidem recentior. Descriptio est. Ut vero & veteres videamus, Clavatam Plinius facit Purpuram ad Turbinem usque, aculeis in orbem septenis ferè, qui non sunt buccino. Testam intortam curiculatim in crepidinem desinere, apud Aristotelem extat. *Partes* illæ quæ Dioscoridi secundum Hermolaum κίονια, aliis ἰόνια, quod violam significat, partes sunt interni Purpure corporis mediæ, fibratæ, torosæ, & firmæ, circa quas testæ volumina capreolorum ritu circumvolvi incipiunt secundum Dioscoridē: vel quibus hæret vena illa vel membrana illā florē Purpuræ continens, inter *papaver* nempe quod turbinata omnia sua clavicula continent, quod est inferiore loco, & cerviculam seu collum superiore loco.

De eo flore seu succo ita breviter Aristoteles. Inter papaver & collum florem continent, textura densa, colore candidæ membranæ, qua ablata & compressa manus flore tingitur. Hoc ipse flos videtur esse: reliqua concretio, quasi alumini. Id Plinius florem in mediis faucibus habere dixit, liquoris eum esse minimi in candida vena, unde pretiosus ille bibitur, nigrantis rosæ colore sublucens, reliquū corpus sterile. Rondel. partem succum continentem, cordi proportionem respondere existimat, florem, sanguinis loco esse. *Caro* earū penitus includitur, nec ulla ex parte, excepto capite conspicitur, ut apud

Aristotelem habemus: Testa sua adhæret. *Lingua* duram habere eaque testas escarum perforare, non tantum ab Aristotele, sed & Plinio, qui longitudine digitali facit, & Æliano proditur: Rondeletius promiscidibus muscarum quæ inter cornua

comparat, & firmam, torosam, quæque exeri possit, concedit: sed tam durā esse ut testas perforaret negat, rostro id fieri verisimilius addens. Qui κροκίδα, seu κροκίδα τῆς πορφύρας apud Galen. l. 3. lenum, pro tomento purpurarum, de Medic. pro depexo & contuso in medicamē. secund. loc. tis veteres uterentur, sumunt, vehementer fallitur. Lanæ n. purpura tinctæ crassior & minus curata pars est, cuius & Dioscorides meminit. *Operculum* varia apud authores sortitū est nomina. Plinius purpurarum cavum dixit, Aristoteles καλύμμα, ἑπικαλύμμα, Galenus πώμε vocavit. Alii βλάττον βυζάνιον, vel βύζαντον, à Byzanto vel Byzantio Africæ nominant, & longè verius quàm illi, qui id nomen ori narium purpuræ adscribunt, quas non habet, vel qui blattas Byzantias buccinorum & Conchyliorum permixta opercula appellant. Galenus Indici conchilii testam inter ostraca & testas purpurarum & muricum generatim comprehendit. Nec negandum fortè est, Conchylii, buccinæ & purpuræ opercula, nec substantia, nec viribus differe, nisi fortè unguis odoratus differetiam supponat. Nam blatta Byzantia dū uritur ingrati est odoris, & castoreum redolet: unguis vero, suavē odorem spirat. Potest tamē & id quod εὐωδὲς Græcis dicitur, gravis apud Latinos odoris esse, & in quibusdā locis ungues odoratos, fetidos in aliis reperiri. Ut ut sit, Carni hæret operculum purpurarum ut unguis noster. Ex filis seu fibris coagmentatur, & quia pinguedinis aliquid in se habet, fumum cornu modo accensum emittit. Et hæc quidem de partibus sufficiant.

Flori, qui & succus Plinio, τὸ αὐτὸς τῶν Flos Purpuræ Græcis, varia indita sunt nomina. Vitruvius ostrum dixit ὄστρεον, cui Virgilius Sarrani epithetō, à Sar urbe Phœniciæ, quæ postea Tyrus, unde purpureus color & Sarranus & Tyrius, secundum Massariū addidit. Nec tamen omnis Purpura ostrum, ut tradit Gellius, quamvis omne ostrum purpura sit, quod exuberantiam splendoremque ruboris habet, hoc est, illustratur splendore, quo
f alia

Arist. H. A. l. 5. c. 15.

Arist. H. A. l. 5. c. 15.

Plin. H. N. l. 9. c. 36.

Ælian. H. A. l. 7. c. 34.

alia purpura caret, *Saniem* etiam præter Plinium idem Vitruvius vocavit, Pollux *λαβρον*, Fucus, pelagiū, venenum Tyrium, purpurisum, *καλχα* eiusdem sunt apud alios nomina. *Tria* verò huius floris, à varietate coloris sumpta, posuere genera, *πορφύρεα*, coloris violacei, saturati, & subnigricantis, quo colore *πορφύρεον κύμα* Homerus dixit: qualis erat amerhytina & quæ è Pelagiis purpuris & buccinis fieri solebat. *Φινικίδα* puniceorū rubentem colore cocci, qualis fuit Tyria vel Tarentina. *Αλγυίδα* deniq; colore glauco, irato mari simili, austero, diluto, qualis fuit conchyliata, Tyria omnium celeberrima, quæ & ostrum dicebatur quo obscurior & nigricantior eo carior. Sed & à loco aliqua est differentia. Testatur enim Vitruvius, ostrum quod legitur in Ponto & Gallia, quòd hæ regiones sint proximæ ad septentrionem, esse atrum. Progredientibus inter septentrionem & occidentem, lividū, quod legitur ad æquinoctialem, orientem, & occidentem, violaceo colore inveniri: quod verò meridianis regionibus excipitur, rubrum esse. Inventum fuisse à Phœnice regnante à Tyrio Philosopho Hercule produnt. Cum enim in eam. referente Cedreno, Tyri partem adscendisset quæ ad mare pertinet, pastoris canē concham vorantem, & pastorem lana sanguinem prout ille putabat à sanguinis ore abstergentem vidit. Tinctura delectatus, lanam istam ad Regē derulit, qui lanam ita tingi, & sibi vestem parari curavit.

Locus.

Quantū ad Purpurarū locū in pelago & littorib. ut in Differentiis dicemus degūt, nec ulla magis idonea ipsis regio quàm limosa. Si amnis in mare effluentis aquam degustarint, eodem di moriuntur. Dies tamen circiter quinquaginta extra aquas captæ vivunt, sæpe in arena latent, & canis exortu circiter tricenos dies conduntur. Sunt tamen peculiaria loca, quæ à Purpuris celebrantur. Virgilius & Petronius Assyriæ meminere, Plinius Meningis Africæ insulæ, non longè à Syrtibus sitæ, quæ

Lotaphagorum terram putant, & Getulici littoris: Laconica Pausaniæ, Horatio & Valerio Flacco celebris est. Unde huic fucus Tenarius; Arriano, Muxa emporium ad mare rubrum. Tenientem purpuram apud Pliniū lego, fortè quod in tæniis seu cautibus in mari candidatibus, & fasciæ instar pratensis, degit. Dialutensem seu fortè Dialutensem alibi, quasi *δία* & *άλυπον*, quod per salum æquor rapit: Porphyrusa Aristoteli à frequentia Purpurarum dicta est. Fit & Melibææ apud Festum mentio. Celeberrima deniq; omnium est Tyria, ut Plinius de suo tempore scripserit: Tyri nobilitas nunc omnis Conchylio atque Purpura.

Vitiant pisciculis teste Aristotele: sed nec algæ nec muscum rejiciūt. Ita ista in suas testas recipiunt, ut iis in orbem exertis, quasi circularē convivationem præbeant, una alterius alimentum depascente. Plinius pabulo & solo purpurarum genera discernit, ut sit lutense, quod putri limo; algense, quod alga; dialutense quod vario soli genere, pascitur. Istud esse vilissimum.

Ortum apud Aristotelem invenio duplicem. Velenim ex limo existunt vel ex salivario lentore, ut Plinius prodidit, quem emittunt, de quo ita Aristoteles. Purpuræ verno tempore eundem in locum congregatæ faciunt id quod vocant favaginem. Est enim favi specie, sed minus expolita. Quemadmodum si è folliculis alborum cicërum multis quiddam cōpartis. Nullus his patet aditus, neq; inde fiunt purpuræ, sed tum illæ tum testacea alia ex putredine atq; limo proveniunt. Sed id est quasi purgamentum & ipsis & hæccinis. Etenim hæ quoq; favificant. Generantur verò hæc quoq; favificantia, quemadmodum cætera testacea. Cæterum etiam facilius, si qua subsint principia referencia genus suum. Cum n. incipiunt favificare, emittunt lentorem quendam mucosum, ex quo folliculi concrescunt illi. His igitur omnibus solutis, effluit in terrā id quod continebant. Atq; eo in loco purpurillæ minuat

Vitius.
Arist. H. A.
l. 8. c. 2.

Genera-
tio.

Arist. H. A.
l. 5. c. 14.
edit. Scal.

minutæ oriuntur atq; concreſcunt, quæ herentes purpuris capiuntur, aliquot etiam inchoatæ tantû. Quod ſi ante partus tempus capiantur, in iſtis ſtoreis non tenerè pariunt, ſed in eundem locum conventu factò quæ admodum etiam in mari: Unde per cratium anguſtias quaſi racemi prodeant. Celerrime inter teſtacea creſcunt. Sex annos vivunt, & ſingulis annis incrementum earum per orbes patet, quibus totidem quot annos habent, teſta claviculatim intorta in crepidinem deſinit. Parum progrediuntur, & ad eſcas à longo accedunt, quòd odoratu valeant. *Tinctura* ratio alio ſpectat. *Uſum in Cibis* præſtant, & hoc cum oſtracodermis communes habent, quæ ſallum ſuccum contineant, eodemq; alvum ſubducant, carne autem ſint dura. Athenæus ex Hiceſio papaver copioſius alere ſcripſit, magis tamen Scillam ſapere. Colla ægrè confici & difficulter ſecedere excrementum facile, partes extremas aptiſſimas eſſe, & ſeu elixas ſeu aſſas humori origratum & ſtomacho acòmodû emittere, Xenocrates prodidit. Peculiare eſt eis quòd coctæ juſculis ſpiſſent. Nec à *Medicina* excluduntur. Contra venena prodeſſe, docuit Plinius, contra Dorycnion Nicander. Saliva recentia vulnera agglutinâtur. Callus pro ſe operiuntur tuſos glutinat nervos præciſos, Teſtæ cinis puſtulas verendorum è melle diſcutit, ad dentiſcra cum roſis & caryophyllis uſurpatur. Cû pulvere glycyrrhiæ, papaveriſq; ſemine, cremore hordei pauco vino albo pulmonib. auxiliantur, & fluxiones ſiſtet. In pollinè redacta ulcerib. malignis còpetit. Cum melle illita, pilos attenuat. Filum è purpura quo viperæ cervici circûpoſita ſuffocata fuit, collo circûdatum tonſillar. affectus tollit. Aëtius verò purpuram hircinio felle madafactam & mulieri umbilico diebus ſeptem impoſitam conceptum juvare tradit, ſi deinde creſcente luna cum viro congregiatur.

Ariſt. l. c. *Differentia ſeu genera*, ſi quæras, ſunt *Magna*, quæ ad Sigæum & Loctû Idæ promontoria gignantur, *Parva*, quas

Euripus fert & Caria. *Pelagia* quæ magnæ & ſcabræ, quarumq; ſlos magna ex parte niger, ſed nonnullis puſillum rubidus. Nonnullæ ad pretiû minæ evaſiſſe, prodidit Ariſtotel. *Littorales* quæ parvæ, & flore ſunt rubro. *Echinatæ*, quæ vel pluribus ſpinis maximè in poſtica parte horrent: vel rarioribus, minoribus, & brevioribus. Illæ extra modò flaveſcunt, modò cædicant: intus, modò violacei ſicut coloris modò rubicundi. Iſtorum tota turbinata pars rubicundo colore conſpicitur, dorſum verò partim rubet, partim vireſcit. Anterior mucro acutus non eſt, ſed notabili latitudine ſpectabilis. Intus colore ferrugineo, flaveſcente ac eleganti cæruleo variant. Sunt & *Rubræ*, ut in Auſtrinis partibus *Nigræ*, in Aquiloniis, *Livide*, in Occidentalibus & Orientalibus. Marmoreæ qualis eſt illa longis undiq; tuberibus, ubiq; ferme duplicibus at minimè acutis ſed obtuſis plena, labro latiffimo, quaſi canaliculato, binæ enim id foveæ percurrunt, tota ferè marmoreæ duritie, undiq; candida, præterquam in extremis foraminis oris, quæ purpuræſcunt. Ad hanc pertinet tota excinerem candida, minor quàm priores omnes labro ſubtus ſpiſoſa, cum alioqui nullæ in toto corpore ſpinæ dentur. Vêtre eſt plene ſeffili, ſeu non turbinato. *Pentadactyli* deniq; qualis eſt illa quâ ſuperius deſcripſimus. Geſneri quâ ex Adriatico mari accepit.

ARTICVLVS III.

De Buccino.

Buccinum à ſimilitudine potius ^{TAB. X.} ^{8.} buccini quo ſonus editur, rotunditate oris in margine inciſa, ut Plin. viſum dicitur, quàm quod vel buccis admodum ſonos muſicos edat, vel buccas inflare tubicines rogat, ut Bellonius voluit, Gillius maſculino genere extulit, quidam etiam dentale buccinû interpretantur. Græcis hodiernnis *φύκων* dici Geſn. autor eſt: nonnullis *σκόμβος* & *σκόβιλος* idè ſignificant. Còmuniter *κήρυξ*, fortè à cera, quam mucò ſimilem mutuo attritu ſalivant, & Græcis eſt *κινέειν* vocatur: f 2 quod

Plin. H. N. quod vocabulum ex antiquis Græcis nonnulli pro purpura sumpserunt: Plinius nonnunquam muricem trātulit Athenæus purpuræ filium nominat.

Descriptio.

† Arist. H.

A. I. 4. c. 4.

Testa tegitur scabra, eaque congenita promuscidibus, ut musca instruitur, quod membrum linguæ effigiem præ se fert. Venter os protinus excipit, similis in umbilicis ingluviæ avium. Infra duo candida quædam firma specie mammillari, qualia in sepiis inveniuntur: sed hæc solidiora. A ventre gula duplex longa ad papaver usque, quod papaver in fundo est: quæ omnia perspicipossunt in sinu verticoso testarum. Quod gulæ jungitur intestinum est; à qua continuo tractu fertur totum simplex usque ad exitum, incipiens à verticoso sinu quo papaver continetur, atque inde laxior. Papaver verò pars eius ima esculentaq; est. Inter hoc & cervicem flos est, sed, ut Plinius dicit, dilutior & minus floridus. Et hæc de Buccino veteres. Bellonius Buccini concham ut plurimum minimi ovi magnitudinem non excedere, strias in tergore quinas habere, ut nerita, plerisque in gyrum tuberculis obtusis, brevibusque obseptas, multo quam in purpura frequentioribus, sed ubi in claviculum desinunt, unicum tantum eam comitari testatur. Interna parte incisam oris magnitudinem habet turbinum modo, & canalem ad latus, per quem linguam exerit, purpurarum modo: eodemq; operculo contegitur, qua etiam turbinata omnia, ne in testas contracta ab externis offendantur. Color testæ intus lacteus foris fulvus, tantaque magnitudine aliquando crescit, ut ad Cartejam purpuræ & buccinæ deca cotyli, id est, decem cotylorum capaces reperiantur.

Locus.

Arist. H. A.

I. 8. c. 13.

Arist. H. A.

I. 5. c. 15.

Locum si spectes, petris adhærent, circaque scopulos leguntur. Canis exortu circiter tricenot dies latere scripsit Aristoteles, quod Plinius de muricibus accepit. Annos circiter sex vivere, idem tradidit.

Generatio.

Idem ipsis *Gignendi* modus qui purpuris. Semen ad generationem

nullum habent. Favificare in more eis positum. Ova sub lapide prona parte oblonga albaque, deinceps pendentia disponunt, quæ ita disposita favi nomen habeat ab apum similitudine. Supini autem sub lapide stabulantur, cum favificant: quo verò tempore favos exstruunt, si incoquantur & abscindantur, ova intra continere comperientur: quæ saliverio lentore lapidibus & cautibus ferruminant, ut inde decidere non possint: quod tam magno artificio constituunt, ut nihil coacervatum esse videatur.

De earum in *Cibus* usu, hæc scripsit Xenocrates. Buccinæ sunt duæ: riores purpura; & magnitudine ac loco differunt, triplicesque vires habent, testæ, colli, & excrementi in testa contenti. Nam scabra substantia piscis alvum fistit, ac præcipue si asseretur; contra magis facit elixa.

Collum earum alvum fistit, difficulterque concoquitur: idcirco ex sinapi vel aceto, aut liquore, aut pipere corrigere ipsum debeat, qui eodem vescuntur. Aqua denique quæ ex eis manat, calefacta, ventrem subducit: Cum eo verò excremento quod testa continetur, cocta, magis gilva fit, & piscis qualitatem præfert. Si verò totæ decoquantur, maiorem sistendi vim habebunt, & sitim offerent. Quidam verò eas elixas lævigant, & æquæ ac urticas condiunt, huncque origratæ. Luna exoriente plenæ, & æstate graciles. Eadem apud Dioscoridem, Galenum & Diphilum invenire licet.

Habent & in *Medicina* usum. Car-dialgia laborantibus in cibis præscribit Trallianus, purulentis etiam, si falsus humor est. Ad alopeciam, usta, trita, & in oleo veteri subacta, & ad glutinis crassitudinem redacta à Myrepto vehementer commendantur.

Galenus ad ophelidas & lenticulas, in furno assæ & ex melle trita commendat. Andernacus ex succo limonum detrita ad genus mulierum deale.

Ufus in Cibus.

Ufus in Medicina.

dealbandas deprædicat, præsertim si aliquid argenti vivi sublimati, iisdem inieceris. In Belgio contra tussim inanem inprimis & puerorum, potus ex buccino propinatus.

Differen-
tia.

Differentias quod spectat, Rondeletius duo reperiri scribit, parvum, nempe, lineis frequentibus asperiusculum, & alterum ei simile, nisi quod lineas prominētiore habeat, & transversas, ut striatum merito dici possit. Est & testa spissiore durioreque, nec non genus magnum coloris violacei, sed cuius orbes flavescent, & in ore candicant. Gesnerus se & aliud vidisse scribit, purpuræ similis, figura & magnitudine propius, tuberculis undiquaque dispositis, deinceps rotundis scitè omninò eleganterque *εὐχρηδὸν* elevatum; nec in mucronem adeò exprorectum, sed capite obtusiore brevius. Missa & Aldrovando peregrina, colore & duritie marmoris, circulis rosas æmulantibus.

ARTICVLVS IV.

De Murice.

TAB.
X. & XI.
Nomen.

Murex modò Buccinum, modò Purpuram significat, taceo colorem purpureum, cui Muricis nomen imponitur. Hic pro testaceo sumitur, quod & turbinatum & longos firmosq; aculeos habet, nomenque ab asperitate muror. sortitum est. Perottus inter ostrea enumerat, propter scabritiem corticis. Sed alia in Ostreis asperitas, alia in Muricibus. Illa per totam superficiem sese repandit: hæc, aculeis quibusdam per intervalla eminentibus constat, iisque longis & firmis, quod Plinius quoque firmare videtur dum ait. Firmioris jam testæ murices & Conchar. genera. Valerius Flaccus dum intortum vocat, debuccino fumen- dus est.

Vsum in Cibis quoque habent, sed illaudatis. Xenocrates enim falsos virosos esse, & ventrem turbare, urinam ciere, ori ingratos, concoctu difficiles, pituitam gignere, &c. scribit. Scribonius Largus tamen & Cel-

sius inter Cibus stomacho gratos recensent. Apud Macrobiū etiam cum aliis conchis in epulo apponuntur, quo die Lentulus flamen inauguratus est.

Largus
Compos.
104.

Vsum in Medicina si attendimus, Carnes appositæ pilos in mammis tollunt: Testar. cinis cum oleo tumores aufert; panis resistit; Capitis ulceribus cum melle illinitur; maculas in facie mulierum purgat, & parotides tollit. Habetur & pro dentifricio. Carbunculos de veretris exterminare, Marcellus Empiricus prodidit.

Vfus in
Medicina

Quantum ad *Differentias* & Genera, est Murex *Marmoreus*, *Triangularis*, *Lacteus*, *Purpureus* *Orthocentros*, *Coracoides*, & *Aporrhais*. *Marmoreus* à candore & duritia nomen sumit. Rondeletii parte interna ex albo purpurascit. Testa gravis est, densa, solida, aculeis multis horrens, figura inter buccinum & conchylum media, ampla, ut merito *δεκαὶ ὀκτώ* dici possit. Vritur facile, & in cinerem abit, acrimoniaque ob empyremum acquirit, Ambustis medetur, cicatricemque pulchram inducit, postquā abluta, & cum oleo rosato in unguentum redacta fuerit. Gesneriani marmorei muris color fortisecus pallescit, intrinsecus cum pulcherrimo splendore ex albo roseus est. Labrum exterius protendit se & dilatat in marginem: mucrones infra caput seu conum testæ duo magni, sed obtusi prominent. In ipso cono parvi admodum & subrotundi, per spiras deinceps non aculei sed tumores visuntur. Huic accedit *Aldrovandi*, turbine acutissimo atque longo & exili, undique strictus aut potius undatus.

Triangularis, altera parte est planus, altera ferè rotundus, sed ita, ut utrinque sint duo latera, tertium, plane pars afficiat, à qua figura, quæ huic propria est, nomen sumit. Aculeos habet breves & firmos, vario est colore, foramen duplex habet rugosum, quo ob testæ amplitudinem & brevitatē sonus editur gravis & tristis. Operculum cum uritur fumum

f 3 emittit.

Descri-
ptio.

Vfus in
Cibis.

emittit. Pinguetudinis aliquid habere, rectè inde colligas. Quare in oleo amygdalino decoctum in aurium doloribus utiliter usurpatur. *Lacteo* color nomen imposuit. Obtusior est turbine aliquando quam ceteri, aliquando Exochas potius & tubercula habet quam clavos. Triplicis effigies invenies apud Aldrovandum. *Purpureos Orthocentros* totus forinsecus & intrinsecus rubet, turbine candicat. Mucrones habet duodecim rectos & robustos, sex constat volutis quæ exiguis & obtusis tuberculis resperguntur. *Coracoides* Rondeletio ab infirmis & rostris corvorum similibus aculeis dicitur.

Aporrhaides quidam inter Lepades, quod ut istæ faxis adhæreant, ponunt; sed malè. Faciunt enim & Neritæ idem, quæ tamen toto genere ab iisdem differunt. Adde lepades parte altera detecta & carnem ostentante affixas; *Aporrhaides* verò acclinato tegmine, quod iis operculum est, ad saxa agglutinantur. Quid si illius *Muricum* generis sint, quæ Græci Plinio proden-
Plin. H. N. l. 32. te *Colycia*, & *Corythia* vocant, turbinata æquè sed minora multo, efficiaciora etiam, & oris halitum custodientia. Ut ut sit, quem Aldrovandus expressit, marmorea est duritia, intus & extra candicans, septem aculeis, ab uno tantum latere, iisque canaliculatis instructus.

ARTICVLVS VI.

De Conchylio.

Aldrov. l. 3. s. 15. **C**ONCHYLII nomen ut ut univ-
erso testaceorum generi imponatur, privatim tamen pro unica specie accipitur. Sic apud Plinium invenimus, cum in Ponto conchylia non esse cum ostrea abundant, scribit: sic apud Philostratum in vita Apollonii, cum, in Biblo maxima conchy-
lia & murices eximie magnitudinis nasci, dicit. Sumi & pro colore, apud Plinium inprimis, tam certum est, ut demonstratione non indigeat.

Qui pro Ostracio sumunt, nomen partis totiaccommodant. Est autem ea parte latius qua in turbinem deficit, sine aculeis tuberculisve ullis. Foramen quo caro interior ostenditur, non rotundum, ut in purpura & buccino, sed longum. Operculum blattam Byzantiam Serapionis esse, quæ eadem, quod avium unguem æmuletur, cum ungue Dioscoridis, opinatur Rondeletius. Nec *εὐώδεις* vocabulum obest. Nec enim hoc semper gratus innuitur odor; sæpe etiam gravis. Ideò expresse Dioscorides, *ἀμφοτέρω δὲ εὐώδεις, θυμιάματα, καὶ ἐλκόντες πρὸς τῇ ὀσμῇ.* At castoreum fœtet, & utrumque, tam operculum, quam hæc blatta Byzantia ad suffocationes uterinas adhibetur. Quod autem, in Indiæ nardiferis lacubus unguis inveniri, & nardi pabulo vesci dicitur, cum conchylium marinum sit, id ex aliorum potius quam sua sententia à Dioscoride scriptum opinatur Rondeletius. Similis purpuræ tegumento dicitur, non figura, sed usu potius & substantia.

Laudatissimus est qui à mari rubro *Vfus* adfertur, candicans, pinguis. Baby-
Plin. H. N. l. 21, c. 8. lonicus nigrescit atque minor conspicitur, succum ipsis & quidem purpureum inesse testatur Plinius. Partes eius omnes in medicamentis usurpantur. Crematum idem efficit quod purpura & buccinum. Caro in-
Galen. l. 3. de Med. s. l. terna medicamentis aurium dolores sedentibus à Galeno admiscetur.

CAPVT II.

De Turbinatis in orbem circumactis.

ARTICVLVS I.

De Turbinibus.




Tantum de *εὐωδίοις* seu Turbi-
natis, & in anfractum tortis, sequuntur Turbinata, quæ in orbem circumaguntur, *Turbines* nempe, *Trochi*, *Nerita*, *Cochlea*, *Echyni*, & *Cœchyliæ*.
Turbinum haud spernenda sunt genera.
E&R

TAB. II.

Murex marmoreus Rondel.



Murex Orientalis.

Aporrhais. Tab. XI.




Concha Longa Rondel.


Murex Coracioides.




Concha altera.



Concha Indica polita. Concha echinata cruda.



Turbines.




Trochus magnus.

Trochus Pyramidalis.



Trochi.



Trochi.



Turbo magnus.




Nerita Rond.



Nerites.




Turbo Longus.



Nerites.



Nerites.





Descri-
ptio.

Est turben *magnus*, *auritus*, *tuberosus*, *angulosus*, *muricatus*, *pentédactylus*: sunt & *turbines* in *spongiis* nascentes. *Magnus* multis voluminibus constat, margine spisso & aspero, testa alba, lineis tuberculisque multis scabra & aspera. Foramen habet rotundum, & rimam qua excrementa excernuntur. Saxi hæret turbine sursum verso. *Auriti*, tres icones habemus, quorum primus perelegantem & in mari Gallico rarum exhibet, alter, intus & in tergore ferrugineum cætera croceum, concha tuberosa, pronè & supinè pictum; tertius, tuberculolum, testa superius leucophæa, infernè crocea. *Tuberoso* tubercula nomen indidere. Varii est generis, longus, tenuis, acutior, lævis, albus, niger, varius. Aldrovandus quatuordecim Icones exhibet, ex quibus secundus, est striatus, è monte erutus. *Angulosus* exinde nomen fortitus est, quod testæ volumina ita à se discreta sint, ut in medio angulos efficiant. Utus dentificiis conficiendis utilissimus est. *Muricato*, tubercula brevia & obtusa nomen impoluere, testa est intus purpurea, foris alba, & quasi calce illita. *Pentédactylos* dicitur, quod quinque appendices longas & acutas, si extremum turbinis annumeres habeat. *Spongiis* quæ delectantur, multorum sunt generum, quæ omnia apud Aldrovandum videri possunt.

Conchula, quæ lactea vocatur, in succo pomi Citrii, cum aqua vitæ dissoluta, mulieres ad faciem fucandam utuntur.

ARTICVLVS II.

De Trochis & Nerite.

TAB.
X.Aldrov. l. 3.
c. 25.

TROCHI à similitudine instrumenti, quo pueri lûstant, appellantur. Omnes sunt leves & varii. Testa veluti crustis duabus constare videtur; externa minus nitet: quæ subjacet unionum est splendore. Alii sunt parvi, alii oblongi. Icones exhibent *Magnos*, *Pyramidales*, *Niloticos albos* & *maculosos*, *Nerita* seu ut Scaliger legit *Narita*, Græcis

νερίτις *ἀννερίτις* & *ἀνδρίτις* apud Athenæum, Hesychio *νιέρτις*, dicitur. Nomen à Nereo Deo marino fortitus videtur; quod is fortè tali concha tanquam elegantiore buccinæ loco, usus esse fingatur: sicut & Triton, quem visum auditumque in quodam specu Olyssiponehsis oræ concha canentem Plinius refert. Ab illis qui Adriaticum sinum accolunt etiam nunc veteri nomine appellatur. Testa est levi, si Aristotelis descriptionem sequimur, ampla & rotunda, forma buccinis proxima, papaver tamen non nigrum ut buccina, sed rubrum habet. Corpus medium testæ firmiter annectitur. Trāquillis diebus soluti pascuntur: coortis ventis recipiunt se ad saxa cancelli, atque ibi quietem agitant. Neritæ autem adhærent more patellarum, & earum quas *στοπίδες* Græci vocant, & cætera horum genera omnia. Hærent enim saxi reclinato tegumento, quod quasi tegumentum esse videantur. Quem enim usum ambæ valvæ biforibus, hunc præstat altera tandem pars turbinatis. Intus pulpa carnea, inque ea os. In rimis cavernisq; saxorum generantur, celerique incremento augeſcunt. Et olfaciunt, & audiunt. Ideò silentium servant necesse est, qui eos capiunt.

De *Natatione* eorum ita Plinius, *Motus*.
Navigant ex his Neritæ, præbentes. *Plin. H. N.*
que concavam sui partem, & alteram auræ oppositas, per summa æquorum velificant. *l. 9. c. 33.* *Ælianus* & *Bellonius* diversos ab Aristotelis Nerite proponunt. *Illius* est magnitudine exigua, pulchritudine eximia, & in mari ubi sordium nihil, & tranquillitas viget inque saxi ad imam maris sedem adhærescentibus nascitur. *Huius*, testam in anfractum intortam habet, qua penitus inclusa, nulla ex parte præterquam capite conspicua est. Apud *Aremoricos* tanta huius testacei frequentia, ut abscedente æstu, magnos acervos è saxi colligant, & coquant. Quia papaver rubrum habet, pulmenta ex eo confecta, ac si minio tineta essent, conspiciuntur.

Græci

Græci crudas eius carnes edunt, quod appetentiam excitare, inprimis cum cæpis comestæ, credantur. Icones plurimas apud Aldrovandum vide. Nobis aliquot duntaxat exhibere visum.

ARTICULVS III.

De Cochleis.

Nomen.
Aldrov. l. 3.
c. 29.

COchleæ, Aristotele καχλία & καχλοι, quod πὲ ὄσσηκα κυχλοῖς μὴ habeant, Spartanis σήμελοι & σέσηλοι, Hefychio & Varino σελάτι, aliis παματία ab operculo, φερέσση & φερενύοι, seu domiportæ, χαμαιδύτοι, χαμαδολία, ἀχαδαμύδοι, &c. dicuntur; quorum tamen nominum quædam terrestribus potius convenire videntur.

Descriptio.

Descriptionem si attendas, Teucer animal esse sine pedibus, sine spinis, sine ossibus, testaceum, oculos nunc exerens, nunc retrahens, ad exemplum quæstionis ludicræ scribit. Siliceo, claviculatim intorto tegmine clauditur, quod vulgus testam, & volutam, Cochlearem testam Budæus, Cochleam synecdochicè Celsus, domum Sammonicus & Statius, calicem Plinius, κέλυφος Dioscorides, ὄσσηκα Galenus vocant. Sicam detraxeris hebetescere atque exspirare quidam aiunt, negant illi, qui circa initium Augusti exire, & novis super induci prodidere. *Capitis* figura carere, apud Albertum M. legimus. At Plinius equorum capitibus assimilavit, Massarius bovini præ se ferre figuram scripsit. *Cornua* quidam bina attribuerent, ut Plinius; quatuor nos, id est, magna duo quæ posteriora sunt, & minora totidem ferè in fronte, habere videmus. An *Oculi* dati sint disquiritur. Pro visu tentamenta proportionè puncti attrioris in summo corniculorum accepisse, tradit Scaliger. Careretis, & corniculis in quibus arenacea durescit, præterante iter, Plinius. Habere in summitate cornuum, & cum appropinquant, oculos in cornua retrahere, cornua in caput, & caput in corpus, Albertus. Os eis inest. *Dentes*, acuti, tenues præ-

duri, eiusque indicium, derosam à Plin. H. N. minimis earum vitem, dentibus car-nosum quid interiacet. *Promuscidem* etiam inter aculeum & linguam habent, & ori jungitur quasi ingluvies avium; à qua stomachus est, quem excipit venter, in quo situm est, quod papaver vocatur, mox intestinum continuum tendit simplex, originem à papavere illo ducens. *Saliva* quæ punctis acu vel stylo carnibus manat, myxa Græcis dicitur.

Quantum ad *Locum*, reperiuntur in mari, fluviis, & terra, quarum istæ sylvas & confita arboribus loca potissimum amant. Hyeme propter frigus nimium, æstate quod fervidum tempus reformident, in occulto delitescunt, suoque succo vivunt, nisi quid roris de cælo deciderit. Ideo Varro. Locus is (pro cochleis) melior, quem & non concoquit sol, & tangit ros. Locum mutare Ælianus prodidit, ad Propontidem calidam hyemare, ad Ægialum æstatem infumere scribens.

Rore *visitare* dixi, sed non solo. Sub noctem sæpissimè ad pastum exeunt, & tum post pluvias æstivas & autumnales accenso lumine à rusticis capiuntur. Plinius mirè caulem asphodeli in Campania prosequi & fugendo arefacere scribit. Theophrastus easdem inter ficorum genera recenset. Saginabantur apud veteres in vivariis. Instituit ea Fulvius Hirpinus in Tarquinensi paulò ante civile bellum, quod cum Pompeio M. gestum est, distinctis quidem generibus earum: quia & saginam commentus est, sapa & farre aliisque generibus, ut cochleæ quoque atiles ganeam implerent: cuius artis gloria in eam magnitudinè perductæ sunt, ut octoginta quadrantes caperent singularum calices. Macrobi seculo hæc saginandi ratio ignorabatur.

Inimicitias cum lacertis gerere apud Plinium legimus, cum laris avib. apud Ælium. Massarius ubi limax sit, neque suum esse, neque perdicem thia. ait. Sale super limacem piecto, rotū ferè liquefcere, & in aquā viscosam converti, Albertus M. prodidit.

De

Scalig. in
Arist. l. 1. de
plant.
Plin. H. N.
l. 11. c. 37.

Locus.
Arist. H. A.
l. 8. c. 13.
Plin. H. N.
l. 8. c. 32.

Varro R. R.
l. 3.
Ælian. H.
A. l. 10. c. 6.

Victus.
Plin. H. N.
l. 22. c. 22.
Theophr. l.
7. c. 24.


Plin. H. N.
l. 9. c. 56.

Macrobi.
Saturn.
l. 3. c. 13.

Plin. H. N.
l. 8. c. 39.
Antipat.

Cochlea cœlata.


Cochlea rugosa et umbilicata.



Cochlea Sarmotica.





Cochlea cœlata cum suo operculo.





Cochlea cylindroides alter.

Cochlea olearia.



Cochlea echinophora Rond.


Cochlea cylindroides prior.



Cochleæ operculum.

Limax marinus.





Cochleæ operculum.



Cochlea depressa.

Echinus spoliatus a suis spinis.





Echinus Spatagus, et Brissus.



Echinus idem in duas

partes

dissectus.





Genera-
tio.
Aristot. l. 3.
de Gener.
l. 11.

De *Ortun* non convenit inter autho-
res. Solas ex omnibus testaceis in coi-
tu coherentes videri, & vere ac autu-
mno prægnantes apparere, ex Aristo-
tele habemus. Gesnerus quoque Li-
maces coire, & ova parere candida,
magnitudine oculorum lucii piscis,
iisque incubantes mense Maio ali-
quando inveniri, audivisse se scribit.
Albertus, & Porta ex limo, & putre-
fcentibus aquis vel rore oriri, & ideo
breviore vita frui, Hyeme tantum o-
riri, quod Plinio placuit, vix verisimi-
le, cum easdem lactucis innasce testi-
tur, nos vicinæ sciamus. Testa detracta
hebetescere, & processu temporis in
aureliam transire, ut eruca, atq; im-
mobilem vivere, sed quidnam ex eo
animalis pennati oriatur, compertū
nondum esse, Massarii fide addimus.
Terrestres contractione & concus-
sione corporis moventur.

Vfus.

De *Vsu* earum in Cibis apud Ro-
manos constat, ex superioribus. An
verò boni vel mali sint succi, inter
scriptores non convenit. Celsus bo-
ni succi esse prodit, nec intus vitia-
ri; Galenus, etsi Græcis in mensa
frequentes, sed concoqui pertina-
ces, crassioris succi, & quæ ventri-
culo diutissimè immorentur, soli-
dus alimentum præstare, sed tardius
& paulatim concoqui. Archigenes
inter ἀσθμα, nutrientia, & syncopitica
exhibenda reponit: sed mendum,
cum Mercuriali suspicor, quod Ae-
tius, qui ad verbum transtulit coch-
leas omiserit.

Plinius nec veteres, nec recentes
ori gratas esse reliquit. Fluviales
& albas virus habere, ut & sylvestres.
Alexandrinis idè frequentiore
elephantiafin, quod crebro salsa-
menta, limaces, quidam & asininas
carnes comedunt, si Cælio Rhodi-
gino, & Galeno credimus. Mathiolo
quæ in apricis degunt locis, & odo-
ratis victitant herbis, iis quæ in opa-
cis & palustribus degunt, præstant.

Dioscor. M.
M. l. 2. c. 8.

Dioscorides terrestres stomacho u-
tiles esse, nec facillè corrumpi scri-
bit. Optimas Sardonicas, Africa-
nas, Aftypaleicas, & quæque in Si-
cilia ac Chio gignuntur, quæque in

Liguria Alpibus, pomatiæ, cogno-
minantur. Marinas facillè excerni:
fluviales virus olere; quæ vepribus
frutetisque glutinata coherant,
quas scifilos vocant, ventrem & sto-
machum turbare, addit.

Marcellus earum usum penitus
improbat. Apud Apilium lacte &
pulte pastas invenies. - In *Medicina*
frequens earum *usus*. In capitis do-
lore, caput præcisum de collo sus-
penditur. Earundem pinguedi-
ne capilli multiplicantur. Integræ
pro febris amuleto, de collo suspen-
sæ commendantur. Oculis caligan-
tibus Africanas combustas & tri-
tas. Marcellus Empiricus commen-
dat; auribus dolentibus, cum oleo
nardino aut rosaceo fervefactas A-
sclepiades; cum hordeo decoctas
Villanovanus. Cartilagine, car-
nem earum, glutinare, Hollerius
prodidit; nervos Dioscorides. Ta-
gautius emplastro ad maturanda œ-
demata adhibet. Sanguinis è naribus
fluxum concisæ ex aceto sistunt.
Cum melle & felle bovis mixtæ,
anthraces maturant & rumpunt.
Tritæ cum suis volutis hydropico-
rum aquas exsugunt.

Aqua ex Cochleis destillata, he-
cticam febrem ad uncias sex sumpta
tollit; maculas oculorum, cum fimo
lacerti, corallio rubeo, & saccaro de-
stillata, abolet: clavos & verrucas,
resectas, mense Maio vel Octobri
detracta & instillata sanat. Pol-
len de testis limacum inanibus con-
trititis fissuras manuum pedumque
inpersus tollit, &c. Plura vide in Al-
drovando.

Iam de *Differentiis* dicendum Differen-
tia. Multiplex autem ipsarum est
varietas, magnitudinem, figuram,
colorem, regionem, victum, vitam,
& alia, si spectemus, sunt nigra, al-
ba, ruffa, varinæ, nudæ, testæ. Ad-
hærent fico, lauro, asphodelo, car-
duis, aut foliis gregatim.

In mari rubro, maximam, testa
purpurea, cum spira in medio, mira
colorum varietate, inveniri, scribit
Ælianus. Sertum, inquit, dicens, *Ælian. H.*
summo artificio & ornatu contex-
tum,

tum, è floribus multiugis, viridibus, aureis, rubicundis, per æqua intervalla digestis. Gyllius tantæ se unam magnitudinis vidisse asserit, ut tantum vini caperet, quantum piscator exsiccare uno prandio posset. In Ægypti Nilo grandissimæ feruntur, vocales, ululantium expressa similitudine.

In agro Romano sunt quædam lupinis paulò maiores, quæ autumnò quorundam carduorum caulibus accervatim adhærescunt, si Mathiolo credimus. Minutæ fortè Plinio. Sunt & *Echinophoræ* oblongæ, quibus tubæ loco utuntur tubicines; *Pomatia*, quæ cancellum qui testas ingreditur, raditur, rarò excedunt, & in Tridentinis montibus, è Terra, hyeme, & frutetis, uncis quibusdam ferreis, propè fruticum radices, terra circumfossæ, eruuntur, præstantissimæque censentur.

Seseli, quæ sylvestribus frutetis & sentibus adhærent: & ex quibus quædam opere vermiculato à natura elaboratæ conspiciuntur: *Cavatica* in Balæaribus insulis quæ non prorepunt è terræ cavernis, neque herba vivunt, sed uvæ modo inter se cohærent. Minus denique vulgares, quæ adhærente operculo eiusdem testæ sese operiunt, & semper terra obruuntur. Circa maritimas Alpes quondam effodiebantur, fortè & hodiè. *A regionibus* sunt *Illyrica*, quibus magnitudo præcipua; *Africana* quibus fecunditas; *Solitana*, quibus nobilitas; *Sicula*, quæ modicæ, quoniam magnitudo duras, facit, & sine succo, *Astypalaica*, quæ laudatissimæ; *Linusia*, ab agro cui nomen lina est, ita dictæ, juxta Pytiuntem, medio inter Parianam coloniam & Priapum spacio; *Germana*, quas Vegetius in potionem equi prophylactica, admiscet. *Acerata*, quæ latæ & multifariam nascuntur. Et hæ quidem Terrestres sunt. Marinis accensentur; *Sarmatica*, *Calata*, *Olearia*, *Depressa*, *Rugosa*, *umbilicata*, *Echinophora*, *Cylindroides*, & lævi turbine obtusæ, addi his *umbilici* possunt.

Sarmatica, in mari Sarmatico in-

venitur. Dolium corporis mole æquat, cornibus arboreis cervum. Extrema cornua in orbiculos rotundantur, unionum instar splendentes. Cervice est crassa; oculis accensæ candelæ modo micantibus; naso obrotundo, & pilis felium ad instar obvestito; rictuoris magno, sub quo pender prominertque carnea moles, aspectu subhorrida. Quatuor nititur cruribus totidem latis & aduncis palmis.

In Dania se vidisse, fortè mentitur Theverus. *Calata*, Caragolo de-
mat, seu Scaragolo Hispanis, testa
est turbinata & satis longa, cælaturis inæqualis & scabra, intus lævi. Operculo superiore parte est non aspero, intus tuberoso, inæquali, & rubri coloris. Succum salsum gignit, & venerem stimulat. Testa in aceto macerata, superiore veluti cute vel crusta spoliatur, redditurque cochleæ margaritifera modo splendens, nitida & unionis modo colorata. Huic similis est Cochlea maculis viridibus Aldrovandi, nec non ea, quæ inter Turbinem & cochleam cælata tam mediam naturam habere videtur. Quæ hic exprimitur, operculo est miniaceo, miniaceis tuberculis, turbine violaceo infra, supernè ferrugineo. Cavitas inter turbines, viridi est colore.

Olearia nomen à Plinio inditum quod ea oleum decapularent, vel in
usus quotidianos haurirent. Rotunda
est, intorta, & adeò magna ut aque
quatuor libras capiat. Huiusmodi
aurifices, additis anfa & basi inurceos efformant.

Depressa, est altera parte plana, altera excavata in voluminibus, quæ initio parva paulatim crescunt ad foramen usque. *Rugosa*, rugas per transversum ductas, ita elatas habet, ut & striata dici possit. Colore est intus albo foris flavescēte, valdè fragili. *Umbilicata*, & quidem in medio, in satis insignem magnitudinem excrescit. Aliæ nigricant, aliæ corneo sunt colore, aliæ maculosæ. Ad cochlearum terrestrium quæ conglomeratæ feculiculi crassioribus caulibus adhæ-

rent.

Plin. H. N.
l. 9. c. 56.

Aldrov. l. 3.
c. 32.

Aldrov. l. 3.
c. 34-35.
37-38.

Echinus maritimus ferrugineus.

Echinomitra amethystini
coloris.

Tab. XIII.

Echini quantum gaus
Rond.

Echini species oblonga aperta.

Echinomitra Aldrov.

Concha

Margaritifera.

Concha imbricata Rond.

Concha Echinata.

Pina magna.

Concha Tridachner.

Concha squamosa.

Concha Pictorum.

Concha corallina.

Concha rugata.

Concha falcata.

Concha Longa.

Concha tenuis testis.

Concha uera cum animali.

rent; formam quam proximè accedunt. *Echinophora* aculei quibus tota conspersa est, nomen indidere. Operculo, succo, substantia, à parvo buccino non differt. *Cylindroides* pyramidem refert, pyri modo turbinata, magnitudine pugni, & punctis variis subcastaneis notatur. *Lævem turbine obtuso*, politam admodum Rondeletius facit. Testa est crassiorè, carnè minus dura. Frequentissimè circa Levinum insulam capitur. Hisce adde *Limacis marini* insolentem speciem, nec non Cochleam marinam aliam tuberosam, quorum Icones damus. *Umbilicum marinum* Bellonius lapidi rubro persimili tegumento rugoso & scabro occludi scribit, quodque solum inter Gallici Oceani turbinata politiciem admittat. Rotundiori hiat ore, edulisque est. Clavicula earum herbarum more, quæ sese arboribus alligant à dextra ad sinistram invertitur. Papaver in clavicula testæ continetur. Rondeletio *Umbilici* vocantur, quod præter foramen illud quo cochleæ saxis inhærent, quoque exerunt, alterum habeant umbilico admodum simile, quod profundum convolutionum veluti centrum est, vel circa quod anfractus Cochleæ convolvuntur, veluti circa *κεφάλιον*.

Duos imprimis apud Rondeletium habemus, quorum prior, superiore parte latior, mox in turbinem desinens, nigris, rubris, & albis tuberculis, corallorum omnium colorem & naturam referentibus, distinguitur: alter ciceris magnitudine, qui in spōgiis reperitur, veluti granulis rubri coralli æmulis conspersus est. Inter umbilicum & foramen quo corpus exierit, testam incisam habet, incisuræ operculi vice sunt.

ARTICVLVS IV.

De Echinis.

ECHINUS, quem quidam cum Echeneide pisce perperam confundunt, Græcis *ἐχινός*, vel *δοτό* ἢ *ἐχεν* *ἐαυτοῦ τῶν σκευῶν ἀφανῶν ὁσίων*, vel *δοτό* *μὴ*

διωκτῆς ἐχέτω *ἡ δὲ πὰς ἀνάγκη ὁ ἐστὶν ὁ ἀ-* Nomen.
κατέμνητο, quod teneri ob aculeos non possit, dicitur. Quidam Car- Descriptio.
dum marinum, nec non Erina-
ceum vocant. Spinofus ergo est piscis. Mirum est quod de iis Aristoteles reliquit. Eorum scilicet corporis partes dissectas coire rursus & redintegrari. Idem apud Ælium & Philem invenies. Spinæ ipsis propedibus sunt: his ingrediuntur & volvuntur in orbem. Hinc eos sæpè detritis aculeis invenias, quod Aristoteles & Plinius prodidit. Agilius & celerius moveri qui sunt cibo idonei, vel exinde colligas, quod semper aliquid algæ suis implexum spinis gerant. Imminente tempestate sese affigere aut harrena saburrare, ne à fluctibus excuterentur, inde procellarum nautis præfagia, ab Oppiano, Plutarcho & Plinio creditum: at Bellonius frustra hoc credi prodidit, quod multis promuscidibus instructi, à fluctibus volutari non possint.

Sunt ex illis quidam *ἡγεμονί*, seu *Vfus* cibo inepti; sunt tamen quorum & in *Eduliis usus est*. Nullo enim tempore ovis carent, ut Aristoteles prodidit: maximè tamen pleniluniis diebusque tepidis pleniores redduntur, eos si excipias, quos Pyrrhæus fert Euripus, qui hybernis mensibus meliores censentur. Exiguum illudque humidum nutrimentum præbent, Mnesitheo aut- Galen. l. de attenuante victu.
thore, sed quod Galenus stomacho commodum esse existimat. Ventrem deiicere, omnes ferè scriptores annotarunt; magis eos qui circa Cephaleniam, Icariam, & Hadriam nascuntur, quia amarescunt, minus, rubicundos, melinos, crassiores, & qui cum raduntur, lacteum quiddam emittunt. Plinius secundus jus eorum multis verbis commendat, quo vocabulo aquam internam esse intelligendam, Gesnerus putat. Laco apud Athenæum unum in os immisum una cum testa dentibus comminuit: nostri, inquit, Dalechampius lapide, testam frangunt, & flavam

five croceam partem, id est, ova, edunt, de quibus ita Perottus. Scinditur Echinus levi percussu, hirta testudo in duas partes dividitur: abjicitur altera, altera verò leviter aqua abluitur. Decidunt sordes, quæ in iis pro visceribus sunt: remanent quinque partita ova, subrufa, ad stellæ imaginem formata. Hæc cruda sumuntur, sapore non iniucundo, quamvis nescio quid amaritudinis habeant. Cōditos mense Decembri olim, Palladius auctor est.

Quantum ad *usum Medicum*, *venenatos* quidam prodidere, Arcefilaumque Batti Eudemonis F. cum in lethalem morbum incidisset, marino Echino in potionem à Learcho sumpto, mortem obiisse, apud Plutarchum legimus: quod tamen apud nullum alium invenies. Testæ crematæ cinis, Dioscoride teste, *sordida ulcera* expurgat. Eadem contusæ & ex aqua ilitæ *luxuriantem carnem* comprimunt, & incipientibus *panis* resistunt. Ad *capitis manantia ulcera* valere, Rondeletius auctor est. Ad *abortum* eundem prodesse Aëtius prodidit.

Contra *urina stillicidium* valere Paulus Iovius reliquit. Quippe, inquit, qui frigiditate maris præalti, in quo degunt, (sexaginta enim aut etiam amplius passuum gurgite oriuntur) ipsi quidem exigui sunt, sed aculeos grandes duosque gerunt. Causa magnitudinis est, quod incrementum corporis in ipsos convertitur. Cum enim parum caloris obtineant, neque concoquere possint, multum ob eam rem habent excrementi: aculei autem & pili, & reliqua generis eiusdem excremento nascuntur. Duri verò & rigidi penè lapidis constant propter frigus. Ad *secundas expellendas*, Hippocrates tres tenuiter tritos in vino odorato propinat. *Alopeciam*, cinis cum adipe porcino vel ursino sanat, &c.

Hippocr. l. i.
de morb.
mulier.

Differen-
tiæ.

Differentia Echinorum sunt variae. Sunt *Toronenses*, qui circa Toronem nascuntur. Candidi sunt, & spinis & testa, & ore, augenturque forma productiore quàm cæteri, est-

que iis spina parva, nec rigida, sed mollior. *Euphratenses*, quos Eratosthenes, ut est apud Strabonem, *Strabo Geogr. l. 16.* in insulis apud Euphratem, miræ magnitudinis esse prodit, alios pileis maiores, alios *δυνατὶ λυγρῶς*. In mari Indico facilè congiuntur capiunt, si Æliano adhibenda fides. *Balthici*, qui instar magni mali sunt, & in mari Balthico inveniuntur. Duros esse, punice ferè coloris, & spiculis ademptis maculosos, Gesnerus prodidit. Circa Daniam quoque & Norvegiam habentur. *Fluviales*, ut Hermolaus & Massarius ex Paulo Ægineta prodidere. *Purpurei* mixto virore, quales in scopulis quibusdam maris mediterranei aqua contactis, apud Antii reliquias, & juxta Baias, reperiri scribit Perottus, tam grata oculis varietate, ut, si colores durent, nulla esset cum gemmis comparatio, sed mortuo pisce colores tabescunt. *Agiles*, qui velocius moventur, nec sunt edules. *Ἀεζωπὶ* inde dicuntur. Calidiores quidem sunt, sed quia voraces iidem, & præcopia ingestorum cruditatem colligunt, idè in cibis non veniunt. Bellonio si credimus, maiores aculeos habent, sed crassitie minores sunt, vixque grandis gallinæ ovum magnitudine excedunt. Diversa in eis colorum varietas. Sunt omninò nigri, albi, vitrei, ruffi, flavi, cyanei. Quidam purpura splendent, subinde circumagentibus se igniculis, micantibus ad aculeos scintillæ modo. *Ovarius*, ut Hermolaus vocat, quem Rondeletius ita descripsit. Forma eius in rotunditatem conglobata est, dempta una parte parum compressa, in qua os est rotundum, quinque *dentibus* incurvis, intus cavis, & in idem punctum coeuntibus munitum: ii quinque maxillis inter se connexi sunt, quæ ab ore intus erectæ, ex acuto in latum tendentes, & ambienti calyci non continuæ. Inter dentes interna *caruncula* quædam est, quæ linguæ vice est; mox iungitur *gula*, quæ in *intestinum* desinit longum, per testam stellatim dispositam, eius tenuibus fibris

bris suspensum, tandem in parvum foramen terminatur. Hoc foramen ad egerenda intestina destinatum est, ex adverso oris situm, ita ut os in terram versum sit, excrementi foramen supra habeatur, Partus enim ex imo petitur, unde fit ut os ad partum sit versum, excrementum vero superius parte prona testæ contineatur. *Excrementa* rotunda sunt exiguarum pillularum instar. Qualis intestinorum talis ovorum ordo est. Nam inter nigrum id quod carnis vice est, & intestinum ova flava cernuntur quæ sola eduntur cruda.

Testa tota intrinsecus foraminibus parvis plena est, per quæ movendi facultatem *nervi* aculeis supeditant: Extrinsecus in exigua tubercula eriguntur aculeorum cotylem excipientia, vinculo, membranula, scilicet, obligata, ut in orbem moveri possint. Talis radii cum brachio articulatio. Aculeorum igitur caput cavum est, & in aculeum illi desinunt. His in gyrum moveatur.

Spatagus & Brissus prout à Rondelietio describitur, vix à cordis figura recedit, aculeis parvis & raris septus. Os dentibus caret, verum maxilla inferior superiore prominentior est, ad hauriendum aquam arenamq; accomodata. His enim & luto vescitur. In interiore testa intestinum est convolutum, aqua & arena plenum, neque ova, neque nigrum illud continet, quod carnis loco est. Rari sunt.

Echinometra, quam cum Plinio, spinas longissimas calycem minimum habere Gillius putavit, cum Aristotele Rondelietius & Bellon. calycis potius magnitudine alios superare, crediderunt. Ille eius magnitudinis exhibet, ut ambabus manibus quaque versum extensis vix capipotuerit. Hic in Insulis mari Ægæi ita profecisse vidit, ut ad duorum pugnorum crassitudinem extuberarent. De cætero, pelagiæ sunt, minimis aculeis præditæ, brevibus & obtusis interceptæ spiculis, colore ad extrema albicantibus, ad radices

liventibus, & ex purpuræa nitentibus. Parte prona planæ, supina rotundæ visuntur.

Aldrovandus quatuor exhibet, *Prima* est aculeis non admodum longis, coloris tota ferruginei. *Altera* spinis denudata, extrinsecus scabrosa, coloris eiusdem. *Tertia*, magnis longisque aculeis insignita, coloris tota amethystini. *Quarta*, omnium maxima, quæ in Thyrræno & Adriatico mari nascitur, tantæ capacitatis, ut quinque aquæ libras capiat, in superiore parte gibba & rotunda, inferiore plana. Circumferentia erat duorum dodrantum & palmi. Calyx evidenter in parte anteriore apparebat albus, in quinque ceu ventres, ut in Melopeponibus divisus, quorum singuli tres habebant tænias, quarum media erat tanquam futura, quæ partes separat, & facillimè aperitur, aperta figuram serræ refert. Binæ illæ aliæ tæniæ sunt colore quasi castaneo, crebris foraminibus pertusæ, quæ tamen nisi expositæ aëri, non apparent, quintuplo majores ea futura. Dentes habebat qui nos, concavos, figura triangulari, &c.

Est tandem *Echinus minimus* pelagius, spinis grandibus, longis, & præduris, modo penè lapidis. Plerumq; un Judeo Italis vocatur, quod perpetuò nigrescat & sordescat. Testam juglande majorem non promit, estque reliquis omnibus vividior. Nā si supinum ponas, mox suas spinas deprimit, & se in pronam partem convertit. Gignitur in alto gurgite. Belonius ita hoc genus descripsit. Plures habet quàm alii proboscides: idcirco citius repit, firmitusque hæret. Ova non fert, sed sanguineum quiddam nigrum saniei simile, quo manus cruentat. Dentes verticillimodo habet quinos, circulari ordine dispositos, quibus algas, saxa, & conchyliorum testas arrodit. In interna eius parte multos nervos annexos cernas: ex quo indigenæ coacervatam dentium congeriem, ita cum nervis exficari sinunt, ut annuli vice ad signandum panem utantur. Refert enim quinquefolium, vel

quippiam simile affabrè delineatum. Ventrem in quinque partes distinctum habent, quæ ab oris verticillo testæ appensæ, ad foramen excrementi coeunt, sed disunctæ sunt, & quasi interventu liminū discriminantur. Totidè promuscides habet Echini, quod in testis foraminulis pertusis apparent. Sunt enim ultra sex milia in quolibet.

Ad hunc referri potest, ille qui in *rubri maris* littore semipedem latus, prona parte planis, superiore gibbus, paucioribus ac minus frequentibus spiculis præditus à Bellonio visus est; nec non ille maris rubri aculeis longissimis ferrugineis, ad rubrum vergentibus, cuius pictura Castelleto Genuensi debetur.

Quem in quinto genere *Rondeletius* reposuit, saxo inhaerentem, calyce quoque est parvo, spinis pro corporis ratione longis & duris, quo ad urine destillationes felicissimè idem usus est. Idem est cum Echino Aristotelis, quem in *Historia Animalium* describit.

Arist. H. A. l. 4. c. 5.

ARTICVLVS V.

De Conchyliis, & quidem Bivalvibus.

PUNCTUM I.

De Conchis.

TAB. XIII.

HActenus de Echinis, sequuntur Conchylia, quæ vel sunt *Bivalvia* seu *dissexæ*, vel *Univalvia*. Ad illa pertinent, *Concha*, *Chama*, *Ostrea*, *Pectines*, *Musculi*, *Mytuli*, *Tellina*, *Balani*, *Pholades*, *Solenes*, *Pinna*: & *Concha anatifera*. *Concharum* plura sunt genera, quæ ad *Asperas* seu striatas rugosasque & *Læves* redigi possunt.

Aldr. l. 3. c. 41.

Ex *Asperis* est 1. *Margaritifera* quæ & *Indica* quod apud Indos; apud quos *Βέγγε*, dicitur, plurima nascatur, & *Mater perlarum* dicitur. *Androstenes* apud Athenæum in Indiæ uavigatione ita describit. *Ostreum* aspectu pectini simile, concha non striata sed plana, spissu, (hirsutam *Echinorum* modò malè *Plinius* red-

Athen. l. 3.

didit) non utrinque aurita, pectinis modo, sed una tantum parte. In eius carne gemina concrevit, ut in suilla grando: modò colore adeò similis auro, ut cum eo collata non facillè internoscatur, modò argentei coloris, modò omninò alba, & piscium oculis similis.

Multi earum genera *Plinius* recenset, cuiusmodi sunt, *Pentadactyli*, *melicembates*, *echinophoræ*, &c. Interdum tam grandes in India reperiuntur, ut referant inventam in mari insulæ *Borneo*, cuius caro pondus septem & quadraginta librarum pendebat. Sunt quædam totæ argenteæ: quædam colore rubicundo flammeo micant.

Carnes ab Indis quandoque crudæ, quandoque assæ comeduntur. Ex testis varia, ut cistæ, pocula, cochlearia, scipiones mulierum, & rabulæ lusoriæ formantur. Inde mulieres armillas & monilia ex illis gestant.

Vfus.

De *Margaritis* in *Historia Naturali fossilium* agemus.

2. *Imbricata*, seu imbricatim undata, sic dicta, quod testa ad undarum sese attollentium similitudinem distincta est. Græcorum vulgus *Aganon*, Calojeri Arabiæ *Tridacnem* vocant.

Aldr. l. 3. c. 43.

Est dura, carne concoctu difficili. Quæ *Tridacna* *Plinio* dicitur, est pedalis longitudinis. Utraque testalibras medicas quindecim pendebat. Eo loco quo sibi invicem cōnectebantur, singulæ duos digitos per transversum crassæ erant. Allata erat *Aldrovando* ex rubro mari. *Tridacna* dicitur, quod nonnisi tribus vicibus deglutiri possit.

Descriptio.

3. *Striata* cui striæ percurrentes nomen dedere. Varia harū sunt genera. Albæ sunt, nigricant, flavescunt, per ginglymum colligantur. Est quædam *longa*, ovi figura, testis multum cavis, canaliculis parum profundis. Est & *pectiniformis* tota ex cinereo lutescens, fasciis tribus ochreis ornata. Est & extra ferruginea, intus albo, & purpureo violaceo varia, in qua animans luteo, cæruleo, & rubro varium.

Est &

Est & *Candida* ac admodum lucida: fasciam in medio habens latam castanei coloris, cuius medium percurrit linea castanei coloris valde saturati.

Aldrov. l. 3.
c. 45.

4. *Echinata*, quæ pectini similis est, testis admodum concavis, striatis, in ambitu incis. In striis sive exochis eminent aculei frequentes, incurvi, certis intervallis à se diffiti. Unioniones in ea reperiiri testatur Plinius. Nam & Iuba tradit, Arabicis esse cocham similem pectini insecto, hirsutam Echinorum modo, ipsam unionem in carne ipsa esse grandini similem.

Plin. H. N.
l. 9. c. 35.

5. *Squammosa*, quæ striis seu lineis semicircularibus, squammarum in modum est exornata.

Aldrov. l.
3. c. 47.

6. *Longa*, cuius duas species Rondeletius ponit. Unam colore vario, in medio albescente, intus cum lævitate candido: Alteram, testa alba, aspera, lineis multis distincta, quam Plinii longam esse putat. At Aldrovandus veram Plinii longam se exhibere credit, colore extra albo fuscoque variam, intus vero roseam, animante suo prægnantem. Idem aliam exhibet, parte quæ replicatur, foramina multa, ordine disposita habentem, quæ à natura fortè, ut aer ingrediatur facta sunt.

Aldrov. l. 3.
c. 48.

7. *Pictorum*, quæ ideò ita vocabitur, quod testæ eius pro conficiendis coloribus raderentur. Crassitudine plurimum excedit, & florem foris habet. Reperitur maximè circa Cariam. Aldrovandus unam exhibet ex Rondeletio colore Cinnabaris, aut Sandarachæ, figura Spondylorum aut minorum Ostreorum.

Aldr. l. c. c.
40.

8. *Corallina*, quæ quod Corallum colore imitetur ita dicitur. Externa testarum parte pectinem refert: sed lineis est aspera, tuberculis rubris inæqualis, intus lævissima, candidi marmoris colore. Carnem habet duram, odore viroso, sapore falso. Post diutinos Austri flatu, & caniculæ exortum in littus eiecitur.

Aldr. l. 3. c.
50. & 51.

9. *Rugata*, quæ lineis multis & e-latis, per transversum ductis rugata est: testis valde spissis, coloris intus

argentei, quæ per ginglymum articulantur. Exiis Spherulæ precum & dentiscalpia conficiuntur.

Ad hanc pertinet *Conchula rugata Rondeletii*, quæ à latere ad latus multas veluti rugas sparsim & sine ordine habet, Testæ sunt depressæ, colore vario. Labra testarum crassæ & tam arctè cōnexa, ut sine vi non aperiantur. Diphilus carnem copiosum bonumq; succum gignere tradit.

10. *Rhamboides*, quæ veteribus ignota videtur, quod testa sit musculorū marinorum testæ simili, *musculū striatum*, Rondeletius vocavit. Tota concha nigricat. Rara est, quia in alto mari degit, duramq; carnem habet. Bellonius Balanum Græcis dici putat, sed falsò ut apud Rondeletium videre est.

Ex Lævibus est *Concha Galades, Nigra*, Aldr. l. 3. c. 60. *Fasciata*, *Crassæ testæ*, & *Tenuis testæ*. *Galades* sunt maximæ & lævissimæ, intus verò candidissimæ, non admodum concavæ, caro ipsis alba, dura, contactu difficilis, succum crassum gignens. Satis rarò capiuntur. *Nigra*, hiæce est similis, nisi quod intus & foris nigricat. *Fasciata*, testa est admodum lævi, dura, & marmoræa. Nomē hoc obtinuit, quod quinq; veluti fascias latas à latere ad latus ductas habeat. Harum plures Aldrovandus exhibet: *Crassæ testæ*, à galadibus & Chamis asperis, non tantum testarum crassitudine, sed fasciarum ratione, quæ in illis rariores & latiores sunt, & in his plures & unica tantum linea constātes. Aldrovandus aliquot earum icones exhibet, interque has clathratam maiorem & minorem. Ex ustis & in cinerem reductis præstantissimum antispodium fieri scribit Rondeletius. *Tenuis testæ*, conchæ, extra sunt colore fædo, lutulento cinereo, intus argenti modo resplendent.



PUNCTUM II.

De Chamis.

T A B. XIV. *Aldrov. l. 3. c. 58.*
Nomen.

Chamarum nomen à verbo χαῖν, ut Gesnero placet, derivatur, inditumque huic concharum generi, seu quod hient, seu à capacitate, χαῖν Varino est χαῖμας, id est, oscitatio, unde Plinius, Conchas Margaritarum pandere se dixit quadam oscitatione. Galli flammæ & flammatas vocant, Itali Peverazas, non tã quod sapore sint piper redolente, quam quòd pipere condiantur. Spartianus Ostreas & Lithostreas cum dixit in Heliogabalo Chamas tracheas & Chamas leas intellexisse Hermolao creditur. Quidam Hiatus dixere, Galenus verò Concham pro Chama usurpavit. In genere eas si spectes, vix in tanta varietate constat, quomodo à conchis & quibus notis differant, hoc unico excepto quod Chamæ id peculiare habent, quod plerumque in littore hiantes inveniantur, unde earum nomen Ion Chius *Sorò ἡ κεχυνέται* derivat. De cætero ita *Ælian. H. N. l. 15. c. 12.* *Ælian. de iis.* Chamæ marinæ & variæ & multiplices sunt: aliæ asperæ, aliæ leves: quædam digitorum compressu confringuntur, aliæ vel saxo ægræ conteruntur. Quædam ipsarum nigerrimæ sunt, uonnullæ argentei coloris similitudinem gerere videntur, aliæ utroque colore mixto insignes. Ac quemadmodum earum est varium & multiplex genus, sic multas & diversas sedes habent. Quædam enim in littoribus dispersæ jacent in arena, vel in limo quiescunt: nonnullæ sub algam subjiciuntur, aliæ saxi mordicus adherent.

Locus. *Æstivo tempore cum incipit mæsis, in Istrio mari gregatim natant, & leviter feruntur, cum ante id tempus sua sibi mole graves efferrî non possint. Contra, ex tranquillo mari mirifica voluptate afficiuntur, & Favonii mollibus auris afflari gaudent: eamque ob rem in latebras abditæ,*


& in suis conniventes testis, cum à tempestatibus mare conquiescere sentiunt, & Favonium flare, tum relictis sedibus, ad summum maris natant, & apertis testis eminent, & quiescentes ventum expectant placidum ac secundum: qui si contigerit, alteram concham substernentes, alteram erigentes, hac pro velo, illa pro navi ad navigandum utuntur, ut si eas procul videas, sic per tranquillum mare natantes, classem navium existimes: Quod si navem ad se accedere sentiunt, aut bellæ impetu, aut valentioris piscis metu percussæ, contractis uno impetu testis, subito delabuntur, Carnem album & urinam ciere Athenæus scribit: at Dioscorides urinæ non meminit. *Dispersuntur in Laves, & Asperas, Aldrov. l. 3. c. 65.* *Aspera χαῖμας τραχέαι* Græcis nomen à testarum externa parte, qualineas multas obliquas & cavas, ideoque musco oppletas habent traxere. Belonius valvas tornatas & orbiculari ferè rotunditate habere dixit, Testas tam duras ut non nisi valido ictu confringi possint. Labra haud quaquam in gyrum denticulata, sed Mytulorum more lævia. Movetur ut limax, & quia fortibus spondyliis constat, iis testas movendo per arenam lumbricorum more, conscendunt. In arena circa littora reperiuntur. Carnem ipsorum Icesius duriusculam, mali succi, parum nutrire, facile excerni, marisque, salsuginem referre pronuntiavit. Diphilus stomacho gratam esse addidit.

Leves Chamæ, Chameleis Græcis Aldr. l. 3. c. 59. dictæ, testa duplici constant, quæ tam digitorum compressu facile frangitur. Conchis lævibus, quæ Galades dicuntur similes sunt: ut tantam in Oceano magnitudinem adipiscuntur, ut quaternorum digitorum latitudinem, senorum verò longitudinē exsuperent. Intus & foris candidissimæ sunt, Caro quoque intus candida, inque ea duo foramina cernuntur: alterum os est, alterum excrementi meatus, utrumque sinuosum, ut dilatari & constringi possit: hoc ad attrahendum

Chama aspera Bellon.




Chama laevis Rond.



Tab. XIII.


Chama nigra Rond.




Chama glycymeridis.




Chama Teloris.




Ostrea marina.




Ostrea marina Rond.




Ostrea siliquaria Rond.




Ostrea gaidaro poda.




Spondylus Aldro.




Spondylus Aldrou.



Pecten.




Pecten Versicolor.






Pecten minor castaneus cum animalj.



Pecten asper.



Pectines alij Aldrou.



Pectunculj.



hendumaquam, illud ad reiiciendū excrementum. Habent & μήκωνα, ut conchæ cæteræ. Latenter magis protuberante semper hiant. Facile à calido tanguntur: quomobrem mox hiantes sua labra pandunt, & facilius exanimantur, si longius secesserint à mari. In arena cum Tellinis capiuntur. Moveri à se, & sedes in littore mutare comperiet, qui eas in vasa aqua pleno immerferit; quod Veneti ut minus exanimis fervent faciunt. Non elotæ propter arenam respuuntur: recentes elotæ & adhuc vivæ Tellinis non sunt posthabendæ. Differentias earum varias Aldrovandus posuit, quem in Iconibus vide.

Aldr. l. 3. c. 60. Sub Lævi comprehenduntur, *Piperata*, *Nigra Bellonii*, *Nigra Rondeletii*, *Glycymeris eiusdem*, & *Peloris*.

Piperata Bellonii *Biverone* quibusdam Italidis dicitur, non tam quod ob pipæris saporem sitim excitet, quam quod perpetuò bibat, neque diu sine aqua servari possit, atque in forum allata & aquæ immersa geminam atque oblongam exerat ligulam, ut cochleæ modo perpetuò sitiens moveri percipiatur. In cœno degit, & usque adeo tenues testas habet ut transpareant. Cardinibus non junguntur invicem infarctis, sed nervo ut ostrea. Labra habent lævia magisque in rotunditatis ambitum circinantur quam Tellinæ.

Aldrov. l. 3. c. 61. *Nigra Bellonii* robore testæ cum aspera faciliè certat: nec crenas ita profundas in labris habet. *Pelorida* quoque maior est & dulcior. Ideo glycymeridem putat.

Aldrov. l. 3. c. 63. *Nigra Rondeletii* est testis oblongis, lævibus, duris, spissisque ac veluti marmoreis. *Glycymeribus* sapor carnis dulcis nomen imposuit, facitque earum Macrobius mentionem. Sunt maiores quàm *Pelorides*, testa oblonga mytolorū fluviatiliū testæ modo, sed duriore & spissiore, rugosa, non tamen ob id aspera, ex albo rufescente, carne & succi bonitate *Peloridi* similes. Sunt qui *Glycyamaridas* vocant. Aldrovandus *Pe-*

lorides maiores *Athenæi* esse credit. Frustra verò *Corycia* in Plinio ad *Chamas glycymeridas* referas. Macedones enim teste *Ægeandro*, conchas asperas κορύκας ut *Athenienses* κρείκας, id est, arietinas vocant. Macrobius in cœna adyciali *Lentuli* appositas fuisse dixit.

Pelorides non tam à luto, (scribi de-

beret πηλὰ εἰδες) quam vel à magnitudine: πελώριον sive πέλωρον significat τὸ μέγα καὶ τεράστιον, id est magnum & prodigiosum; vel à *Peloro* Siciliae promontorio, juxta quod optimæ reperiuntur, nomen sortitæ sunt. *Athenæus* eas uno loco ex sententia fortasse *Phililii* à *Chamarum* genere segregasse videtur. Duabus conchis constant, ut *Rondeletius* reliquit, quæ nunquam ita iunguntur, quin semper hient seu vivo seu mortuo animali, etiam sine calidi contactu. Eæ oblongæ sunt & læves, ex albo purpurascens, in medio connexæ. Caro intus alba est, quæ etiam contracta, tota testa vix capi potest, extenta longior multo est, rotunda, spissa, pudendo virili non absimilis, digiti medii crassitudine. In extremo altero foramina duo apparent, alterum oris est rotundum, alterum excrementi. *Bellonius* à calcinellis differre scribit, quod turbinatio-ri & grandiori corpore constet. *Calcinellæ* enim, inquit, compressiores sunt forma testa traslucida, ac multo quam *Chemæloij* teneriores. Media autem est inter asperam lævem constitutione & natura. Non enim ita horret ut aspera, neq; ita glabrescit ut lævis, albo præterea ac fulvo emblemate distinguitur.

Eius caro durior est, quam *Tellinarum*. *Diphilus* copiosum bonūque succum gignere tradit. Labra earum, addit idem, sunt crassiusculæ, & tam arctè connexa, ut nisi vi aperiantur, & sæpe etiam rumpantur, priusquam os aperiant. Hucusq; *Bellonius*.

Macrobius.
Saturn. l. 5.
Aldrov. l. 3. c. 64.

Bellon. de
Piscib. l. 2.

Vfus.

PUNCTUM III.

De Ostreis.

TAB.
XIV.
Nomen. **T**estaceum quod Latini Ostreum
& Ostream dicunt, Græci vete-
res ὄστρεον, & ὄστρεον, vel ὄστρεον, vel
quasi ὄστρεον quod testa velut ostrea tegat-
ur; moderni ὀστρείδιον, Psellus ὀστρείδιον,
Hesychius ὀστρείδιον, vocant. Invenies
tamen ὄστρεον pro toto testaceorum
genere sumi. Unde Suidas Echium
παλαίσιον τὸ ὄστρεον tradit.

Descri-
prio. **Formam** quod spectat ita de iis
Aldrovandus. Quod ad formam
Aldr. l. 3. c. 66. Ostreorum attinet, Bellonius inter
bivalvium genera hoc peculiare ait
esse ostreae, & pectini, ut partem ha-
beant pronam & supinam, quarum
altera sit turbinatior ac prætumida,
altera verò plana, Plinius alibi ori-
ginem atque genituram conchæ,
quæ Margaritas fert, esse ait, haud
multum Ostrearum conchis diffe-
rentem.

Alibi quoque Thethya ostreae si-
milis esse scripsit. Et Hegesander a-
pud Athenæum hepatum piscem in
capite duos lapides habere, colore
splendoreque ostreis similes. *Capita*
ostreorum generi nulla eodem Plinio.
Galenus ostreis pilos esse negat,
sed melius Plinius oculis carere o-
streas omnes dixit. Eidem præterea
ostreorum præcipua *spondylo* (caro
hic interior) brevifunt, atque non
carnoso, nec fibris lacinioso, ac tota
in alvo. Perottus spondylum in O-
streo esse scribit, callosum illud ro-
tundum, albicans, quod intus habe-
at in medio, à similitudine spondyli,
quod nos verticulum dicimus appositum
fusus, ut melius nendo vertantur. Nā
reliqua caro circumspersa *Lacinia* di-
citur. Quod *ovum* vocatur. Wottonus
non semper, sed vere habere o-
streas asserit: moxque procedente
tempore minui demumque totum
ferè aboleri.

Aristoteles illud in altera tantum
parte eis fieri voluit, idemque esse
quod Echinos habere alias dixerat.

Eodem autore Ostreae meatum
habent, quo excrementum secedat
parte superiore. Idem Aristoteles *tes-
tas* eis tribuit scabras, alibi etiam
labra crassa. Et Plinius quædam fili-
cum duritia tegi, ut ostreae & conchæ
dixit.

Quantum ad *Generationem* nullum. Genera-
tio:
eis sexus discrimen, ut Plinius & Op-
pianus prodidere: ideo putrescente
limo proveniunt, aut spuma circa
navigia diutius stante, defixos-
que palos, & lignum maximè: sed
& in cavernosis & petrosis aquarum
dulcium adventu gignuntur. Obti-
nere tamè ex putri producta aliquid
prolificum quamvis non coeant, a-
pud Aristotelem habemus, Hinc & Arist. de ge-
ne. l. 3. c. 11. Plinius. Nuper compertum in O-
streariis humorem ostreis foeticum
lactis modo effluere, & Perrus Gyl-
lius, Bizantinos ostrea ferere & eo-
rum quasi lac seminare; à spectata
fide esse accepisse scribit. Grandescunt
syderis ratione maximè, sed priva-
tim circa initia ætatis multo lacte
prægnantia, atque ubi Sol penetrat in
vada. Sydus illud Luna est, quæ plena
corpora humentiora reddit, adeo ut
nec prudètes Chirurgi trepanotum
aperiāt, quia tū cerebrū magis dif-
fundi, & totam cranii capacitatem im-
pleri est. Nullū eisdem sensum inesse a-
pud Plinium legimus. Auditum esse
nō est verisimile, inquit idē, sed ad
sonum se mergere solent, idē & si-
lentium in mari piscantibus. Tactus
tamen omnibus. Carere & motu A-
ristoteles prodidit. Aqua marina &
limo *pascuntur*, quin & rore, quare
ἐρσηντα Ostrea, id est, roscida, Oppia-
nus dixit.

De Loco in differentiis agatur: hoc Locus,
tamen addere placet, non tantum in
pelago, dulcibusque aquis, & ubi
plurimum influunt amnes reperiri:
sed & in petrosis, carentibusque aqua-
rum dulcium adventu, sicut circa
Grynium & Myrinam, quod apud
Plinium legimus. Mirum verò quod
apud Athenæum habetur, posteaquā
Appameam Phrygiæ urbem, Mithri-
dati belli temporibus à motu terra
disces-

discessisset, lacus, qui ante ibi nulli comparuissent, repente extitisse, fluviolque & fontes novos ex iisdem locis terræ motu excitatos fuisse, veteresque multos exaruisse, ac nimirum plurimam aquam tum dulcem, tum salinam, tametsi ab eis locis mare longè abesset, ex visceribus terræ sic emanasse, ut tractum universum illud tum ostreis, tum aliis piscibus marinis refererint.

Infectos sibi Cancros marinos & stellas marinas ostrea habent. De illis author de natura rerum ita. Cum testas aperit ostrea ut clementioris auræ deliciis gloriatur, cæcer infidias ei repentinas præterdit, & lapidē inter eius testas proicit, ne illas cōjungere possit, & si carnes ostreæ comedit.

Vfus. *Vsum in Cibis* habere nemo non novit, crudas, elixas, assas, omniumque testatorum nobilissimas, Bellonius

Galen. 1. prodidit. Legimus tamen apud Galen. 1. de boni & mali succi li. 3.

prodidit. Legimus tamen apud Galen. 1. de boni & mali succi li. 3. humoremque crassum, crudum, & frigidum gignere. Crudæ salsum humorem de se fundunt, ideò alvum movent, & turgentiam excitant, Elixæ, humore suo destitutæ, murmura excitant, secundum Iovium, secundū Iulium Alexandrinum, ob multam carnis molitiem concoctu faciliores sunt, ac pituitam potius quàm crudum humorem procreant. Assæ, (assantur autem in craticula addito aromate multo ac salis momento, sed testis suis non avulsæ) minimè noxiæ sunt. Plinius crudas stomachum unicè reficere, fastidiis mederi, ac leviter alvum mollire scribit. In pontificali cœna apponebatur, teste Macrobio, echini initio & ostrea cruda. Qui modò edere eo volet, Lunæ motum observet; hoc est, ea decrescente, ea edas: senescente longè sunt deteriora.

In Medicina invenere quoque locum. Adhibentur ex mulso & pipere cocta contra tenasum. Gariopontus hydropicis dedit. Usta ad labiorum ulcera & alia prodesse, apud

Myrepsum habemus. Cinis dentes splendidiore efficit. Trita & optime lævigata ulcera rebellia exsiccant, quod Galeno debemus. Cinerem veteri urinæ misceri adversus eruptiones in corpore humano & ulcera manantia Plinius reliquit. Marcus Empiricus eundem, si in morem salis pane colligatur & voretur, statim ad removendam narium gravedinem proficere scribit. Rondeletius denique experientia comperit, ex testarum cinere factam aquam lixivam, ad minuendos tumores *οιδημάτων* pedum & genuum plurimum cōferre. Exsiccatur, enim, inquit, multum digerit, & calefacit, si post ustionem cinis non lavetur.

Differentiæ Ostreorem sunt variae, quæ a loco & colore sumuntur. Locum si spectes, sunt 1. λιμνοσφρα ut Aristoteles vocat, quæ in stagnis marinis nascuntur. Rondeletius ea ex duabus testis componi ait modicè concavis, & parum in dorsum elatis, foris inæqualibus & asperis, in tenues laminas faciliè sectilibus, intus lævibus & candidis. Testas parvas esse, carnem mollem, suavem, concoctu facilem.

2. *Littoralia*, quæ in littoribus (*ωχθισιν*) inveniuntur: nec non saxis limi & aquæ dulcis expertibus. Parva sunt, dura & acria.

3. *Pelagia*, seu marina, quæ in mari nascuntur, parva & rara. Grandescunt quidem syderis ratione maxime: sed privatim circa initia æstatis multo lacte prægnantia, atque ubi sol penetrat in vada. Hæc videtur causa, quare minora in aliis locis reperiantur. Opacitas enim prohibet incrementum, & tristitia minus appetunt cibos. Sunt aliquando in Mediterraneo multa simul connexa, & supra se posita. Inter hæc repunt Scolopendræ, & vermes in canaliculis inclusi vivunt. Testæ foris fordidiæ & luto obductæ, & ex crustis multis sive laminis constantes, intus læves & albæ. Caro mollis: circa eam fibræ multæ veluti fimbriam constituentes, eam aliquando ambi-

Differentia.

Plin. H. N. l. 32. c. 6.

Macr. Sat. l. 9. c. 6.

purpureo crine, quæ præstantiæ nota est auctore Plinio, qui Calliblephara dixit.

4. *Britannica*, quæ omnibus præferuntur, quæque Massarius post Lucrina inventa fuisse, & Ruputina Iuvenali dici putat.

5. *Santonica*, quæ magis salsa & acris judicantur.

6. *Burdigalensis*, inter quæ Medokina ab oppido vicino Medoë, dicta, capite nigra, suavitatem præcellunt.

7. *Circaea*, quæ ab Horatio commendantur.

8. *Abydena*, quæ olim à ganeonibus celebrari solita, Clemens Alexandrinus in Pædagogo prodit.

9. *Lucrina*, à Lucrino Campaniæ lacu, in sinu Bajano, prope Puteolos ita dicta, de quibus ut & de Britannicis ita Plinius. Nondum Britannica serviebant littora, cum Orata Lucrina scilicet littora nobilitabat: postea visum tanti in extrema Italia petere Brundisium ostreas: ac ne lis esset inter duos sapores, nuper excogitatum, famem longæ advectionis à Brundisio compascere in Lucrino.

10. *Brundisina*, de quibus ita idem. Gaudent peregrinatione transferri; in ignotas regiones. Atque ita Brundisina in Averno compasta, & suum retinere succum, & à Lucrino adoptari creduntur.

11. *Cumana*, quæ Strabo præstantissima facit. Nihil interim de suburbanis circa Venetias & Adriaticis, quibus Bembus teste Calcagnino palmam dedit, dicemus. Plinius paucis meminit, dum inquit, Dicemus & de nationibus, ne fraudentur gloria sua littora, sed dicemus aliena lingua, quæque peritissima huius censure in nostro ævo fuit. Sunt ergo Mutiani verba quæ subiiciam: Cyzicena maiora Lucrinis, dulciora Britannicis, suaviora Getulicis, acriora Lepiticis, pleniora Lucensibus, sicciora Coryphantenis, teneriora Istricis, candidiora Circiensibus.

Quantum ad Colores ruffa sunt in Hispania, fusca in Illyrico, nigra & carne & testa Circæis, quibus pal-

ma mensarum diu tributa est. In mari rubro flammeis illustrantur Zonis, ea ut diceret variis coloris temperatione ad colorem iridis accedere; adeò lineis perpetuo ductu inter se distantibus distinguuntur. *Meliora* ita descripsit Plinius. Præcipua habentur in quacunque gente spissa, nec saliva sua lubrica, crassitudine potius spectanda, quam latitudine, neque in luto capta, etsi ea Veneti cæteris antecellere opinentur, neque in arenosis sed solido vado, spondylo brevi atque non carnosum, nec fibris laciniosum, actota in alvo. Addunt peritiores notam; ambiente purpureo crine fibras, eoque argumenta generosa interpretantur, calliblephara appellantes. Iovius maxime probari tradit, quæ magnarum navium carinis adhærent, & ab urinatoribus de manu colliguntur. Præter hæc sunt adhuc *Ostrea Sylvestria* & *Gaideropoda*. Illa vulgus in Provincia Scandebec vocat, propterea quod sapore sunt acris, & idèò delicatiorum labra calefaciunt & urunt. Testa sunt pellucida, partibus quibusdam flavescens, alias purpurascens, foris crinita & crispa, intus splendida, levissima, candidissima. Carnem habent parvam, salisam, subamaram, & insuavem.

Facit horum Athenæus mentionem, multiq; alimenti esse dicit, sed ^{Athen. Dip.} virus olentia, & ori ingrata. Reperiuntur in mari mediterraneo. Testa in fucis mulierum lapidis specularis vice usurpari potest, & exsiccantibus pulveribus utiliter admisceri. *Gaideropoda* quasi pes asini dicitur apud Græcos, quidam ideron hodie asinum vocant. Testa eius, describente Bello- ^{Aldrov. l. 3.} nio, eximio naturæ artificio, superior inferiori infarcta est, ut quibusdam ^{c. 68.} veluti cardinibus annexa, nigroque nervo in eius medio inter tubercula & sinus coaptato, vineta ac contracta esse videatur.

Tubercula quoque superiora duobus acetabulis inferioribus benè correspondent, ut & inferiora superioribus. Proinde apertas Gaideropodas, si quis

si quis attentè intuebitur, in his branchias, (hoc certè ridiculum est, nulum enim ex testaceis habet) & stomachum & reliquas partes nutritorias contemplabitur: imò etiam aurículas fungi crispæ figuram referentes, magnitudine grandioris acetabuli, polypi, quæ dilatari ac contrahi soleat: umbilicum vulgus esse putat. Rondeletius hæc pro spondylis, qui Athenæο *τερχήλοι, ἀπὸ τῆς τερχήντης*, id est, ab asperitate dicuntur. Meminit eorum Plinius & Galenus, interque ostracoderma recenset; Macrobius etiam, qui inter cœnæ Pontificalis prima fercula numerat; sed & Columella, qui inter testacea reponit. Duplici spondylus, secundum Rondeletium *testa* constat, intus cava & *lævi*: foris scabra, ad ungulæ asini formam rotundata, latiore parte, quæ & inferior dici potest, tenuior est, & multò minus densa, minus concava, arcta valdè & firma articulatione connexa: utriusque enim testæ binæ apophyses sunt, sive tubercula, quæ binis acetabulis vicissim recipiunt & recipiuntur: vinculo medio nigro & valido cohærent. *Caro* interna ostreor. carni similis est: circa hanc fimbriata membrana. Intus caro, sed durior, & virus olens. Adnascuntur faxis, & ita hærent, ut non nisi malleo, aut fracta faxi parte capiantur. Rondeletius idem, in faxis Fresconiis Agathensis sinus parvos reperit. Reperiuntur in eis cancri parvi. Aldrovandus aliquot spondylorum genera exhibet, interque illa elegans quoddam, plurimis extra tuberculis obtusis præditum, ab uno latere rubicundis, ab altera inter viridem & cæruleum ambigentibus, quibus tamen rubra etiam permiscetur tubercula: summum caput seu vertex candidat. Intus circulus satis conspicuus colore viridescente totam ferè concham propè extremitatem ambit: dein color sequitur castaneorum, dein albus & subviridis. In medio velut umbilicus est, addito luteo constans.

PUNCTVM IV.

De Pectinibus.

PECTINES, si Gyllium sequimur, à rugis seu imbricaturis illis quibus signati sunt ita dicuntur. Plinius ali- quando à pectunculis distinguit, nō nunquam utrumque promiscuè nominat. Græci *κτένες* nominant, ob manuum & pedum similitudinem, ut Nicandri interpreti placet.

Descriptiones exactas in differentiis dabimus, hic dicere sufficiat bivalves & clusiles esse, ut apud Aristotelem legimus, seque concludendo tueri: pectinatim eis divisas testas; ideo Athenæο *ῥαβδωπὼν, & τερχήνες* dici: utraque parte auritas, easdemque referatiles esse. Nam ab altero latere nodo ligantur, ovum dictum altera tantum parte eis fieri: Athenæus eis ostrea in quibus nascuntur margaritæ contulit. Sponte in arenosis limosis locis proveniunt: in sinu verò Aquitanico & Normannia capiuntur frequentissimè. Anno autem perficiuntur. Temporibus pluviosis proveniunt plurimi, quod & aliis testatis accidit. Nam squallore pecines magis trahunt rufum colorem. Iamque in Pyrrheo Euripo pectines aliquando defuerunt, non modò propter ferramentum, quo piscatores abradendo ubertim caperent, verum etiam propter siccitates. Quæ autem ova in iis appellantur, quamvis verè iis insint, moxque procedente tempore minuantur aboleanturque, tamen nihil ad generationem conferunt, sed indicium sunt nutritionis melioris, quale in sanguineis pingue est. Oculi ut ostreis nulli, Conchis dubii, sic pectines si quis digitos ad versus hiantes moveat, contrahuntur ut videntes. Volare sagittæ, modo, nisi fortè hoc ad Loliginem pertineat, Plinius prodidit: sed & stridere sentiuntur, quoties per summa humoris nitibundi feruntur. Massarius per aëra volare negat. Cum enim, inquit, callo illo interiori ambæ testæ connexæ sint, ut difficile di-

velli queant, non possunt ita liberè aperiri, ut volare valeant &c. Tanta tamen velocitate dehiscunt: ut ex vehementi percussione saliant, & superiacent, ut quasi volare videantur.

Ufus.

Vsum in Cibus quod attinet, fuere olim apud antiquos celebres, nec in Coryis convivio omissi. Celsus & Archigenes stomacho aptos faciunt. Galenus succum alvum ducere non aliter ac serum lactis scribit. Xenocrati dulces sunt ac facilius ostreis concoquuntur. Magis assati, secundum eundem, minus succi habent & difficulter excernuntur: in testis suis si assentur, minus huius incommodi habent, facilius alunt, & valentiores sunt. Nativam autem dulcedinem in muria conservant & urinam movent: ac candidi quidem & lati sunt dulciores atque albi duri: ruffi virosi & urinam cient: varii autem medii sunt, & eorum aliqui fucis similes, qui per se dati difficulter concoquuntur, & tamen urinam movent. Diphilo candidi molliores sunt.

Clemens
Pedag. l. 2.
Varro in
Satyra.

Locor. varietas bonitatis differentiam invexit. Methymnæos à plærisque gulæ amatoribus suis temporibus expeditos Clemens Alexandrinus testatur. Varro pectunculum Chium, inter cancrum ciborumque exquisitas delicias comprehendit. Horatius Tarentinos laudat, idè in eorundem numismatib. frequenter occurrunt. De reliquis ita Xenocrates. Pectines, inquit, optimi sunt, qui ad justam magnitudinem pervenerunt, cavi, colore nigriore: præstant autem vere ac æstate, siquidem eo tempore ad Lunæ incrementum optimè augentur. Omnibus autem antecellunt Mytilenæi, magnitudine, natura, humoris bonitate. His similis Ionium mare juxta Illyrida, Hetruriam, Salonas, & Latium producit. Iam verò & Chios & vicinæ insulæ, item Alexandria eiusmodi pisces ferunt. Pontus quidem etiam multos fert, sed minutos & qui ægrè augeantur.

Vsum in Medicina si spectes, Trallianus in colico affectu dari jubet. Pli-

nus urinam ciere, & quæ in vesica *Plin. H. N.* sunt moderatè detergere scribit. Ad *l. 32. c. 9.* Venerem excitandam non minus valent quàm ostrea.

Differentiæ pectinum sunt variae: Differentiæ sunt *magni*, quibus altera valvular. *latior* veluti tegmen superposita est; sunt & *ruffi*, candidi, versicolores, candidi & lati: sunt utraque parte auriti, alterutra tantum, nulla, si Bellonio fides est. Ex auritis, quidam utramque aurem habent magnitudine; alii minores aures habent quàm caput testæ; quidam tam magnas, ut ab una aure ad alteram ducta linea, caput testæ non tangat, sed potius emineant aures; alii denique una aure minores. Duos Rondeletius descripsit: *Priori*, testa est qua parte aurita, strictior, deinde amplificata in orbem circumagitur, altera modicè cava & in dorsum elata, altera veluti alterius operculum. Intus carnis multum habet, quæ circa medium etiam carnosum, longum, tenerum, alligata apparet. Inest in carne particula luteum ovar. colorem referens. Spectantur, *μύκων*, & os tubæ modo factum, atque intestinum tenue luteo plenum. Tota caro in ambitu membranam habet veluti fimbriam versicolorem, ex qua fila & multa & tenuia dependent. Huic similem Aldrovandus ponit, testa ferruginei diluti coloris, fasciisque ferrugineis. *Alter* superiore est toto corpore longior & strictior, amplioribus auribus, utraque testa pectunculorum Burdigalensium modo concava. Aldrovandus plurimas earundem figuras, auriculis & colore differentes exhibuit, interque eos versicolorem, castaneum eburneum, & croceum qui auriculam unam habet satis latam proportionem animalis, rudimentumque alterius. *Eburneus* in summitate macula quadam rubra condecoratur, cui alia lutei coloris infidet. Est & *asper* colore fusco, cuius *Iconem* adjicimus.

PUNCTVM V.

De Musculis.

TAB. XV. **TESTACEA**, quæ vulgariter Musculi vocantur, Plinius quædoque myias, aliquando myifcas, nonnunquam myfcos, sæpè musculos appellat. Athenæus *μύας*, Aristoteles *ἐλάττης μύας*, vocant, moderni Græci *μύδιον*, id est, parvum musculum dicunt: nos musculos simpliciter minores appellamus. Rondeletius ita eos describit. Sunt ex ostracodermorum genere, quæ tenui testa & duplici conteguntur, circa saxa aut ligna nascuntur pilis, & veluti lana alligantur. Testa foris nigra, ferè semper vel musco vel lanugine obducta, intus lævis & splendens, ex albo cærulea, parte acutiore crassior & spissior, reliquo ambitu rotundo tenuior. Caro intus pallida, cum non cruda est, cocta vitellis ovorum similis, in ambitu fimbriata, in eo foramen est evidens ad attrahendam aquam, neque enim per villos trahit: in media carne est particula carnosa linguæ similis: inest & mutis, & pituita quædam glutinosa, callo albo adhæret. Reperiuntur & in mari & in aqua dulci stagnante: nunquam verò ferè in rapidis fluminibus.

Vfus.

Ubique ferè in *Cibum* cedunt, sed optimi sunt Ephesii. Marini commodum præstant nutrimentum: qui in aqua sunt dulci, carne sunt dura, concoctu difficili, pravi succi. Laudatissimi qui in inferiore Germania ex Oceano Germanico capiuntur. Medicinam si spectes, ad ciendam & urinas multum præstare vult Athenæus, cui Celsus adstipulatur. Marinum tritum ex oleo vetere talorum tumoribus & doloribus impositum mederi, Marcellus Empiricus reliquit. Aquatiles ad nebulas oculorum in jumentis adhiberi, testis est Gesnerus. Uruntur super carbonibus, & corium externum detrahitur usque ad medium, quod albi apparet: additur Zingiber, & chal-

canthū paribus portionibus, & ex his mistis, pollen in oculis equi inflatur.

PUNCTVM V.

De Mytilis.

TAB. XV. **MYTULORUM** nomen à Græcis *μύτις*. **MYTULORUM** tuavere Latini, *μύτις* eos illi vocant. Dioscorides testam ipsam *μύτακα* dixit: animalia Oribasius *μύτας*; Athenæus *μύας σκιδάδεις*, quod scyllam quidam ex iis resipiant; Aristoteles *μύας πτελῶδεις*, non foliatos à figura, ut Gaza vertit, nec latioris & amplioris conchæ, ut Niphus, sed in imo maris, seu gurgite nascentes, ut Rondeletius, nisi fortè *πτελῶδεις*, quod in limosis producantur dici debeant, ut Gesnerus innuere videtur. Iovius cum Tellinis eisdem esse censet, sed falsò, ut in sequentibus apparebit. Dioscorides sanè, Galenus, & Ægineta distinxere, ideo separatim de utrisque agunt.

Descriptionem inter Differentias *Descriptio.* quære. Spontè naturæ in arenosis *Generatio.* proveniunt, quod ante Plinium Aristoteles prodidit: prodire tamen & aliqua ab ipsis emissa facultate, (bucina & purpuræ, quæ favare dicuntur, id est quasi à seminali natura humores quosdam mucosos emittere) vel potius sobole, quippe minores subinde juxta principium adnascuntur, Massario ex ipso Aristotele visum.

Reperere & in *Cibis* locum, tam elixi quàm assi. Crudi virus & scyllam resipiunt. Elix, & acrioribus quibusdam, ut sinapi, nasturtiove conditi, illud deponunt. Assi, sitim vehementer excitant. Deteriores sunt qui in locis arenosis, aut inter testas figlinas proveniunt, quàm qui in algosis gignuntur. Autumno & ubi multa dulcis aqua miscetur mari, bonitatem servant, procedente tempore amaritudinem trahunt, & colorem rubrum. Optimi quoque mytuli, quando illa sic vocata ova continent. Ius corpus augere Plinius reliquit: eodem sues, teste Lemnio, pinguescunt.

Vfus.

Lemn. de Nat. mirab. l. 3. c. 7.

Maio-

Maiores duri sunt, ideò concoctu difficiles: sanguinem procreant crassum, succumque non adeò bonum: copiosè tamen alunt, & ventrem urinamque cient.

In *Medicina*, easdem cum Musculis facultates habet. Carnes ad canis morsum valere scribit Dioscorides, sed repugnat Galenus. Iuri multum Plinius tribuit. Myacum jus, inquit, traditur alvum & vesicas exinanire, & in teranea distringere, omnia adaperire, renes purgare, sanguinem adipemque minuere. Itaque utilissimi sunt hydropicis, mulierum purgationibus, morbo regio, articulari, inflationibus &c. Concha ad excipiendum oleum loco cochlearis utuntur.

Differen-
tia.

Differentias aliquot apud authores invenias. Sunt enim, si locum spectes, alii *Marini*, alii *Fluviatiles*. Hi marinis sunt similes, in eo tamen differunt, q̃ minores sunt, subreñti apparent, atque humi pinnæ modo infigantur. Sedem nō mutant, grandi hiatu suas testas pandunt, easque referatiles & clusiles, tenues, intus glabras, pictorum coloribus accommodatissimas habent. Gustus sunt ingrati. *Marini*, ut Bellonius habet, villos extrorsum habent more pinnæ, ab ea testæ parte qua scopulis hærent, per quos alimentum exsugunt, atque arenas & marina dejectamenta attrahunt. Cancrum pinnæ modo in concha nutrit, orbicularem, parvum, suis sic membris absolutum, ut & incedat & alatur, & ova excludat grandi lente multò maiora & crassiora; humi accumbant, cum tamen glandes sive muscoli adhærendo pendeant. Differunt & magnitudine, rotunditate, & gustu. In maioribus cancelli, ut dixi, nascuntur cancelli. Salem virusque resipiunt quidam. In eo verò à cæteris ostracodermis differunt, teste Aristotele, quod tenuia labra habeant. De magnitudine trium vel quatuor heminarum, quod apud Plinium legitur, nil dico. Videtur hoc Phocæ vel Lepori marino competere, vel in genere conchis debere describi.

Arist. H. A.
l. 4. c. 4.

Aldrovandus plura earum genera cum Iconibus exhibuit, inter quæ est, Castaneus, Niger cum tuberculo adnato, alter cum striis flavis. Fluviatilium alium maiorem, alium minorem dedit.

PUNCTVM VI.

De Tellinis.

Tellinarum nomen Athenæus ^{TAB. XV.} Latinorum mytulis tribuit, Plinius pectunculis illa, quæ Tellinis à ^{Aldrov. l. 3. c. 72.} Dioscoride adscripta sunt. Nos hic illas intelligimus, quas moderni Greci ^{Nomen.} ξιφύδεια, Lesbi incolæ Chinades, Galli Narbonenses & Romani Tellinas, ^{οτι τὰ χεῖρα γίνονται πέλειαι}, quod ocyssimè perficiantur, Veneti Capparazole, sive Capparole, à capparibus similitudine, appellant.

Descriptio inter differentias quæ ^{Descriptio.} ratur. Non tantum in mari, & portibus undis agitatis degunt, sed & fluviis, Locis verò arenosis maximè delectantur.

In *Cibis* laudem præ cæteris testatis meruere. Plus succi habet earum caro, quæ etiam reliquarum carne mollior. Recentes, secundum Dioscoridem, stomacho sunt utiles, sed maximè jus earum. Elixas, dulces esse, earumque jus alvum solvere ^{Oribas. 2. Coll.} Oribasius prodidit. Venetiis, Genuæ, & Romæ rustici in saccis per urbem circumferunt, quas modiolis divendunt. Cum enim exiguo corpore (verba sunt Bellonii) consent, nec facilè aperiantur, gustuique gratæ sint, mirum in modum ob id experi bellariorumque loco assumi solent, inprimis, si ab arena optimè, repurgatæ fuerint. Marinæ inprimis, & in his tenuiores, quæ Athenæo Basilicæ commendantur; & quod Castor ^{Durant. in Thesauro sanit.} Durandus rantes ventriculo noxias esse scribit, de fluviatilibus fortè sumendum est. Sitim certè istæ excitant, calculosque gignunt: Oribasius tamen maiores esse, & plus succi habere, Ægyptias inprimis, scribit. Clausæ sale sparguntur, & per testas humorem trahunt.

Vfus.

In

In Medicina ustæ cinerem reliquūt causticum, adeò, ut is cum cedria myxtus & instillatus, evulsos radicatus palpebrarum pilos renasci prohibeat. Arotæus in Iliaco affectu ius ipsarum propinari jubet. Pueris ad sonum tubæ imitandum usui esse, Athenæus prodidit. Sopater etiam in Comœdia quæ inscribitur Eubulotheombrotus scibit. At resiste, è Tellina repente ad meas aures suavis quidam sonus illapsus est.

Galen. de
simpl. med.
11.38.

Athen. Dip.
1.3.

Differen-
tiæ.

Quantum ad *Differentias & Genera*, Athenæus alias marinas, alias Fluviatiles, seu quæ in fluviorum ostiis reperiuntur, fecit. & addit, in Canopico ostio & Nili ascensu multas esse. Illarum *λεπτερες* seu tenuiores Basilicasidem vocat, & alvum subducere, beneque nutrire ait. Hæ, quia majores, Basilicarum nomen mererentur, nisi expressa Athenæi in contrarium verba essent. Bellonius Basilicas ita describit. Lævis est Tellinarū testa, candida, nequaquam striata, crenulis tenuissimis denticulata, in longitudine diffusa & angusta mediocriter fortis & quodammodo teres. Rondeletius duas etiā species ponit, quarū una duplici testa constat, utraque similis, lævi, valida, & satis spissa, in ambitu ferrata, qua de causa ad unguen conjunctæ sunt, intus leviter cavæ; altera, in ostio Araris fluminis invenitur, in sinu Agathensi, superiori similis, nisi quod testa sit maiore, minusque spissa, & ex rubro flavescenti parte, qua testæ colligantur, in acutorem angulum definente. Addit & Tertiam, colore candido, testa pellucida, ex additamenti multis conflata, intus lævissima. Tenuis admodum, & ambitu magis rotundo. Aldrovandus plures apposuit, inter quas sunt nonnullæ cum dentalibus; una etiam testa diaphana & fragili; alia cinerea, lineis purpureis transversalibus,



PUNCTUM VII.

De Balanis, & Pholade.

TAB.

XV.

Aldrov. l. 3.

c. 3. 73.

Nomen.

Descri-

tio.

Balanis seu glandes, à glandium similitudine nomē obtinere Pollicipedes Bellonius vocat, quia vulgo poulsepieds dicuntur, quod pollicum in pedibus similitudinem habeant.

Descripsit eas ita Rondeletius. Id genus glandem esse colligimus, quod illi cum glandibus magna sit similitudo. Nam ut glandis quercus vel Illicis pars prior levis est, & in acutum tendit, posterior aspera; sic hæc, quæ saxo exhibemus affixa, posteriore parte, qua saxis hæret, rugosa sunt, & aspera, glandiumque caliculis, posteriorem earum partem arctè retinentibus simili, Plura ex una radice pendunt è sanorum rimis. Ex testaceorum genere sunt. Pars enim prior, longa, rotunda, ex duabus testis componitur, colore & lævitate unguium, in medio rima est, ex qua capillamenta quædam veluti plumæ rubescentes prodeunt. Concha una veluti ex multis acutis unguibus constant, tota in quinque digitorum longitudinem accrescit. Crassitudine sunt pollicis in Hispania; in Britannia Aremorica minores. Pars posterior quæ saxo alligatur, corio duro asperoque potius quam testa constat, ex nigro flavescit. Plura in Differentiis vide.

De *Loco* non est quod multa addamus. In Hispaniæ parte ea quo Oceano alluitur, in Normannia & Britannia frequentissimi sunt, perque vicinas urbes & pagos divenduntur. Racematim Oceani caudibus adhærent.

Locus.

Laudantur in cibis, tanquam optimi saporis ab Epicharmo, & qui mirum in modum fastidia stomachi sublevent, & mulierum malaciis accommodentur. In convivio quo Lentulus flamen Martialis inauguratus est nigros & albos appositos esse, Macrobius testatur. Elix ex aqua

i salsa

falla pulpam habent duriusculam, quam auferunt, sinistra tenentes radicem, ad quam alligatur, dextra vero caput arripientes: quod posteaquam contorserint, pulpam à theca extrahunt, ut ambiens corpus relinquatur vacuum calami modo. Pulpa autem quæ inde egressa est, lumbrici modo oblonga, rubra, teres, aceto piperato maceratur ac manditur, Archigenes quoque apud Galenum stomachicis convenire scribit,

Differen-
tia.

Differentia & Genera eorum recensentur aliquot. Sunt i. *Majores*, quos ex Rondeletio superius descripsimus. 2. *Minores*, qui nascuntur in saxis & rimis navium, quæ diutius immotæ uno in loco manserint. Adnascuntur etiam mytilis. Striatæ sunt, foramen habent, è quo veluti frondem emittunt, multæ simul nascuntur. Intus parum carnis continent, & parvæ semper manent. 3. *Ægyptii*, qui ad Nili ostia capiuntur, & sunt, teste Athenæo, dulcissimi, originati, copiosi nutrimenti, multi succi, diuretici, & solvunt alvum. Aldrovandus etiam quosdam exhibuit, interque hos, multos modicè rubescences, simul adnatos, à Gigante sibi communicatos, eosque striatos; Ostraceum quoddam, quod merito polyceps dici possit, quoniam veluti ex multis Balanis compactum est, læve rubescens, balanum denique sessilem, qui in parte inferna ubi insidet, maximum habet foramen.

Aldr. l. 3. c. 34. *Pholades* ὁπὸ τῆς φολῆς & φολιδίου, quod in cavernis & latibulis condantur, suum obtinere nomen. Et rectè ita in saxis latent, ut iisdemque undiq; contegantur, per foramen verò exiguum & sensui vix patens aqua nutriuntur. Missum est, inquit Rondelet. ad me alio ex littore saxū, in quo nullæ rimæ, nullæ cavernæ, sed foramina tantum apparebant tam exigua, ut vix aciem admitterent. Eo igitur ictibus multis confraeto, cavitates internæ multæ erant vario situ, & diversæ magnitudinis, in quibus conchas istas reperi. Testis constant

duab. lōgis, non in latū extensis mytilorum modo, sed rotundis. Intus eadem ferè est caro quæ in mytilis. In saxorum cavernulis, vel veli natura factis, aquæ marinæ appulsu procreantur, atque in concham vertuntur, quæ cavitatis seu foraminis figuram servat. In portu Veneris multæ occurrunt.

Vfus.

Nullus earum præter Athenæum meminit, qui easdem palato suaves, sed mali succi & virosas facit.

PUNCTUM VIII.

De Solene.




Solen Eustathii ἐν τῇ Γῶ καὶ τῇ Ὀλίῳ & per crasin σολῶν, dicitur, TAB. XV. Græcis vocatur ὀλῶν, à canalis sive tubi similitudine, δόναξ, à figura arundinis crassæ, concavæ, quæ Cypria arundo Dioscoridi; Dactylus, ab humanorum unguum similitudine; οὐξ denique seu unguis, ab extremis, tenuitate & figura unguibus simili, vel à testæ colore & substantia unguibus nostris non dissimili. Veneri Cappam longam nominant, Bononienfes piscem canellam. In *Cibis* Vfus. à pauperibus adhibentur. Galenus dura carne esse dicit, & ob id difficulter concoqui, propriumque hac ipsis & Purpuris, ut refert Nicesius quod cum in iuscule coquantur, id crassius reddunt. In ore mandentium relucere Plinius scriptum reliquit. His natura, inquit, in tenebris remotolumine, alio fulgore clarere, & quanto magis humorem habeant, lucere in ore mandentium, lucere in manibus, atque in solo atque veste, decidentibus guttis, ut procul dubio pateat, succi illam naturam esse, quæ etiam miremur in corpore. Splendoris causam glutinoso Solenis succo adscribit Rōdeletius, hi quidem quæ tenacia & veluti glutino compacta sunt, ea lævia, æqualia, ac ac perpolita esse solent, atque ob id relucencia, *Dispersuntur in Mares & Faminas.* Illos Plinius

Musculus Muschel.

Tab. XV.




Musculi Rondel.

Musculi Aldrou.



Mytuli oblongi.


Mytilus niger cum strys flauis.




Tellina



Tellina



Tellinae congerentes.




Tellinae cum dentalibus.



Balanus marina. Meer Eychlen.



Balanus alius.



Tellinae congeneres.




Balani rubei.




Balani sine Polycipedes.



Balani Gygantis.




Pholas.



Pholas Aldrou.






Phola concha alia.



Solen mascul Rond.

Solen faemina Rond.



Plinius Solenes, Aulas & Donacas vocat, has Onyches. *Mas* secundum Rondeletium, ex Concharum longarum est genere: duplici constans testâ, lævi, tenui, altera tantum parte colligata nigro vinculo, etiam si aliter scribat Aristoteles. Cum enim *διθύγων* alia sunt altera parte ligata, altera soluta, ut claudi & aperiri possint; altera utroque latere connexa, in his postremis Solenas numerat, cum contra semper altera parte solutos videas. Dodrantali sunt longitudine, pollicis crassitudine, harundinis modo cavi, extremis duobus semper apertis: anteriore caput exerit, & retrahit testudinis ritu, secundum testæ longitudinem carnem protensam habet. Testa cæruleo est colore, lineas evidentes habet per transversum ductas, qua parte colligatur; crassior est, aliis partibus in tenuem substantiam desinit, ut mytuli. Aqua & arena vivit. Carni facultatem urinæ ciendæ inesse Plinio scriptum: sed quia glutinati succi est, metuo ne erret. Differt ab isto *Mas Rondeletii*. Est enim lineis miniaceis, per transversum variegatus; in altera quoque Conchæ extremitate, linea lutea apparet. De *Faminita* item Rondeletius. Onychas appellat Plinius Solenes foeminas, quæ colore, sapore, magnitudine, à maribus differunt, in aliis omnino similis. Testa lineis cæruleis distincta non est, ob id Plinio unicolores dicuntur.

Vfus.

Caro dulcior est: sed vix comedi potest nisi ab arena repurgata. Sumuntur frixæ & elixæ, melioresque in prunis tostæ, quoadhient. Rondeletius deteriores existimat, quod sint exsuccæ, duriores, & sicciore. In arena stare Bellonius tradidit, sed cum omnia silent sursum è profundissimo foramine emergere, & in id sese postea abdere, unde postea nisi palla ferrea in transversum supposita, & præfundissime impacta avelli possint, id quod & Plinius, & ante eum Aristoteles vidit.

33

CAPUT IX.

De Pinnis.

Pinna, Græcis *πιννα* & *πιννα*, quod TAB. semper sordibus obducta sit, dici- XVI. tur. Hermolaus Concham Ægyptia cognomine Paralios, à Democrito Pinnam vocari scribit. A quibusdam Agnus castus vocatur. Neapolitani Pernam, Veneti Asturam, vocant.

Descriptiones in Differentiis vide. Descriptiones. Ex duabus testis componuntur, & à pto. mytulorum figura non admodum differunt. Cancris etiam in illis hospitantur. Rondeletius tantam Romæ se vidisse scribit, ut ad cubiti magnitudinem accederet.

Locum si spectes, in Acarnania Pin- Locus. na oriri & uniones gignere Plinius restatum reliquit. In mari an sint ambigit Bellonius, & Rondeletius in locis in quibus mare fluit ac refluit, vix reperiri scribit. Venetiis non visitur: sed in Propontide ad latera eius sinus, qui Nicomedia fertur, quæ terram pertingunt, frequentia magna existit. In ruinis Nicomediæ civitatis reperiri, Bellonius auctor est.

In Cibo comparando, Cancellum Natura. semper aut Squillam comitem habent, sua sede non dimoventur quin pereant; nisi iterum eodem statu humi defigantur. Nam cum eis natura hæc insit, ut rectas stare, & per villos arenulam attrahere necesse sit, jacentis vivere non possunt. Naturam eius optimè versibus Philes expressit, in cuius testa & uniones & byssum reperiri testatur.

Vsum in Cibo quod attinet, Athe- Vfus. næus eas urinam pellere, difficileque concoqui & distribui dixit. Ovum, quod secundum Aristotelem continent, pro lunari potestate, aliquando minus, non ad generationem confert, sed melioris nutritionis indicium est.

De carnis dotibus ita Wottinus. Pinnæ, inquit, optimæ sunt, tenellæ,
i 2 plenæ,

Plenæ, carnosæve, quæ in limosis (περὶ ὧδ.) vadis gignuntur; & ubi mari dulcis aqua miscetur, & locis tranquillis, ac ventis carentibus: teneriores enim hic nascuntur, quàm ubi fluctibus agitantur. Grandioribus parvæ; & quæ vere & æstate capiuntur, aliis præstant. Sunt enim & fraviores & pleniores. Quæ magnitudine mediâ sunt, carnem quidem habent mollem, candidam, ac dulcem: collum durum, concoctu difficile, corruptionique renitens, Collo namque corpus reliquum facilius corrumpitur: elixis assæ duriores evadunt, præsertim si vino fuerint aspersæ. Earum quæ in vino macerata sunt caro, mollior est, sed flatum generat.

Differen- *Quantum ad Differentias*, Rondeletius tres differentias agnovit, Bellonius duas, Aldrovandus quatuor posuit.

Rondeletii *prima* est Minima, mytilis similis, nisi quod strictiorem partem multo magis acutam & longam habet. Testa foris aspera est, colore fusco, intus viridi, & argentei splendoris, si in arena vixerit Pinna; si in cæno, colore est magis flavescente, & minus splendente. Ab inferiore & strictiore parte in amplam latitudinem extenditur: illic arctissimè clauduntur testæ, hic faciliè discluduntur. Intus multum est carnis, cuius omnes ferè partes indiscretæ. *Alteram* Pernam Plinio vocari scribit. Pernæ, inquit isti, Concharum generis, circa Pontias insulas frequentissimèstant, velut suillo crure longo in arena defixæ, hiantesque qua limpidus est, pedali non minus spacio.

Cibum venantur. Dentes in circuitu marginum habent pectinatim spissatos. Intus pro spondylo (spondylus seu callus caro durior & interior ostreorum est.) Eius generis hanc esse in qua unius nascuntur, ex Theophrasto Athenæus tradit.

In Gallico mari inveniri, & in

ea uniones parvos author est Rondeletius. *Tertia* minor est, & eo differt, quòd antequam acuta & stricta parte in amplitudinem extendatur, excavata sit.

In cæno & arenosis locis vivit defixa: & carnem intus duram habet quæ virus resipit.


Bellonio altera *Major* est, altera *Minor*. Hæc foris magis albicat, intus ad cæruleum accedit. Mollioribus in gyrum spiculis obtusis hirta est, valvasque continuò cardine rotolare annexas claudit ac referat, quâ parte planior esse constat, quæ autem se in latum expandit, eadem byssum est veluti capillamentum quoddam coacervatum prædurum ac nigrum quod lapillis affigitur, limumque ac spurcicias inde ad stomachum attrahit. Illam Pernam vocat, quæ pelagia est, rugis profundis caret, duriore testâ contigitur, & bipedalis sæpissimè invenitur. Pinnophylacem, ut minor, alit: uliginoso ac palustri tractu nascitur: profundiore gurgite immergitur, & multum ingrati saporis habet.

Ex Aldrovandi pinnis *prima* est ^{Aldrov.} culeata, coloris rubei: *Alter* ^{13.6.78} *pinna* parvæ Rondeletii similis cum capillamentis: *Tertia* pinnae Pernæ genus. *Quarta*, parte interna & externa depicta, testa foris fusca, rubra, & aspersa; intus sanguinei, & cærulei coloris. Datur & *quinta* cum tubere verrucoso intus adnata.


Pinnis adde *Conchas anatiferas*, diversi generis. *Prima* tribus partibus constat cum umbilico annexo. *Alter* *quinque* partibus cum umbilico. *Tertia*, aperta est, eique umbilicus inseritur. *Quarta*, huius est ea parte qua primum plumula prorumpunt. *Quinta*, foetum intra vulvas situm ostendit. *Sexta*, foetum imperfectum è valvis exemptum. *Septima*, Berniclam avem

adultam, ex ejuscemodii Concha natam.


Pinna magna Rond.



Pinna Perna. minor.




Pinna alia.



Pinna alia





Pinna aculeata Aldrou.



Pinna parva Rond.



Pinna j. Perna. maior.






Patellae diversae.

Pinna alia cum tuberculo adnato.






Patellae Aldrou.



Patella Gypria maior non striata. n. 1. *Patella Gypria maior striata. n. 2.*




Tab. XVII.
Lepas, siue Patella Bellon.





Concha Venerea.

Concha Venerea Zoographi.


Patellæ feræ siue Aures marinæ.




Concha Ven. Rond.




Concharum Venerearum Speciebus.




Concha Persica maior.




Concha Persica minor.




Tubuli in quibus Vermes.



Penicillus alius.







Penicillus Meerbensel.



Vermes in Tubulis.

Tubuli alij parui.



ARTICULUS VI.

De Conchylijs Univalvibus.

PUNCTUM I.

De Lepade seu Patella.

TAB. XVI. & XVII. **H**Actenus de Bivalvibus dictum: Univalvia sunt, *Lepas, Concha Venerca, Concha Persica, & Penicillus*. Ad priorem *Auris marina* pertinet. *Lepades*, Plauto nisi mendum subest *Lopades*, quibusdā Græcis *πρωάτια*, modernis *Petaglides*, ve. quod sint petrarum in mari quasi, *λεπίδες*, id est, squammæ quædam; vel quod petrae cum eis spoliatur veluti *λεπίδες* *ἢ λεπίδες*, hoc est, desquamari videantur, dicuntur. Gaza *Patellas*, à *vassiscarii* similitudine, ut *Rondeletius* autumat, exponit. Inter *μονόθυγα*, cenferi debere, nullum dubium. Saxis testa in dorsum data adhærent: ideo *Aristoteles* alteram partem superficiei detraham, carnem ostendere dixit. Os ipsius versus terram, & excrementorum exitus superius habetur: *Papaver* quoque in imo, sive in suo fundo habent. *Bellonius* scribit tantā esse magnitudine, quanta extrema ovi putaminis pars abscissa esse potest. Colorem *æstarum* livere vel cinereum esse cornuæque limacis instar exerere, & os, & caput habere huic persimile. Plura in *Differentia* vide.

Locus.

Locum si quæris, in saxis littoris *Aquitani* & *Britanni*, nec non *Masiliensis* & *Agathensis* sinus scopulis inveniuntur. Circa *Lepadusas* insulas tam frequentes, ut nomen iisdem dederint, si *Athenæo* credimus. A saxis solvi, pastus quæritandi gratiā *Aristoteles* author est, cui & *Bellonius*, dum cochlearium more serpere ait, subscribit. Ad *Rondeletius* id negat. Nullis enim, inquit, ad natandum partibus prædita est, nisi

temerè huc & illuc undis jactata feratur; neque victus illi quærendus, nam maris sūma & aqua vescitur, quā alluuntur saxa. Quod si aquā allui saxa desinant, ea quæ in testa relicta est absumpta, contabescere & emori tandem necesse est. Tam se fortiter attrahæ saxis applicant, ut ne *Milonis* quidem digitis, avelli possint. Cultro igitur aut aculeato ferro opus est, inter ipsas & saxa immisso, quod ad oras Oceani *Aremoricorum* pueri facere solent, prodente *Bellonio*.

In *Cibis* crudæ à piscatoribus & maris accolis usurpantur. Coctæ facilius concoquantur, modò non nimium decoquantur. Jus alvum ciet. Usus earum & ad capiendos cibos esse, ex hoc *Tarentini* videre licet. *Obsonii* dicti, præparatio in mari cuius vi in unum locum statim omnes pisces conveniunt.

Ex mari *patellas* accipito, earum scilicet, quæ circa saxa nascuntur: quarum quidem contundens carnem, exprimesque ex ea in testa aliqua inscribito, quæ sequuntur: subitoque non sine magna admiratione videbis pisces in unum locum fluere confertum. Sunt verò ipsa nomina *ταῖς, συβαῶν*, quibus sanè *ichthyophagi* utuntur.

Dividitur in magnam, Maris rubri parvam, & feram, Major Rondeletii testam habet non exquisiti rotundam, sed inæqualem, intus lævem, foris parum asperam, cui aliquando muscus innascitur, gibbam in ambitu liviscentem & striatā, intus cavam. Carnosam quoque fimbriam in corporis ambitu quam expandit quum hæret, soluta contrahit. Interius subest caro dura, quā maximè saxo hæret, quæ scuti picti formam refert. Os superiore in loco manifestum est, inferiore ori adverso, excrementi meatus, non in testa, ut in ea quæ *ἀγεια* dicitur. Os venter sequitur, in eo est *μήκων*, inimo ventre etiam pars, quæ ovum dicitur. *Maris Rubri* *lepas* *Bellonii*, tabellis, quas in tergo gerit, corneis numero oëtonis,

tranversis, lorice modo contegitur, atque undequaque cartilagine obsepta est, multis spinulis horrida, iis persimilibus quæ in stellis marinis videntur: sesquidigitum lata est, ternos verò longa. Caro rubrilimacis colorem ac naturam habet, esturque cocta. *Parva Rondeletii* testa media nucleis pinearum nucum figura similis est, & æqualis. Ex laminis parvis constat: Carnem intus habet, sed ob parvitatem partis vix discernuntur.

Aldrov. l. 5. c. 81. *Fera*, λεπτός ἀγέλα, & *auris marina*, θαλάσσιον ὅς ob magnam cum aure nostra similitudinem, testam habet cavam, argenti vel unionum colore: foris gibbam, lineis multis depictam: parte unâ, cochlearum modo claviculatim contortam, à qua foramina incipiunt, initio parva, quæ deinde magis ac magis augentur. Differt à majore excrementi meatu, quod ut annotavit Aristoteles, parte ima testæ excrementum egeratur, quâ foramen habetur. Bellonius majorem vocat. Quia testa pellucida & perpolita est, ideò ab aurifabris in tenues laminas difsecatur, ut inde elegantissima vasa incrustentur. Aldrovandi Cypria major striata & non striatam ad majorem Rondeletii referri potest.

PUNCTUM II.

De Concha Venerea.

TAB. XVII. **Nomen.** **C**oncha Venerea nomen forte ex eo invenit, quòd non modò Venerigrata, sed & ob communem originem è mari cognata, crederetur: celebrisque esset eius Deæ effigies, atque haud suo an ex hoc genere, ut Gelenii verbis utar, pede premens. Martialis Conchâ simpliciter vocat, Hyle Poëtria Conchâ Erythræam, sine dubio, quòd circa mater rubrum frequens sit. Bellonius in vico nomine Tor viginti camelos his conchiliis rotundis onustos se conspexisse prodit, & Cairi incolasis ad lævigandam papyrum, & telas colorib⁹ permixto gummi con-

factas uti. Ideò eidē Lævigatoria dicitur. An Belliculi marini, ἐμπλεκτικοί θαλάσσιοι Myrepsi, seu ut quidam vertit, Umbilici marini rectè à Pharmicopæis nonnullis dicantur, dubito.

Putat enim interpres lapides intelligi exiguos & candidos, in littore maris repertos, umbilicum hominis referentes abstergendi facultate præditos, quos alii fabas marinas dicunt. Cordus Dentalium nominavit. Ennius fortè, citante Apulejo, *Matriculos* Mutianus apud Plinium *Muricem*. Nec aliud quid sibi χοιρίων Græc. l. 9. c. 25. corum volunt, quamvis eas Aristoteles præterierit. Expresse enim, eas Conchas marinas, quibus utebantur Athenis ante calculorum usum inductum, Scholiastes Aristophanis vocat: ne dicam, Pollucem quoque idem attestari. Galli *Porcellanas* appellavere, seu à quadam oris suilli specie, ut Gesnero placet, quam parte sui inter labra denticulata dehiscente, vel potius altero extremo testæ, nempe acutiorē & eminentiorē, rostri suilli instar, quodammodo referunt: ἡ δὲ τῶ μορίου γυναικίῳ πῶς εἰκέναι: τῇ τε μεταξὺ τῶν χειλῶν ὁρᾷ: καὶ τῇ ἐνδοτέρῳ κοιλότητι τῇ μητρὶ. Sane nutrices apud Varronem maximè naturam quâ sceminæ sunt, appellant Porcum, & Græci, eadem significatione Chæron five Delphaca. Uterinos etiam calculos, qui hoc genere minores sunt, vulgus Germanorum appellat. Minimam aliqui Corvinam aut Corviolam dixere.

Descriptio si attendatur, Latior est, Descriptio. secundum Mutianum purpura, neque aspero, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice concha, utroque se latere colligente. Testam omnibus admodum duram esse vel inde agnoscas, quod nunquam eam arrosam comperias. Tota intus candida est, foris colorum varietate insignis, in diversis conchis, politissima & æquabilis. Osipfi est in ambitu denticulatum, inque eius lateribus canales breves, per quos linguam exerit. Plura in Differentiis.

Vsum

Vsum in quibusdam concha sola invenit. In pillulis de bdellio adalvum stringendam reperitur: quamvis Monachi Mesues interpretes matrem perlar. supponi jubeant. Turcæ & Cairi incolæ quomodo eis utantur, superius diximus. Galli ad suspendendas claves & conficienda cochlearia utuntur. Æthiopibus loco monetæ infervit. Ideo in tanto apud eos precio, & sæpe aurum pro ea permutent, sæpe filios suos vendant. In Concha maiore faciem sculptam & pulchrè expressam se vidisse, Gesnerus testatur.

Differentia. *Differentias* Concharum plurimas apud Rondeletium, Gesnerum & Aldrovandum invenies. Rondeletius quatuor habet.

Prior ovi est figura, in testæ extremo utroque foramen habens, alterum cibi gratia parum prominens, alterum ad excrementa rejicienda. Remoram Mutiani esse credit.

Secunda, testa est tenuiore & magis perspicua, varia quoque, & pro maculis inspersis lineolas habente, Concha simplice utrinque sese colligente.

Tertia parte plana compressa magis est, maculis rotundis notata, durior secundo, colore candido.

Quarta, parte altera est in tumorem elata, in qua circulus aurei coloris. Alioqui tota foris est candida, intus cærulea.

Gesneri ruffa maior & minor non multum à Rondeletii abeunt. Illa nusquam inniti potest nisi parte plana quæ candida est, ut intus quoque gibba, quæ hæmisphærium constituit, ruffa, maculis nigris distincta. Lavitate ita resplendet, ut imagines reddat, sed obscurè. Minoris dorsum in summo varium est, albis, pallidis, & glaucis maculis. Pars interna candicat.

Aldrovandus, tredecim species, si non plures ponit, ex quibus una tota ex ruffo candicat, & maculis per totum dorsum oblongis & ferrugineis aspergitur: alia lutescebat primò

& maculis purpureis ornabatur, in humido detenta pallidior evasit, postquam superioris corticis cuticulam exuisset. *Tertia* maculis per dorsum aterrimis rotundis & inæqualibus tingeatur. *Quarta* subpurpureis, amethystinis & cæruleis. *Reliquas* ibidem vide. Nos hic tres depingi curavimus. Quam Lusitani & Æthiopes Buzios dicunt, undique alba est, nisi quod in dorso lineæ binæ flavent, in ovalem ferè speciem coniunctæ, & dorsum ipsum inæquale quàm cæteris & gibbosum, ita ut illi quoque testa incumbere possit, sed obliquè. Pars interior è roseo ad cæruleum redit.

Huc *Concham Persicam* & *Penicillos* refero. Illa à loco nomen sumsit. Est maiore sui parte rubicunda, cætera candida. Margaritas proferre proditur. Minor tota cinericii coloris est. Tubulos testaceos *Danivillos* ex Aldrov. l. 2. c. 84. centiorum nonnulli vocavere. Mollis quadam & laxa substantia saxis aligantur, ita ut aquarum undis cedat & agitetur. Cum id carnosum, quod nimirum intus latet, se exerit, frondem expandit, sunt & in quibus vermes delitescunt, quorum sex Icones hic damus.



HISTO-

HISTORIÆ NATURALIS

De Exanguibus Aquaticis

LIBER IV.

De Zoophytis sive Plantanimalibus.

CAPVT I.

De Urticis.

TAB.
XVIII.
Aldrov. l. 4.
c. 1.
Nomen.



Urtica Exanguium aquaticorum genus sunt Zoophyta, quæ Aristoteles τὰ ἐπιμφορεῖ-ζοντα φύτῳ καὶ ζῳῳ, seu ambigenti plantæ &

animali ut Budæus & Gaza vertunt, appellat.

Talia verò sunt, *Urtica*, Pulmo marinus *Holothuria*, *Tethya*, *Malum granatum*, *Fungus*, *Pyrus*, *Mentula marina*, *Penna marina*, *Vua marina*, *Malum insanum marinum*, & *Manus marina*.

Urtica, ab urendo Latinis dicuntur, quòd manum urere videantur, si ea tangantur. Græcis ἀκαλίφαι, seu quam ἀπολέσσαι τὴν ἀφὴν, id est, sensum corrumpentes, seu tanquam ἀπέλαι τῇ ἀφῇ id est, tactui molles ac lenes, sed per antiphrasin, asperæ quippe sunt & infestæ, dicuntur. Vocantur & κνίδαι, ὅτι κνίζειν, hoc est, δηγμὸν καὶ κνησμὸν τινὰ ἐμποιεῖν τῶν ἀπτομένων χερεί, *morsum aut pruritum excitare tangentium manibus*: nec non μετεῖδια, à similitudine quàm cum muliebri pudendo habent: *Colyzenæ* quoque à modernis, quòd colis, id est, pedunculis suis, Polypor. more firmiter adhæreant. In Italia *flamma maris*, apud Trottulā, *Carnes marinae* dicuntur. Iovio *urticæ* & *vertibuli* haud sine errore iidē sunt.

Descriptionem generalem si species, Descri-
os in medio habere, quod in maiori-
bus evidentius esset prodidit. Arist. H. A.
stoteles. Excrementa nulla in iis cer-
nuntur, & hac re stirpib. sunt similes. l. 8. c. 2. &
Summa tenui fistula reddi, apud Plin. H. N.
nium legimus. l. 9. c. 45.
Locus.

Diversa diligunt *Loca*, & in variis Arist. H. A.
generantur. Quædam enim nun-
quam absolvuntur, sed saxis semper
adhærent, reliqua quæ vagantur, lit-
toribus & planis locis gaudent. De
saxo, quasi de testa vivunt, & præna-
tantes pisciculos excipiunt retinent-
que, Plinius carne vesci scripsit. I-
dem *Urticis gignendi* modus qui te-
sta inclusis: per rimas enim, & caver-
nas, & fauces saxorum oriuntur, ut
tradit Philosophus.

De *Natura* earum ita Plinius. Con-
trahit ergo se quam maximè rigens, *Natura*.
& prænatante pisciculo, frontem suā Plin. H. N.
spargit, complectensque devorat. l. 9. c. 45.
illas marcenū similis, & jactari se pos-
se fluctu algæ viæ, contactos attrita-
que petra scalpentes pruritum (*Dale-*
champsius legit, petras scalpentes
obpruritum) invadit. Eadem nocte
pectines & Echinus perquirat: dum
admoveri sibi manum sentit, colo-
rem mutat & contrahitur. Tacta u-
redinem mittit, paulumque si fuit in-
tervalli, absconditur.

Comēdebatur olim, ut nunc etiā: *Vfus*.
quoniam Pythagoras abstinere di-
scipulos iusserit, vel quòd Veneris sti-
mulos afferre diceretur: vel quod
Hecataæ sacra esset. Ab Aristotele
post æquinoctium hyemale magno-
pere laudatur. Arist. H. A.
Hoc tempore pluri-
mas ligneo veru transfixas, & ali-
quantulum aflatas, primum ex sale &
aqua fervefaciunt: deinde farinā
conspargunt, & ex oleo vel butyro in
sartagine frigunt. Secundum Xeno-
cratem gratæ sunt ori, sed stomacho
admodum insuaves: (*Diphylus* ta-
men ἐν σαρμάχῃς facit) sed aflatæ elixis
accommodatiores. Alvum cient,
urinamque magis movent. Cum
passio aut vino mulso facilè conco-
quuntur & excernuntur. *Medicinam*
si attendas, aiunt in vino potas cal-
culosis prodesse, ut author est Gale-
nus.



Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

Verrea Conchata Willm.

nus. Cum aceto scyllitico pilothrum constituit.

Differentia. *Differentias* varias apud auctores invenias. Aristotelialia sunt corpora parva, quæ cibo aptiores: alia maiusculo duroque. Alia sinuosis adhærent quæ nunquam à faxis absol-

Arist. H. A. l. 5. c. 16. & l. 6. l.

Athen. l. 3. vuntur: alia plana littora amant, quæ suis abiuncta sedibus vagantur. Idem apud Athenæum habetur. Secundum Rondeletium, Alia faxis vel cuilibet rei alteri adhærent; alia minime. Rursus earum quæ faxis vel alteri rei hærent, alia perpetua stabili- que sede illic degunt, quæ sunt Urtica parva in rimis saxorum latitans: quæ Purpuris & Buccinis adnascitur: quæ cinerea est, longisque cirris constans: Alia sedes mutant, & liberè per mare feruntur natantque, ut, purpurea urtica. Semper solutæ sunt, quas vulgò Potes appellant. Parva, juglandis magnitudinem vix superat. Tota carnosæ est, cirros breves habet, contracta recti intestini extremum refert, colore vario est. Quædam enim cærulea, alia viridis, alia subnigra, sed punctis aliquot cæruleis vel flavis vel rubris notata. Græcis καλέκωνια dicitur. Cinerem à colore nomen sortita est. Tenuis est admodum, quia frondem magnam, id est, cirros multos habet, carnis parum. In Saxorum rimis vivit: comam semper explicatam habet, nec unquam contrahit.

Utraque scopulis littoralibus, & iis potissimum marinis tractibus qui ventorum impetum minus sentiunt, tam pertinaciter inhæret, ut nisi primo impetu divellatur, vix postea nisi in frustra concisa dirimi possit, adeò suas trichas arctissimè contrahit. Purpurea, seu Phœnicea, Rosa quibusdam, aliis Posterol, quòd contracta recti intestini extremum cum musculo sphinctere seu podicem refert, est primæ similis, nisi quòd frondem & longiorem & copiosorem habet.

Purpuris & buccinis adnascens, partem exterioriorem habet duram & rigidiusculam, spissioreque quàm in aliis urticis, cirros brevissimos in

ambitu. In exterioribus eius partibus filum longum deducitur purpureo colore, tam jucundo tamque fluido infectum, ut cum precioso illo Purpuræ succo certet. Ideò hanc à cane Herculis demorsam fuisse Rondeletius credit. Datur & in Lepade nata, de qua Ferrantes Imperatus ita scripsit. In dorso esse sex rimas stellam æmulantes: in medio dorsi foveam parvam cum figura quadam inclusa Conchæ rhomboidi simili, sustinerique à lateribus lepadis mediante membrana continua, & cavitatem, quæ est in animali non habere aliud intermedium quàm membranam. A parte anteriore conspici fructum Lepadis instar penicilli pictoris in se revoluti.

Ad priores illas referri Bellonii possunt, quarum quædam rubro colore suffusa est, altera magis cærulea, granulis in gyrum circumfessa. Utraque marinum tuber contracta refert, explicata Cæsariem totum corpus rotundum ambientem: nam infinitis cirris, antennarum papilionibus, aut scarabæi crassitudine constat.

Huc etiam spectat Aldrovandi Contracta, Cinerea Rondeletii congener, quæ etiam faxis adnascitur, cirris tenuibus: pilei ferè forma, colore tota coccineo, excepta summitate, quæ est viridis, cum nigra rotundaque macula: & quæ ex leporis marini generis, coloris partim purpurei, partim albi.

Urtica soluta, seu Potta marina vulgi, quòd speciem quandam mulieris vulvæ repræsentet; Græcis Mongi, inhonesto etiam vocabulo, quòd, ut scribit Bellonius, partibus verendis admota, pruritus ac Venerem, imò etiam ampullas excitet, dicitur. Cum jacet, omaso similis est: cum erigitur, pulmo videtur, & adeò tanquam vitrea & lucida est, ut sine sectione interiora omnia videre possis. Suspensa, quandam Polypi imaginem gerit, nisi quod brachia tenuissima & crassissima habent. In partibus unde pedes oriuntur, quosdam meatus arenarum plenos Gyllius vidit. Formam supernè rotundam, infernè

concavam refert Maſſarius, ut Conchæ videri poſſint; Cirros ex imo emittere ad modum Polypi.

Differen-
tiæ.

Duo huius apud Rondeletium genera. Primum ita deſcribit. Pars una veluti fungoſa quædam maſſa, rotunda, cava, in medio perforata, purpurea veluti faſciola ambiente, pileum planè refert: altera parte Polyporum pedibus ſimilis eſt. Octo enim pedes habet craſſiuſculos, extremis partibus quadratos, in acutum deſinentes, nullas interiores partes diſtinctas habet. Corpore eſt adeò pellucido & ſplèndido, ut oculos offundat. Ad eam magnitudinem accreſcunt, ut pileos, quibus viatores uti ſolent, ſuperent.

Alterum, quatuor duntaxat pedes ſeu frondes habet, qui foliis acanthi comparari poſſunt: in altera parte lineæ ſtellatim diſponuntur. Huius generis illa quoque videtur, quam *Bellonius* ita deſcripſit. Mollis quidem & albus corpore cartilagineo, ac cryſtalli in morem pellucido, quod in mucorem facilè reſolvitur. Gibbâ habet inſtar dimidiatæ ſphæræ figuram, glabrâ, pollicis craſſitudine: cuius pars interna nervis rectis à medio incipientibus, quaſi ſtriis fulvi coloris in gyrum radiatur, quibus ſe diffundit & conſtringit: qua corporis commotione aquam concutit, & nunc in prorum, nunc in ſupinum effertur. Pinnarum vice pinnis tenuibus & ægrè conſpiciis in orbem communitur, ut *Lepus marinus*. Cruciformes quoque cirros, ſtriatos, craſſos, in modum ſtellæ radiatos, numero quaternas, parte interna natationi accommodatos habet: quas ut exactè conſpicias, erit in leberem aquæ ſyncerioris congiendus: qui ſi ſupinus devolvatur, multas fiſſuras in radice cirrorum oſtendet.

Os quoque habet parte prona ſitum, quo ea quæ venatur abſorbet, in quem uſum quatuor cirri ad eius latera ſubiacent, coloris ſynopidis, quaſi eius branchiæ eſſent, vel inteſtina. Hinc fit, ut intuentibus pulmonem in mari pabulandi gratia di-

vagantem, grandis videatur quaſi pituitæ globus, qui unicum tantum colorem referret, niſi rubris illis quatuor circulis ſigillaretur, & ea cruce, qua interna pars ſtriatæ eſt, diſtingueretur.

Ad primum genus referenda eſt *Vrtica ſoluta Mathioli*, quam hic damus. In fruſta diviſa, ac in mare coniecta, vivit nihilominus ac movetur: extra mare exanimis apparet. Emortua in alto mari, ac in littus eiecta, transparentis glaciei ſimilis eſt. Omnes pruritus in pudendis & uredinem in manibus movent, & acrimonia ſua Venerem extinctam & ſopitam excitant.


CAPUT II.

De Pulmone marino, & Holothuriis.


Inter Teſtacea quidem Pulmonem Tab. XIX. & marinum poſuiſſe Ariſtoteles videtur: Plinius tamen inter Zoophyta recensuit, quem nos ſequimur. Aldrov. l. 4. *Pulmo marinus* dicitur ita vel à pulmonum noſtrorum figura, vel ab eorum ſubſtantia laxa, & molli, foraminulisque plena. Kiranidis interpres Cunnæ marinum exponit, & ſic pro *Vrtica ſoluta*, ſed falſo, ſumere videtur. ^{c. 3. Arist. H. A. l. 5. c. 15.}

Sanè decoctum pulmonis commendant Medici: at *Vrticæ* ſubſtantia eſt nimis mollis, & pituitæ concretæ ſimilis, qua in aquam abit; & nec in cinerem redigi, nec in aqua decoqui, corpore aliquo ſuperſtite poteſt.


Deſcriptionem eius vix ex antiquis obtineas. Plinius per mare ferri ubi imminet tempeſtas, plurimumque die-rum hyemem portendere ſcripſit: Ephēſius verò non adhærere, ſed abſoluta eſſe, addidit. Commendantur ad pylos evellendos. In aceto putrefacto & mento aſperſæ carnes, fugam illorum facere dicuntur. Cinis alligatus egregiè profluvia purgat. Decoctus verò in aqua, calculoſis medetur, ^{Deſcriptio. Plin. H. N. l. 8. c. 35.}




Pulmo maring Mathuoli.




*Potla Marina
Vulgo prena.*





Pulmo marinus Rond.



et supina parte.



Holothurius Rond.




Holothurius Rond.

2



Thetjorum.



3



4




8



Species.




5



Varice.






7



6









Mentula Marina Rond.


Epiphrum.

Mentula Marina.




Malum in sanum Marinum Rond.

Dua marina.



Penna Marina Rond.



*Manus marina.
Meer hand.*



Meer feder.


Penna Marina alia.

Cucumis marinus. Meer Cucumbre.




Malum granatum.

Pyrum marinum Zoophyhton.



Fungus

*marinus
Zoophyhton.*





pl. H. N. detur. Lignum si eo confricetur, ar-
 132. c. 10. dere videbitur, ut sua luce faculam
 quoque vincat. Rondeletius inven-
 nit substantiam quandam saxis hæ-
 rentem, corio duro & nigro inte-
 ctam, intus mollem fungosam & fi-
 stulosam aplysiarum modo. Vel in-
 quit pulmo marinus dici potest, cor-
 pus quoddam rotundum, pilæ mari-
 næ modo, virescens, foris substantia
 filtro simile, intus totum fistulosum,
 veluti spongia aplysia. In maria aqua
 plenum est & grave: extra mare in se
 concidit, & flaccescit: in saxorum ri-
 mis delitescit & inter algas.

Alrov. l. 4. c. 4. *Holuthuriorum* nomen unde veniat,
 nescimus. Pauca etiam de iis vete-
 res. Saxis soluta esse, sed immobilia,
 asperoque corio contegi. Rondele-
 tius duas nobis icones exhibuit, cum
 his descriptionibus. Id genus, in-
 quit, quod hic proponimus, altero
 extremo obtusum est & planum, in
 quo rosæ sculptam imaginem dicas,
 circa quam sunt acetabula. Inde
 parva appendix & mollis dependet.
 Pisculentum odorem respicit, nec mi-
 nus ingratum & insuavem ac lepus
 marinus: altero extremo tenuius est;
 intus, partes omnes sunt indiscretæ.
 Altero extremo caput habere vide-
 tur rotundum, os in medio rotun-
 dum, rugosum, quod aliquando di-
 latatur, aliquando constringitur.
 Sequitur corpus crassius, aculeis
 multis rigens: videtur in caudam de-
 ficere, ex cuius utraque parte duæ
 sunt appendices pedum pinnarum-
 ve loco, sed differentes. Superior
 enim strictior est, in ambitu incisa, in
 acutum desinens, ad quam à cervice
 producta est linea; altera latior ubi-
 que. Harum beneficio motum ha-
 bere videtur, cuius prorsus expers
 est primum genus: quod aliquan-
 do acetabulis suis saxis

hæret, sed solvi-
 tur.

CAPVT III.

De Tethyis.

Tethyia seu ut Plinius vult, Te- T A B.
 theæ, veteribus Græcis τήγεια, & XIX. &
 τήγυα, modernis Sphærodoles, à sphæ- XX.
 ra sine dubio; Adriatici sinus acco- Nomen.
 lis spongiæ, quia cum premuntur,
 spongiarum instar, aquam forami-
 nibus reddant; Tarentinis, propter for-
 mam & parvos quosdam anfractus
 verticilla; aliis à colore & tumore,
 seu quod nullis fibris, ut Tuber ter-
 rena niti crediderint, Tuberæ; qui-
 busdam, quod callosa materia teg-
 antur Calli; nonnullis, sed falsò, id-
 que ex comparatione patere potest,
 Urticæ vocantur. Gaza cum Holo-
 thuriis confundit, Eustathius & Ho-
 meri scholiastes τὴ τήγεια ab Ostreis
 non distinguunt. Nicander τὰ τήγυα
 patellas feras explicat.

Aristoteles ita eas descripsit. Quæ Descri-
 Tethya sive callos speciali nomine à ptio.
 tegminis qualitate appellamus, na- Arist. H. A.
 turam inter hæc genera (Testato- L. 4. c. 2.
 rum) peculiarem sortiri notum est.
 Hoc enim solis corpus toto tegumento
 includitur, cuius durities inter te-
 stam & corium est: quam obrem mo-
 re præduri bubuli tergoris secatur.
 Adhæret id genus saxis sua testa.
 Duo à se invicem distantia foramina
 habet, admodum exigua, & visum
 vix patientia, quibus humorem acci-
 pit & reddit. Excrementum enim
 nullum in eo spectatur, quale in cæ-
 teris Ostreis, vel Echinæum, vel
 quod papaver vocatur. Dissecanti
 ea tibi primum occurret membra-
 na nervosa Carnaceo corpori ob-
 ducta.

Hac enim, corpulentum tethyi
 continentur: idque à cæteris omni-
 bus dissimile; suo in genere omnibus
 similis eiusmodi caro. Hæret hoc
 duobus locis & membranæ & corio
 ab latere: quaque hæret utraque
 parte pressius est: quibus partibus
 tendit ad meatus ipsos, qui proti-

nus per ipsum calicē extrorsum ducunt: atque hac emittit, atque exigit tum cibum, tum humorem, perinde atque si hic os sit, ille autem exitus excrementi. Atque horum alter crassior est, alter tenuior. Intus autem in parte utraque sinus dissepti, continua re pusilla quadam. In eorum altero humor inest. Cæterarum partium, quæ vel instrumenti nomine vel officio sensuum, ac ne excrementa quidem cuiusquam modi qualia in aliis sunt, quicquam habent. Et hæc quidem Aristoteles. His addit Rondeletius, non solum petris, sed & Ostreorum testis affixa esse, & in illis veluti duros tumores cerni. Ovi, addit, figura sunt aliquantò longiore. Testa extra fusca, inæqualis, rigida, intus argentea, lævis. Tethyos caro membrana alia alba involuta ventriculi formam refert, rotundam scilicet & oblongam, meatus crassior & amplior gulæ proportionem respondet: alter minor podice. Colore uterque est rutilo vel ruffo, reliquum corpus croceum.

Locus. In Ægypto nulla inveniuntur. In Smyrna præstantissima. In Oceano ad Gallicum littus sunt frequentia, Parisiisque in foro piscario sæpe Ostreorum testis adhærentia visuntur. Signantur etiam in cavernis saxorum: maximè verò in cæno & littoribus, quæ phyco algæ marina abundant. Inveniuntur & in musco marino, aut aliis in herbis foliisve marinis. Unde Plinius. Tethæ inveniuntur fugentes in foliis marinis, seu potius scopulis. Hinc Eustathius τῆς διὰ dicta conjicit à verbo θῶ, quod significat θηλάω quod & pro lactare & sugere accipitur. Fungorum verius sunt generis quàm piscium: & quia nullum viscus intus habent sed carnem uniformem, nihil de animalis natura habere videtur.

Motus. Motum & sensum qui illis inest ab interno provenire, cum multa Conchylia & Crustacea intus habeant, à quibus motus provenit, Plinius auctor est.

Vfus. Rubra cibo sunt idonea: pallida

verò aut sublutea amarulenta Mafarius prodidit. Xenocrates plurimum dare alimentum tradit, coriaque maximè eorum non confici.

Medicinam si attendamus, torminibus & inflationibus succurrere, & tenesmum dissolvere renumque vitia; in cibo sumpto lateris dolores lenire, apud Plinium habemus. Conferunt etiam ischiadicis ventrique superiori una cum ruta: item cachecticis, quorum corpus macie conficitur cum ruta & melle.

Quantum ad *Differentias* & species quatuor Aldrovandus posuit. *Prima* parte externo & interno pyri formam æmulatur, & colore est cinereo: ablataque cuticula substantia apparet densa poris exiguis, vixque visibilibus referta, per quos aqua attrahitur, & per universum corpus distribuitur. Duo grandiora habet foramina, unum oblongum; alterum rotundum; hoc alvo, illud ori respondere videtur. In his quandoque conspiciuntur Scyllari, Cancelli, & alia crustacea; item trochi, turbines & Ostreoderma.

Alter est figura mali, foraminibus duobus; rotundo, quod maius est; oblongo, quod minus. In eo Scyllarus continebatur, quæ totum ferè illius foraminis continebat interval- lum. Cauda erat revoluta.

Tertia figura est inæquali, tuberosa: foramine uno oblongo maiore, quod in opposita erat parte minore. In eo continebatur Purpura, proportionem magnitudinis Tethyi, ut etiam exterius corium penetraret.

Quarta, figura est rotunda sed inferius compressa: foramen habet tam exiguum, ut vix conspici possit. Intus, crustaceum aliquod, ut in partis superioris foramine conspicitur.

CAPUT IV.

De Mentula marina.

TAB. XX. **M**entula marina Numenio περιλιν, forte *περιλιν* τὸ περιλιν τὸ πέλιν; aliis Aldr. l. 4. c. 7. fortè Holothurium, à *πολύενδεσσι* libidini operam dare, *πολύ* genituram significat; hinc Rondeletii altera Holothuriorum species virilis genitalis speciem profert; quibusdam Halesurion, quasi *ἁλὸς ἕρως*, marina cauda, Apuleio veretillum dicitur. Albertus cuiusdam ostrei meminit, cuius species una virgam, altera vulvam præseferret. Moderni Græci Psoli vocat.

Descriptio.

A Bellonio ita describitur. Exanguie maris purgamentum est: solum vagatur. Sed ea eius natura, ut à piscibus aliis minimè tentetur, neque à quoquam in cibo expectatur. Littorale est neque alibi reperitur, quàm ubi Patellæ, Ricini, & vertibula degunt. Genitale ex hoc dicitur, quod teres sit, pedem longum, & mediocris brachii crassitudine: Distendit se & contrahit hirudinis in morem. Unde ei & nomen inditum est. Quin etiam rufi coloris est, Iners, nec nisi serpendo incedit, aspectu toroso, Nymphææ radice similitudine. Semper ad ima fidit: nunquam natat: cōtrectatumque in seipsum contrahitur, ac cornu duritiem habet, vixque acuta cuspide pertundi potest: alioqui permolle dum sua spōte movetur, suas promuscides quādo vult, exerit, atque ita constringit, ut ex pedali longitudine vix sex digitos longum appareant. Acetabulis quæ in promuscidibus habet, lapidibus hæret; in quibus plusquam quatuor millia nonnunquam annumeres. Ex anteriore autem capitis parte rursus crinitas emittit, veluti arbusculas acetabulis plenas; quibus quicquid palpat, ad os adducit, quod tam amplum aperit, ut vel integram conchulam admittat: vescitur enim o-

mni conchyliorum genere. Eius recrementa viscida sunt ac lenta, albissima, copiosa, quæ tandem induratur, ut cum fidibus de duritia nervea certare possint. Os in gyrum officulis, dentatum habet, præterea nullis ossibus alibi præditum. Ab ore gula in stomachum differtur, quomodo in Erinaceo marino dictum est; reliqua ut intestina circumponuntur in gyrum, quæ vix observari possunt.

Rondeletius duas species facit. Differentia coria duro constat. Dum vivit vitiumescit & distenditur: flaccescit post mortem. Partes internæ indiscrète sunt. Altera ex testa spissa, dura, cartilaginea, perspicua & rufo constat.

Gesnerus duas quoque à Sittardo accepit. Prior massa quædam informis erat, retrorsum ubi crassior altiorque veluti cornu parvum, rugosum, extendebatur: opposita pars humilior, in glande, foramen rubicundicoloris ostendit. Altera Epipetrum dictum, informis quoque, inæqualis, & tuberosa, multis acetabulis compacta, colore partim nigris, partim rubescens & albicans alicubi erat.

CAPUT V.

De Malo Granato, Fungo, Pyro, Penna marina, Uva marina, Cucumere marino, Malo insano, & Mannu marina.

Malum granatum, Fungus marinus, TAB. XX. & Pyrum à figura nomen sortita sunt. Illud eiusdem est cum Punico coloris. Iste cærulei; hoc eiusdem ferè.

Penna marina est pennis magnis quæ in pileis gestare solent, perquæ similis. Piscatores Itali ob extremitatis alterius similitudinem Mentulā

alatam vocant. Est enim ea pars præputio, id est, glandi similis, altera vero parte pennam refert. Pars illa crassior, quæ glandis specie est, rimas aliquot habet, quales sunt branchiarum rimæ in galeis. Quæ pennam præsentat, festucis tenuibus constat, quæ alumini scissili similes sunt: iis, substantia alia quadam tenera innititur. Noctu maximè splendet, stellæ modo, ob candorem & levorem. Pénam marinam *aliā* rubentem, lineā per medium caulem albā, fronde simili ferè, sed parte altera, quæ fronde caret longiore, simplici; nulla cum glande dissimilitudine.


Vvæ marinæ facit & Plinius mentionem dum scribit. Rerum quidem

non solum animalium simulachra mari inesse, licet intelligere intuentibus, Uvā, Gladium, Serras. Est autem oblonga quædam & informis massa, ex uno pediculo dependens. Partes internæ indiscretæ sunt, inter quas aliquando reperiuntur glandulæ parvæ. In vino putrefacta vini tædium adfert, ut Plinius prodidit.

Malum insanum marinum, & *Manus marina*, à similitudine quoque nomē obtinuerunt.

Cucumis, digiti est crassitudine & longitudine, tuberculis aliquot asperis veluti in Cucumere terrestri parvo. Partes internas indiscretas habet.

F I N I S.





I N D E X,

Quibus paginis Tabulæ piscium sunt subjungendæ.

In Historia de Piscibus & Cetis.

TABULA I.	pagina
II	8
III	12
IV	16
V	20
VI	22
VII	26
VIII	26
IX	30
X	37
XI	37
XII	37
XIII	42
XIV	46
XV	52
XVI	52
XVII	60
XVIII	68
XIX	74
XX	82
XXI	92
XXII	98
XXIII	106
XXIV	114
XXV	114
XXVI	130
XXVII	146
XXVIII	146
XXIX	146
XXX	172
XXXI	176
XXXII	178
XXXIII	184
XXXIV	190
XXXV	194
XXXVI	200
XXXVII	202
XXXVIII	204

XXXIX	206
XL	208
XLI	216
XLII	216
XLIII	218
XLIV	220
XLV	226
XLVI	226
XLVII	226

N. Tabula tres posteriores superaddita sunt, ut
iconismus piscium, exhiberetur plenarius. Ni-
mirum, quia prioribus absolutis in authorum
pervolutione, hi in Clusio, Salviano atq. Schon-
feldio occurrerunt à prioribus illis differentes,
peculiariter eos subicere visum fuit.

In Historia de Exanguibus Aquaticis.

TABULA I	pagina
II	15
III	18
IV	20
V	24
VI	27
VII	30
VIII	31
IX	32
X	39
XI	46
XII	48
XIII	52
XIV	56
XV	66
XVI	69
XVII	69
XVIII	72
XIX	74
XX	75





I N D E X

IN HISTORIAM DE PISCIBVS

ET CETIS, IVXTA SERIEM ALPHABETICAM

dispositus, in quo litera P. paginam descriptionis, T.
tabulam denotat.

A.	P.	T.		P.	T.
 Bacatuaia	202.	37	Alphestes	49.	15
Acacana	226		Ambiza	211.	
Acara	192	34	Amia	14.	3
Acaraaia	191.	34	Amilott	212.	
Acaramucus	202.	37	Ammocatus, vide Exocatus		
Acarnan	68.	38	Amore Guacu	190.	34
Acara Pinima	182.	32	Amore Pixuma	194.	35
Acara pitamba	184.	33	Amore Tinga	194.	
Acarapucus	178		Anguilla	120.	24
Acarauna	178.	32	alia		24
Acipenser Zelandicus		23	Anthias Rondelet.	53.	16
Acipenser 1	111.	23	Anthias asellis conformis Rond.		16
2		23	Anthias primus		16
3		23	secundus		16
Aculeatus marinus maior		47	tertius		16
Acus maior Oppiani	157.	15	quartus		16
Minor Bellonij	58.	15	Anthias Conger		16
Alia species	56.	15	Antacæus Rondel.	147.	25
Acus Aristotelis	56.	15	stellatus	147.	28
alia species	56.	15	Antropomorphos	209.	40
Adonis exocatus Bellonii	60.	15	Aper	10.	1
Agonus Italicus	175.	30	Aphya Cobites	77.	19
Germanicus	136.	26	Aphya Membras	77.	19
Aiereba	205.	38	Aphya Phalerica	77.	19
Alanda cristata	59.	17	Apua	76.	19
non cristata	60.	18	Apua vera	77.	19
Albula cœrulea	173.	30	Aquila	33.	9
Albula lavaretus	171.	30	Aramaca	198.	36
Albula lacustris Bezola dicta	172.	30	Araneus maior sive draco-marinus		
Albula minima	173.	30	maior	91	21
Albula nobilis		46	minor	91	21
Albula parva Gesneri	173.	30	Asellus	7	1
Albula		46	Asellus minor seu Callarias	7	1.2
Alburnus albus Saluiani	174.	30	niger	8	2
Alburnus Ausonij	159.	29	Asellus alter sive Merluccius	8	1
Alosa	105.	27	Asellus mollis	8	2
Alosa seu Clupea	105.	27	Asellus alius		2
			Asellus virescens		46
					Asel-

I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
<i>Afellus varius</i>		46	<i>Carpio Bonaci</i>		30
<i>Asper Pisciculus</i>	141.	26	<i>Catan</i>	227.	
<i>Danubianus</i>	141.	26	<i>Cataphractus</i>	114.	24
<i>Attagenus lepras</i>	44.	13	<i>alius</i>		46
<i>alius</i>		13	<i>Idem supinus</i>		46
<i>Atherina</i>	79.	17.19	<i>Catulus maior</i>	25.	8
<i>Attilus Padi</i>	146.	28	<i>Catulus seu Canicula Aristotel.</i>	25.	8
<i>Aurata</i>	70.	19	<i>Chalcis altera Rondel.</i>		30
<i>Axotott</i>	211.		<i>Chame hiatula</i>	47.	14
			<i>Chame</i>		14
	B.		<i>Chromis</i>	69.	17
B agre	204.	38	<i>Ceixupira</i>	186.	33
<i>species alia</i>		38	<i>Centrine</i>	28.	7
<i>alia</i>		38	<i>Cepola</i>	75.	15
<i>alia</i>		38	<i>Cete</i>	213.	
<i>alia</i>		38	<i>Cete admirabilis forma</i>		45
<i>Balena genera</i>	215.	41	<i>Citharus</i>	89.	20
<i>Balena vulgi</i>	216.	41	<i>Citharus flavus sive asper</i>	89.	20
<i>Balena 60. pedum longitudine &</i>			<i>Clavatus Cyprinus</i>	174.	30
<i>41. altitudine</i>		42	<i>Cobites aculeata</i>	142.	26
<i>Ballerus</i>	166.	26	<i>barbatula</i>	143.	26
<i>Barbo</i>	130.	26	<i>Cobites fluviatilis Rondel.</i>	142.	26
<i>Barbota Gallorum</i>	150.	27	<i>Cobitus</i>		26
<i>Barbus Salviani</i>		31	<i>Colia sive lacertus</i>	97.	
<i>Bezola</i>	172.	39	<i>Conger</i>	18.	4
<i>Blennus</i>	75.	19	<i>Coracinus</i>	50.	15
<i>Blennus Bellonii</i>		19	<i>minor</i>	50.	15
<i>Blica seu ballerus</i>	166.	27	<i>niger</i>	50.	15
<i>Boops</i>	84.	20	<i>Corax Rondel.</i>	98.	22
<i>Boops peregrinus</i>		20	<i>Corocora</i>	195.	35
<i>Boops Rondeletii</i>	99.	22	<i>Corvulus</i>		2
<i>Bubulca Bellonia</i>	145.		<i>alius</i>		2
			<i>Corvus Niloticus</i>	138.	26
	C.		<i>Cottus Gesner.</i>	140.	29
C amaripuguacu	196.	40.35	<i>Cuculus</i>	65.	17
<i>Camuri</i>	186.		<i>Cucupuguacu</i>	192.	34
<i>Canadella</i>	47.	14	<i>Cucuri</i>		39
<i>Canicula seu Galeus Canis</i>	25.	8	<i>Curema</i>	197.	
<i>Canis Carcharias</i>	24.	6	<i>Curimata</i>	184.	33
<i>alia species</i>		6	<i>Cururuca</i>	181.	
<i>Canis Carcharias alius</i>		6	<i>Curvata Pinima</i>	201.	36
<i>Canis Carcharia dentium series</i>		7	<i>Cynadus Alphestus</i>	49.	15
<i>Canis marinus</i>		8	<i>Cyprinus</i>	161.	27
<i>Cantharus</i>	73.	19	<i>latus Rond.</i>	165.	29
<i>Caper sive Caprifiscus</i>	110.	23	<i>alius</i>	165.	29
<i>Capeuna</i>	183.	33	<i>monstrosus</i>	163.	27
<i>Capito anadromus</i>	109.	23	<i>Salviani</i>		31
<i>Capito Ausonii seu Squalus veterum</i>	132.	26		D.	
<i>Capito fluviatilis seu Squalus minor</i>	133.	26	D elphinus prior	218.	43
<i>fluviatilis rapax Gesneri</i>	134.	26	<i>alter</i>		43
<i>Carapo</i>	193.	34	<i>Dentex sive synodon</i>	69.	18
<i>Carauua</i>	181.	32	<i>Doncella seu Iulia Salviani</i>		19
<i>Carpio</i>	171.	29			Draco

I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
<i>Draco marinus maior</i>	91.	21	<i>Guarapucu</i>	206.	39
<i>minor</i>	91.	21	<i>Guara Tereba</i>	194.	35
<i>Dracunculus</i>	93.	21	<i>Guarerva</i>	196.	35
			<i>Guaruguaru</i>	192.	34
E.			<i>Guatucupa Iuba</i>	181.	32
			<i>Guebucu</i>	203.	37
E <i>Ncrascholus</i>	78.	19			
<i>Epelanus fluviatilis</i>	159.	28	H.		
<i>Eperlanus</i>	116.	24			
<i>Erythrinus</i>	67.	18	H <i>Arengus</i>	9.	1
<i>Exos seu Ichthyocolla</i>	148.	16	<i>Hepatus</i>	48.	14
<i>Exocetus</i>	51.	15	<i>Hephetus</i>	79.	19
			<i>Hippurus</i>	11.	1
F.			<i>Hirundo</i>	64.	17
			<i>Hirundo Plinij</i>	66.	18
F <i>Aber</i>	58.	17	<i>Histrix</i>		45
<i>marinus</i>		17	<i>Holosteon Bellonii seu Ostracion Nili</i>	123.	25
<i>Fario seu Trutta</i>	125.	16	<i>Huso</i>	115.	25
<i>altera</i>	127.	16	<i>Huso seu Antacaus stellaris</i>		25
<i>Farra</i>	174.	30	<i>Huso seu Antacaus Rondel.</i>		25
<i>alius generis</i>		30			
<i>Frater Hugo</i>		40	I.		
<i>Fratola seu Fiatola</i>	74.	19			
<i>Fuga seu Phycis</i>	46.	14	I <i>Abebirete</i>	206.	38
<i>Fundulus</i>	139.	29	<i>Iaguacaguare</i>	184.	33
			<i>Iaguaraca</i>	180.	32
G.			<i>Ichthyocolla</i>	148.	29
			<i>Iperuquiba</i>	209.	39
G <i>Alei genus</i>	45		<i>Iulia</i>		19
<i>Galerita</i>	40		<i>Iulis</i>	45.	14
<i>Galeus Acanthias seu Mustelus spi-27.</i>	8		<i>Iurucapeba seu Itaiara</i>	186.	32
<i>nax</i>					
<i>Asterias</i>	26.	7	L.		
<i>Galeus canis</i>	25.	8			
<i>Galeus glaucus</i>	26.	8	L <i>Acertus</i>	97.	21
<i>Galeus levis seu mustelus</i>	26.	8	<i>peregrinus vel rubri maris</i>	98.	21
<i>Galeus seu glaucus AEliani</i>	26.	8.226	<i>Lamia</i>	40.	
<i>Galeus Rhodius</i>	113.	24	<i>Lampreta</i>	117.	24
<i>Gladus</i>	15.	4	<i>fluviatilis</i>	154.	28
<i>Glanis</i>	148.	27	<i>Latus</i>	104.	47
<i>Glaucus Bellonij</i>	52.	15	<i>Lavaretus</i>	171.	30
<i>Glaucus veterum</i>	11.	1	<i>Lavaronus Bellonii</i>	80.	
<i>Gobio Battatria Salviani</i>		31	<i>Leo marinus</i>		40.
<i>Gobio capitatus</i>	140.	26.29	<i>Lepras</i>	44.	12
<i>Gobio fluviatilis non capitatus</i>	139.	26	<i>Leuciscus</i>	136.	26
<i>Gobius maior Gesn.</i>	54.	15	<i>Rondel.</i>	138.	26
<i>minor Gesn.</i>	54.	15	<i>Liparis</i>	10.	117
<i>Guacari</i>	190.	34	<i>Lota Gallorum</i>	168.	29
<i>Guacucuja</i>	207.	39	<i>Lucius</i>	159.	29
<i>Guacutufa</i>	195.	35	<i>Lumpus Anglorum</i>	40.	13
<i>Guaibi Coara</i>	188.	34	<i>Lupus</i>	103.	23
<i>Guamaiacu Ape</i>	198.	36	<i>Lupus marinus Schonfeld.</i>		47
<i>Guamaiacu Attinga</i>	208.	39	<i>Lycosthonus Baltheicus</i>		47
<i>Guamaiacu Guara</i>	207.	33	<i>Lyra</i>	66.	24
<i>Guapeiua</i>	188.200.36	32			
<i>Guaracapema</i>	187.	33	l 2		Maltha

I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
<i>Piranema</i>	178.		<i>Reversus Indicus Anguilliformis</i>		2
<i>Pirapixanga</i>	182.	32	<i>Indicus squamosus</i>	12.	3
<i>Piraguiba</i>	209.	39	<i>Rhomboides Rondel.</i>	89.	20
<i>Piratiapia</i>	185.	33	<i>Rhombus</i>	99.	22
<i>Piratia Pua</i>	197.	36	<i>Rhombus aculeatus</i>	99.	22
<i>Piraumbu</i>	191.	34	<i>levis verus</i>	99.	22
<i>Piraya</i>	189.	34	<i>Rosmarus</i>	227.	44
<i>Piscis Anthropomorphus</i>	209.	40	<i>Iuvencus</i>		44
<i>Gibbosus</i>	40.	13	<i>Vetus</i>		44
<i>Goensis</i>	60.	18	<i>Rubellius Salviani</i>		31
<i>Gutturosus</i>	210.		<i>Rutilus fluviatilis</i>	145.	2.26
<i>Innominatus</i>	202.	36			
<i>Piscis ludicrus</i>	211.				
<i>mularis</i>	211.				
<i>Remorans</i>	209.		S <i>Alar</i>		29
<i>Tauriformis</i>	212.		<i>Salmo</i>	101.	23
<i>Triangularis</i>		45	<i>Salmo Salviani</i>		31
<i>Pompius</i>	14.	3	<i>Sallemas seu Salema</i>		40
<i>Porcus supinus Salviani</i>		31	<i>Salmerinus seu Salmero</i>	155.	28
<i>Pracamo Bras</i>		40	<i>Salpa</i>	73.	19
<i>Pudiano Vermelho</i>	179.	32	<i>Sandilz Anglorum</i>	90.	21
<i>Verde</i>	179.	32	<i>Sarachus</i>	175.	30
<i>Punaru</i>	203.	37	<i>Sarda</i>	80.	20
<i>Pungitius</i>	159.	28	<i>Sarda Flandrica maior</i>	81.	20
<i>Puraque</i>	201.	36	<i>minor</i>	81.	20
<i>Pusta</i>	211.		<i>Sargus</i>	71.	19
<i>Pustes</i>	217.		<i>Sargus Aldrovandi</i>		45
			<i>Saurus</i>	97.	21
			<i>Scarus onias</i>	40.	13
			<i>varius</i>	40.	13
			<i>Cretenfis</i>		45
S <i>Qualus</i>	174.	30	<i>Sciana sive Vmbra</i>	51.	15
			<i>Scolopax</i>	10.	1
			<i>Scolopendra Cetacea</i>	221.	44
			<i>Scomber</i>	95.	21
R <i>Aia</i>	33.	10	<i>Scombrus alius</i>	95.	21
<i>Raia asperima</i>	37.	10	<i>Scorpio maior</i>	74.	19
<i>Raia Asteria aspera</i>	36.	10	<i>minor</i>	74.	19
<i>levis</i>	36.	10	<i>Scorpena</i>	75.	18
<i>Raia clavata</i>	36.	10	<i>Scorpio marinus alter</i>		47
<i>clavata alia</i>	36.	10	<i>Idem supinus</i>		47
<i>exiccata & concisnata ad formam mon-</i>		12	<i>Schilus</i>	175.	30
<i>strofi piscis volantis</i>			<i>Schrollus</i>	158.	28
<i>Fullonica</i>	37.	11	<i>Serpens marinus verus</i>	18.	4
<i>levis</i>	35.	10	<i>marinus</i>	18.	4
<i>oculata & levis</i>	35.	10	<i>marinus Norwegicus</i>	18.	5
<i>oculata Gesn.</i>	36.	10	<i>Siluri vera effigies</i>		47
<i>Oxyrrhynchos major</i>	35.	10	<i>Simia marina</i>	29.	7
<i>minor</i>	36.	10	<i>marina Danica</i>	29.	7
<i>Piscatrix Aldrovandi</i>	35.	11	<i>Smaris</i>	83.	20
<i>Piscatrix sive marina</i>		11	<i>alia</i>	83.	20
<i>minor</i>		11	<i>peregrina</i>	83.	20
<i>Spinosa</i>	37.	11	<i>Solea</i>	87.	20
<i>Raia Vndulata</i>	35.	10	<i>lingulata</i>	87.	20
<i>Olai</i>	34.	12	<i>oculata</i>	87.	20
<i>Rana marina</i>	37.	11			
<i>Remora</i>	16.	4			

I N D E X.

<i>Sparus</i>	P.	T
<i>Sphyrana sive Sudia</i>	72.	18
<i>Spirinchus</i>	55.	18
<i>Squatina</i>		47
<i>Squatino-raia</i>	39.	11.12.
<i>Stromateus</i>	39.	11.12
<i>Sturio</i>	74.	19
<i>Symagris</i>	111.	23
<i>Synodon</i>	69.	40.18
	69.	18

T	T.
<i>Tamoata</i>	182.
<i>Tania</i>	22.
<i>altera</i>	23.
<i>Tania Bellonii</i>	23.
<i>cornuta</i>	
<i>falcata Imperati</i>	23.

<i>Tabac pype</i>	
<i>Taiafca</i>	177.
<i>Tamoata</i>	182
<i>Tareira de Alto</i>	185.
<i>de Rio</i>	185.
<i>Thymallus</i>	128.
<i>Thymus Salviani</i>	
<i>Tiburonis</i>	209.
<i>Timucu</i>	203.
<i>Tinca marina</i>	9.
<i>Tinca</i>	166.
<i>Torpedo</i>	30.
<i>maculosa</i>	31.
<i>Trachurus</i>	94.
<i>Trutta fluviatilis</i>	125.
<i>altera</i>	127.
<i>Lacustris</i>	170.
<i>Thunnus</i>	12.
<i>Turdus</i>	42.
<i>eius species</i>	42.

V.	
<i>Varius seu Phoxinus levis</i>	155.
<i>Vitulus marinus</i>	221.
<i>Vmbla maior</i>	169.
<i>minor</i>	169.
<i>Vmbra</i>	51.
<i>fluviatilis</i>	130.
<i>Vranoscopus</i>	93.
<i>Vribaco</i>	196.
<i>Vtilis piscis ferram ad instar Priscis</i>	
<i>habens</i>	
<i>Vubarana</i>	183.
<i>Vulpecula marina</i>	27.

Z.	
<i>Ziga</i>	106
<i>Zygana</i>	29.
<i>Zygana seu libella altera</i>	29.

INDEX IN HISTORIAM DE Exanguibus Aquaticis.

A.	P.	T.
<i>Ratn pinima</i>	34.	9
<i>Astacus fluviatilis</i>	18.	2. 4
<i>marinus communis</i>	17.	2
<i>maior</i>	19.	3
<i>minor</i>	19.	3
<i>Astacus parvus marinus Rondel.</i>	18.	2
<i>supinus</i>		3

B.	P.	T.
<i>Alani</i>	65.	15
<i>Buccinum</i>	43.	10

C.	
<i>Amarrus seu astacus fluviati-</i>	
<i>lis</i>	18.
<i>Cancris in genere</i>	24.
<i>specie</i>	25.
<i>Cancer marinus</i>	25.
<i>Majas</i>	26.
<i>Eques</i>	28.
<i>Cordis figura</i>	29.
<i>flavus undulatus Rondel.</i>	28.
<i>fluviatilis</i>	29.
<i>Leo seu Elephantus Plinii</i>	
<i>dictus</i>	18.
<i>Cancer brachychelos</i>	29.
<i>Macrochylos</i>	29.
<i>Cancer maximus Guaja Apara</i>	32.
<i>Congener brachychelo</i>	29.
<i>Cancris parvi</i>	30.
<i>Cancellus</i>	31.
<i>Chama</i>	56.
<i>Carara Vna</i>	33.
<i>Ciecie Ete</i>	33.
<i>Ciri Apoa</i>	33.
<i>Cochlea</i>	48.
<i>Conchylum</i>	46.
<i>Concha</i>	54.
<i>Concha Venerea</i>	70.
<i>Persica</i>	71.
<i>Crustata</i>	3.
<i>Cucumis marinus</i>	78.
<i>Cunuru</i>	33.

Echinus

I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
E chinus marinus	51.	13	P Agurus	27.	56.6
			Paranacare	35.	9
			Fatella	69.16	17
F ungus marinus	77.	20	Pectines	61.	14
			Penicilli	71.	17
			Penna marina	77.	20
G uaia Apara cancer maximus	32.	9	Pholades	66.	15
Guaja alia species	32.	9	Pinna	67.	16
alia species	32.	9	Polypus	5.	1
Guaricuru	36.	9	Potiquiquia	34.	9
			Pulmo marinus	74.	19
H olothurium	75.	19	Purpura	40.	10
			Pyrum	77.	20
L eo seu Elephantis Plinij	18.2	4	S epia	9.	1
Lepas	69.16	17	Sepiola		1
Lepus marinus	12.	1	Solen masc.	66.	15
Locusta	15.	2	femina	66.	15
Loligo maior	10.	1	Squilla in genere	20.	4
minor	10.	1	specie	21.	4
			Squilla lata	21.	4
M alum Granatum	77.	20	gibba seu Crangone	22.	4
Insanum marinum	78.	20	parva	22.	4
Manus marina	78.	20	Mantis	23.	4
Maracoani	34.	9			
Mentula marina	77.	20	T amaruguacu	35.	
Mollusca	3.		Tellina	64.	15
Murex	45.10.	11	Testacea	36.	
Musculi	63.	15	Tethya	75.	19
Mytuli	63.	15	Trochi	47.	11
			Turbines	46.	11
N autilus	39.	10			
Nerita	47.	11	V CaVna	33.	9
			Vrtica	72.	18
			Vva marina	78.	20
O strea	58.	14	Z oophyta	72.	18
Ova Sepiarum		1			





BENEVOLE LECTOR.

EA est scriptorum qui longè à prælo remoti sunt, infelicitas, ut alienis & oculis & manibus, in perlustrando & corrigendo typo uti cogantur. Hinc fit, ut multa in contextum irreperant sphalmata, quæ non irreperent, si operæ ad manus essent. Non est ergo quòd mireris idem & mihi contigisse, qui per tot terrarum spacia à Francofurto remotus sum: ut verò videas me omnino dedisse operam, ne quis nævus superesset, (commata, puncta &c. huius generis excipio) en Tibi sequentem errorum catalogum. Dabimus interim operam, ut sequentes tomi, emaculatiores prodeant.

Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta	Errata.	Correcta.
p. 5. infinito	infinito	p. 31. a. eminis	geminis	accendente	accedente
p. 6. veteres, Geo-veteres prater Geo-	graphos.	b. masculis	musculis	Cryssallinum	crystallinam
graphos,	graphos.	p. 32. ea.	de ea	p. 68. b. rinula	rimula
quasi scripta	quasi in eorum	corpora	Corpore	adnotant	adnatant
illa præcipuè	ubiq; illa,	b. branchias	branchia	p. 69. b. quem cubili quem cum è cubili	venter
alii	aliis me	angustum	angustum	venter	ventriculus
p. 7. b. avenâ	arenâ	aliud	in aliud	firmatori	firmatori
p. 9. a. nationis	natationis	p. 34. b. in superiore in superiore parte	p. 71. a. ramorum ru, ramorum tutela	p. 73. b. virentes	virescentia
b. in primo	in supremo	p. 37. a. nomine	nomen	Loum	Loum
per	que per	p. 38. b. insula	insulsa	p. 74. a. in hunc piscem in hunc piscem	b. Inoos
p. 10. a. postilla	post in illa	ferina	ferini	tenia	tenue
frctificavere	fetificavere	p. 39. a. olfactu distin-	olfactui desti-	procopius	per Corpus
b. se falso	sed falso	cta	nata	p. 75. a. è strangurio-	à stranguriosis
p. 11. a. Scolopace	Scolopace	p. 39. a. ebore	ebur	sis	tum exceptum, lana exceptum
b. Locum	Glaucum	anulum	angulum	b. exentetato	exenterata
id id	id est	p. 40. a. crematis	crenatis	ad hoc	ob has
p. 12. b. eidem destinato, eadè distincta,	p. 41. a. ovi ea	b. Oniso	Oni sco	tum quod	tum quoq;
asseret	asserit	colli itur	ovum earum	imis	fetido
M. DC. LXV.	M. D. LXV.	b. Capit is	colligitur	p. 76. a. padido	ima
p. 13. a. nstigmat ur	instigantur	p. 42. b. Colli paræq;	Capit is	igne	asperso
repore	tempore	p. 43. a. fusa sunt,	Colli Paponis,	p. 80. a. à beata	quàm
p. 13. b. Capi	capti	uri	fusa est,	quem	privatim
Cordus	taridus	apurplea	aurei	p. 82. b. superbis	superius
Scordulas	Cordylas	b. sinapum	purpurea	p. 83. b. alio	allio
Auxiades	Auxidas	p. 46. b. Reges	sinapi	p. 87. b. respiciente	respiciente
p. 15. a. neq;	inq;	p. 48. b. an Bello-	Regis	p. 90. a. recensentes	recentes
passuum	passuum	niano	an compertant Bel-	in ambientibus	id ambientibus
p. 16. a. ne	nec	p. 49. a. decidius	loniano	b. multa operæ stu-	multum operæ
b. facultatis	facultas	minutum	deciduis	divq;	studiq;
que unicam	que in unicam	b. viscatur	munitum	in eo medio	in eius medio
Carinâ	carinæ	Calorem	alga	p. 92. a. venatum	Venenatum
b. indiciorum	judiciorum	p. 50. b. peculiares	vescatur	p. 95. b. arborum	abortum
p. 18. a. quibusdam	in quibusdam	easdem anni	colorem	p. 96. a. abjectu.	obiectu
Claudienus	Claudianus, ut	& Dorione	peculiaris	b. peno	penè
prodiderè	superius dictum	p. 51. b. aqua	eosdem anni	p. 101. b. certum	centum
p. 19. b. de eodem	ab eodem	p. 52. a. & graciliores	ex Dorione	p. 102. a. aque	aqua
p. 20. a. terrefacta	torrefacta	que	à qua	b. laxis	Saxis
Latini	Latinis	p. 53. b. verguni	gracilioresq;	p. 103. b. huc	hinc
liteis	luteo	tam amplis	vergunt	p. 104. a. penitendo	penetrando
albo nigris	albo & nigro	ameihistin;	tam maculis	cibati;	cibati
simillimus	simillima	o aurea	ameihystino aureo	b. Callo	collo
b. spino acuto	spina acuta	p. 54. q. nigra	nigram	p. 108. a. Nilum	Nilum
p. 21. a. flutatur	fluitant	p. 55. a. nocivis	nocivus	p. 110. a. branchijs	branchias
b. in variis	in vivariis	b. Dorycnii	dorycnii	p. 112. a. squamas	squamis
p. 22. a. Huius villam	intra huius villâ	pendent	pendunt	jugulum	juguli
quam	modicam	p. 59. a. modo	modi	summo	summe
p. 23. b. gemini	gemini lobi	p. 66. a. dicitur	ducitur		
p. 25. a. arenarum	arenearum	b. porum	parum		
p. 26. a. umbilica	umbilici	p. 67. a. omittit	emittit		
p. 29. b. mano	magno				

Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.
p.113.a.plaudens	paludem	p.156.b.Porca Maiori	Perca maior	edem	eundem
p.114.a.huius	hunc	quos	quas	p.219.a.necti	necti
b.recipit	respit	p.157.b.uvis.	ovis	b.teluere	tellure
aculei	aculeis	semiffas	semiaffas	p.220.a.motus	fatus
p.115.b.Coro	Corio	p.158.a.esset	esse	b.fortitudo	fortitudo
p.116.a.non ut	quoad	qui	quia	p.221.a.for	forum
similem	similes	p.159.a.tesina	resima	p.222.a.immisse	immisi
Belgi,cuni	Belgium	p.160.b.duo	dua	p.223.a.Cortis	horti
p.117.a.geniculo	panniculo	p.161.a.sanare	sanari	b.vasse	hassa
p.118.b.ferram	ferram	p.163.a.impotenti	potenti	p.225.b.untias latus	uncias latas
p.119.b.dispensato	dispensatori	p.164.b.distinans.	distinctus		divisum
p.120.a.fepè	fese	ob aliquo	obliquo	p.226.a.transversi	in transversini
b.minutim	munitum	p.165.a.illic quemuco	illicq, mucu	resicatum	resicatum
p.121.a.immoraban-	immolabantur	b.londriorem	longior	pradicatus	praditus
tur		latiorem	latior	p.277.a.Mystica	mysticem
p.122.a.ventris	ventis		e	b.præcebantur.	perciebantur.
p.124.b.orbem	in orbem	p.171.a.ediffere	edisse		
Niloos	Niloticos	b.contabescere	Contabescere	Reliqua, Benevolus Lector, corri-	
p.125.a.mortui	motui	p.172.b.separatur	superatur	get, si occurrerit. In Græcis	
portione	ratione	p.173.b.sapa	sinapi	interdum invenire est, & pro	
b.offa	ossa	p.174.a.Capto	Capito	ἐν ξῶν pro ζῶν: φριδία pro	
putaris	putavit	b.Capti	Capiti	φριδία: &c.	
p.126.b.hic	huc	p.176.a.litus	littus		
humatis	hamatis	pinna	pinnam	⚔ ⚔ ⚔ ⚔ ⚔ ⚔ ⚔ ⚔ ⚔ ⚔	
p.127.a.altissimæ	altissimè	sigillatur	fugillatur		
p.128.a.influvius	à fluviis	p.177.b.ditos	digitos	Errata super Exan-	
b.pulchrè	pulchris	p.178.a.pennam	pinnam	gium historiam.	
undute	uncate	b.Pranema	Piranema		
p.119.a.ist ec	isthac	Capionis	Carpionis		
b.facile	solere	calor	color		
p.132.a.Idem	eundem	p.181.a.Inruuca peba	Inruucepeba	p.3.a.μαλακία.	μαλακία.
parvum	parvum caput	Gvatacuba	Gvatucupa	p.4.a.hic.	hi.
p.133.a.altero Cerafa	altero quando	p.182.a.a.tinea	linea	p.5.a.brevieret ro-brevius & rotun-	
	Cerafa	p.184.a.branchias	branchiam	tundior	dius.
aliquis	alioqui	lajara	latere	memini.	minimi.
vafi	vafis	p.185.a.sensum	sensim	p.6.a.appetit.	appetunt.
p.134.a.argenteo	argento.	b.triangular.	triangularem	depassi.	depassere.
p.136.a.purpureis	puerperis	p.186.oeditur	vestitur.	esse.	est.
fercebatur	feribat	Capit.	Capitur	p.7.a.cambulatio.	ambulatio.
p.138.a.vocè cavit	vocitavit	Parabacu	Prabucu	p.8.c.sphicratis.	Iphicratis
c. partione	ratione	p.187.a.alius	alias	vertit.	vertatur.
p.140.a.Rh.	Rheni	b. at	&	b. quò &	que.
p.141.a.impeditu	impeu	illa	ilia	p.9.a.aquis	arcis.
Cocta	Coctos	p.188.a.fufesceentis	fufescentis	fortita est.	fortita sunt.
b.Cognominatum	cognomen	p.190.a.specus	species	b.vocant,quam.	vocant,parte
p.142.a.fluite	fluitat	p.198.a.hialius	hyalinis	p.10.a.soli suo utitur.	folia.
b.parvum	parum	p.203.b.bifecta	dissecta	p.11.a.inquit.	inquit.
p.143.b.detei	detegi	p.205.b.liula	ligula	quod sepi	quo
labo	lobo	p.206.a.superior	superiore	p.12.a.parvè.	parvæ.
p.144.b.lefo	lato	p.208.a.suffecit	fufescit	p.14.b.promittentes.	prominentes.
p.145.b.minutus	munitas	b.triangulo	triangulum	p.17.a.purpupera	purpurea.
p.147.a.portione	ratione	p.212.b.fed	sex	b.prominant.	promineant.
b.Cartilaginil	cartilagineas	p.213.a.hac	hic	Euxinio.	Euxino.
p.148.b.potum	potum	p.215.a.magnitudo	magnitudinis	quæcetera.	quo
p.149.a.vestis	vestes	falsamentario	falsamentaria	p.18.b.quas dum &	quos duo.
b.quid	quod	habeat		partis branchiis.	parvis.
p.151.b.tradit	tendit	p.216.a.horæ	horam	p.19.a.datam.	datos.
maculis	maxillis	audiri	audire	discretionēs.	dissectiones.
nullo	nulle	septem	supra	numeravit.	numeravit.
p.153.a.à Colios	à colicis	p.217.a.μυσκητον	μυσκητον	b. illius.	illorum.
gimum	nimiam	musculum me	musculum ma-	parvos.	porcos
p.154.b.maioris	maiores	nuum	rinum	p.20.a.squama.	Sequana.
quos	quas	duæ balæne	duce Balene	b. στο τῷ	τῇ
				quas etiam.	chelas etiam.

Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.
p.21.a. color.	colore.	p.39.b. foramam.	foramen.	p.52.a. lapidis constant.	lapidis modo,
eā meatu.	eo.	p.40.b. quod Plinius	quod, cum Plinius.	p.54.a. planis,	planus.
utrinq; latus. utrinq; ad latus.		cum,		gilibus,	gilyus.
Laborare.	Labracc.	p.41.a. illam floream,	illum florem,	p.55.a. quā,	quā.
b. Carrigine,	sartagine.	Testa sua	testa sue	p.56.b. conscendunt,	Conscendit,
Hipinna,	his.	b. pro detexo,	quo,	ut,	et
p.22.b. rimine,	vimine.	ωωμ.	ωωμ.	p.57.a. latenter,	latere.
ut tam	et tam.	diffore,	differre.	vasa,	vasc.
p.23.a. Icon.	Nullus apponitur.	εωδdec.	εωδdec.	Glycymeribus,	Glycymeridibus.
preguedicus.	Preguedieux.	p.42.a. sanguinis,	canis ore	b. adficiali,	aditiali
spensippe	Speusippi.	p.43.a. communes.	commune	πεγσιον	λεγειον.
b. tallele	tabelle	quē,	quod.	asperam levem,	et levem.
cancrarium.	cancrinum,	jusculis.	juscula.	p.58.a. eodem.	eidem,
p.24.a. sine.	hinc.	pro,	operiunt.	hic,	hac
b. aperica,	aprica.	operiuntur,	operiunt.	b. fidei se,	fidei viro se,
tractatione	tractione	tusos.	tusus	impleri est,	est necesse,
p.25.a. transeunt.	transeunte.	p.43.a. sistet,	sistunt,	p.59.a. si,	fic,
b. Et mares.	sunt et mares	competit.	competunt.	p.60.b. deideropoda.	gaideropoda,
plenam	plenā	b. Nonnulla,	Nonnullas,	p.63.a. nascuntur,	nascuntur piles
pilose	pilos ē	sicut,	sunt.	ciendam,	ciendam alvum,
p.26.a. quā	quē	ex Cinerem,	ex Cinerea	p.65.a. Aroteus,	Aretaus
p.27.b. Dr	De.	plenē,	planē.	b. sanorum,	saxorum,
et in levi,	et levi.	p.44.a. cotylorum,	Cotylarum,	p.66.a. manserint.	manserunt.
viridiorum,	viridiorē	b. supini,	supina,	b. Eustatufii,	Eustathio.
descripte,	descripsit.	offerent,	adferent.	simili,	similibus;
pars utroq;	utroq;	aphelidos,	ephelidas	hac,	hoc
p.28.b. aquas	aquarum;	assa,	assa,	hi quidem,	siquidem.
p.29. cum invicem,	cum se invicem,	genus,	manus,	p.68.a. unius.	uniones
p.30.b. isti in aliis,	isti nisi in aliis,	p.45.b. empyremum,	empyreuma,	p.69.b. mares,	maris.
servent vitam,	tritam.	muris.	muris.	Contundens,	contundes,
p.31.a. sine,	sinu,	p.46.a. Triplicis,	Triplices,	ex eā	et eā
p.31.b. Civada.	Civada dicitur,	Cum,	dum.	p.70.a. θαλασσιον	θαλασσιον
p.37.a. Alii.	Alia.	b. ipsi,	ipsi.	haud suo,	haud scio,
Tolline,	Telline,	eius,	Conchylī.	p.71.a. ut sape,	et saepe
Eorum quē,	Eorum alia quē.	sedentibus,	sedentibus.	p.72.a. feri quam,	seu tanquam.
et Mytuli.	ut Mytuli.	εσομειδεis.	εσομειδεis.	χερσι	χερσι
b. Bibacta,	pone ad marginem Pli.	p.47.b. tandem,	tantum,	p.73.a. Cinerem.	Cinerea.
p.38.a. emoli.	emoliuntur.	p.48.a. αωχλοις μῆ,	αωχλοις μῆ.	p.74.c. albus,	alba;
μωωδωεε.	μωωδωεε	p.49.b. Apilium,	Apitium.	p.75.b. reddant,	reddunt,
b. unicam. si ex unicam. si externa	p.50.a. raditur,	dicens,	diceret.	Continentur	Continetur.
terne eti. spectemus. Si interna	lina,	b. de mat.	Lino,	p.76.b. qva,	qvi
minutas.	minutos,		de mar,		



Copy of this vol. only

Offered by Antiquariaat Junk

Cat. 236 (1985): Hfl. 2500 = \$700

Item 29

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01169 9725